

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com














NOUVEAU MANUEL

ÞΕ

NÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

PREMIÈRE PARTIE

MANUEL DE MATIÈRE MÉDICALE

019

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX EFFETS DES MÉDICAMENTS HOMOSOPATHIQUES

AVEC INDICATIONS DES OBSERVATIONS CLINIQUES

Pul

LE DOCTEUR G. H. G. JAHR

MUITIÈME ÉDITIOS REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME PREMIER

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS LIBRAIRES DE L'ACADÈMIE DE MÉDECINE Rue Hautsfeuitle, 19.

Lendra, Maittikas, Tantel and Ges.

ą,

Matrice, Marriet-Battlether.

Droits de traduction et de reproduction réservés.


1872

4

.









AVERTISSEMENT

DE LA HUITIÈME ÉDITION.


Désirenz de donner à notre ouvrage la perfection dont il est susceptible, nous avons introduit de nombreuses modifications dans cotte huitième édition s, tout en restant autant que possible dans les limites que nous nous étions imposées et que la bienveillance du public nous obligeait de respecter.

Dans la matière médicale, plus de 20 nouveaux médicaments américains ont été ajoutés au grand nombre de médicaments dont notre précédente édition avait déjà été augmentée; mais, malheureusement, ces Remèdes américains publiés par Hale, sont lois de valoir ceux publiés par Hérixo; la plupart contiennent presque exclusivement des aris cliniques, sans pathogénésies valables, et les études pathogénésiques que quelques médecins en ont publiées nous ont paru trop fantaisistes pour prendre place dans un livre sérieux. Le lecteur trouvera cependant des indications pratiques des plus précieuses dans les extraits que nous avons donnés

(1) Manuel des médicaments homoropathiques, traduit de l'allemand 'par D. D. Roth et Petrox. Paris. 1834, 1 vol. 10-8 de xx-502 pages. — Manuel d'homoropathie, traduit de l'allemand par L. Noirot et Ph. Mouzin. Dijon et Paris, 1835, 2 vol. in-18.

Les deux premières édit.ons de ce Manuel n'étaient que des traductions de notre ouvrage allemand. La trouième édition française, que nous publiques en 1840, avait subi des changements et un rémaniement tellement considérables que nous d'unes la considérer en quelque sorte comme un nouvel ouvrage. Nous avons publié en 1855 la quatrième édition, en 1859 la cinquième et en 1861 la septième.







DE LA HUITIÈME ÉDITION.

YII

LI, BORS ices, mon les quelits n'est nt mal-Aucune ilement ne plus ccepter telques: igenceccepter quelle toutes ment : faire le leur

table
quelle
haque
a con-

table, nous avons eu surtout en vue les besoins des commençants; mais nous pensons qu'elle pourra aussi être très-utile au praticien; en la détachant du volume, on pourra l'annexer à son agenda et la consulter facilement pendant qu'on écrira ses notes. Ceci évitera l'inconvénient qu'il y aurait à porter un livre volumineux chez ses clients, sans pour cela être privé d'aide-mémoire en cas de besoin.

Enfin, nous avons de nouveau porté toute notre attention sur le Rierronne, qui, depuis la 6° édition déjà, a été littéralement refondu et augmenté d'un grand nombre d'indications précisuses, notamment pour les circollètances aggravantes et les épiphénomènes des manx de tête, des fièvres, des odontalgies, des affections gastriques, etc. Nous l'avons de nouveau rédigé d'une manière absolument indépendante du texte, dont il forme non la table, mais le supplément pour ainsi dire, ne contenant que les indications dont le praticien a besoin, et se rapportant, non-seulement au texte, mais encore aux renseignements contenus dans les avis cliniques. Nous espérons que les praticiens ne tarderont pas à s'en servir avec plus de fruit que jusqu'ici.

Voulant montrer le degré d'importance des médicaments cités dans le Répertoire, nous avons employé pour les distinguer des signes caractéristiques qui les divisent en cinq classes, savoir :

- 1º En majuscules (*ARN, p. ex.), les médicaments les plus importants de tous;
- 2. En caractères italiques acec astérisques (*arn. p. ex.), ceux que la pratique a également confirmes d'une manière assez fréquente;
- 3º En caractères italiques avec un petit rond (*arn. p. ex.), les médicaments pratiques du troisième ordre;
- 4º En caractères italiques, sans signe (arn. p. ex.), les médicaments que leur pathogénésie recommande à l'attention des praticiens;
- 5º En caractères de texte, ceux qui paraissent avoir moins d'importance que tous les autres.

Quant à cette huitième édition, nous pouvous dire que nous l'avons revue et corrigée avec tout le soin possible : le succès qu's



VOT AVERTISSEMENT DE LA HUITIEME EDITION.

obtenu ce Manuel nous y encourageait et nous y obligeait. On remarquera que nous avons fait tout ce qui dependait de nous pour rendre ce Manuel de plus en plus utile aux praticiens et pour répondre a l'attention toujours croissante que le public et les mesdecins accordent a notre art.

Depuis quelques années, de grands efforts out eté faits pour la propagation de l'hommopathie En Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Espagne, an Bresil, partout enfin, elle compte de nombreux representants; des tetes couronnées lai ont accorde leur estime et leur confiance. Plusieum nædecins d'un talent reconnu ent daigné s'occuper serieusement de la doctrine de Hahnomann, de nouveaux journaux et de nouveaux livres ont etc publiés pour la defense de nos principes. En France, l'homœopathie n'es pas en armere : a Paris même, siège des facultes et des académie foyer ardent des luttes et des rivalites, elle poursuit sa mare victorieuse : le gouvernement français s'est vu forcé de se rendr l'évidence des faits et de reconnaître, n'algré l'opposition de l'/ démic, les avantages que tons pourraient retirer de la propagde l'homœopathie. En meme temps, le public se montre at plus en plus sympathique à la reforme de Hahnemann. quelques années, et l'homœopathic tiendra partout le rang mérite.

10 octobre 1871.




TABLE DES MATIÈRES.

	ACASTERES.	★ M0	384
TABLE DES	MAILE		100
TABLES 14 ANAC Anacardium orientale, 14 ANAC Angusture vru 14 ANG Angusture vru 15 ANG Angusture vru 16 ANG ANGUSTURE ANGUSTU	, states	A Sugarate	545
14 ANAC Anacardism orientale, 12 ANG. Angusture vra 13 ANT-CRUB. Antimonium crudi	Fère de Mante	dandia triminasa	
Angeordists Originate,	ic Ecorre du Bon	ue, Sulfure a and	39
14 AMAC ARBUSTATA ANGUSTUTE	UR, ARRIBANIC C.		63
49 AMG. Angra Antinoniam Crass			(49)
42 ANG. Angustantinonian crack 43 ANT-CRUD. Antinonian crack moins 44 APIS. Apis mellifera, Abeille 45 APOC ANDR. Apocynum cann AN APOC ANDR. Apocynum cann	mellilere.	· 'a and and	
48 ANT-CRUIT Mellifere, Abeille 44 APIS. APIS Mellifere, Abeille 45 APOC ANDR. Apocynim cann 46 APOC-CAN Apocynim cann 46 APOC-CAN Apocynim cann 46 APOC-CAN Apocynim foliatim, A	Programment Change	ameticain .	
14 APIS. APOCHNICA	abinion, Change		72
45 APOC ANDR Apocynum cannot a APOC CAN Apocynum cannot a Apocynum foliathm, A 47 ARG. Argentum nitreum, A ARG-N. Armoracia rustica a ARMOR. Armoracia rustica a ARMOR. Armoracia, Armoraci	rgent d'arcent		77
46 APOC-CAN foliation of ARG. Argentum foliation of ARG-N. Armoracia rustica 49 ARMOR. Armoracia inontana, Armoracia ARN. Armora inontana, Arm	Nitrate officin	al .	77
47 ARG. Argentum nitreum, 48 ARG-N. Armeracia rustica 49 ARMOR. Armeraciantonia, Art 90 ARN. Armeraciantonian, Ar	na, Kaltor montagne		193 193
48 ARGOR, Armoracia Art	ica der monistr		. 179
			992 985 98
MILL (M. 1947)	(III). • " #1		
AND LEADING AND TOTAL MAIN	Florida Elotic	OC HIGH	40
ANAR. ARRENM Cheus, Asi	erie islingue.		40
			10
Aurana Journal of	m's linte d'ut		46
AT ATTEM. ARTHUR SHIPERICH	Bandiste .	Lord P	
98 AUR-B. Antur sulfutions 98 AUR-S. Antur sulfutions 99 BAPT. Baptina tinctoria 30 BARYT. Bargia mutialia 31 BARYT. Bargia mutialia	Carbonate de	Date of	· • • •
BAPT. Baptinia carbania	Muriale de la	ladone	minen. 4
W BARYT. Barger marialle	heliadona, bei	anya de Benjoin, 18	1
98 AUR-S. Astrata tractoria 99 BAPT. Baptanta tractoria 30 BARYT. Baryta carbonia 31 BAR M. Baryta mutiatia 31 BELL. Belledona, Atrop 33 BENZ. Benzois acidans, A 33 BENZ. Benzois deidans, A	side benzoique,		
33 BENZ. Bentheria tenightre	outh	ennile	
14 BERD. Dienstinnin, Bin	Sous-borate de		
34 BENZ. Benzois acidans. 34 BENZ. Benzois delatas. 34 BENZ. Berberia indigara 35 BISM. Biannathum, Bism 36 BORAX. Borax repeta. 36 BORAX. Bornafa, Racis	de Bounala	des bouviers	
36 BORAX Roundfd, Hart	c. Vesse-de-loup	_	
34 BERB. Bismathum, plan 35 BISM. Bismathum, plan 36 BORAX. Borar repeta 37 BOUN. Bornafa, Raciu 38 BOVIS. Becerta, Bovis 39 BROM. Broman, brot 40 BRUC. Bryonia alba, l	nr. Fanse	e Angusture	
the party Halling and Wille	THE MALE AND A PROPERTY OF		-
AND TRACE STREET, TAILED IN			
30 BRUC. Brucea antition of BRV. Bryonia alba, 14 BRV. Cactus grand 15 CACT. Caladium 40 CALAD. Calcarea car	forus. Cartus.	vénéucux :	Carbo
TI TO THE TALLARY TO	AND RESIDENCE TO A DATE OF THE PARTY OF THE	Arte C. Differenced	
12 Caladian	pointed, Carponal	ire hans	
40 BRUC. Brunnia alba, 40 BRY. Brunnia alba, 42 CACT. Cactus grand 43 CALAD. Calcarea car 44 CALC. Calcarea car 45 CALC. Calcarea 46 chaux provenant 46 chaux provenant	de l'Ecallie a ph	cebpate de chan.	
1) Change Paris Blokenan	- PUEDITOLIS		•
CALCOTT Comphora	Campure cul	tire.	
de chaux protected Ab CALCETT. Categoria Ab CANTH. Canthabia at AT CANTH. Canthabia AB CANTH. Canthabia AB CANTH. Capaicum a	tera, Chantile offic	Haje.	
O CANN. CHINES	Cantharpos de	Calenna	
AN CARTE CARREST &	HIMITIN, Charbo	n animal.	
to CAPS. Capter Carbo	animatra, Ch.	PLPOU AGEGIA.	
47 CANN. Cantharia 48 CANTH. Cantharia 49 CAPS. Capaicum a 50 CABB-AN. Carbo 51 CARB-VEG. Carbo	O failstungen		
54 CARB-VEG. Carter 54 CART-EQ. Caster 52 CAST-EQ. Caster	egut.		
DE COMPANY OF THE PROPERTY OF	·		Sate
53 CAST. CHUSTICHE	CARRIGO	arrearing character	MATCHI
		anile and one	
K6 CHA COUNTURE	Matricasa Grand	de Laterachina	*
56 CMAM. Chandred mille commune Cheldon St CHIN. Chung, China, Ch	tent may officiand	Sulfate de qu	11111
			h
59 CHIN. China, 159 CHININ. China, 159 CHININ. China, 160 CHLOR Chior. 61 Cic. Cicuta en 61 Cic. Cong, At	Chlore	Cigne d'er	in.
SA CHINA Chlor	Chentaria aq	SELICAL O.	4
			1 Rr
60 CHLOR Chlore 60 CHLOR Chlore 61 CIC. Cicuta ett 64 CIN Cimic. Cimica 64 CIN Cimata 64 CIN Cimata 65 CIST. Citus 65 CIST. Citus 65 CIST.	moise racemosa,	on de mereure .	*
On Marie Cimici	annute to	Translating.	•
63 Ctm Cinnab	dris Ciste	decité .	
64 Clina Cistus C	anducta, Clemat	The drawn	
65 Clema	Come du Let	Elic .	
63 CIMIO Cinnab 64 CINN Cistus o 65 CIST. Cistus o 68 CLEM. Ciema 68 COCC. Coccu	High road.		
65 CIST, CHUIC CON GO COCC. Coocus			



TABLE DES MATIÈRES.

R


		PA	geq,
66	COCC-CAC. Coccus cacti, Corbenille du Nopal ou Mexique		35.5
80	COPP Coffen arabica, Coffea cruda, Café era COLCH. Colchicum autumnale, Colchique d'antonne, Safran		351
70	COLCH. Colchicum autumnale, Colchique d'antorane, Safran e	tr,	
	prés, Safran bâtard COLOC Colocynthes, Coloquinie		25%
71	COLOC Colocynthis, Coloquinte		365
73	CON. Commi maculatum, Grande eiguê		265
73	CON. Commu maculatum, Grande riguê COP Coparer Balsamum, Baume de Copahu.		272
74	CORALL. Corallium rubrum, Corall rouge		272
73	CROC Crocus saturus, Safran cultivé		274
76	CROC Crocus saturns, Safran cultivé		277
\boldsymbol{n}	CROTON, Croton tiglium, Huile de croton		379
78	CUPA. Cuprum metallicum, Guivre. CUPA-AC. Cuprum acciicum, Acétate de cuivre Verdet		267
79	CUPR-AC. Cuprum accticum, Acétate de cuivre Verdet		201
80	CCPR-C. Cuprum carbonicum, Sous-Carbonate de cuivre		213
81	CYCL. Cyclamen europæum, Cyclame d Europe		293
85	DAPH. Dapline indica, Dapliné des Indes		295
83	DIG. Digitalis purparea, Digitale pourprée		297
84	DROS. Drosera rotundifolia, Drosere à feuilles rondes, Rosée	dц	
	solvil		304
85	BULC. Dulcamara, Dince-profes.		304
86	EUPHORR, Euphorbaum officiente, Euphorbe officinal		TOR
877	EL PRE Euphrasia officinales. Euphraise officinale.		310
88	FERR. Ferrum metallicum, Fer métallique FERR-M Ferrum muriaticum, Hy rochlorate de fer FLUOR-AC. Fluoris Acidem, Acide fluorique		312
8 0	FERR-M Ferrum muriationm, Hy rochlorate de fer		316
190	FLUOR-AC. Fluores Acidem, Acide fluorique		316
81	GELS: Gelseminum sempertirens, Gelsemine,		324
92	GINS. Genseng, tanseng.		320
93	GRAN. Granatum. Ecorce de la racine du Grenadier 🔒 👝		327
94	GRAPH. Graphites, Graphite. Plombagine, Mine de Pfomb	+	328
95	GRAT. Gratiola officinalis, Gratiole		335
86	GUAI Guancum officinale, Besine de Goule		336
91	HAMAM, Hamamelis virginica, Hamamelie de Virginie		338
98	HELL Helleborus majer, Ellebore noie. HEP, Hepar sulfures Fore de soufre calcaire		339
99	HEP, Hepar sulfures Fore de soufre calcaire		317
400	HIPP Hippomanes Hippomanes		847
401	BY DRAS Hydrastis canadensis		350
102	HADR Hydrocyani acidum, Aride prossique		351
103	H3 03. Hyoscyamus inger, Jusquaine	•	351
404	HIPP Hippomanes Hippomanes. HI DRAS Hydrostes canadensis HI DR Hydrocyani acadum, Aride prassique HI OS. Hydrocyanius inger, Jusquame LAT. Intropha cureas, Gros pignon d'Inde Ricind Amerique. Fig.	ደፀየ	!
	infernale		- 6.₽ 3©
405	infernale 16 N. Ignativi out tro., Feve de S. dat-Ignace		350
106	IND. Indigo, Indigofera tinctoria		365
	ton. Iodium, I de		. 2660
108	IPEC Ipecaciamha, lps rea aby		370
109	IRIS. Iris rerander, Iris d'Amerique. KAL-BI Kali bichromatienu, Bichroma e de potasse.		37 (
4 EO	KAL-BI Kale bichronatienne, Bichtonia e de petasse		371
7 11	WAR With carbonicant bonz-rathoning or balazze, Sel to fathe	٠.	
413	KAL-CH Aute chlorienni, Chloriere de potasse, Muri te oxygénie	de	
	potasse.		386
	MAL-M Kale hydriaet eva Hydriadale de palasse		387
	KALM Kalmin latifol a, Kalmie a larges femilies		380
	KREOS Kreosotum, Kreosote		. 391
116	LACH Lucheser, Venin dentaire du Trigenoc sphale à dosaeyes,		397
417	LACHY Lachmenthes tractoria, Lachmenthes		414
418	LACE, Luctura virosa, Latine vironse	•	446
	LAUR, Lauros crasus, Laurier cerise		. 420
	LED. Ledum pulnytre, Romarin sanyage		423
191	LEPT, Leptandea Loginsia, Leptandre		426
123	LYC. Lucopodium claratum, Lycopode, Pied de-Loup		. 49



TABLE DES MATIERES.

XH

	PAUKE.
123 MAGN Magnesia carbonica, Magnésie carbonatec	. 436
124 MAGN-M. Magnesia inuriation, Muristo de magnésie.	. 440
125 MAJOR, Majorani, Majoran, Marjalaine vulgaire	443
126 MANC Mancinella, Maneenillier venéneux .	454
127 MANG Manganum, Manganese	. 447
128 MEN Menyanthes trifoliata, Irelle d'eau	
129 MEPH Mephates puterius, See felide du putois	451
430 MERC Mercurius Mercure	455
130 MERC C Mercurius, Mercure Sublimé corros	ı£.
Deuto chlorure de mercure	465
132 MEZ. Mezereum, Mezéréon, Bois gentil	. 470
183 MILL. Milletologo, Millefeuslts	. 478
The state of the s	\$7es
135 Mt R. Murc e purpurea, Pourpre antique, Murex a pourpre.	479
136 MUR-AC. Mariatis acidum, Acide muriatique ou hydrochlorique	
137 NATR. Natrum carbonicum, Sous Carbonate de soade .	184
438 NATR M Natrum muriationin, Mariate de soude, Sel commun	
139 MITGL. Netroglycerman, Attroglycerme, Glonotne	. 496
140 NITH. Nitrum, Kali mitra um, Nitre, Nitrate de potasse	. 499
141 NITE-AC. Mire acidina, Acide astrique	
142 NUPH, Nuphar Intenn	300
4 9 42	. 510
144 N MOSCH Nux moschata, Noix muscade.	8.4
145 N-VOM. Nux vomica, Nois vomique	. 84
146 OLEAN, Oleander, Laurier-rose	· 설
147 OP. Oppon Oppon	
147 OP. Opium, Opium, Acide oxalique	. 17
140 PAR Paris quadrifolia, Parisette à quatre feuilles, Raisin de s	6-
nard	
450 PETR. Petroleum, Huile de pétrole	
431 PHOSPH Phosphorus, Phosphore	
152 PHOS AC Phosphore acidum, Acide Phosphorique	
453 PHYT Phytologica, épipared des Indes	
454 PLAT. Platma, Platme	
100 PLUME. Prinnount, Plontil	
188 PODOPH Podophyllum peltatum.	
156 PODOPH Podophyllum peltatum	
HOID).	
158 PCLE. Palsatilia mgricans, Anemone pratensis, Anémone des	
Pulsatelle nouvatre, Coquelourde	
158 RAN. Rannaculus bulbosus, Repodeule bulbeuse	
180 RAN SC Ranunculus sceleratus, Renoncule scelerate	
16t RAPH. Raphanus sativus, Rave	
162 RHAB Rhabarbarum Rheum, Rhubarbe	
163 RHOD Rhododendron chrysanthum, Rosage a fleurs bland	
164 RHUS Rhun toricodendron, Arbre a poison, Sumac véné	
165 RUM CR. Rumer crispus, Patience crepue	
466 RUM. Rumer patientia, Patience	
167 Rt T. Ruta graveolens, Rae des jardins	
468 SABAD. Sabaddilla, Sévadille	
470 SAMB Sambaras Marie Sambaras	
170 8 MB. Sambueus nigra, Sureau 171 8 MG. Sangunaria canadensis, Salicaire du Canada,	
172 SARRAC, Sarracinia purpurea	
178 8488. Sassaparilla, Salsepareille	
174 BEC Secale cornatum, Sergie ergold	
178 SELEN Selemma, Sciences	
178 SELEN Scientum, Scientum	
177 beneg. Senega, Polygula Senega, Polygule de un	
478 BEP Senia Senia	



AVIS ET EXPLICATIONS DIVERSES.

L -- GRORE

DANS LEQUEL ON POURRA ÉTUDIER LES MÉDICAMESTS.

A.) ORDRE DES MEDICAMENTS A ÉTUDIER.

A.) Polychrestes. — 1) Acon. bell. bry. merc. n-vom. puls. — 2) Arn. ars. cham. lach. rhus. sulf. — 3) Calc. chin. lyc. phos. sep. sil. — 4) Carb-v. dulc. hep. hyos. ipec. veratr. (24). . 24

B.) Demi-Polychrestes. — 1) Caus. cocc. fer. graph. ign. nitrac. op. petr. staph. — 2) Aur. baryt. cann. canth. coloc. con. phos-ac. spig. stram. — 3) Ant. cic. coff. kal. magn. magn-m. plat. stann. tart. — 4) Dig. dres. iod. led. natr. natr-m. n-mos. thui. zinc. (36)


D.) Médicaments dont, jusqu'ici, on a fait un usage moins étendu ou moins fréquent, — 1) Bar-m. calc-ph. camph. chel. croc. cycl. euphorb. fluor-ac. grat. laur. nitr. samb. sec. seneg. tarax. mgs. — 2) Arg. arg-n. aur-m. crotal. men. meph. nitrgl. par. ran. ran-se. stront. tabac. teucr. verb. viol-od. viol-tr. — 3) Berb. brom. bruc. calc-ph. chlor. cinn. cist. corall. daphn. fluor-ac. kalbi. merc-c. n-jugl. rum. sang. selen. — 4) Ast. aur-s. benz. calad. cast. cast-eq. croton. kal-ch. kal-h. lact. major. manc. murex. ox-ac. ther. mgs. (64)

B.) ORDRE DES ÉTUDES A FAIRE.

I Cours. — Ce qu'il y a de plus important.

 Distinction des cas camques les plus importants, pour tous les médicaments des lettres A-D.

 Distinction de ce qu'il y a de plus important dans les symptomes oénérates, y compris la PRAU, le somment, les rièvres et le monat, pour A et B.



AVIS ET EXPLICATIONS DIVERSES.

XV

3. Etude de ce qu'il y a de plus important dans les symptômes des ORGANES PARTICULIERS, seulement pour A.

4. Même étade pour B.

Même étude que celle du nº 2, pour C et D.

6, 7. Mêmes études que 3 et 4, d'abord pour C, puis pour D.

II. Couns. — Études détaillées des polychrestes a et n.

8. Etade de tous les cas celuiques, pour A et B.

9. Etudo de tous les signes des symptomes généraux jusqu'au moral,

pour A seulement.

10-13. Etudes de tous les signes des organes particuliers, successivement pour chacune des quatre collections contenues dans A. Même étude que celle du nº 9, pour B.

15-17. Mêmes études que celles des nº 10-13, pour les quatre col-

lections de C.

IIIº Couns. — Études détablées des autres médicaments, ç et p.

19-29. Mêmes études que celles du IIe cours, et dans le même ordre, pour C et D, et les collections que ces lettres contiennent. Pour la comparaison des médicaments analogues, voir la liste de ces médicaments en tête de la pathogénésie de chaque substance.

II. — DISTRIBUTION DES MATTÈRES

DANS L'EXPOSITION DE LA PATHOGÉNÉRIE DES MÉDICAMENTS.

A. Abréviation du nom du médicament. — Nome français. — Nome des auteurs qui ont publié les médicaments. — Doses usitées. Durée d'affection.

B. Antidotes du médicament, avec les substances dont celui-ci est

l'autidote.

c. Médicaments analogues, avec indication de ceux qui peuvent suivre ou préceder.


CLINIQUE, contenant une énumération des affections contre les-

quelles le médicament a été employé ou recommandé. SYMPTOMES GENERAUX, contenant les sensations prédominantes, l'état des forces, les phenomènes des systèmes nerreux, sanguin, lymphatique, osseux, etc., les accès de malaise, de conrulsion, etc., les circonstances prédominantes sous lesquelles les symptômes s'aggravent, s'améliorent, etc.

Prau, avec les lésions des organes extérieurs, ulcérations, ab-

cès, etc.

Sommen, avec les réves et les souffrances nocturnes. Fixvar, avec l'état du pouls, la transpiration, etc. Moral, avec les symptômes de l'intelligence et de la mémoire. TRTE, avec l'obnubilation, les rertiges et l'état du cuir cherelu. YEUX, avec les symptômes des paupières et de la rue.



AVIS

XVI

OBEILLES, avec les symptômes de l'onfe et les parotides.

NEZ, avec les symptômes de l'odorat et le coryza.

FACE, avec les phénomènes à la peau du front, aux lerres, aux mûchoires et aux glandes sous-maxillaires.

Dexts, avec les gencires.

Borene, avec la langue, la parole, la salire, etc.

tioner, avec le roile du palais, la luette, les amygdales, etc.

Appétit, avec les défauts du goût, la faim, la soif, les répugnances ou les appétances extraordinaires, les souffrances après les repas on à la suite de certains aliments, etc.

Estonac, avec les renvois, les nausées, les comissements et les symptômes de la région précordiale.

werne avec les ermottones de fois d

Ventre, avec les symptòmes du foie, de la rate, des aines et des glandes inquinales; ainsi qu'avec les flatuosités.

Selles, avec les souffrances de l'anus, du rectum et du périnée. Unixes, avec les affections des roies urmaires.

Parties viriles, avec les fonctions sexuelles de l'homme.

Règles, avec les symptômes des parties génitales de la femme, les mamelles, etc., ainsi qu'avec les symptômes qui se présentent chez les nourrissons.

Larrax, avec les symptômes de la toux.

Portraire, avec les symptômes de la respiration et des souffrances du cour.

Tronc, contenant les symptômes du dos, des reins, du cou, de la nuque, des aisselles et de la peau du tronc.

Bras, contenant tous les symptômes des extrémités supérieures. James, contenant tous les symptômes des extrémités inférieures.

III. - EXPLICATION DE QUELQUES EXPRESSIONS


DONT LE SENS DANS LEQUEL NOUS LES AVONS EMPLOYÉES POURRAIT ÉTRE DOUTEUX.

Note. — Il nous a paru superflu de donner ici l'explication de tous les termes dont nous nous sommes servi : les médicins les connaissent, et les autres personnes qui voudraient se servir de ce manuel peuvent les trouver dans tous les dictionnaires, mais particulièrement dans le Dictionnaire de missolae, de chirurgie, de pharmacie, des solences accessoires et de l'art vétériunire, treixième édition, revue et corrigée par E Littué, de l'Institut de France, et Cu Rosty, profession à la Ficulté de médecine de Paris; auvrage confensal la synonymie gracque, latine, au fluise, allemande, et agnos intercaleus d'une, et le glassione le ces diverses langues, illustré de 550 figures intercaleus d'une le texte, l'aris, 1812, qui beau volume grand in-8 de 1870 pages à d'une colonnes. — C'est un livre de premiera nécessité.

AGALACTIE. — Manque on suppression du luit chez les nourrices.

Augusties. — État morbide, caractérisé par des renvois et des vomissements aigres, goût acide de la bouche, etc., etc.

Anaugose et ansurone. — Perte plus ou moins complète de la vue.



ET EXPLICATIONS DIVERSES.

XVII

sans lésion organique appréciable. Quelques auteurs allemands distinguent l'Amaurose et l'Amblyopie amaurotique, en ce qu'ils n'emploient ce premier mot que pour désigner la perte de vue qui dépend d'une paralysie complète de la rétine ou du nerf optique. Le premier degré de cette affection reçoit alors le nom d'Amblyopie. Mais, en France, le mot Amblyopie ne désignant souvent que simplement cue faible ou cue trouble, nous avons préfère l'expression d'Amblyopie amaurotique, pour désigner l'amaurose commençante.

ANTEROPOPHOBIE. — État de celui qui craint et fuit les hommes.

Le Misanthrope, au contraire, les hait.

Apoplexie. — On a. dans les derniers temps, voulu employer ce mot pour designer l'Hémorrhagie cérébrale, mais c'est en forcer l'étymologie au dernier point. Le mot Apoplexie vient du grec, et signifie un état comme si l'ou était terrassé par un coup. C'est pourquoi nos ancêtres et bien des médecins allemands entendent par apoplexie, aussi bien la suite d'une forte congestion cérébrule ou d'un coup de sang, que la suite d'un épanchement de sang, ou seulement d'un épanchement sereux, et ajoutent, pour distinguer les différentes causes, les mots : Sanguine, séreuse, etc. Même les médecins français ne sont pas tous d'accord sur la définition du mot Apoplexie, car voici ce que nous lisons : - Nous entendons par apoplexie, dit M. Cruveilhier (1), un état morbide de l'en-- céphale, caractérisé par l'assoupissement, la diminution de la sensibilité des moucements colontaires, et le plus ordinaire- ment par la rareté et la lenteur des inspirations et la extesse - des expirations, ainsi que par la largeur et la rareté du pouls... Donnant trop d'attention aux épanchements sanguins, que l'on trouve si souvent dans le crane des apoplectiques, Rochoux voudrait que l'on reservat le nom d'apoptexie pour désigner l'hemorrhagie cérebrale, et qu'on ne s'en servit plus - pour designer les cas où l'on ne trouve qu'un épanchement séreux, ou même rien de particulier: si ces opinions étaieut " fondées, il vaudrait mieux bannir ce mot du vocabulaire medi-" cal et le remplacer par celui d'hémencéphale. Mais c'est vrai- ment abuser de l'anatomie pathologique que d'établir les diffe- rentes especes de maladies, seulement d'apres les traces qu'elles laissent dans les cadavres, d'ériger ainsi en autant d'affections. des particularités anatomiques, effet d'un trouble vital uni-- que. - Cela en réponse à ceux qui pourraient nous reprocher de n'avoir pas fait attention à la pathologie française, lorsque nous disons que le sens dans lequel nous avons employé le mot

^{[1} Dictionnaire de medecine et de chirurgie protiques, I aris, 1830, t. 111, p. 201, article Apoplexie — Comparez Hartmann, Therapeutique homicopathique des maladies aignès et des maladies chroniques. Paris, 1849, t, 11, p. 340 et suivantes.



AVI8

XVIII

Apoplexie est entièrement d'accord avec la définition donnée par l'auteur que nous venons de citer.

Asphyrie. - Nous avons employé ce mot comme synonyme de mort

apparente.

Bissnorshée. — Nous avons employé ce mot pour désigner tout écoulement de matière muqueuse, sans distinction de l'organe qui en est le siège.

CATARREE. -- Ce mot, employé par nous dans un sens absolu, signi-

fie *rhume de poitrine et de cervea*u.

Conques. — Nous avons constamment employé ce mot comme synonyme de douleur intestinale en général, avec ou sans diarrhée.

Déchirement, Douisiers péchirements. — A l'exemple des traducteurs de la matière médicale, nous avons employé ce mot pour rendre le mot allemand : Reissen, expression excessivement vague qui veut dire tantôt simplement douleur sans autre distinction, tantôt une douleur rive, encore plus aiguë que la douleur tractice avec laquelle elle a le plus de ressemblance. En général, c'est là une douleur plus particulière aux affections des muscles, des membranes séreuses et du périoste. La douleur appelée rhumatismale, telle que le mercure et surtout le sublimé corrosif la produisent, en causant le rhumatisme mercuriel, est tout à fait celle que le mot Reissen désigne le plus souvent; et si le mot Rhumatismal n'avait pas en même temps un sens vicieux, il n'y aurait pas eu de meilleur mot à substituer constamment au mot allemand.

Dysmenie et Dysmenorrhee. — Nous avons employé le premier de ces deux mots pour désigner l'établissement laborieux des menstrues à l'époque de la puberté; tandis que le nom de Dysmenorrhee a été employé pour désigner l'écoulement menstruel ordinaire, quand il se fait avec difficulté, avec douleur, et le plus ordinairement trop peu abondamment.

Dyspersie. — État morbide de l'estomac, caractérisé par une digestion faible, lente, laborieuse et accompagnée de souffrances.

GASTRITE. — Ce n'est jamais dans le sens de l'école physiologique que nous avons employé ce mot. C'est la gastrite des anciens que


nous avons voulu désigner par là.

MIGRANE. — Bien que ce mot désigne littéralement mal de tête semilatéral, nous l'avons employé pour désigner des céphalalgies caractérisées par des douleurs partielles, venant par accès périodiques, et étant accompagnées, dans leur plus haut degré, de romissements, besion de se coucher.

MISANTHROPIE. - Voyez Antrophobie.

Morbilles. — Maladie qu'ordinairement on désigne par le nom de rougeole, mais à tort, car ce sont deux maladies bien différentes. Voyez Rougeole.

Morriergation. - Nous avons employé ce mot pour désigner les



ET EXPLICATIONS DIVERSES.

TIT

émotions morales qui résultent d'un amour-propre biessé, et qui se caractérisent plutôt par une affliction profonde que par l'emportement et la colère.

Nerveux (Faiblesse, Douleurs nerveuses), etc. -– Le mot nerveux, joint aux mots fatigue et faiblesse, désigne un état de fatigue avec grande susceptibilité du système nerveux. — Douleur nerreuse est synonyme de nérralgie (Céphalalgie, Prosopalgie, Odontalgie, etc., nerveuses).

Paralytique. — Ce mot, joint à la dénomination de quelques douleurs, telles que déchirement, tirnillement, etc., paralytiques, vent dire que ces douleurs sont accompagnées d'une sensation de fai-

blesse paralytique dans les parties affectées.

Phynisis. — Lorsque ce mot se trouve sans aucune épithète, c'est toujours la *phthisie pulmonaire tuberculeuse* que nous avons sous-entendue. Dans tous les autres cas, nous y avons joint des épithètes, telles que phthisie laryngée, muqueuse, intestinale, etc.

Pituites de l'estonac. — Nous avons employé ce mot pour rendre le mot allemand Wurmerbeseigen, mot par lequel Hahnemann a désigné la déjection d'une certaine quantité d'eau de l'estomac, sans effort de vomissement, telle qu'elle accompagne quelquefois l'état morbide appelé *pyrosis* ou *fer chaud*. (Voyez ce mot.)

Pyrosis, venant du mot grec pur (le feu), n'a été employé par nous que pour désigner la sensation désagréable d'un brûlement à l'épigastre et l'œsophage, qu'il y ait ou non déjection de sérosités.

Reins, Maux de reins. — C'est par cette expression que nous avons rendu le mot allemand Kreusschmersen, vu que, dans le langage familier, ce mot a tout à fait la même signification que le mot français Maux des reins, mal aux reins, etc. Pour désigner les douleurs dans les reins mêmes, nous avons dit ou douleurs dans les reins, ou douleurs néphrétiques.

Sonnambulisme. — Mot qui ne veut pas désigner l'état d'une personne magnétisée ou clairvoyante, mais seulement l'état de colui qui, pendant le sommeil, se lève et fait un grand nombre d'actes

qu'on ne fait ordinairement qu'étant éveillé.

Inflammation de l'intérieur de la bouche, avec ulcé-

ration allant quelquefois jusqu'à la gangrène.

Typholdes: Fièvres typholdes. — Nous avons compris sous ce nom toutes celles qu'ordinairement on désigne sons le nom de Fiècres malignes, nerveuses, ataxiques, adynamiques, putrides, etc.

IV. -- EXPLICATION DES SIGERS

EMPLOYÉS POUR DÉSIGNER LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SYMPTÔNIES,

Les symptômes qui n'ont aucun signe sont des symptômes purement pathogénétiques, c'est-à-dire symptômes produits par l'expérimentation pure.



AVIS ET EXPLICATIONS DIVERSES

(*) L'astéresque designe les symptomes pathogenetiques qui out ete confirmes par des guerisons.

() Le zero in sique les synqtonies in les circenstances sous la presence desquels le me Leament à agi favorablement, mais qui jusqu'ici n'ent pas encore ete observes comm symptones patho-

genetiques

the trust superious a pour objet l'annuler l'indication du supre precident C'est ainsi que la va ce truit ne se treuve pas, le dernier signe d'une phrase en dernine constamin au tout le reste. Au contraire it ent ce qui vient oprès ce trait est entièrem au equivalent aux symptoms pui n'ent aucom segue, et appartient aux observations paren ent putho penetoques.

Souvent on renemitrem dans une seule phrase tous les signes;

comme, par ven ple, dans l'esuvante :


Prurit, *elancements et pressi m dans les yeue et aux paupieres enviout la nuit. Sou le voir, ainsi que le matin.

Dans to phrase, if y a labor! Prurd, el incoments et pressign qui ont che deserve tons les trois comme samplomes pathogenetopies mais dont les deux d'impris, clancements et pression, out ite en mome temps enleves par le me heament dans un cas de guerron, semme l'asteresque follandi que Mais le frait (1) superieur devant et max perspecces det it in me terips que la gaerison jusqu'i a na che locry e que jour les meur et u n pour les passpieces, your lesquales l'observation n'est que pathegenetique. Vient alors le zero () want surtout la muit, qui dit qui ces sousations, dans le cas gueri, est en hen la neit, mais qu'a cette heure-fa elles n'ent pas encire eté elserve « connaix effets path genete, ues Mais le deuxieme asteresque (*) devant le soir, dit qu'i cette dernière, épaque, ces symplais out en lon aussi bien dans le cas de guerison qu'en qualife d'effets pathogen triques. Le brisier (*) Il differential laptical cossimptimes, le maten, n'a enco eté observo que comme effet patnego actique

I es symplomes in princes en ara toes etaloques sont ordinaly ment coux qui ont eta obseev son enleves plus frequ minent les autres, mais esté listinett in n'a été faite que relativement symptemes du meme organe et lou ut in me soulement por genre des souftrances, de mani requ'une douleur par exemple eta distinguée que par rapport une natres douleurs et non par port aux autres symptomes du meme organe, et encore moi rapport a tous les symptomes du medicament. Cest ainsi q

exemple, dans la phrase suivant .

Pression, prunt et chancements aux yeux et aux paupièt le passage impaine en caracteres del ques veut dire seulem les élancements out etc observes plus frequenment que le la pression, et qu'ils ent eu heu paus frequenment aux yeu paupières.



NOUVEAU MANUEL

M

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

INTRODUCTION

1. - BUT BY COMPAGINION BE OUT OVERAGE.

Dans les deux premières éditions de cet ouvrage, nous en avons clairement indiqué le but. Il n'est nullement destiné à remplacer la matière médicale, ni à en rendre l'étude superflue; mais, au contraire, à en faciliter l'usage et la connaissance, par des résumés aussi complets et en même temps aussi concis que possible, et à donner toutes les indications pratiques que, jusqu'à ce jour, l'expérience clinique a fait connaître comme importantes pour le choix du médicament. A cet effet, nous avons mis à contribution tout ce que les ouvrages de Hahnemann et ceux de ses disciples, tant en Europe qu'en Amérique, renferment en observations pures et cliniques jusqu'aux temps les plus récents, et nous y avons ajouté le fruit de notre propre expérience et de nos expérimentations, ainsi que tout ce qui nous a été communiqué par des amis et des confrères dignes de notre confiance. Toutes ces observations, nous les avons étudiées et comparées entre elles, afin d'arriver ainsi à conservations étudiées et comparées entre elles, afin d'arriver ainsi à conservations et des comparées entre elles, afin d'arriver ainsi à conservations et des comparées entre elles, afin d'arriver ainsi à conservations et des comparées entre elles, afin d'arriver ainsi à conservations et des conservations et de conservations et de conservations et de

Hahnemann, Exposition de la Doctrine médicale homosopathique, ou Organon de l'art de guérir, traduit de l'allemand par le docteur A. J. L. Jourdan; 4º édition, augmentée de Commentaires, par le docteur Léon Simon. Paris, 1855, 10-8º. — Doctrine et traitement homosopathiques des maladies chroniques; 3º édition, augmentée, traduit par A. J. L. Jourdan. Paris, 1846, 3 vol. in-8º. — Traité de matière médicale pure, traduit par A. J. L. Jourdan. Paris, 1834, 3 vol. in-8º. — Études de médecine homosopathique. Paris, 1855, 2 vol. in-8º.



2

clure sur ce qu'il y a l'essentiel dans le caractère des medicaments. C'est ainsi que les fableaux que nons avons traces dans ce Manuel, loin de n'être qu'une computation de faits isoles et juxtaposés sont le resultat d'études serieuses et raisonnées, et l'expression la plus exacte que nous ayons pu denn r de ce qu'il maporte surtout de committre en matière medicale.

Comme c'est, avant tout, un resumé et un ouvrage pratique que nous avons voulu faire, nous n'avons pu citer, a chacune de nos indications, l'autorité qui nous determinait à l'enregistrer.


La nomenclature que nous avons employee pour designer les médicaments lest celle qui est usitée dans les pharmacopees. Nous l'avons preferee en songeant que la propart des medecins hemorepathes y sont deja accontames. Mais a la fin de cet ouvrage, nous avons denne une table de nois français, avec la concordance des noms latins, afin que ceux qui sont encore etrangers a netre terminologie pharmaceuti que arrivent ainsi a la connaître. Les medienments sont constamment ranges par order alphabetique, a l'exception de l'account, que nous avons place a la fin, et nous avons prefere mettre constamment les acides a la suite de leur base, c'est pourquoi on trouvera Mur ne, Nete ac., Phosph ac., Sulf. ac., au lieu de Acid. mar., Acid. mar., Acid. phosph., etc.

Dans la partie intitule. (linique, nous avons employe constaminent les termes scientifiques, mais dans le texte courant des symptômes, nous avens evite autant que possible toute expression pathologique, reservant ces noms pour la denomination des maladies qui se trouvent consignées en tête. Du reste, dans l'explication des termes scientifiques (Table III, 1, on trouvera aussi celle de qu'ilques mots extraordinaires, a peu usites, dont nous avons fait usage pour designer des symptomes

Dans l'ordre des symptomes ce ne sont plus les signes de la tête qui sont les primers, mais les symptomes genéraux suivis de ceux que la peau, du sommed, de la peare et du moral, et apres lesquels les autres se suivent dans l'ordre accoutume. Cet ordre est, en général, le meme pour tous les medicaments, sculement nous avons quelque fois reuni, sous une meme rubrique, deux ou trois articles contenant plu de symptemes, mais alors nous l'avons indique par les titres. Du reste, nous avons encore donne, l'able III) un aperçu de l'ordre que nous avons suivi, avec l'indication de ce que contient chaque article.

¹ Ces indications renvoient aux Aris et Explications diverses qu'on troutora en lete de ce y dume, après la Table des matieres.





11. — STÀ LES STEPPÈRES COMMERCO DANS CUY OCYPLICA.

Les éléments sur lesquels reposent les résumés de l'action des médicaments sont surtout les effets pathogénétiques, c'est-à-dire les effets produits par l'expérience pure, et nous n'y avons ajouté les indications cliniques ou les symptômes guéris, que pour sons firmer ou pour compléter les premiers.

Nous avons désigné par un zéro (*) ceux qui, sans avoir été observés comme symptômes pathogénétiques, ont cependant été guéris par un médicament, et par un *astérisque* (*), ceux qui**n**nt été observés en même temps comme effets pathogénétiques et comme indications cliniques, en laimant cans aucun signe ceux qui jusqu'ici ont bien été observés comme effets pathogénétiques, mais n'out encore contribué à ancun cas de guérison qui nous soit connu. Ainsi, chacun pourra apprécier chaque symptôme à sa juste valeur, et se déterminer suivant la conflance qu'il accorde à chacune des classes que nous venons d'établir. Quant à nous, ce n'est jamais à un seul symptôme que nous nous en tenons : c'est par le caractère général du médicament, tel qu'il résulte de la pathogénésie entière, que nous nous laissons guider dans notre appréciation des symptômes particuliers de toute espèce. C'est ce que nous faisons lorsqu'il s'agit de déterminer le choix d'un médicament : c'est ençore ce que nous avons fait en traçant les tableaux de cet ouvrage ; et c'est ce que devra faire tout médecin homœopathe qui voudra se mettre à l'abri des déceptions. Car lors même que quelque trait isolé manquerait d'exactitude dans les symptomatologies de la matière médicale de notre école, la physionomic totale, telle qu'elle résulte de l'ensemble des symptômes, n'en serait pas pour cela moim exacte que le meilleur portrait d'après nature ; et quiconque sera arrivé par une etude approfondie à en saisir le caractère vraiment essentiel, nera en pomercion d'une science que la connaissance des traits isolés ne lui aurait jamais donnée.

Pour mieur préciser la sphère d'action des médicaments, nous avons donné un nombre plus considérable de symptômes que dans les éditions précédentes. Par là, il est vrai, le coup d'œil en est devenu moins facile; mais par les observations cliniques qui se trouvent en tête, et les symptômes imprimés en caractères italiques, on aura toujours un résumé plus concis, sans pour cela être privé du reste. Il ne faudrait pas croire pourtant que les symptômes

¹ Voy. Bonurais, Effets toxiques et pathogénétiques de plusieurs médicamênts sur l'économie animale dans l'état de santé. Paris, 1815, in-8-,



marques en caractères italiques dussent fixer le choix du médicament à l'exclusion de tous les autres. Tout a une raleur sous ce rapport, mais rien n'en à d'une manière absolue. Tout ce qui est caractéristique, dans la pathogénésie d'un médicament, ne l'est que relativement aux médicaments qui n'ont pas ce symptome, et le même symptôme qui, dans telle ou telle serie de comparaisons, n'a aucune valeur distinctive, parce qu'il se trouve commun à tous, acquiert la plus haute importance des qu'on compare le médicament avec un autre groupe.

En genéral, nous avons distingué de cette maniere les phénomênes qui paraissent predominer sur les autres dans un même organe, on les sensations qui semblent se retrouver le plus souvent dans les organes les plus différents, etc. Souvent aussi nous avons distingue, entre deux effets alternatifs, celui qui parait avoir lieu le plus fréqueniment, quoique, dans presque tous les cas, l'un et l'autre de ces effets aient une importance egale. C'est ainsi que la diarrhée et la constipation dans la Noix comique, la soif et l'adypsie dans la Pulsatille, la douteur brûlante et la sensation du froid glacial dans l'Arsenic, sont les unes et les autres également caracteristiques pour le choix du medicament, lorsque le reste des symptômes convient a la maladie, ("est même un phenomène plus constant qu'on ne se l'imagine; tous les medicaments, principalement les polychrestes, qui ont quelque symptôme bien prouoncé, ont également le phénomène opposé en qualité de symptôme alternatif ; et, en géneral, on a tort de considerer l'un comme primitif. l'autre comme secondaire ou consécutif : car, en realité, l'un ou l'autre (selon les individus) peut se manifester le premier. Et ne voyons-nous pas le même fait dans un grand nombre de maladies sur generus? Le typhus, par exemple, ne produit-il pas tantot l'insomme la plus complete, tantôt un coma profond, ou bien tantôt l'hébetude, et tantôt le délire, ou encore la constipation la plus opiniatre ou la diarrhée la plus violente, surrant la constitution de l'individu qui en est atteint? La question des semblables et des contraires n'est pas dans le rapport de quelques symptômes isoles, mais bien dans l'ensemble des phénomenes et dans l'aspect général de la maladie et de la pathogénésie du medicament.

III. — SUE LES AVIS CLINIQUES QUI SE TROUVENT EN TÊTE DE CHAQUE MÉDICAMENT.

Dans les éditions précédentes, nous avions mentionné parmi les



6

avoir recours à tel ou tel medicament. Toutes les citations qui se trouvent à l'article Clinique, lien qu'elles reposent sur des faits constates, n'ont d'autre but que de consciller au medecin homeopathe d'examiner tel ou tel medicament, pour voir si, en l'examinant en detail, il le trouverait peut-etre indique. Envisager la chose sous un autre point de vue, considérer ces nous comme des indications infaillibles, et les prendre pour guides dans la détermination du choix, ce serait un abus contre lequel nous ne saurious jamais pro-tester arec assez de jarce.

IV. - SUR LES DOSES HOMEOPATHIQUES USITÉES.

Outre la pathogénésie et le résumé de cas cliniques, on trouver a en tête de chaque médicament quelques mots sur les doses usitées et sur leur durée d'action. Pour les deses usitées, nous avons indiqué celles qui se trouvent chez nos auteurs, quoique, quant à nous nous ne regardions ces chiffres que comme des ortations historiques, et nullement comme des regles absolues La question de la dilution sera toujours secondaire par rapport à celle du médicament Hahnemann empliyait, pendant quelque temps de preférence la trentieme, d'autres celles qui se trouvent dans les pharmacopées, d'autres passent d'une dilution à une autre, surt ut en cas de répétition, Le docteur Mure 'a voulu reserver l'emploi des premières (basses) atténuations aux maladies aiguês, et celui des dermères aux maladies chroniques. Nous-même, dans la préface de notre première édition 1, avions exprimé des idees semblables sur l'opportunité desdifferentes dilutions, et aujourd'hui même neus sommes en quelque norte encore de cet avis, en ce sens que, s'il y avait une distriction à frare pour la pratique, nous penserions qu'en genéral les premières attenuations conviendraient micux aux maladies dont la marche est rapide, et les dernières à celles dont les progres sont plus lents. Mais une autre qu sti m scraft de savoir si, dans les cas qui semblent exiger des atténuations plus basses (tels que quelques formes primitires de syphilis, de gonorrhée, etc.), en n'obtiendrait pas tout ce qu'in pourrait desirer, en administrant les dernières dilutions en doses réiterées, et surtout en solution dans l'eau à prendre par cuillerées. Car, quel que soit l'accreissement d'energie qu'éprouvent nos médicaments par le frottement et les secousses, il n'en est pas moins

3 Manuel d Homosopathie. Dijon 1835.

¹ Bibliotheque homosopathique de Genève.



tions : en rous abstenant de répéter ces doses jusqu's ce qu'il survienne une nouvelle indication, vous ne remarquerez pas d'aggravation plus fâcheuse que si vous aviez administre quelques gle bules des dermères dilutions, et, en tout cas, la différence ne seru nullement en proportion avec le volume relatif de la substance médicale

ingérée.

8

Changez au contraire votre expérimentation; prenez un seul globule d'une dilution quelconque, soit de la première, soit de la trentième, faites-le dissoudre dans 10, 12, 15 cuillerees d'eau, et donnez a vos malades cette solution par cuillerces · les aggravations qui en résulteront dans certains cas, et surtout dans quelques affections chronques, seront beaucoup plus fortes et bien moins faciles à combattre que celles qui surviennent a la suite d'une goutte entière même de la premiere dilution, lorsque celle-ci n'est prise qu'en une neule fors. C'est la du moins ce que nous avons cru remarquer plus de cent fois dans nos observations; et Hahnemann lui-même nous a confié que, survant sen opinion, il n'y avait pas de dose plus faible ni plus douce que 1, 2 glabules pris à la fois, tandis que ces memes globules, dissous dans une quantite d'eau et pris par cuillerées, avaient bien plus d'action sur l'organisme. Souvent, il est vrai, le mainde peut prendre pendant une quinzaine de jours, tous les soirs ou tous les matins, une cuillerée d'une solution semblable, sans qu'il en résulte aucun accident, mais souvent aussi, des que la solution est fime, il survient une aggravation d'autant plus violente que l'etat du mala le aura éte plus satisfaisant pendant le temps qu'il prenait son médicament, aggravation qui, dans bien des cas, ne cede a une nouvelle dese en solution que pour revenir ensuite avec une nouvelle intensite, agissant ainsi absolument comme des soulagements par des palliatifs ("est pourquoi, quelque salutaire et quelque preferable que sort, dans beaucoup de cas, ce mode d'administrer les medicaments a doses reitérées, il n'est cependant pas toujours applicable et demande, pour etre employé avec succès, à être basé sur des principes et sur des regles fixes. Ces règles, nous le savous fort bien, ne pourront être établies avec certitude que par la comparaison d'un grand nombre d'observations les plus opposées.

Le principe dont il faut partir, suivant nous, et conformément aux bases de notre science, pour envisager la question sous son véritable aspect, c'est que ce n'est jamais par l'action directe du médicament, mais par la Réaction de la nature que s'effectuent les guerisons véritables, durables et radicales; et de la îl résulte, comme première conséquence générale, que toute repetition de doses est au moins superflue, sison tout à vait déplacée, tant que




s'arrêter des qu'on verra survenir les premiers signes d'une aggravation.

Enfin il est encore un autre cas dans lequel on pourra répéter les doses; c'est lorsque, après un temps de mieux plus ou moins prolongé, la maladie commence a se relever, et que les symptomes indiquent encore le meme medicament plus que tout autre. Mais ces cas ne se presentent guère que lorsqu'en a donné une seule doss une fois pour toutes, ou bien plusieurs cuillerées jusqu'a aggravation, dont on a ensuite attendu les effets sans rien faire, et encors faut-il qu'on soit bien certain que l'aggravation ne cessera pas bientôt d'elle-même, avant d'avoir recours a la repétition.

VI. - DE LA DURÉE DE L'ACTION DES MÉDICAMENTS.

Ce que nous venons de dire de l'époque où la répétition d'une scule dose pourrait sembler indiquée, s'applique également au choir d'un nouveau médicament Car toute aggravation, après un temps de mieux, n'est pas toujours une aggravation naturelle de la maladie souvent, au contraire, elle n'est due qu'a une nouvelle excitation provoquée par le medicament qui agit encore, et, dans ce cas, il n'y a rien de mieux à faire que d'atten les, puisque ordinairement elle cesse sous peu de jours pour faire place à un mieux beaucoup plus prononcé. C'est ce que n'us vovons arriver fréquemment, surtout dans les maladres chromques, après l'administration d'une seule dose, une fois pour toutes. Souvent les deux et trois premiers jours sont bons, puis survient une légère aggravation qui disparait et se renouvelle alternativement pendant quelque temps; en sorte que généralement dans la promière quinzaine, et surtout dans la seconde huitaine, le nombre des jours mauvais dépasse celui des bons, jusqu'à ce qu'enfin, vers la quatrième semaine, la chose change : les jours bons l'emportent sur les mauvais, un bien-être plus durable ne tarde pas a s'etablir, et continue seuvent jusqu'à le septième et huitieme semaine, époque vers laquelle les restes de ? maladie, qui n'ont pas éte e impletement detruits, commencent reparaître. Cependant il est des cas où cette aggravation mêt n'est qu'un dernier effort de l'action du medicament, effort qui manque pas de cesser au l'out de quelques jours, laissant la maladi sinon entièrement guerie, du moins dans un etat tel, qu'on nº saurait obtenir un meilleur par aucun autre moyen. On n'ad' nistrera pas, dans de pareils cas, un médicament nouveau, a




d'être sar de ce qui va arriver; en sachant attendre et comprendre la marche de la réaction vitale, on obtiendra souvent plus en deux mois avec une soule dose d'un seul médicament, que ne pourrait faire en deux ans celui qui, par un changement continuel de ses médicaments on par une multiplication inopportune de ses doses. voudrait accélérer la guérison. Telle est l'expérience que nous avons faite bien des foje, en suivant les préceptes que Hahremann a donnés à ce sujet dans son Organos et dans le premier volume de ses Maladies chroniques; et c'est là ce que nous recommandons adrieusement à l'attention de tout médecin homosopathe. Jamais, dans une maladie elfrowique, on ne changera de médicament sans avoir observé, au moins pendant cinq ou six jours, l'aggravation qui semble l'exiger, et même celles qui surviennent quelquefois après la cessation d'un médicament administré par cuillerées decraient être traitées de la même munière, c'est-à-dire en laissant agir le médicament aussi longtemps qu'il y a encore quelque bien à en espérer.

Toutefois, quelque indispensable qu'il soit constamment de laisser un médicament salutaire épuiser toute son action, et de ne pas se laisser abuser par des aggravations momentanées, on n'hésitera pas à intervenir lorsque les circonstances le demandent, soit que le médicament donné se produise aucus effet, soit qu'il en produise de fúcheux. Le premier de ces cas se révélera an médecin attentif, lorsqu'il n'observera aucun symptôme propre su médicament, et que l'état de la maladie restera stationnaire ou s'aggravera progressirement sans s'améliorer sous aucun rapport, ne présentant que des symptômes appartenant à une période peu avancée de la maladie. C'est alors que le médecin fern bien de répéter d'abord la dose du médicament administré, jusqu'a ce que celle-ci produise un changement quelconque. S'il se prononce un mieux, fût-ce même le plus léger, on attendra en observant les alternations de bien et de mal, comme nous l'avons indiqué plus haut; si, au contraire, l'état est empiré après cette répétition, on observera si cette aggravation est salutaire ou si elle est due à un médicament mal choisi de l'action prolongée duquel on n'aurait à attendre que des résultats fácheux. Ce desnier cas sera facile à reconnaître, en ce que l'aggravation survenue, bien qu'elle soit mêlee de symptômes du médicament, n'est ni précédée, ni interrompue par aucun moment de bien-être, et qu'en même temps la maladie originaire fait des progrès dans le sens de ses symptômes généraux. Dans ce cas, le médecin devra remplacer ce médicament par un autre qui réponde mieux à l'ensemble



13



INTRODUCTION.

ninghamen , parce que, dans les faits de pure appréciation, nous ne connaissons point d'autre autorité que la nôtre.

Du reste, le principal avantage que pourrait tirer le médecin de ces indications serait de faire des études comparées de ces médicaments analogues, pour mieux établir leur point de dissemblance, et se mettre ainsi à l'abri d'une foule de déceptions qui ne manqueraient pas d'arriver, si on les confondait, et qu'on administrat l'un pour l'autre, annue, par exemple, Lachesis au lieu de Mercure. Verhirum ou China au lieu d'Arsenie, etc. Un abus déplorable de ces indications serait, au contrairé, de les prendre pour guide absolu dans le choix, et de donner des séries de médicaments analogues. sans autre raison que cette analogie, ou même de faire précéder encore le médicament indiqué par un autre qui ne le serait pas, seulement parce qu'il serait réputé plus efficace après l'usage de celuici. La loi fondamentale, pour l'emploi des médicaments, est toujours la similitude des symptômes et la nécessité de laisser tout médicament épuiser son action. Ce n'est qu'après sa cessation que 👌 l'on pourra songer à un médicament analogue, et encore faut-il que. par la comparaison des symptômes, on se soit bien convaincu de son opportunité avant de l'employer.

Dans l'article des Antidotes, nous avons indiqué aussi les médicaments, dont celui en question est lui-même l'antidote, persuadé que nous sommes que, dans bien des cas, les rapports antidotaires de deux médicaments sont réciproques, et que par les uns, on pourrait souvent subvenir aux autres. Du reste, il en est du choix des antidotes comme de celui des médicaments en général. Le meilleur antidote sera toujours celui qui répondra le mieux aux symptômes; et, en général, on fera beaucoup mieux de ne pas perdre le temps à la recherche d'un antidote, mais de faire de suite usage du médicament qui répond le mieux à l'ensemble de tous les symptômes que présente le malade. Si ce médicament se trouve faire partie à la fois et des antidotes et des affinités du premier, tant mieux; mais si aucun de ceux-ci ne convient, on s'adressera à un autre qui convienne mieux.

viir, — sur la manière de se servir de cr manuel.

Plus nous avons entendu les diverses opinions de nos lecteurs,

¹ Bonninghausen, Manuel de Thérapeutique homospathique pour servir de guide au lit du malaile et à l'etude de la maiure médicale pure, traduit de l'allemand par le docteur D. Roth. Paris, 1846, in-18, J.-B. Builbere.



14

plus nous nous semmes convaineu que tout ce qu'en pourrait dire a ce sujet ne servirait absolument à rien aux personnes qui n'auraient point des connaissances approfondies en homosopathie. C'est pourquoi nous avons écrit un traite special contenant l'expose détaille et raisonne de tous les points essentiels de la théorie et de la pratique de cette doctrine et la discussion de tous les théorèmes controversés :

" Principes et regles qui doivent guider dans la prutique de l'hommopathie. Exposition ruisonnée de tous les pointnessentiels de la doctrine de Hahnemann. Paris, 1857, 1 vol. in-8°, xvi, 528 vages. "

C'est dans cet ouvrage que le lecteur trouvera tout ce qu'il pourra déstrer, d'une manière beaucoup plus complete que nous ne pouvions la donner lei, dans les precedentes editions.


AVIS

On trouvera à la tête de chaque substance, apres le nom de l'auteur qui a publié et étudié le médicament, les abréviations suivantes:

Hist, nat. et prép. Pharm. homœop., p. 155. Ceci veut dire :

" Pour ce qui concerne l'histoire naturelle et la préparation de la substance, roy, notre ouvrage avant pour titre

* Nouvelle Pharmacoper homoropathique, on Histoire naturelle et préparation et Posologie ou administration des doses des médicaments homoropathiques, 3° edition, accompagnée de 144 figures intercalces dans le texte, Paris. 1862, p. 153. ...



MATIÈRE MÉDICALE HOMŒOPATHIQUE

ACOMITUM HAPMLLUS.

ACON. - Aconit Rapel. - HANNEMANN. - Hist. not. et prép. Pharmac. рошшор., р. 155. — Dazes usitées : 8, 24, 30. — Durée d'action : 8, 46. 24, 48 houres, suivant les circonstances.

Antidotes: Acet. visum, par.? — On l'emploie comme antidote de : Cham. coff n-vom. petroi. sull'. sep. voratr.
Companen avec : Agar. anne. ant-crud. arm. ara. asar. bell. bry. cann. canth. caus. cham. coff. colch. croc. dros. dulo. graph. hep. hyos. ipos. merc nitr. ac. n-row. op. phos. plat. puls. rut. sabin, sep. spig. spong. stram. sulf. veratr. — C'est surtout après arn. et sulf. que l'acouit se trouve quelquefeis indiqué comme remède intermédiaire. — Après l'acouit, soit qu'on l'ait donné dès l'abord ou dans le courant du traitement, on trouvers souvest convenable : Arm. are. bell. bry. cann. ipec spong. swif., etc.

CLINIQUE. — Etant indiqué par l'ensemble des symptômes, ce médicament pourra quelquefois être utile dans l'un ou l'autre cas des affections suivantes! : ... Inflammations locales aigués; Inflammations rhumatismales et arthritiques avec gonflement ; Affections principalement des personnes pléthoriques, d'un caractère rif, constitution bilieuse et nerreuse, yeux et chereux bruns ou noirs, teint fortement coloré, etc.; Congestions sanguines actives, névralgies et accès de spasmes, principalement chez les jeunes gens (et surtout chez les jeunes filles) d'un tempérament sanguin, et menant une vie sédentaire : suites fâcheuses d'un refroidissement dans un froid sec (vent d'est) ou par un courant d'air; affections

♣ NOTA En faisant ci-dessus une énumération des affections dans lesquelles on a employé on recommandé ce medicament, nous ne voulons ni justifier les noms palhologiques dont les auteurs se sont servis. Di répondre d'aucune manière de l'efficacité absolue du médicament dans ces cas. ce que nous voulons dire, c'est que, dans une affection pareille, le médecin pourrait s'adresser à ce médicament, non pour l'employer comme apécifique, mais seulement pour s'assurer, par la comparaison des symplômes, s'il y a réellement indication suffisante on non pour y avoir recours. Agir autrement, ce serait non-seulement le meilleur moven de ue jamais obtenir aucune guérison, mais ce serait aussi faire l'abus le plus déplorable de mos citations, alias contre lequel nous protestons ici une fois pour toules, et pour tous les medicaments on nons avons donné une enninération paréille.




10

par suite d'une frayeur ou d'une colère. Accès de convulsions; Tétanos?; Trismus?. Accès d'évanoussement; Accès de catalepsic?, Brulures. Eruptions miliaires. Miliaire pour prée: Roscole; Rougeole: Periode eruptive de la petite verole, Inflummations érysopelateuses; Eruptions urticaires; Fierres inflammatoires. même avec symptômes bilieux ou nerveux. Fièvre catarrhale avec un caractere inflammatoire: Somnambulisme?; Somnolence comateuse't; Alienations mentales arec idees fixes d'une mort prochaine; Congestions cerébrales arec vertiges; Apoplexie sauguine; Céphalalgies congestires, catarrhales, nerveuses, etc.; Migraine; Encephalite: Hydrocephale aigue, Ophthalmics aigues, même celles par l'introduction de corps étrangers; Prosopulgies et odontalgies congestives ou nerveuses. Angines aigues phlegmoneuses ou catarrhales, Angine scarlatine, Dentition difficile avec fièvre; Souffrances bilieuses. Vomissement des femmes enceintes ou hystériques, Vomissements de vers. Hematemèse: Ictère, Hépatite; Enterite, Peritonite; Orchite, à la suite d'une gonorrhée, Metrorrhagies et regles trop copieuses par suite de plethore: Peritonite puerpérale; Metrite; Flueurs blanches; Hernies mearcérées; Catarrhe erdinaire et gruppe dans la periode inflammatoire: ('roup, première période : Coqueluche, première période ; Acres d'asthme congestif; Asthme de Millar; Laryngite et bronchite aigues, Pleuréme : Pneumonie : Hémoptysie : Affections de cœur , Palpitations, etc.

SYMPTOMES GENERAUX. - *Douleurs lancinantes oou rhumatismales qui se renouvellent par le vin ou autres causes echauffantes. - *Souffrances qui, principalement la nuit, paraissent insupportubles, et qui pour la plupart, disparaissent dans la position assise. * Acces de douleurs avec sonf et rougeur des joues. - . *Sensibilité doubureuse du corps et surtout des parties malades a tout mouvement et au moindre contact. Douleur de meurtrissure et sensation de lourdeur dans tous les membres Tiraillement avec faiblesse paralytique aux bras et aux jambes. --Manque de force et de solidite, douleurs et craquement dans les articulations, principalement des jambes. Chute rapide et gene-*Acces d'ecanouissement, principalement ense rale des forces redressant de la position conchee, cet quelquefois avec congestion de sang a la tête, *bourdonnement des oreilles, opileur mertelle du visage et frissonnements. * Malaise comme par suite d'une transpiration suppriméeou par suite d'un refroidissement, avec mal a la tete, bourdonnement des oreilles, coliques et rhume de cerveau. Sensation de froid et de stagnation du sang dans tons les vaisseaux. Secousses dans les membres Acces cutaleptique avec cris, grincement de dents et loquet. Gonflement et conleur noirâtre de tout le corps.






Penn. — Formication à la penu, avec prurit et desquamation, principalement aux parties malades. — *Peau sèche et brûlante. — *Gonfiement et chaleur brûlante des parties blessées. — *Couleur jaunaitre de la peau. —Élancements avec sensation d'excoriation par-ci par-là. — Taches semblables aux piqures de puces, aux mains, à la figure, etc. — *Petits boutons rouges et larges svec prurit brûlant. — *Miliaire pourprée. — *Rougeole.

lerges svec prurit brûlant. — Miliaire pour prée. — Rougeole.

Summeil. — Grande envie de dormir, parfois en se promenant, et principalement après le diner. — Somnolence avec révasserie anxieuse et respiration rapide. — *Révasseries et idées confuses, ayant les yeux fermés sans dormir. — *Insomnie par anxiété, avec agitation et jactation continuelles. — *Sursauts pendant le sommeil. — Rèves anxieux avec cauchemar. — Rèves avec une sorte de clairvoyance. — Sommeil léger. — *Impossibilité d'être couché sur le côté. — En dormant, on est couché sur le dos, la main sous la tête, ou dans la position assise, la tête penchée en avant.

Plèvre. — *Chaleur sèche, ardente, avec soif extrême précédés quelquefois (principalement au début de la maladie) de frissons avec tremblement. - *Chaleur principalement à la tête et au visage, avec rougeur des joues, horripilation par tout le corps, mal de tête pressif, humeur pleureuse, plaintive et contrariante; ou sensation de chaleur par tout le corps, avec rougeur des joues, mal à la tête en tournant les yeux et galeté folàtre. — *Frissons pour peu que l'on se découvre pendant la chaleur. - Froid par tout le corps avec chaleur interne, front chand et lobes d'oreilles chands; on *avec rougeur des joues et douleurs dans les membres; ou avec roideur de tout le corps, chaleur et rougeur d'une joue et froid et paleur de l'autre, yeux ouverts et fixes, pupilles contractées et se dilatant difficilement. — Froid et frissons aux doigts, suivis de crampes aux mollets et aux plantes des pieds. Chaleur du visage avec tristesse, exaspération et envie de vomir, précédée de froid et de frissons aux pieds et aux mains. — Chaleur générale arec face pâle. — Horripilations fréquentes avec chaleur ardente et sèche de la peau. — Sueur continuelle, surtout des parties couvertes. - Sueur acide. - Pouls dur, fréquent et accéléré.

Moral. — *Grande agitation et jactation avec angoisse, exaspération inconsolable, cris, pleurs, gémissements, plaintes et reproches. — *Appréhensions et crainte d'une mort prochaine. —
Pressentiments comme en état de clairvoyance. — Anthropophobie et misanthropie. — *Grande disposition à se fâcher, à
s'effrayer et à se quereller. — Le moindre bruit, même la musique, paraît insupportable. — Humeur changeante : on est tantôt
triste, accablé, contrariant et désespéré; tantôt gai, excité, plein
d'espoir et disposé à chanter et à danser. — *Accès alternatifs
de rires et de pleurs. — *Inquiétude sur sa maladie et désespoir



de la guérison. — Peur de spectres. — *Dispositions à s'enfuir de son lit. — Esprit comme paralysé, avec impossibilité de réfléchir, et sensation comme si toutes les fonctions intellectuelles s'accomplissaient dans la région précordiale. — Accès de manie et de folie. — Instabilité des idées, —*Délires principalement

la nuit. - Faiblesse de mémoire.

18

Tôte. -- Tête entreprise au front comme si le cerveau était bouché. principalement à la chaleur de la chambre. - Vertiges, surtout en se redressant, ou bien en se relevant de son siège, en se baissant, en remnant la tête, et souvent *avec sensation d'ivresse ou tournoiement à la tête, perte de connaissance, obscurcissement des yeux, nausées et sensation de faibleme au croux de l'estomac. - *Sensation comme si le cerveau ballottait dans le crane, augmentée par le moindre mouvement, et même en parlant et en buvant. - *Mal à la tête avec envie de vomir et vomissement. Tête commo brisée avec sensation de brisure dans les membres. - *Douleur stupéfiante à la tête avec sensation de compression et de constriction crampoldes, principalement au front et 🛒 à la racine du nez. — *Pesanteur et plénitude au front et aux tempes, avec pression expansive comme si tout alluit sortir par la, principalement en se penchant en avant. -- Secousses, *clancements et battements dans la tête. - Céphalalgie tractive, quelquefois semi-latérale. — Bensation comme si une boule montait dans la tête en y répandant de la fraichenr. — *Congestion de sang à la tête, avec chaleur et rougeur du visage, ou avec sensation de chaleur au corvegu, sueur au cuir chevelu et pâleur de la face. — Ardeur et bouillonnement dans la tête, comme s'il y avait de l'eau bouillante dans le cerveau. - Bruissement et craquement dans la tête. — Sensation au vertex, comme si l'on était tiré par les cheveux. — Mal de tête comme par suite d'un refroidissement ou d'une transpiration supprimée, avec bourdonnement des oreilles, rhume de cerveau et coliques. - *Aggravation des maux de tête par le mouvement, en parlant, en se redressant de la position couchée et en buvant; amélioration au grand air.

Yenx. — *Yenx rouges, enflammés, avec rougeur foncée des vaisseaux sunguins et douleurs insupportables. — *Larmoisment
abondant. — Chaieur et ardeur dans les yeux, avec *douleurs
pressives et *lancinantes, aurtout en remuant les globes. —
*Gonflement des yeux. — *Pupilles dilatées. — Sécheresse, pesanteur et *gonflement inflammatoire des paupières. — *Yenx
étincelants, *convulsés et proéminents. — Regard fixe. — *Photophobie excessure, *ou grand désir de la lunière. — Taches
noires et brouillard devant les yeux. — Accès de cécité subite. —

Traction dans les paupières avec somnolence.

Oreilles. — Tintement et *bourdonnement dans les oreilles. — Chatouillement et douleur vive dans les oreilles. — Sensation



Sensation de contraction dans l'estomac, comme par des substances âcres.

Ventre. -- Constriction, *tension et pression aux hypocondres, quelquefois avec plénitude et sensation de pesanteur. -- *Douleur brûlante, elancements, points et *pression dans la région hepatique, avec gêne de la respiration. -- *Sensibilité douloureuse de la région du foie au toucher. -- *Ictere -- Douleurs tractives au ventre, en s'accroupissant. -- Constriction, pincement et *brûlement dans la region ombilicale, quelquefois avec rétraction du nombril. -- Tranchées insupportables, le matin au lit. -- Tension et ballonnement douloureux du ventre, principalement à l'épigastre. -- *Gonflement du ventre, comme dans l'ascite. -- *Sensibilité douloureuse du ventre à tout contact et au moindre mouvement -- Colique flatulente principalement la nuit, avec pression, tension, borborygmes et grondement dans le ventre.

Selles. *Suppression des selles Petites selles fréquentes, molles, avec tenesnie. *Selles diarrheiques, aqueuses — *Selles blanches, avec urines rouges. Selles involontaires, par paralysie de l'unus. — Avant et apres les selles diarrheiques, nausées et sueur. — Douleurs au rectum. — Pression et picotement à l'anus. Hémorrheides saignantes. — Diarrhee avec flux d'urines

et coliques.

20

Urines. Suppression des urines, avec pression dans la vessie et douleurs aux reins. Envie frequente d'uriner avec anxieté et douleurs. Flux d'urine, avec sueur, diarrhee et coliques. Émission involontaire des urines, par paralysie du col de la vessie. — *I'rines rares, brûlantes, range foncé, et avec sediment couleur de brique. — Depôt sanguinolent dans les urines. — Ardeur et ténesme au col de la vessie.

Parties viriles. — Appetit vénérien alternativement augmenté et diminué. — Acces erotiques — Fourmillement aux parties.

Douleurs de contusion aux testicules. — Prurit au prepuce. — Elan-ements et pincements au gland en urinant

Règles. *Regles trop abondantes. - Fureur à l'apparition des règles - Perte de sang par la matrice. Leucorrhée visqueuse

et jaunatre. - Augmentation du lait dans les mameiles

Larynx. Sensation d'engourdissement dans la trachee. — Accès de paralysie de l'epiglotte, avec facilité a s'engouer. *Endolorissement du larynx. «Voix cronssante. Envie continuelle de tousser, produite par une irritation ou un chatouillement au larynx. — Toux pour avoir bu ou fumé. — *Toux courte et seche, principalement la nuit — «Toux conculsive ou rauque et croassante, quelquefois avec péril de suffocation et constriction du larynx. — Expectoration de matières epaisses et blanchatres en de macosités sanguinolentes, *ou crachement de sang par la tour. — *En toussant, elancements et douleurs dans la portrine.

Poitrine. - *Respiration courte, principalement pendant le som-





meil et en se redressant. — *Respiration pénible, auxieuse et gémissante, ou rapide et superficielle, ou forte, bruyante et à bouche ouverte. — Respiration leute pendant le sommeil. — *Haleine fétide. -- Constriction et oppression anxieuse de la postrine avec gêne de la respiration. --- Accès de suffocation avec anxiété. — Sensation de pesanteur et de compression à la poitrine. *Points douloureux dans la poitrine, principalement en respirant, en toussant et pendant le mouvement (même des bras sculs). - *Points de côté, avec humeur pleureuse et plaintive, agalagés un peu étant couché sur le dos. — Fourmillement dans la poitrine. — Douleurs de meurtrissures au sternum et aux côtés. — *Sensation d'angoisse dans la poitrine qui coupe la respiration. — *Battements de cœur avec grande auxiété, chaleur du corps, principalement au visage, et grande lassitude dans les membres. -- • Elancements dans la région du cœur pendant le mouvement et en montant l'escalier. — Sensation de compression et coups dans la région du cœur.

Tranc. — Douleurs de meurtrissure au dos, aux reins et à la nuque. — *Roideur douloureuse de la nuque, des reins et des articulations coxo-fémorales. — Douleur de térébration au dos et aux reins. — Fourmillement et picotement au dos. — Faiblesse et

douleur de meurtrissure dans la nuque.

Bras. — Douleur de meurtrissure et faiblesse dans les bras, principalement dans les épaules, avec gonflement. — Pesanteur des bras, avec engourdissement des doigts. — Faiblesse paralytique du bras et de la main, surtout en écrivant. — Tiraillements aux bras. — Mains mortes. — Gonflement des mains. — Chaleur aux mains avec froid aux pieds. — Sueur fraîche au plat des mains. — Fourmillement aux doigts, principalement en écrivant. — *Gonflement inflammatoire du coude, avec engourdissement et état

paralytique des doigts.

Jambes. — Douleur de meurtrissure dans les articulations corofémorales, surtout après avoir dormi ou être resté couché. — Tiraillement avec faiblesse paralytique dans les jambes. — Douleur
lancinante dans l'articulation coro-fémorale, jusqu'au genou;
douleur qui force à crier à chaque pas. — Manque de force et de
solidité dans les articulations de la hanche et du genou. —
Gonflement inflammatoire du genou, avec rougeur luisante, douleurs lancinantes, immobilité et grande sensibilité au toucher. —
Sensation de roideur dans les jambes en les remuant. — Endolorissement du cou-de-pied avec désespoir et crainte de la mort.
— Engourdissement des jambes. — Lourdeur des pieds. — Froid
aux pieds, principalement aux orteils, et sueur à la plante des
pieds.



AESCULUS. - AGARICUS.

ARSCULUS HIPPOCASTANUM.

AES-RIPP. - Marron d'Inde. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Medicament encore peu etudie, mais employé jusqu'ici avec succès contre les affectious suivantes :

Construction chronique et hemorrhoides, avec sensation de secheresse dans le rectum, ou comme si l'anus etait rempli de petits morceaux de bois, hemorrhoides tres-douloureuses, mais saignant peu : douleur et sensation paralytique dans les reins, jusque dans les hanches, empire en se levant de son siège. — Leucorihee, avec douleurs et sensation paralysante dans les reins et les hanches, s'étondant du ventre au sacrum et ne permettant presque pas de se lever de son siège. — Paralysie des extrémités inferieures.

AGARICUS MUSCARIUS.

AGAR. — Agame — HARNEMANN. — Host not, et prép Pharmac homosp., p 157. Dove unité 30 - Davée d'action : pasqu'à 40 jours dans quelques affections chromques
ANTIBOTES Compa coff pals vinum.
Comparer avec : Acon. heli, coff. graph. phos puls.

CLINIQUE. - Les affections dans lesquelles on a jusqu'ici fait usage de ce remède sont . - Ambiyopie amaurotique. Odontalgre; Faiblesse par abus du cort Douleurs esteoropes aux jambes. Convulsions et tremblements des membres f: Acces opileptiques, Eruption comme des grams de millet; Engelures.

Voir la note, page 15.

22

cles, étant assis Tarallement aux membres, principalement pendant le repos soit assis, soit debout, et disparaissant par le mouvement. Symptomes qui se manifestent en croix (par exemple au bras droit et à la jambe gauche) en marchant lentement, amélioration. Grande sensibilité de tout le corps; la pression la plus douce produit les douleurs continues. Douleurs de meurtrassures aux membres dans toutes les articulations apres un exercice meme modere. Douleurs terebrantes dans differentes parties du corps, principalement à la tete, avec envie de dormir, et accablement etant assis. — Grande faiblesse et lour-



AGARICUS.

nez. — Écoulement d'une can limpide par le nez, sans coryza. — Couleur bleuâtre du nez.

Visago. - *Douleurs lancinantes ou tiraillantes aux mâchoires, aux joues et au menton. Prurit, rougeur et ardeur aux joues comme par des engelures. — Palpitation et pulsation aux joues. — Traits alteres. Levres bleuatres. Gerçures brûlantes à la lèvre superieure. — Tiraillements crampoides au menton et à la mâchoire inférieure.

Dents. Douleurs déchirantes aux dents, aggravees par le froid. — Gencives gonflees, douloureuses et saignant facilement.

Bouche. Douleurs d'excornation dans la bouche et au palais. — Excoriation de la langue. (Apres le repas), langue parsemes d'aphthes d'un jaune sale, avec sensation, comme si la peau allait s'enlever. Ulere au filet de la langue. Mauvaise odeur de la bouche comme si on avait mange du raifort. Ecume à la bouche. — Écoulement de salive d'un gout acre.

Appétit. — Goût fade et fétide dans la bouche. — Inappétence pour le pain. Faim avec manque d'appetit. Acces de boulimie, principalement le soir. — Après le repas, pression dans

l'estomac et le ventre, avec plenitude.

24

Estomac. — Rapports a vide alternant avec hoquet. — Rapports avec le goût des aliments qu'on a pris. Nausées avec tranchees. . Envie de vomir immediatement après le repas. Pression a l'estomac et dans la region précordiale après le repas. Douleur crampoide et pesanteur pressive à l'estomac.

Ventre. Élancements dans la region hépatique. - Points dans la region splenique pendant et hors le temps de l'inspiration. - Tranchees et puncements dans le ventre comme par une diarrhée.

Mouvements et grondements dans le ventre. Expulsion abondante de flatuosités d'une odeur fétide comme celle de l'ail. Tranchées violentes avec duarrhée, angoisses, soif ardente, traits altéres, sueurs froides, pouls petit et irrégulier, selles très-fétides, tramblement et délire.

Selles. - Selles dures d'une couleur foncée, après un temps de constipation. - *Selles duarrhéiques, en forme de bouille, acec beaucoup de flatnosités et de fortes coliques. Pendant les selles diarrheiques, traction douloureuse à l'estomac et au ventre.

· Fourmillements à l'anus.

Urines. Urines rares et peu aboudantes. Urine limpide et d'un jaune citron. Écoulement d'un muçus visqueux par l'urèthre.

Parties viriles. — Exaltation de l'appetit venérien avec flaccidité de la verge. — Éjaculation insuffisante dans le coit. — *Après le coit, grande faiblesse avec sueur nocturne. — Prurit aux parties genitales. — Tiraillements dans les testicules.

Larynx. - Expectoration de petits globules de mucosités, presque

sans toux.

Poitrine. - Respiration courte et oppressée, avec disticulté à mar-



AGNUS CASTUS.

CLINIQUE. — Les principales affections dans lesquelles on a employé ou recommandé ce médicament sont : Impuissance, Gonorrhée secondaire, Règles supprimées; Agalactie; Ulcères dans la bouche et aux gencives; Gonfiement et indurations de la rate; Ascite; Flatuosités; Excoriation et crevasses à l'anus (application extérieure); Gonfiement et induration des testicules; Flueurs blanches; Luxations; Nodosités arthritiques; Gonfiement inflammatoire, rhumatismal, des articulations; Stérilité, etc., etc.

Voir la note, page 15.

26

SYMPTOMES CHARLAUX. — Démangeaison picotante à différentes parties. — Somnolence. — Sommell agité avec réveil en sursaut. — Rèves anxieux ou lascifs. — Frissons avec tremblement, quoique le corps soit chaud au toucher. — Frissonnement sans soif, avec froid aux mains. — Le soir, au lit, chaleur passa-

gère au corps avec froid aux genoux.

Moral. — Humeur mélancolique et hypocondriaque, avec apathie, absence d'idées et incapacité de faire quoi que ce soit. — État d'exaltation alternant avec mépris de soi-même. — Découragement complet et désir de la mort. — Grande tristesse arec idée fixe d'une mort prochaine. — Grande distraction, absence d'esprit et étourdissement. — Conception difficile des discours des autres. — Accès d'angoisse avec faiblesse et sensation, comme si une diarrhée allait s'établir.

Tête. — Douleur contractive dans la tête, principalement en lisant.

— Mal de tête comme lorsqu'on est resté longtemps dans une chambre pleine de fumée, avec sensation de pesanteur, améliorée en fixant les yeux sur quelque objet. — Tiraillement pressif principalement au front et aux tempes, augmenté par le mouvement.

— Douleur de contusion comme si on avait reçu un coup à la tempe. — Cuisson lancinante à la tête comme dans les os, principalement le soir, et sensible même pendant le sommeil. — Prurit et démangeaison lancinante au cuir chevolu. — Tension et friesons aux téguments de la tête, qui, copendant, paraissent chauds au toucher.

Youx et Oreilles. — Sensation brâlante aux yeux, le soir, en lisant. — Prurit et picotement aux paupières et autour des yeux. — Pupilles fortement dilatées. — Tintement et bourdonnement des oreilles.

Hez. — Odeur de musc ou de hareng, devant le nez. — Pression à la racine du nez, disparaissant par la compression.

Visage et Dents. — Fourmillement et démangeaison pruriteuse aux joues. — Douleur déchirante dans la machoire inférieure. — Mal de dents excité par des boissons ou des aliments chauds.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche avec salive visqueuse.



ALOËS SOCCOTRINA.

28

Paralysies; jaunisse; anciens ulcères; plaies putrides; gangrène; carie des os; fievres : cauchemar; état pituiteux; état atrabilaire; affections (edemateuses. - Hypecondries, manies; congestions cérebrales; cephalalgies chute des cheveux. Ophthalmies asthéniques; lippitude; taics et autres maladies de la cornée. Affecti uns des oreilles, surdite Epistaxis, - Uleeres aux levres. - Caric des dents; ulceres aux gencives. Nevralgie sublinguaire; ulceration de la langue; hemorrhagies buccales, stomacace et ulceres dans la bouche. — Gastralgies, dyspepsies chez les personnes de constitution phlegmatique, humorale, avec degoût, vomissements avec ventre resserré, hematemèse. Engorgement et induration de la rate; douleurs hepatiques; calculs biliaires; engergement et induration des glandes du mesentere : ascite : phthisie intestinale. ('0liques et diarrhees; excrements gris blanchatre, constipation par suite d'atome torpide, agglomération le matières fécales par suite de constipation, secrétion bilieuse insuffisante, dyssenteries; hemorrhoïdes arrêtees; souffrances abdominales en rapport avec des affections spleniques ou hépatiques, accumulations muqueuses dans les intestins, ascarides. Ulcerations à l'anus, aux parties sexuelles, au prépuce. Douleurs utérines; retention des menstrues, amenorrhée; chlorose; stérilité. — Congestions pulmonaires; asthme. — Goitres.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Douleurs comme par une contusion ou une luxation; tiraillement paralysant dans les muscles: clancements dans les articulations, douleur comme de faiblesse, dans les articulations des pieds et des mains, craquement dans les vertebres du cou, les epaules et les hanches. - Abattement, las itude. paresse. -- Dans la matinée : surexcitation, irritation, humeur qui fait qu'on se sent malheureur; nez sec ou saignant, souffrances gastriques, diarrhee, émission de vents, froid et frissons, . Après mudi . souffrances des membranes muqueuses, coryza fluent, diarthées muqueuses, besoins frequents d'uriner, froid, frissons et pouls lent. Le soir aggravation de la plupart des souffrances. emission de vents, pieds froids. - A gauche, puis à droite : clancements dans l'orcille, palpitations de cœur, battement dans la poitrine, rhume de cerveau ; craquement à gauche dans l'articulation de l'epaule, et à droite, dans celle de la hanche. A droite : souffrance des yeux et du nez; à ganche, ballonnement du colon, elancement dans la portrine, douleurs dans la main. Les acides aggravent les souffrances. - Grande sensibilite au froid, surtout pendant un temps couvert. - Amaigrissement : flaccidité des muscles — La chaleur aggrave le mal de tete que les compresses froides soulagent, le contact de l'eau aggrave les souffrances de la figure, après la marche au grand air, qui cause cependant de la



ALOÉS SOCCOTRINA.

dehors, avec scintillement devant les yeux et chaleur à la face ; elancements dans les tempes, a chaque pas. - Sensation d'un poids au vertex. - Mai de tete pendant les souffrances abdominales, ainsi qu'apres des garde-robes insuffisantes. Aggravation des maux de tete dans la chaleur, amelioration par des compresses froides. *Affluence du sang a la tete, battements, forçant a se redresser de la position couchee. - Sensibilité du cuir chevelu, par plaques circonserites.

Yeux. Affluence du sang aux yeux; presson dans les orbites.

Pendant la douleur frontale, contraction des paupieres.

Oreilles. - *Otalgie, elancements qui se dirigent vers l'oreille; elancement tractif, d'abord dans l'orealle gauche, puis dans la droste Chaleur en dedans et au dehors des oreilles. Craquement dans l'oreille en lisant à haute voix, petillement en remuant la machoire Surdite avec otalgie violente.

Nez. Nez douloureux, le matin, pendant le mouvement. Nez rouge, au grand air. - Pointe du nez froide. - Secheresse du nez, le matin. au lit *Epistaxis, le matin, au lit, apres s'etre réveille. Exconation de l'aile droite du nez. Eternument

avorté, *coryza fluent, apres midi

Pace. Face pale, pendant un temps couvert. - Chalcur de la face, pendant la surexcitation, ainsi que pendant le mal de tête. - Levres plus rouges; levres seches, gercees, s'exfoliant, gonflées, avec des plaques excorices, fongueuses,

Donts. Sensibilité dans une molaire creuse, puis pustule ulcérée

aux gencives.

30

Bouche. Secheresse dans la bouche; plaque enflammee; mauvaise odeur - Langue douloureuse; elancements sous la langue, vers le devant, en remuant la langue ; langue sèche, petitsulceres

a la langue

Gorge. Grattement, apreté, raucite dans la gorge, qui est comme brulee Palais gonfle. Douleurs en baillant, ainsi qu'en machant des aliments solides ; ou bien aggravees le soir ou le matin au reveil. Accumulation de mucosites tenaces, en morceaux epais,

Gout et Appetit. - Gout amer, acide, comme de l'encre, on bien fade au pateux. Appetit nul pour la viande, avec desir de fruits et de choses succulentes; faim, comme par ennui; le soir, faim Soif, en mangeant, apres avoir mange, la nuit. Apres avoir bu, souffrances de l'estomac. La biere amoindrit les souffrances de l'anus. Les acides ne sont pas bien supportes. Apres avoir mange flatuosités; pulsations a l'anus; appetit venerien excite.

Symptômes gastriques. — Rapports : sans gout; amers; acres; acides - Nausces pendant les douleurs au nombril. - Vomisse-

ment de sang.

Estomac. Pression dans l'estomac, avec sensation de chaleur; sensation de plenitude, avec douleur dans l'hypocondre gauche.



ALUMINA.

34

bres. - Sensation de constriction dans plusieurs organes. - Aggravation de souffrances par les ponimes de terre, et souvent tous les deux jours. - Plusieurs souffrances se montrent après le diner et durent jusqu'au soir, ou elles disparaissent ou sont remplace » par d'autres, qui commencent alors sculement — Les souffrances qui ont apparu le matin ou le sur, » ameli ront après le repas, — osouffrances par suite de contrarietes — *Tremblement et montements convulsifs des membres et même de la tête. — Spasmes avec pleurs et rifes alternatifs. — Exaltation de tout le système nerveux. — Tremblement de tout le corps, avec onvie de se coucher, ce qui cependant augmente la fatigue. - Grande fatique générale, même après une petite promenade à pied, mais principalement après aveur parle. - Pandiculations frequentes, chant assis. - Manque de chah ur vitale

Pean. - Eruption unitaire aux bras et aux jambes, avec beaucoup de prurit, et saignement séreux apres avoir gratte. Les
moindres lesions de la peau cuisent et s'enflamment. Tuberosites le preuses - Creutes et dartres suintantes, ou pruriteuses, principalement le soir. Renouvellement des symp-

Sommeil. *Sommeil tardif et insomme avant minuit. *Sommeil nocturne, trop léger, agulé, avec sursauts frequents. *Sommeil et urdissant, non réparateur, avec envie, le matin, de dormir davantage. Réveil frequent la mit. *Réves fréquents. auxieux, avec paroles, rires, pleurs, lamentations, gémissements, somnambulisme. Réves de chevaux, de querelles et de vexations, d'incendie, de mariages, de sportres, de morts, de roleurs. Reves avec crainte de la nurt apres s'etre réveillé. Cauchemar. - La mud, auxiete, agitation; ou chaleur, mai aux dents, mal à la tête, spasmes et oppression de la poitrine, ou diarrhée avec douleur a l'estomae et frissans. — Après le sommeil, le matin, en se reveillant, moral accable par des idées chagrines, ou nausées avec fadeur dans l'estomae et mouvements cabelles.

Plèvre. - Frissonnement, même à la chaleur du poêle, et la nuit, nu point de ne point se réchauffer. Fièrre vers le soir avec prédominance du froid. Apparition du froid immediatement

apres avoir mange la soupe à midi.

Toral. *Humeur chagrine, triste, avec desespoir de la guérison,
-- Pleurs involontaires. *Angoisse et anxieté, comme si l'on
etait menacé de quelque accident facheux ou qu'on eut commis
quelque crime. *Appréhensions. Disposition a s'effrayer.
- Air triste et morsse Mauvaise humeur avec *maptitude
au travail. - Disposition a se facher. Entétement et humeur
contrariante. On prend tout en mal. Humeur changeante,
tantôt courageux, tantôt craintif. - Faiblesse de la mémoire. --



ALUMINA.

36

Pace. - Air sombre, morose. Alternation rapide de rougeur et de *paleur du risage. Rougeur emvree des jones, comme chez les ivrognes. Fourmillement au visage, et tension comme s'il était convert de blanc d'out desseche. *Sensation de gonfie n'ent et de *pesanteur du visage. - Tache rouge doulouveuse à la jone. Aprete de la peau du visage, surtout au front. - Prunt et eruption de petits boutens à la face "Croutes suintantes aux tempes. *Tiraillement lancinant dans la pommette des jones. - Chaleur passagère du visage — Furoncles aux jones. - Taber sites lepreuses au visage. Levres seches et gercees avec exfehation de la peau — Conflement des levres. Boutons et cruptions crouteuses aux levres. — Gonflement

Boutons et cruptions crouteuses aux levres. — Gonflement des machoires avec douleur tensive en ouvrant la bouche et en machant. — Raccourcissement de la machoire inferieure.

Denta - Douleurs aux dents en machant, on le s ir, an lit. Dechirement aux dents, jusque dans l'os zygomatique et dans le
front et les tempes. Douleur terebrante dans les dents cariées.

Ulceration des racines des dents. Ulcere aux geneives. Gonflement et saignement facile des geneives - Sensation d'allongement des dents - Odentalgie avec irritation nerveuse,
comme après un refroidissement, ou après l'usage de la camonoille.

Bouche. — Douleur d'excoriation dans la bouche, au palais, à la langue et aux gencives, qui empêche presque de manger. Petits ulceres dans la bouche. *Secheresse de la bouche principalement en se réveillant Accumulation d'une solure douce ceûtre on aigre dons la bouche, comme une ventable sahvation. — Odeur putride de la bouche Langue chargee d'un enduit blanc ou remaitre. Exprestration de maceutes a remaindantes.

blare ou jaunâtre — Expectoration de mucosites sanguinolentes.

Gorge. Mal de gorge qui s'aggrave le seir et la nuit, et qui s'ameliore en prenant quelque close de chaud, ainsi que dans la matirée. *Douleurs contractives ou lancinantes a la gorge, principalement en avalant *Déglutition d'ficile, comme pur retrecissement de la gorge — "Mal de gorge avec goullement des geneives et du voile du palais, accompagne de douleur d'érosion dans toute la bouche, empechant d'avaler jusqu'au moindre liquide. Pression crampoide et serrement dans l'æsophage.

Gonflement des amygdales. - Grande secheresse dans la gorge. *Accumulati n d'un mucus epais et visqueux dans la

Appétit. Gout deuceatre ou gout de sang, dans la bouche.

Gout apre, astringent, ou am ret fade. *.tppetit errégulier;
tantel teop fort, tantét trop fachte : Insepudite des alaments,
surtout le soir, et principalement du pain et de la rande. Degoût de la viande. Faim avec manque d'appetit : Boulunie. Desar de leguines, de fruits et d'aliments tendres.

Après avoir mange, et principalement le soir, hoquet, pression dans



ALUMINA.

38

de rêves, bouillonnement de sang, chaleur au visage, mal à la tête et palpitations de cœur. — Avant et *pendant les règles, coliques, mal à la tête et autres souffrances. — Après les règles, grande fatigue. — *Flueurs blanches corrosives, avec cuisson aux parties génitales. — *Flueurs blanches avant ou après les règles, —et souvent avec tremblement, fatigue et coliques. — Flueurs blanches incarnates, ou aqueuses et roidissant le linge.

Larynx. — Toux sèche, principalement le matin, et quelquesois suivie plus tard d'expectoration. — *Toux courte, sèche. — *Toux avec géne de la respiration, ou avec douleur à la tête et à la nuque. — *Catarrhe du larynx et des bronches, avec grattement dans la gorge. — Eurouement subit, avec aphonie, le matin et le soir.

Poitrine. — *Oppression de la poitrine. — *Dyspuée, étant assis, — Pression nocturne à la poitrine. — Sensation de constriction de la poitrine, principalement étant assis dans une position courbée, ou en se baissant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine et le creux de l'estomac, quelquefois avec toux. — *Palpitations et *secousses au cœur. — *Douleur au sternum en y touchant.

Trono. — *Mal aux reins, pendant le repos. — Douleur de brisure aux reins et su dos. — Elancements au dos. — Sonzation

au dos, comme si l'ou y enfonçait un fer chaud.

Bras. -- Douleurs aux bras tant qu'on les tient pendants ou étendus au lit. — Déchirement dans le bras, depuis l'épaule jusqu'aux doigts. — Douleur de brûlure comme par un fer chaud, dans les coudes et les doigts. — *Pesanteur paralytique aux bras. — Gonfiement du bras et des doigts. — *Dartres et croîtes suintantes aux avant-bras. — Desquamation farineuse des mains. — *Gerçures aux mains, qui saignent facilement. — Douleur rongeante sous les ongles, quelquefois avec fourmillement dans le bras. — Les ongles se cassent facilement quand on les coupe. — *Panaris.

Jambes. — Roideur, engourdissement et insensibilité des jambes, la nuit. — Déchirement dans presque toutes les parties des inembres inférieurs. — *Grande lourdeur et faiblesse des jambes, *principalement aux hanches. — Douleur tractive aux genoux en montant l'escalier. — Tension aux mollets en marchant, et crampes en croisant les jambes ou en appuyant les trieils par terre. — *Douleur de fatigue aux articulations des pieds, étant assis. — Douleurs aux plantes des pieds en marchant. - Froid aux pieds. — Prurit et rougeur aux orteils, comme par des engelures. — *Sensation de brûlure sous les orteils.



AMBRA.

Sommeil. *Envie de dormir le jour. -- Insommie nocturne. -- sommeil agité à cause du froid au corps et de tressaillement aux membres. -- *Sommeil plein de rêces ancieux et de récasserses. -- En s'endormant, sursauts avec effroi.

Fièvre. — Frissonnement, surtout le matin, avec fatigue et somnolence, amélioré par le diner. — *Frissons fébriles à diverses parties, suivis de chaleur au visage. — *Chaleur passagère, quelquefois avec anxiété au cœur. — *Sueur continuelle le jour, surtout au ventre et aux cuisses (en marchant). — Sueur noc-

turne après minuit, surtout au côté malade.

Moral. — *Tristesse inconsolable. — Anxiété surtout le soir. — "Timidité. — Désespoir et *dégoût de la vie. — "Répugnance pour le rire et la conversation. — Excitation, agitation, précipitation, principalement pendant des travaux intellectuels. — Imagination occupée de figures à grimaces et d'images lascives. — Absence d'idées. — Conception difficile. — *Embarras en société.

Tôte. — Accès de rertiges surtout en marchant au grand air. — Vertiges qui forcent à se coucher, avec sensation de faiblesse à l'estomac. — Le matin, mal à la tête comme après une débauche nocturne. — Sensation de faiblesse dans la tête, avec frissonnement à l'extérieur. — Douleur pressive à la tête, tous les deux jours, avec chaleur à la tête, ardeur aux yeux et pâleur du visage. — Pression au front avec crainte de perdre la raison. — Serrement pressif, avec embarras, principalement au front et à l'occiput. — Congestion de sang à la tête, surtout en entendant de la musique. — Tiraillement aigu dans la tête avec ulcères au cuir chevelu. — Douleur à la tête comme après s'être donné un tour de reins. — *Endolorissement du cuir cherelu au toucher, avec chute des chereux.

Yeux. — Pression aux yeux avec pesanteur, et sensation comme să les yeux étaient trop enfoncés, avec difficulté de les ouvrir le matin. — Chatouillement insupportable autour des yeux. — Prurit à la paquière, comme si un orgelet allait sortir. — *Rougeur infiammatoire de la sclérotique, avec injection des vaisseaux. — *Trouble de la vue, comme un brouillard et obscurcissement devant les yeux.

Oreilles. — Timillement aigu dans les oreilles. — Tension aux oreilles. — Fourmillement et chatouillement dans l'intérieur des oreilles. — *Tintement et bourdonnement devant les oreilles. —

*Dureté de l'oule d'un seul côté.

Net. — Spasmes aux ailes du nes. — *Hémorrhagie nasale, principalement le matin. — Croûtes de sang desséché dans le nez. — Éternument fréquent. — Sécheresse et *obturation du nez ~avec douleur d'excoriation. — *Coryza sec. — *Suppression chronique d'un rhume de cerveau.

Visage. Rougeur et chaleur (quelquefois passagère) du risage.

- *Face ictérique. — Tremblement et mouvements convulsifs

AMBRA, (1

des museles de la face. - Demangearson fourmillante et pruriante la face, avec eruption de Loutons, mome au front et dans la region des favoris -- Taches rouges sur la joue -- Convulsions aux levres. -- Levres chaudes

Dents. — *Douleurs tractives lancamentes, principalement dans les dents cariées, et surtout au grand air, augmentees en prenant quelque chese de chau l. — Saignement des dents et des gen-

cives Gonflement doub areax des gencives

Bonche. — Le matin, en se reveillant secheresse et sensation d'engourdissement à la bouche, à la langue et aux levres. — Demangeaison et cuisson dans la bouche. — Vesicules dans la bouche avec douleur brulante. — Nodosites avec douleur d'écorchure au-dessous de la langue. — Langue chargee d'un enduit blanc ou gris jaunâtre. — Mauvaise odeur de la beache.

lorge. Sensation comme s'il y avait un tampon dans la gorge, avec lifficulte d'avaler. *Etranglement dans la gorge, en avalant les abments. - *Corrosion, et grattement dans la gorge. — Accumulation de mucosités grisatres dans la gorge, avec vomitarition et vomissement en renaclant. — *Le matin, renaclement

de mucosités.

Appétit. — *Goût fade on rance. — *Manque d'appétit. — Aigreur dans la bouche sprès avoir pris du lait. Après avoir mangé, pression à la foesette du cou, comme si un morceau s'y était arrêté.

Estemac. — *Rapports avortés. — Rapports fréquents, et souvent aigres, ou avec le goût de ce que l'on a pris. — Hoquet après avoir fumé du tabac. — Pyrosis, principalement le soir, ou en se promenant au grand air ou après avoir bu du lait. *Nausées et vomissement — Pression et douleur crampolde à l'estomac. — Bensation de brûlure à l'estomac et à la région précordiale.

Ventre. *Douleurs hépatiques, le plus souvent pressives. — Douleur pressive dans l'épigastre et dans le bas-ventre. *Pesanteur dans le ventre. — Tension et *ballonnement du ventre, "principalement après avoir bu et mangé. — Compression dans le ventre, quelquefois le matin. — Tranchées le soir, après minuit, et le matin au lit, avec diarrhée. - *Douleur de blessure dans les muscles abdominaux en toussant et en tournant le corps. — *Sensation de froid dans le ventre, quelquefois d'un seul côté. — Le soir, tressaillement dans les muscles abdominaux. — *Platuosités incarcérées. — Colique flatulente nocturne.

Bollos. - Constipation et selles tardives. — Envie inutile d'aller à la selle, avec anxiété et impossibilité de supporter l'approche de personne. — *Selles irrégulières, intermittentes, souvent seu-lement tous les deux jours. — Selles molles (diarrhéiques) brun

Après la selle, pression dans le bas-ventre. — Écoulede sang avec la selle. — *Boutous hémorrholdaux à l'anus. Prurit et chatouillement à l'anus et au rectum.



AMBRA.

Urinea. — Le matin, après s'être levé, envie pressante d'uriner. — Sécrétion d'urine augmentée, principalement la nult et le matin.

- Urines d'un brun jaunâtre, et troubles, avec sédiment brun. - Nuage rougeatre dans l'urine. -- Urines sanguinolentes. --Odeur acide de l'urine. — Brûlement dans l'orifice de l'urêthre.

Parties viriles. — Vive sensation de volupté et prurit aux parties génitales, sans excitation extérieure. — Brulure à la région des vésicules spermatiques. - Erection le matin, avec engour-

dissement des parties génitales.

42

Bègles. — Règles trop hâtives. — Ecoulement de sang hors le temps des règles. — Pendant les règles, gonfiement des varices, avec pression dans les jambes. — *Leucorrhée, -épaisse, muqueuse, précédée d'élancements dans le vagin. - Sortie de matières blanches, bleuâtres, par le vagin. — La leucorrhée est plus abondante la nuit. - Brûlement, douleur d'écorchure et

prurit aux parties sexuelles de la femme.

Laryux. – Toux avec coryza et expectoration d'un mucus blanchâtre et salé. — Toux nocturne, excitée par un vif chatouillement au gosier. — Toux le soir, avec douleurs sous les côtes gauches, comme si on y arrachait quelque chose. -- *Touz convulsire, "avec rapports et enrouement. — *En toussant, mal de tête pressif aux tempes. — Voix rauque, enrouée, et accumulation de beaucoup de mucosités épaisses dans les voies aériennes.

Poltrine. — *Haleine courte. — *Oppression de la respiration. - Haleine fétide, le matin après s'être réveillé. — Sifflement dans la poitrine. — *Oppression douloureuse à la poitrine et au dos. — Pression à la poitrine, principalement dans la région du cœur. — *Sensation de corrosion dans la poitrine. — *La nuit, tremblement à la poitrine. — Battement de cœur, souvent en se promenant au grand air, avec pâleur du visage, et pression dans la poitrine comme par une masse. — Douleur de brisure, rhumatismale, à la poitrine.

Tronc. — Mal aux reins, lancinant. — *Roideur aux reins après étre resté assis. — Pesanteur au dos avec douleur au ventre comme si les intestins étaient comprimés. -- Douleur pressive,

tiraillante à la nuque et au dos.

Bras. — *Les bras s'engourdissent facilement, -poit que l'on s'appule dessus, *ou que l'on porte quelque chose, ou même la nuit, avec sensation de torpeur. - *Tiraillement paralytique, comme de luxation, aux articulations scapulaires, aux coudes, aux avant-bras et aux mains. -- *Tremblement des bras. *Douleur ostéocope du coude au toucher. — *Crampes aux mains en saisissant quelque chose. — Froid prolongé des mains. — Contraction des doigts. — Le soir, accès de tremblement au Le matin, la peau au bout des doigts est ridée. — Faiblesse nocturne des doigts. — Dartre pruriteuse entre les doigts.



AMMONIUM CARBONICUM.

14

oité gauche. - La plupart des souffrances apparaissent ou le soir et la nuit, ou le matin. -- *Le soir, agitation générale dans le corps. -- Besoin d'étendre les bras et les jambes. -- En parlant beaucoup et en écoutant parler, on se fatigue beaucoup. -- Fatigue, courbature et *grande faiblesse des membres, principalement en se promenant au grand air, ou le soir, et quelque-fois avec besoin de se coucher. -- *Répugnance pour la promenade. -- Convulsions. -- Inflammations locales. -- Tétanos. -- Dyscrasie scorbutique. -- Disposition du sang à se décomposer. Amaignissement. -- Grande sensibilité au froid et au grand air, avec beaucoup de souffrances après la promenade.

Pean. — Fort prurit par-ci par-là, avec des vésicules et des boutons brûlants après avoir gratté. — *Éruptions miliaires, *chroniques. — Rougeur sur toute la partie supérieure du corps, comme de la scarlatine. — *Scarlatine. — *Ephélides. — Brûlement, élancements et tiraillements aigus au corps. — Excoriation de la peau (entre les jambes, à l'anus et aux parties génitales). — Ganglions. — Gonflements de glandes. — Rachitisme.

Sommeil. — *Somnolence diurne. — *Insomnie et sommeil tardif, surtout lorsqu'on se couche tard. — *Cauchemar en s'endormant. — Réveil fréquent avec effroi, et difficulté de se rendormir. — Sommeil plein de rêves taut anxieux que romantiques, historiques et lascifs. — Réves de spectres, de mort, de vermine et de querelles. — Sommeil agité et qui ne délasse point. — La muit, accès d'angoisse, vertiges, congestion de sang à la tête, céphalalgie, mal aux dents, nausées, gastralgie, coliques, envie d'uriner, crachement de glaires, douleurs aux gros orteils et aux ganglions, secousses dans le corps, douleurs aux membres, prurit et picotement dans la peau, agitation, bouillonnement de sang, chaleur sèche, sueur, surtout aux jambes, frissonnement et froid.

Symptômes fébriles. — *Accès de frissons le soir. — Avant de s'endormir, violent frisson avec tremblement. — *Chaleur fébrile à la tête avec froid aux pieds. — Sueurs toutes les nuits et vers le matin.

Moral. — Tristesse avec humeur pleureuse, apprehensions, et angoisse qui disparaît souvent vers le soir. — *Inquiétude le *soir. — *Anxiété avec faiblesse, —et cauchemar nocturne. — Caractère craintif. — *Dégoût de la vie. — Mauraise humeur le matin, et lorsqu'il fait mauvais temps. — Humeur morose et colère. — *Caractère désobéissant et difficile à conduire. — Gaieté excessive. — Inadvertance. — Grande distraction et manque de mémoire. — *On se trompe en parlant, en écrivant, en calculant. — *Diminution des facultés intellectuelles.

Tôte. — *Vertiges, *en lisant dans la position assise, "ou le matin, ou le soir, quelquefois avec nausées. — *Maux de tête opiniâtres. — *Mai de tête arec nausées. — Les maux de tête apparaissent souvent le soir, après la promenade au grand air, ou le matin, ou



AMMONIUM CARBONICUM.

45

après le repas. — Douleur d'ulcération à la tête, principalement en remuant la tête ou en la premant. - *Martellement, "pression et battements dans la tête, avec *sensation comme si tout allait sortir par le front, -ou que la tête dût éclater. -- Élance-ments au fond du cerveau. -- Mal de tête comme par le gas carbonique. — Beneation comme si le cerveau vacillait. — Endolorimement du cuir chevelu et des cheveux. — Prurit à la tête. — *Chute des cheveux.

Your. - *Bralement aux yeux, principalement de soir, on le matin, avec photophobie. — "Sensation de froid aux yeux. — Orgelet. — Agglutination nocturne des paupières. — *Chassie sèche aux paupières. — Immobilité des yeux. — *Vue trouble avec scintillement devant les yeux. — •Myopie. — •Cataracte. — Diplopie. — *Points noirs et bandes lumineuses devant les yeux. Larmoiement.

Orellies. — Bourdonnement dans les oreilles, particulièrement la nuit. — *Bruissement et tintement aux oreilles. — *Dureté de l'oule, avec suppuration et démangeaison de l'oreille. — «Gonfie-


ment dur des glandes du cou, –et des parotides.

Nos. — Pesanteur au bout du nez, en se courbant, comme par congestion de sang. - *Prurit et bouton purulente au nez. -Furoncle au bout du nez. — Gonflement, sensation d'excoriation et sensibilité douloureuse des narines. — Ecoulement de pus par le nez. — Excrétion de mucosités sanguinolentes. — *Saignement de nes, particulièrement le matin en se levant, ou "après le repaa. — Sécherense opiniatre du nes. — *Corysa opiniatre. — *Corysa sec, –et obturation du nes, principalement la nuil,

avec péril de suffocation.

Visage. — *Bouffissure et pâleur de la face, avec nausées et fatigue du corps et de l'esprit. - *Teint maladif. - Chaleur au visage pendant des travaux intellectuels. -- Tension et *tiraillementx aigus, avec élancements au côté droit du visage. — Tension dans la peau du visage, comme si la face était gonflée. — Gonflement dur des joues. — Contorsion des traits. — *Éruptions au visage oavec prurit. - Furoncles aux jones. - Ephélides. - Eruptions dartreuses avec desquamation de la peau, aux joues, autour de la bouche et au menton. — Lèvres sèches, gercées, brûlantes et saignantes. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Mal aux dents en les serrant, ou le soir après s'être couché, ou quand l'air y pénètre, ou pendant les règles; les douleurs sont pour la plupart tiraillantes, ou tressaillantes, ou lancinantes; ou comme d'ulcération, et souvent elles se propagent jusque dans les joues et les oreilles. — Douleur lancinante, opiniatre aux dents. - Pourriture, allongement et *vacillement chronique des dents. - Gonfiement inflammatoire, suppuration et saignement facile des gencives.



AMMONIUM CARBONICUM.

Bouche. — Rougeur, inflammation, douleur d'excoriation et sensation de gonflement dans l'intérieur de la bouche. — Éruption de bulles dans la bouche et sur la langue. — Parole difficile, comme par faiblesse des organes. — Grande séchereme dans la bouche, principalement la nuit. — Accumulation de salive dans la bouche et crachement continuel. — Mauvaise odeur de la bouche qu'on sent soi-même.

Gorge. — Mal de gorge comme s'il y avait un corps étranger là dedans, principalement le matin et le soir. — *Douleur d'excoriation et grattement dans la gorge. — Gonfiement des amygdales, avec difficulté d'avaler. — Après avoir bu, les muscles an-

térieurs du cou se contractent spasmodiquement.

46


Appétit. — Goût sanguinolent dans la bouche. — *Goût amer, principalement après avoir mangé, ou le matin, après le réveil. — Goût acide des aliments, et après avoir pris du lait. — Goût métallique des aliments. — *Boif continuelle. — Impossibilité de manger sans boire. — Beaucoup de faim et d'appétit. — *Manque d'appétit le matin. — En mangeant, on est bientôt rassasié. — Répugnance pour le lait. — *Goût excessif pour le sucre. — *En mangeant, vertiges étourdissants —et chaleur au visage. — *Après le repas, pyrosis avec grattement dans la gorge, —et envie de dormir.

Betomac. — *Renvois aigres ou à vide, ou avortés. — *Renvois avec le goût des aliments ingérés. — *Pyrosis. — *Renvois et vomissements. — Nausées et vomissements toutes les fois qu'on a mangé, avec pression au creux de l'estomac. — Vomissement sanguinolent, violent. — Pression à l'estomac, principalement après le repas, avec nausées et sensibilité douloureuse du creux de l'estomac. — *Gastralgie. — *Douleur contractive au creux de l'estomac, en s'étendant. — Chaleur et sensation de brûlure à l'estomac. — oTout vêtement sur l'estomac est insupportable.

Ventre. — Pression, douleur d'écorchure et obrûlement dans la région hépatique. — Elancements térébrants dans le foie, le soir étant assis. — *Mal au ventre avec diarrhée. — *Coliques contractives, spasmodiques, avec nausées et accumulation d'eau dans la bouche. — Douleur de commotion dans le bas-ventre en marchant. — *Bruit dans le ventre. — Gonflement élastique dans l'aine, comme une hernie venteuse. — Colique flatulente, douloureuse.

Selles. *Constipation. — *Selles difficiles. — Selles tardives, dures, en petits morceaux. — Selles molles ou diarrhéiques, muqueuses, suivies ou précédées de tranchées. — Après et *pendant la selle, sortie de sang par l'anus. — *Hémorrhoïdes saignantes, ravec douleurs cuisantes. — Sortie des hémorrhoïdes du rectum pendant la selle, avec beaucoup de douleurs après. — Brûlement nocturne et *prurit à l'anus. — Écorchure entre les jambes et à l'anus.





AMMORIUM CARBONICUM.

Urines. — Envie continuelle d'uriner, même la nuit, avec évasuation peu abondante. — Le soir surtout, pissement fréquent et abondant. — *Pissement nocturne. — *Pissement au lit. — Urines blanches, mblonneuses. — Urines rougeatres, comme de l'eau mêlée de sang. — Écoulement de sang par l'urêthre.

Organes géniteux. — Violent appétit vénérien, mas idées lactives ni érections; ou *manque d'appétit vénérien et répugnance pour le sexe. — Pollutions fréquentes, et étranglement, tiraillement et pessateur aux testicules. — Bortie de liqueur prostatique

après une selle difficile.


Région. — Gonfiement, prurit et brûlement aux parties génitales de la femme. — *Excoriation de la peau aux parties et à l'anus. — Règles trop hâtives et trop fortes, d'un sang noir et acre. — Avant et *pendant les règles, coliques et maux de reins. — *Pendant les règles, mal aux dents, pression sur la matrice, tranchées, tiraillements aigus au dos et aux parties génitales, *besoin de se coucher, "pâleur du visage, frissonnement, corysa et tristesse. — Écoulement séreux de la matrice. — *Leucorrhée

Acre, corrosive, "ou brûlante.

Larynx. — Raucité et enrouement avec difficulté de parler. —
Catarrhe avec dureté de l'oule et brûlement à l'estomac. —
*Toux avec enrouement. — Toux sèche, comme par du duvet
dans la gorge. — *Toux avec oppression astàmatique, particulièrement le soir au lit. — *Toux chatouillante avec expectoration. — *Toux seulement la nuit, ou seulement le jour,
ou le soir avant de s'endormir, ou le matin vers les 8 ou
4 heures. — *En touseant, élancements aux reins, "au sternum, ou au creux de l'estomac. — *Toux avec expectoration
muqueuse, sanguinolente, haleine courte, et sensation d'un
poids à la poitrine. — Expectoration de sang pur par la toux.

Poitrine. — *Haleine courte -avec étouffement, principalement en montant un escalier. — Géne asthmatique de la respiration, et dyspnée principalement à la chaleur de la chambre, ainsi qu'après un effort quelconque, parfois avec battement de cœur. — Dyspnée nocturne. —Sensation douloureuse d'asthme spasmo-dique avec toux courte et sourde. — *Élancements dans la poitrine et dans les côtés, particulièrement en respirant, en chantant, en se baissant, en marchant, ou la nuit, avec impossibilité de rester couché sur le côté malade. — Poitrine comme fatiguée. — Congestion vers la poitrine. — Sensation de pesanteur à la poitrine. — oBrûlement dans la poitrine. — Souvent un point douloureux au cœur. — *Battements de cœur, principalement après un effort, et quelquefois avec rétraction de l'épigastre et faiblesse au creux de l'estomsc.

Treno. — Elancemente dans les tégumente de la poitrine. — Miliaire pourprée et furoncles à la poitrine. — Maux de reine et *doulours à la nuque, le plus souvent tiraillantes. — *Ten-



48 AMMONIUM CARBONICUM. -- AMMON. MURIATICUM.

sion tractive au dos et aux reins. — Tiraillements aigus depuis le côté jusqu'à l'articulation scapulaire. — *Gonfiement douloureux des glandes du cou et des glandes axillaires. — •Goitre.

Bras. — *Bras et doigts morts et roides, la nuit, ainsi que le matin, et en saisissant quelque chose. — Pesanteur et faiblesse paralytique des bras. — Tiraillement aigu dans les articulations des bras, des mains et des doigts, amélioré par la chaleur du lit. — *Douleur de foulure au poignet. — Accès de tremblement des mains. — Veines gonflées et couleur bleuktre aux mains, après les avoir lavées à l'eau froide. — *Exfoliation de la peau des mains. — La peau des mains devient dure et gercée. — Crampes aux doigts. — *Engourdissement des doigts. — • Enflure des mains en laissant tomber les bras. — Gonflement des articulations des doigts.

Jambes. — Tension dans les jambes, comme si les tendons étaient trop courts. — Tressaillement et contraction des jambes. — *Grande fatigue dans les jambes. — Douleur de courbature dans l'articulation coxo-fémorale et les cuisses, particulièrement le matin au lit, améliorée par la marche. — *Crampes aux pieds, —aux mollets et au tibia. — Tressaillements dans les genoux et les jambes. — *Douleur tractive aux jambes, étant assis. — Tiraillement aigu aux articulations des pieds, amélioré par la chaleur du lit. — Douleur d'ulcération et *élancements aux talons. — Sensation de brûlure aux pieds. — *Gonflement des pieds. — *Sueur des pieds. — Froid et frissons aux pieds, principalement le soir en allant au lit. — *Douleur (de luxation) dans le gros orteil, principalement la muit au lit, en le remuant. — Le soir, rougeur, chaleur et gonflement du gros orteil, comme par des engelures.


AMMONIUM MURIATICUM.

AMM-MUR. — Muriate d'ammoniaque. — HARREMARN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. bomocop., p. 75. — Doses usitées : 12, 30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines dans quelques cas de maledies chroniques.
ANTEDOTES : Camph. hep. ?.

Companen avec : Amm. arm ars. bell. bry. chin. fer. graph. hep. kal. laur. lyc. mang. merc. n-vom. phos. puls. rhus. sil. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Mélancolie; Migraine; Amblyopie amaurotique; Hémorrholdes; Dysménorrhée; Toux chronique; Douleur de luxation;





AMMONIUM MURIATICUM.

Glandes engorgées; État scorbutique des geneives; Podagra?; Panaris?, etc., etc., etc., Voir la note, page 15.

parties du corps. — Tension dans les articulations comme par raccourcissement des tendons. — Le côté droit du corps parait être plus affectéque le côté gauche. — Les souffrances de la tête et de la poitrine s'aggravent principalement le matin; les souffrances gastriques et abdominales après le diner, et les douleurs dans les membres, les affections cutanées, ainsi que les symptômes fébriles, le soir et la nuit. — Bouillonnement de sang avec anxiété. — *Faiblesse paralytique et fatique, principalement aux extrémités inférieures, *quelquefois avec étourdissement, ou avec tension et tiraillements aux jambes. — Cachexie scorbutique. — Disposition du sang à se décomposer. — Douleurs ostéocopes, tiraillantes, nocturnes. — *Déchirement tressaillant dans les membres, surtout dans les doigts et les orteils.

Pean. — Prurit et démangenison, avec besoin de se gratter, suivis d'éruption de boutons. — Éruption miliaire. — Éruptions vésiculeuses qui forment des croûtes. — Exfoliation de la peau dans

plusieurs endroits.

Semmeil. — Somnolence diurne, avec paresse et horreur du travail. — Le soir, de bonne heure, envie de dormir. — Insomnie avant minuit. — Réveil de trop bonne heure. — Beaucoup de rères anxieux, effrayants ou lascifs. — La nuit, tranchées, éternuments fréquents, fourmillement dans la gorge, pesanteur et pression à la poitrine (cauchemar?), mai aux reins violent et douleurs au tronc et aux membres, froid aux pieds, chaleur à la tête, frisson et prurit à la peau.

Fièvre. — Froid et frissons, le plus souvent le soir vers 6 heures. — Chaleur avec soif et face rouge, bouffle. — *Sueur nocturne,

osprès minuit.

taines personnes.

Tôte. — Étourdissement et vertige qui disparaissent le plus souvent au grand air. — Sensation de plénitude dans la tête et pesanteur au front, principalement le matin en se levant. — Pression au front, vers la racine du nez, avec sensation comme si le cerveau était meurtri. — Tiraillement aign semi-latéral à la tête et au visage. — Congestion de sang à la tête



AMMONIUM MURIATICUM.

avec chaleur intérieure. - Prurit au cuir chevelu, qui force à se

gratter continuellement.

50

Your. — Brûlement aux yeux et dans les angles des yeur le soir au crepuscule, ou le maten avec photophome. — Palpitation aux paupières. — Vue trouble comme par un brouillard — * Taches et points voltigeant devant les yeux, ele jour et le soir à la lumière des bougies. — Taches jaunes devant les yeux, en regardant fixement quelque objet.

Oreilles. — Élancements aux oreilles de dedans en dehors, surtout au grand air. — Tressaillement térébrant aux oreilles. — Éruption aux oreilles. — Écoulement par les oreilles. — Dureté de l'ouie. — *Tintement et bourdonnement devant les oreilles.

Nes. — Gonflement et sensibilité douloureuse du nez au toucher, avec douleur d'ulcération et croûtes sanguinolentes dans les narines. — Eternument avec élancements à la nuque et jusque dans les épaules. — Coryza avec obturation du nez et perte de l'odorat — Écoulement d'eau claire, corrosive, pendant le coryza.

Visage. — Tiraillement aigu, violent dans les os zygomatiques. — Chaleur brûlante de la face — Éruption au visage — *l'l-cération des coins de la bouche et de la lèvre supérieure. — Lèvres luisantes, comme par de la graisse. — Lèvres sèches, ridées, gercées, excoriées, avec douleur brûlante. — *Douleur tensive dans l'articulation sous-maxillaire en mâchant et en ouvrant la bouche. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur pulsative.

Dents. - Tiraillement aigu aux dents. -- Gonflement des gen-

cives avec douleur languante.

Bouche. - Vésicules brûlantes au bout de la langue. - Douleur lancinante à la gorge en avalant. - Mucosités tenaces dans la

gorge, principalement le matin.

Appétit. — Goût amer dans la bouche, principalement le matin, avec renvois amers et anxiété. — Manque de faim et d'appétit. — Beaucoup de soif, surtout le soir. — Après tout repas, nausées, écoulement d'eau par la bouche avec horripilation, diarrhée avec coliques et douleurs aux membres, et quelquefois avec battement dans la patrine, chaleur au visage et inquiétude.


Estomac. *Reneous, le plus souvent amers ou à vide. - Régurgitation de ce que l'en a pris ou d'une eau amère et acide. - Hoquet fréquent, violent, souvent avec élancements à la poitrine. - Pituites de l'estomac. - Douleurs tractives ou rongeantes à l'estomac, comme par des vers. Sensation de brûlure à l'esto-

mac et dans la région précordiale.

Ventre. - *Elancements dans la région splénaque, °particulièrement le matin en se reveillant, avec dyspnée qui force à se redresser Ballonnement du ventre. Pincement dans le ventre. Tension et gouffement aux aines. *En touchant, sensation

de gonflement et douleur d'ulcération aux aines





AMMONIUM MURIATICUM.

Selles. — *Constinution. — Selles dures on fréquentes et molles. — Diarrhée avec douleur d'excoriation on de meurtrissure au ventre. — Selles diarrhéiques, maqueness, verdatres. — Avant la selle, mal de ventre autour du nombril. — *Sortie de sang avec la selle. — *Douleur d'excoriation dans le rectum, *Stant assis. — Douleur au périnée en marchant.

Urinea. — Evacuation d'urine augmentée, principalement la muit.

Urines rougeatres, claires, saus dépôt.

Parties viriles. -- Elancements et battements au cordon sperma-

tique. — Erections fréquentes.

Règies. — *Règies trop hátives et trop fortes, *avec mai aux reins et douleurs (compressives et contractives) au dos. — Pendant les règies vomissement et diarrhée, tiraillement aux pieds, ou sortie de sang avec selle. — Flueurs blanches avec ballonnement du ventre, ou comme du blanc d'œuf, précédées de pincement autour du nombril, ou muqueuses, brunes, sortant après avoir uriné.

Laryax. — Enrouement avec sensation de brûlure au laryax. —

*Touz violente, principalement le soir et la muit, étant couché sur le dos. — *Toux sèche le matin, oavec expectoration de matières blanchâtres et épaisses. — oLa toux est plus forte après le repas ainsi qu'après avoir bu froid et lorsqu'on est couché la tête basse. — Toux en respirant profondément, surtout étant couché sur le côté droit. — En toussant, élancement dans la poitrine et aux hypocondres. — Expectoration de mag précédée de démangeaison à la gorge. — Toux opiniatre venant du fond de la poitrine.

Pettrine. — État asthmatique en remuant fortement les bras et en les baissant. — Pesanteur et oppression de la poitrine, avec gêne de la respiration, principalement au grand air ou la suit. — Pression et élancements dans la poitrine. — Pulsations dans

la poitrine, étant debout.

Trons. — Tension et douleur de courbature à l'extérieur de lapoitrine. — "Éruption et "taches rouges, brûlantes et pruriantes à la poitrine. — Douleurs de courbature aux reins, principalement la nuit, étant couché, en marchant et après s'être baimé. — "Roideur douloureuse aux reins "qui force à marcher courbé. — "Élancements aux omoplates, "surtout en respirant. — "Tiraillements aigus aux côtés du cou et aux clavicules. — Roideur du cou, avec douleur en le remuant, depuis la nuque jusqu'aux épaules.

Bras. — Bras lourds et roides, comme paralysés. — La nuit, tiraillement aigu aux bras comme si c'était dans les os. — Tiraillement aux épaules. — Gonflement des poignets avec douleurs
tiraillantes. — Vésicules au poignet qui forment des croûtes. —
Douleur de luxation au poignet. — Tiraillement tressaillant ou
élancements, battement, fourmillement et douleur d'ulcération
au bout des doigts. — Exfeliation de la peau entre les doigts.



32 AMMONIUM MURIATICUM. — ANACARDIUM.

Jambes. — Tension dans les hanches et les jarrets. — «Élancements, douleur de luxation et "tirsillement à la hanche. — "Raccourcissement des tendons des jarrets et roideur de l'articulation du genou. — La nuit, tirsillement aigu aux jambes comme dans les os. — Douleur lancinante aux mollets, après avoir marché longtemps. — "Jambes mortes et insensibles. — "Douleur d'ulcération et tirsillement aux talons. — "Froid aux pieds. — Sueur fétide des pieds. — Tirsillement tressaillant ou élancement, battement et fourmillement au bout des orteils.

ANACARDIUM ORIESTALE.

ANAC. — Fère de Malec. — HAMMENARN, — Hist. nat. et prép. Phermac. homosop., p. 161. — Dose maitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 30 jours dans quelques affections chroniques.
ANTIDOTES : Camph. n-jugl?.

COMPARER AVEC : Acon, ars. calc eleand.


CLINIQUE. — Se laisant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Aliénation mentale et démence allant jusqu'à la fureur; Mélancolie; Imbécillité?; Hystérie et Hypocondrie?; Céphalalgie par suite de travaux intellectuels trop fatigants; Amblyopie; Dureté de l'oule; Otorrhée; Dyspepsie; Hémorrholdes; Coryza chronique; Faiblesse nerveuse et physique?; Coqueluche?; Souffrances asthmatiques?; Paralysie; Suites fâcheuses de l'abus du coît?; Souffrances par suite de chagrin?, etc.

Voir la note, page 15.

symptomes Generaux. — Douleurs pressives comme par une cheville ou par un tampon, à plusieurs endroits. — Les souffrances apparaissent le plus souvent périodiquement. — La plupart des souffrances disparaissent pendant le diner, mais, peu de temps après, elles se renouvellent et il en apparaît beaucoup d'autres. — Le moindre mouvement fatigue beaucoup. — Grande fatigue, *tremblement et faiblesse extrême dans les membres et principalement aux genoux, "augmentant jusqu'à la paralysie. — Grande lassitude en marchant et en montant l'escalier. — *Disposition à se refroidir facilement, et grande sensibilité pour le froid et le courant d'air.

Peau. - Prurit brûlant; augmenté par le grattement. - Peau





ANACARDIUM.

difficile à exciter par des irritants. — Douleur d'abeès aux parties malades.

Semmell. — Sommoleuce counateure jour et muit. — Envie de dormir de bonne houre, avec sommeil nocturne agité. — *Sommeil tardif. — Réves auxieux, dégoûtants ou horribles, avec cris; réves vifs avec méditation et activité de l'esprit, suivis de douleur de meurtrissure à la tête après le réveil. — Réves de prejets, de feu, de maladies, de morte et de périls. — La muit, mal aux dents, douleurs aux membres et dans les os, diarrhée, crampes aux mollets et tressaillement de la bouche et des doigne pendant le sommeil.

Flèvre. — *Grande disposition au friscomment, "et frimons continuels, même à la chaleur de la chambre. — Froid et tremblement, avec tiraillement à la tête, mauvaise humeur et agitation, tous les deux jours. — Froid intérieur avec chaleur extérieure. — Chaleur du visage, toutes les après-midi vers les 4 heures, avec nausées et fatigue. — *Sueur diurne étant assis.

Maral. — *Tristesse hypocondriaque, et idées mélancoliques. —
*Anthropophobie. — *Anxiété, appréhensions et crainte d'une mort prochaine. — Crainte et méliance de l'avenir, avec *découragement et désespoir. — Disposition à prendre tout en mal, à contredire et à se mettre en colère. — Manières gauches, sottes. — Disposition à rire des choses sérieuses et à garder son sérieux où il y auxait à rire. — *État comme si l'on avait deux voloutés dont l'une rejette ce que l'autre exige. — *Manque de sentiment moral (scélératesse, impiété, dureté de cœur, cruanté). — *Envie irrésistible de blasphémer et de jurer. —
*Sensation comme si l'esprit était séparé du corps. - Faiblesse de l'avenit et de le mémoire.

Tôto. — Tête embarrassée. — Étourdissements. — Vertiges en marchant, comme si tous les objets étaient trop éloignés ou vacillaient. — Vertiges tournoyants avec obscurcissement des yeux en se baissant. — *Mal de tête à l'occiput par le bruit et à chaque (faux) pas.—Mal de tête avec étourdissement et vertiges, aggravé par le mouvement. — Mal de tête à la suite d'un travail intellectuel, avec douleur de mentrissure au cerveau ou pression tractive dans le front. — *Douleurs pressives, principalement aux tempes. — Douleurs constrictives à la tête. — Tiraillement dans la tête, principalement du côté droit et souvent jusqu'au visage et au cou, suivi de bourdonnement des oreilles. — Le soir, fouillement dans la tête, disparaissant en s'endormant. — Démangenison au cuir chevelu.

Youx. — Pression douloureuse sur les yeux. — Photophobie — Contraction des pupilles. — *Faiblesse et trouble de la vue. — Myopie. — *Filets et taches noires devant les yeux. — Auréole autour de la chandelle, le soir.



ANACARDIUM.

Oreilles. — Otalgie lancinante et tiraillante. — Pression douloureuse dans les oreilles.—Douleur d'ulcération dans les oreilles,
principalement en serrant les dents et en avalant. — *Écoulement (brunâtre) par les oreilles. — *Démangeaison dans les
oreilles. — *Dureté de l'oute. — *Bourdonnement et bruissement dans les oreilles. — *Gonflement douloureux de l'oreille.

Non. — *Épistaris. — *Anosmie. — Odeur continuelle devant le nex, comme de la fiente de pigeons, ou de l'amadou brûlé. — *Obturation du nex, avec sensation de sécheresse dans les narines. — *Coryxa et écoulement muqueux du nex, chroniques. — Coryxa violent avec flèvre catarrhale, tension aux mollets et aux jambes, et agitation au cœur.

Visage. — Face pâle, maladive, avec yeux creux, enfoncés et cernés. — Pression sur les pommettes. — Taches râpeuses, dartreuses et farincuses, autour de la bouche et aux joues, avec démangeaison formicante. — Sensation de brûlure autour du

monton

54

Dents. — Odontalgie tiraillante, tressaillante, principalement en prenant quelque chose de bien chaud dans la bouche. — Douleurs tensives crampoldes, aux dents jusqu'anx orelles, le plus souvent le soir vers les 10 heures. — Gonfiement et saignement facile des genoives.

Bouche. — *Mauvaise odeur de la bouche, sans s'en apercevoir soi-même. — Lourdeur et gonflement de la langue avec parole difficile. — Langue blanche, rude. — *Accumulation d'eau dans

la bouche. — Sécheresse dans la bouche et à la gorge.

Appétit. — Goût fade de tous les aliments. — Goût amer avec sécheresse de la bouche et de la gorge. — Goût fétide de la bouche. — Soif violente, continuelle, avec étouffement en buvant. — Manque d'appétit. — *Faiblesse de la digestion. — Après le repas : humeur hypocondriaque, chaleur du visage, pression et tension dans la région précordiale, à l'estomac et au ventre; envie de vomir ou d'aller à la selle; répugnance pour le travail; grande fatigue et envie de dormir.

Betomac. — Le soir, pituites de l'estomac, et vomissement suivi d'aigreur dans la bouche. — *Nausées maintinales. — Pression à l'estomac, principalement après le repas, ainsi qu'en méditant et en travaillant de tête. — Le matin, en se réveillant, pression dans la région précordiale. — Élancements au creux de l'estomac, principalement en respirant. — Gloussement et fermentation au creux de l'estomac. — Après le repas, commotion

dans la région précordiale à chaque pas.

Ventre. — *Pression dans le foie. — Coliques dans la région embilicale, le plus souvent pressives, ou lancinantes obtuses, aggravées par la respiration, la toux et la pression extérieure. — *Dureté du ventre. — Colique flatulente avec pincements et borborygmes dans le rentre, et envie d'aller à la selle. Selles. - Envie inulde d'aller à la selle - Surtie difficule, même des selles molles, a cause de l'inertie du rectum. couleur pale - Sortio de sang avec la selle. (Hemorrhoides deuloureuses a l'anus - *Prurit a l'anus. "Snintement du

Urines, Evacuation trequests done urine claire, aqueuse Pissoment nocturne, unsation de brulure au glang Pendant et apres levas dati de d'arme. gile, Urmes troubles, couleur dur-

Parties viriles. - Erections sans cause, h jour. Prurit voluptueux au scretum - Appetit venerien exalte, en inex itable. Manque de jouissance pendant le cost. Écoulement de liqueur prostatique pendant les selles, et apres as ir arme

Règles, oFlueur, blancle, avec prurit et exceriation aux partus Larynx. Raucite et set satur. Il ve riation dans la gorge, principalement apr - le repas. Toux avec chatouillement dans la gorge et etonffement. - Toux après le repus, avec vomissement de ce que l'on a pris, on le soir, au lit, avec congestion de sang à la tête. - Toux ébranlante comme la coqueluche, principalement la muit, ou à force de parler. - Toux (courte) avec expectoration purulente. - Expectoration de sang avec la tour. - En toussant, élancements à la tête. — Après une quinte de toux,

Poitrine. - Haleine courte et respiratson aethmatique. - Oppression de postrine, avec chaleur intérieure et anguisse qui pousse à chercher le grand air. - Pression et sensation d'excoriation dans la poitrine. - Élancements dans la région du cœur. - oRalement dans la tranchée artère, étant couché sur le côté ganche. Inquiétude au cour.

Trong. - Douleurs au dos et entre les omoplates, pour la plupart tractives et lancinantes ou pressives. - Fourmillement entre les omoplates. — Pression sur les épanies comme par un poids, -

Bras. - *Faiblesse et douleur tensire au bras. - *Tremblement de la main et du bras. — Douleurs pressives dans les muscles et les os des bras, avec fatigue. — Elancement et pasanteur dans l'avant-bras. — Douleurs crampoides dans les ce et les articulations des mains et des doigts, - Sensation de sécheresse aux mains et aux doigts. — Sueur visqueuse à la paume des mains.

Jambes. - Roideur des jambes, comme si elles étaient enveloppées, avec agitation en dedans. - Tremblement, tiraillement et tressaillement aux genoue et dans les cuisses, comme après avoir fatigué les jambes par la marche. — Pression cadeucée dans les cuisses. — Sensation de paralysie aux genoux. — Exoption pruritouse autour du genou jusqu'aux mollets. — Tressaillements et



ANACARDIUM. - ANGUSTURA.

pression crampoide aux mollets et aux jambes. — Douleur tensive aux mollets, le jour, en marchant, et la nuit, au lit, avec insomnie. — *Brûlement à la plante des pieds, —et aux jambes. — Froid aux piede en marchant, particulièrement le matin.

ANGUSTURA.

ANG. — Augusture vraie (écorce du Bonplandia trifoliata). — HAMKEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 168. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 4 jours quelquefois.

ANTIDOTES : Coff.

δli

COMPARER AVEC : Canth. coff. bruc. carb-an. plat.

N. B. — Les symptômes mis entre deux parenthèses, sont regardés par quoiques-uns comme appartenant à la fausse Augusture.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensation de faiblesse et de roideur dans tout le corps. — Roideur et extension des membres. —
Tension dans les muscles en marchant. — Paralysio de différentes
parties. — Tressaillements convulsifs. — Accès de tétanos, provoqués le plus souvent par le toucher, en buvant et par le bruit.

— Convulsions, se terminant par le bleuissement des joues et
des lèvres, respiration difficile et haletante, gémissement, et resserrement des paupières. — Commotion du tronc (comme par des
secousses électriques). — Accès (hystérique?) avec envis de vomir,
sensation spasmodique dans l'estomac et la poitrine, vertige et
sensation de gonfiement de la matrice. — Craquement dans les
articulations. — Carie, et ulcères douloureux qui attaquent les
cs et les perforent jusqu'à la moelle. — Douleurs en plusieurs
endroits comme par des coups.

Sommeil. — Le soir, grande envie de dormir, suivie d'insomnie avant minuit. — Sommeil agité avec rèves fréquents. — Le soir, au lit, sensation anxieuse, comme si tout le côté gauche était

engourdi,

Fièvre. -- "Horripilation à la partie malade. -- Le soir et la nuit,

chaleur avec embarras et douleur à la tête.

Moral. — Caractère peureux et disposition à s'effrayer. — Pusillanimité, et manque de confiance en soi-même. — Mauroise humeur et mécontentement avec grande susceptibilité aux offenses. — Excitation extrême et gaseté exaltée. — Distraction et rêveries. — Vivacité de l'esprit, principalement après midi.

Tôte. — Tête entreprise, et hébétude comme après l'ivresse. — Vertiges à l'air libre, ou en passant sur un courant d'eau. — Vertiges comme si le corps était tourné en arrière. — La tête est tirée en arrière, avec des baillements qui soulagent. — Après le



ANGUSTURA.

avec tranchées. — Douleur pressive et contractive à l'anus, avec gonflement des hémorrhoides. — Brûlement à l'anus pendant la selle.

Parties génitales. — Descente de la matrice, avec élancements, le matin, au lever. — Sensation comme si la matrice se gonflait ou se renversait. — Écoulement d'un liquide laiteux du vagin. — Paraît avoir une forte action sur le système utérin. — Pression dans l'ovaire droit. — Sensation comme si quelque chose de rond était dans le vagin et allait s'enfler. — Boutons pruriteux aux lèvres. — Prurit aux parties, avec grande irritation intérieure; après avoir gratté, il s'écoule du sang, ce qui soulage.

Urines. — Envie fréquente d'uriner, avec évacuation peu abondante, ou évacuation fréquente d'urines abondantes, précédée par une pression sur la vessie et suivie de ténesme. — Urine de couleur orange, et qui ne tarde pas à se troubler. — Prurit vio-

lent aux parties génitales.

58

Larynx. — Enrouement par des mucosités dans les voies nériennes. — Voix faible, timide. — *Toux sèche, avec râlement et grattement dans la poitrine. — Toux violente, profonde, avec expec-

toration de mucosités jaunatres.

Pottrino. — Respiration convulsive (intermittente). — Oppression de poitrine, en marchant vite et en montant. — Seconsses incisives, ou élancements dans la poitrine, et dans la région du cœur. — Battemement violent de cœur, étant assis et penché en avant, ou le soir, au lit, étant couché sur le côté gauche. — *Battement de cœur avec angoisse. — Sensation de contraction douloureuse du cœur. — Crampes de poitrine, avec spasmes douloureux des muscles de la poitrine. — Elancements dans le poumon droit, avec sensation comme si le poumon se retournait.

Trenc. — Douleur de meurtrissure dans les muscles de la poitrine, en remuant les bras. — Maux de reins, comme brisés, le plus souvent la nuit, et principalement vers les 4 heures du matin. — Reideur douloureuse à la nuque et entre les omoplates, le matin, au lit. — Opisthotomos. — Prurit violent le long du des.

Bras. — Bras las et lourds, comme paralysés, avec roideur du coude. — Faiblesse paralytique des coudes et des mains. — Tivaillements crampoides dans les avant-bras, les mains et les

doigts. - Froid aux doigts.

Jambos. — Douleur de luxation, ou de crampe à l'articulation coro-fémorale, aux jambes et aux pieds. — Douleur de courbature aux cuisses et aux jambes, en marchant, comme si elles allaient se briser. — Tension au sacrum et dans la hanche jusqu'au genou, comme si ces parties étaient trop courtes. — Tiraillement pressif dans toutes les parties des extrémités inférieures. — *En posant le pied, douleur a l'articulation du pied qui force à boiter. — Paralysie des articulations des pieds.



ANTIMONIUM.

— Éphélides. — Taches hépatiques. — *Ulcères fistuleux.* — *Corps aux pieds et excroissances calleuses. — Ongles décolorés et difformes. — Gonfiements rouges et chauds. — Dégénérescence de la peau.

Semmoil. - Forte envie de dormir le jour, et *sommolence comateuse principalement le soir ou le matin. -- Coma avec délire. -- Réveil avec effroi la nuit. -- Rèves anxieux, horribles, volup-

tueux, ou pénibles et pleins de querelles.

Fièvre. — *Fièvres intermittentes, avec affections gastriques ou bilieuses, principalement avec dégoût, nausées, romissements, renvois, langue chargée, amertume de la bouche, et soif modérée, diarrhée; tension et pression au creux de l'extomac avec tranchees. - *Fièrre tierce. - Sueur chaude, le matin de bonne heure tous les deux jours. - Pouls irrégulier, tantôt accéléré, tantôt lent. - Forte chaleur sous le soleil.

Moral. - Réflexions tristes sur son sort. — Dégoût de la vie avec tendance à se brûler la cervelle, ou à se noyer. — Disposition à s'effrayer. — *Humeur chagrine, mauvaise humeur. — Les regards et le toucher sont insupportables (à un enfant). — Désirs et amour exaltés. — Esprit obtus, imbécillité. — Manie. —

Démence.

60

Tota. — Embarras de la tête, comme après un long travail au froid. — Ivresse. — Vertige arec nausées. — Attaque d'apoplexie avec salivation écumeuse. — Céphalalgie après s'être baigné dans l'eau courante. — Céphalalgie avec étourdissement, par la fumée du tabac. — Sensation comme si le front allait éclater. — Douleur sourde dans le sinciput et le vertex, augmentée en montant un escalier. — Douleur crampoide dans la tête, améliorée par la marche au grand air. — Douleur térébrante dans le front et dans les tempes. — *Congestion à la tête, douloureuse et suivie d'épistaxis. — Douleur ostéocope au vertex comme par un gonflement du périoste. — *Démangeaison incommode à la tête, avec chute des chereux.

Youx. — Élancement dans les yeux. — *Paupières rouges, enflammées. — Inflammation des yeux, avec démangeaison et agglutination nocturne des paupières. - Léger suintement de la peau près de l'angle externe de l'œil. — Chassie dans les angles des yeux. — Agrandissement des yeux. — Sensibilité des yeux

à la lumière du jour. -- Cécité.

Oreilles. - Elancement dans les oreilles. - Rougeur, gonflement et chaleur de l'oreille. - Fouillement et bruissement dans les oreilles. - Surdeté, comme si on avait un bandeau sur l'oreille.

- Bourdonnement dans les oreilles.

Nes. - Éruption au nez. * Excornation des narines et des coins du nez. - Narines gercées et croûteuses. -- * Obturation du nez. - Saignement de nez, surtout le soir. Séchereme du nez. principalement en se promenant au grand air. -- Accumula-



ANTIMONIUM.

62

Selles. — Evacuation difficile de selles dures. — Envie presente d'aller à la selle. Selles de consistance de bouillie. — *Diarrhees avec tranchées, généralement aqueuses. — *Sécrétion continuelle de nucosités blanc jaunâtre par l'anus. — Ecoulement d'un sang noir par l'anus. — Boutons hémorrhoidaux avengles et fluents, avec brûlement et fourmillement. — Démangeaison brûlante et gerçures à l'anus. — Pression expansive dans le rectum et l'anus. — Furoncle brûlant au périnée.

Urines. Envie frequente d'uriner, avec émission peu abondante.

*Émission frequente et abondante d'urine, carec écoulement abondant de mucosites, brûlement dans l'urèthre, et maux de reins. En toussant, émission involuntaire des urines. — Urines aqueuses, ou de couleur dorée, ou brun rongeâtre et quelquesois mêlées de petits corpuscules rouges. — Douli ur incisive dans l'urèthre, en urinant. — cGravelle.

Parties viriles. — Excitation de l'appetit rénérien et grande lascivite. Pollutions. *Atrophie des testicules; douleurs dans les testicules

Bègles. - Métrorrhagies. - Écoulement acre et corrosif par le vagin.

Larynx. Forte chaleur dans la gorge, pendant le mouvement au grand air. — Grande faiblesse ou perte entière de la voix, principalement en s'échauffant. — Sensation d'un corps etranger dans le larynx, avec impossibilité de l'expectorer. — Spasme violent au larynx, avec sensation d'excoriation — Toux avec brulement dans la poitrine — Toux matutinale, sèche et ebranlante

Poitrine. — Oppression étouffante, et orthopnee paralytique. — Respiration profonde et suspirieuse. — Elancement dans la poiteme, pendant le temps et hors de la respiration — Douleur de contusion dans le grand pectoral, en levant les bras et en pressant dessus.

Trono. - Traction crampolde dans les muscles du cou et de la nuque. - Douleurs chamatismales à la nuque. - Miliaire à la nuque, aux omoplates, et derrière les oreilles.

Bras. Douleurs rhumatismales dans les bras. Vesicules rongentres au bras avec demangeaison — Inflammation doulous reuse des tendons du coude, avec forte rougeur et courbure du bras. *tionflement chaud et rouge de l'avant-bras, avec tendon lancinante — Traction dans l'avant-bras, les doigts et les articulations des doigts — Douleurs arthritiques dans les articulations des doigts. — Sensibilité d'uloureuse de la peau sous les ongles, et croussance lente de ceux-ci.

Jambes. - Traullement dans les membres inférieurs, surtout dans l'articulation coxosfemorale. Bosses avec auréole rouge, aux fesses et aux jambes. Douleurs violentes aux extrémités inferieures. *Engourdissement des jambes après être resté assis. — Douleur lancinante au genou et au tibia. — Roideux



APIS MELLIFERA.

Dysurie; Strangurie; Cystite; Albuminurie; Diabète sucré; Gonorrhée. — Affections des ovaires, telles que douleurs, inflammations, hypertrophies, tumeurs, hydropisie de ces organes; Hypertrophie de la matrice; Hydropisie de l'utérus; Souffrances menstruelles; Tumeurs et Névralgies de la vulve; Avortements imminents; Métrorrhagie; Hystérie; Squirre des seins. — Œdème du larynx; Pleurésies; Hydrothorax; Péricardite; Hydropisie du péricarde. — Panaris; Gonflement du genou; Podagre.

Voir la note, page 15.

64

SYMPTOMES GEMERAUX. -- Nodosités pruriteuses dans les articulations. — *Sensibilité extrême des parties musculaires à la moindre pression. — *Irritabilité et inquiétude. — Faibleme avec tremblement. — *Lassitude pénible, débilité et grande fatique ; débilité et faiblesse avant leur siège dans les centres ganglionnaires. - Epuisement, surtout dans le dos, comme après des travaux pénibles. — Prostration qui force à se concher à plat par terre. — Faiblesse, surtout dans le dos. - - Accès de faiblesse avec vertiges. - Défaillance avec paleur, froid, vomissement et diarrhée. — Sensibilité excessire au toucher et à la pression extérieure. — La chaleur, surtout celle de la chambre fermée, aggrave les souffrances ; l'eau froide soulage les douleurs, les tuméfactions et les sensations brûlantes; horreur de l'air froid. --La position couchée aggrave plusieurs souffrances, qui s'améliorent dans la position redressée; la marche et le mouvement améliorent beaucoup de souffrances, voire même les accidents les plus graves. - Le soir, s'aggravent ou apparaissent principalement : la toux, les frissons, la cludeur, les vertiges, la céphalalgie, les douleurs oculaires, les maux de dents, les coliques et l'enrouement. -- La nuit, souffrances aux yeux et dans la poitrine; vers le matin, diarrhée avec ténesme, coliques, mucosités dans la bouche, maux de tête, frissons, agitation plus grande. --- .*Etat convulsif pendant les couches.

Pean et Phénomènes extérieurs. — Prurit violent, lancinant, comme par des épingles ou des insectes, revenant après le mouvement; prurit sur de petites places circonscrites; prurit nocturne, empêchant de dormir; prurit brûlant, lancinant, insupportable, et qui met en colère. — *Tuméfactions arec violentes douleurs lancinantes; *enflures d'un rouge vif.avec stries rouges le long des membres; gonflement de la peau, rouge pâle, comme avec bouffissure, se répandant plus loin en surface; otumeure, plates, brûlantes, lancinantes, dures, rouges ou blanches, ou l'un et l'autre à la fois; opetits boutons très-sensibles, avec douleurs brûlantes et lancinantes; oélancements dans les éruptions. — oFu-



APIS MELLIFERA.

chaude, amélioration en comprimant la tête des deux mains; *douleurs de tête jusqu'à travers les yeux, autour et au-dessous des yeux; *accès de migraine dans le front, les tempes et au-dessus des yeux. — Tiraillements, tension, élancements brûlants, prurit et picotement au cuir chevelu. *Hydrocéphale imminente.

Youx. - * Frémissement et nalpitation du globe de l'arl (gauche), surfout la nuit : pesanteur, plenitude, pression, dans les yeux et les paupières; *térébration, élaucements et douleurs comme des coups dans les yeux; *douleur incisive, brûlement et rougeur des yeur; prurit lancinant dans les yeux, les paupières et les aleutours des yeux; prurit et cuisson dans les yeux et autour, aux paupieres et dans les angles. *Larmoiement, rougeur et brûlement des yeur; larmoiement, pendant l'inquictude morale, la nuit, pendant le mal de tête, et avec la photophobie, le brulement et la rougeur des yeux, sensation comme s'il y arait des mucontés dans l'œil - *Agglutination des paujnères; *paupières enflummées, rouges et gonflees ; *inflammation vialente des yeur, aree rougeur et fortes douleurs; *gonflements ordemateux, érysipélateux et autres, autour des yeux. *Excoriations des bords des paupières et des angles des yeux; vorgeolets; oinflammation, épaississement et obscurcissement de la cornée : des yeux ou les maux de tête. Vue incertaine.

Oreilles. Oreilles brulantes, avec tension autour; ogonflement

rouge des oreilles. Grande sensibilité au bruit

Nes. Nez rouge et gonfié, prurit et endolorissement du nez. -Coryza, avec sensation de gonfiement du nez, sécheresse de la bouche et lèvres brûlantes; éternument suivi de pression dans le

synciput et de vertiges.

66

Pace. — *Face pûle; *couleur livide, bleu rougeatre. — Chaleur et rougeur de la face, avec sensation de plénitude, désir de lations froides et élancements brûlants, *gonflement de la face avec tension et rougeur; *erysipèle de la face — Picotement et four-millement a la figure. — Lèrres douloureuses, jusqu'aux gencives et à la tête; lèvres comme contusionnées, ou comme gonflées; picotement, tension, douleur brûlante et gerçures aux levres; gonflement et renversement des lèvres; *cancer aux lèvres ?. — Serrement saccadé de la machoire inférieure.

Dents. Maux de dents jusque dans la tête; secousses et tres-

saillements dans les molaires supérieures gauches

Bouche. — *Cavité buccale sensible, comme si elle était brûlée;

*secheresse de la bouche et de la gorge, ofétidite de la bouche.

Salivation: salive visqueuse, écumeuse *Langue comme
brûlée, surtout au bord; résicules au bord de la langue, surtout
à gauche, avec exceriation, élancements et brûlement; *sécheresse, rougeur ardente, élancement brûlant, gonflement et in-



APIS MELLIFERA.

portable et gonflement à l'anus; odouleurs insupportables, lancinantes, terébrantes, dans les boutons hémorrhoidaux; suintement sanguinolent de l'anus, qui est gonflé.

Urines. — Miction plus abondante, jour et nuit : envie fréquente d'uriner. — Impossibilite d'uriner, ou très-peu d'urine à la fois, avec fortes douleurs ; *urines rares, fortement coloriées. — Brûlement et cuisson dans l'urethre, comme a la suite d'une brûlure.

Parties viriles. - Inquietude dans les cordons spermatiques.

Appetit venerien exalte.

6K

Parties de la femme. — Regles intermittentes, cessant et reparaissant alternativement; *menstrues douloureuses. Mêtrorrhagie avec avortement, avortement tres-jacile. *Gonflement des lèvres de la vulve. *Pression vers le bas, dans la région de la matrice, comme pour les regles *Douleur secante, élancement dans les ovaires, particulièrement comme après avoir leré une charge trop leurde; *gonflement, induration et hypertrophie des ovaires. - Douleurs brûlantes et lancinantes dans les mamelles squirreuses.

Larynx et Toux. Enrouement, avec sensibilité douloureuse du larynx; grattement dans la gorge et sécheresse. — Toux, avec chatouillement derrière la fossette du cou, le soir, toux avec co-phalalgie, avant minuit, au lit, après avoir dormi; toux qui cesse des qu'il se detache la moindre mucosité, *toux rauque, *comme dans le croup, avec respiration pénible et fièvre.

Poitrine et Respiration. - *Respiration pénible, avec constriction de la gorge: *respiration accelerée, surtout pendant le mouvement, en montant les escaliers et en marchant, parfois avec chaleur et mal a la tête, ou avec envie de dorinir, sensation comme si l'haleme allait faire defaut. *Les chambres chauffees sont insupportables. *Plenitude dans la poitrine, forçant à se mettre sur son séant; douleurs de poitrine a gauche, pres du sternum; élancements, surtout dans le côté gauche; *douleurs d'excoriation et de meurtrissure, comme après une continuon, surtout aux dernières côtes et le plus souvent à gauche; froid dans la poitrine, *chaleur dans la poitrine, "Hydrothorax, dans beaucoup de cas. - *Douleurs dans la région du cœur, lancinantes et empêchant la respiration.

Trone. — Roideur dans les reins. — Douleurs au dos, sons les omoplates, plus fartes pendant le monvement; veruption au dos comme des piqures de cousins. — Douleur tensive a la nuque, depuis l'epaule jusqu'a la tête, «dartre annulaire a la nuque. — Elancements a la nuque, à droite, en tournant la tête de ce côte

- *Glandes engorgées au cou.

Membres thoraciques. Douleurs tiraillantes depuis l'épaule jusque dans le bout des dougts Engourdissement surtout du bras gauche; *gonflement tedemateux du bras droit. Brûlement et élancements aux mains; rougeur, chaleur et gonflement des



ARGENTUM FOLIATUM.

arocats, des prédicateurs et en genéral des personnes qui sont obligées de parler longtemps sans discontinuer. Voir la note, page 15.

symptomes genéraux. Pression crampoide, tiraillante, principalement dans les membres et les os. — Douleur de brisement, principalement dans le sacrum et les articulations des membres inferieurs. Abattement et sensation de brisure, surtaut le matin et particulièrement apres le receil. — Sensation d'excoriation de la peau et des organes internes. Sensation d'engourdissement et de roideur dans les membres. — Attaques d'épilepsie. — Sensation de commotions electriques surtaut dans les membres du cote gauche. — Exacerbation des symptômes tous les jours après midi. — Démangeauson brûlante a diverses parties de la peau, et prurit ou picitement, comme par des puces ou des etincelles electriques. — Eruption boutonneuse, avec douleur brûlante d'excoriation — Sommeil agite avec rèves anxieux et terribles — Horriphation et froid, surtout apres madi et la nuit. — Sueur nocturne. — Inquiétude qui force a marcher vite. — Mauvaise humeur et aversion pour la parole — Idée fixe que

l'en allait être frappe d'apoptexie

70

Tôte. Hébétude et sensation de vacuité dans la tête. Obscurcissement comme par de la fumée, et sensation d'avresse arec fourmillement dans la tête. — Vertige avec obscurcissement de la vue ou avec assoupissement et chute des paupières — Douleur tractive et pressive à l'occiput, comme causée par un corps étranger, avec sensation de roideur dans la nuque. — Douleurs tractives semi-laterales, comme dans le fond du cerveau. — Pression engourdissante au sinciput — Accès de compression dans le cerveau, avec nausées et brulement a l'épigastre en heant et en se tenant debout. — *Douleurs crampoïdes et clancements dans la tête. — Douleur d'excoriation au cuir chevelu, à la plus légère pression. — Douleur osteocope, crampoïde et pressive, dans la tête. — Tressaillement douloureux dans les muscles des tempes et du front. — Boutons aux tempes, avec douleur d'ulceration.

Yeur - Prurit aux yeux et principal ment dans les angles.

Gonstement et rougeur du bord des paupières.

Oreilles. Elaucements dans les oreilles, avec douleur incisive qui s'étend jusqu'au fond du cerveau. — Prurit rongeaut à l'oreille exterieure, lequel porte a se gratter jusqu'au sang. — Sensation d'obturation des oreilles. — Violents élaucements et tiraillements dans la fossette derrière le lope de l'oreille.

Nez. - Epistaxis apres s'etre mouché, ou précedee de fourmillement et de chatouillement dans le nez. - Obturation du nez, avec démangeaison dans les narines. - Violent coryza fluent,



ARGENTUM MITRICUM.

petito place répandant une sensation de froid. - Sensation comme d'une petite ecorchure dans le larynx, aux environs de la fossette du cou, plus forte en parlant et en chantant. - Accumulation de mucosités dans la tranchée-artere, qui se détachent lorsqu'on se baisse, qu'on rit, ou qu'on monte un escalier, et qui s'expectorent facilement. - Accumulation abondante de mucosites dans la poitrine. Toux excitee par une douleur incisive dans la trachée-artere, avec expectoration de matieres séreuses. - Accès de toux courte et ralante, le jour, avec expectoration facile de matieres epaisses et blanchatres. - Toux excitée par le rire; pendant la toux, sensation comme si la gorge était au vif.

Poitrine. - Pression a la poitrine. - Pression et élancements dans le sternum et aux cotes. Douleurs incisives dans les côtés de la poitrine, en inspirant et en se penchant en avant. Douleurs crampoides dans les muscles de la poitrine et dans les côtes. Palpitations spasmodiques fréquentes, surtout étant couché

sur le dos.

72

Tronc. - Douleurs de brisement, ou de tiraillement aux reins. -

Douleurs crampoides dans les épaules et les omoplates.

Bras. Tension et tiraillements aigus, crampoides et pressifs, dans les bras et les mains. — Douleurs crampoides et pressives, dans les es et dans les articulations des mains et des doigts, -

Contraction des doigts.

En marchant, douleur lancinante, pressive et comme paralytique, à l'articulation coxo-femorale - Tressaillement des muscles des cuisses. Douleurs crampoides, aigues et incisives, dans les genour et les malleoles. Crampes dans les mollets, avec sensation de raccourcissement des muscles, en descendant un escalier. Douleur de brisement et pulsation dans les articulations du pied. Douleurs crampoïdes dans les os et dans les articulations des pieds et des orterls. Sensation d'engourdissement dans le talon et au tendon d'Achille.

ARGENTUM NITRICUM.

ARG V. - Nitrate d'argent. - Journal de Vienne. - Ilist. nat. et prép. Pharmac, homoop., p 79 - Duree d'action?.

ANTIDOTES - Ars, naw-in Comparen avec : Ars, aur, chin, iad, merc, natr-m, phosph, puls, rhus, stann. zinc.

CLINIQUE. — Jusqu'ici un a principalement employé ou recommande ce médicament contre les affections suivantes : Tremblement nerveux; Epilepsies; Catalepsie; Danse de Saint-Guy;



ARGENTUM NITRICUM.

Intellect et Cerveau. — Vertiges tournoyants, comme dans un cercle. — Vertigés avec céphalalgie, nausées, cécité et bourdonnement d'oreille. — Ivresse vertigineuse et étourdissement. — Vertige avec défaillance. — Stupidité et incapacité de méditer, avec manque d'expressions convenables. — Démonce avec sourires niais, manières imbéciles et visions de grimaces en fermant les yeux pendant le jour. — Embarras confus de la tête, avec

endolorissement, surtout après avoir pris du café.

Tôte. — Pesanteur et plénitude douloureuses dans la tête, particulièrement aussi le matin, en s'éveillant. — Céphalalgie comme si
la tête allait se fendre, à la suite d'efforts intellectuels. — Sensation d'un souffle frais qui paraît traverser le cerveau. — Déchirement semi-latéral dans la tête, depuis le front jusqu'à la face, et
liceil gauche, avec larmoiement, rougeur et brillement de l'œil. —
La plupart des maux de tête se manifestent d'un seul côté et
principalement à droite. — Congestion forte à la tête, avec pulsation des carotides, mélancolie, stupeur et inaptitude à la méditation. — *Céphalalgie continuelle. — Le grand air augmente
les maux de tête; la compression de la tête par un bandeau les
soulage. — La plupart des maux de tête, sont accompagnée de
frilosité.

Cuir chevelu. — Beaucoup de prurit au cuir chevelu, avec démangeaison et fourmillement, comme par des poux. — Papules enflammées et suintantes à la tête, avec prurit violent et douleurs d'exceriation. — Élevures comme des bosses au cuir chevelu et à-

la nuque, avec prurit.

74

Youx. — Inflammation des yeux, avec pression, mucosités qui forcent à s'essuyer les yeux, rougeur écarlate, ramollissement de la conjonctive, vue trouble et rétrécissement de la fente des paupières. — Agglutination nocturne des yeux. — Accumulation abondante de mucosités dans les yeux. — Angles des yeux conleur rouge de sang, avec gonfiement de la glande lacrymale, comme un morceau de chair rouge, et formation d'un faisceau de veines procédant des angles. — Conjonctive rouge, et boursoufiée. — Amélioration de l'ophthalmie à l'air libre et frais; douleurs insupportables à la chaleur de la chambre. — Lippitude. — Accès de cécité subite, au crépuscule, avec plaintes à haute voix. — Scotomie fréquente et confusion des lettres en lisant et en écrivant. — Presbyopse en lisant. — Cornée trouble, avec une tache blanche dessus.

Oreilles. — Otalgie. — Son de cloches, tintement et bourdonnement dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe et occlusion fréquents

des oreilles.

Men. — Douleur de meurtrissure aux os du nez. — Prurit violent, continuel, dans les narines, forçant à se gratter jusqu'au sang.
 Mouchement de sang et de mucosités sanguinolentes, purulentes. — Croûtes douloureuses, saignantes, dans le nes. —

ARGENTUM NITRICUM

Oderat emousse. - Obturation du nez avec beauconp de - Eternument frequent. - (or) za avec frissons manvaisc larm dement, eternament et cephalalgie stupefiante forçan coucher.

dans 🐑

botted o - ביינו

D)- € ~

4

Laboration and American

Visage. Face creuse, pâle bleuatre - Air maladif, vieill Dechirement et tiraillement d'un cote de la face - Convuldes muscles de la face, avec serrement de la macheire, « Goi ment de la levre superieure au-desseus du nez enflammees et pastules aux levres et aux coms de la bouche. Levres bleuatres

Dents. - Grande sensibilité des dents à l'eau froble. dents suctout pendant la masticulum et au contact des chos timiles on neides Exf hatem des dents, less sugment facil-ment

Secheresse de la lanque surtout le matin, - Langu charges d'un enduit bleuarre ou Jaune grisatre. - Langue ra peuse, par érection des papilles. - Gonflement de la langue avec douleur d'execriation. — Fétidité de la bouche, le matin. — Beaucoup de salive visqueuse dans la bouche. - Parole difficile et bégayante, par sécheresse du palais.

Gorge. - Rougeur foncée de l'arriere-bouche et de la luette. -Excoriation, sécheresse râpeuse et douleur d'excornation dans la gorge. — Douleur comme une écharde dans la gorge, en avalant. - Accumulation abondante, dans la bouche et la gorge, d'un mucus épars et visqueux, avec rendelement continuel. — Crampe et étranglement dans la gorge. - Crampe dans l'asophage, avec envie douloureuse de rendre des rapports, douleur d'estomac, nausées, défaillance et accumulation d'eau dans la bouche.

Appétit et Goût amer de la bouche, quelquefois astringent on metallique, on pateur et fade. - Perte de l'appetit; le manger n'a pas plus de saveur que la paille. — Désir de fromage fort on de sucre. - Grande faiblesse de digestion avec sensation continuelle de plénitude d'estomac.

Gastrons. - Rapports d'air fréquents et violents, accompagnant presque toutes les autres souffrances. — Nausées et dégoût continuels, jusqu'à la défaillance. — Vomissements qui teignent le linge en noir. — Vomissements avec angoisse, diarrhée et coliques

Betomac. - Pression douloureuse à l'estomac, particulièrement la nuit ansai, comme par une pierre, et suivie de vomissement. Sensation de plénitude comme si l'estomac allait crever. — Gastralgie, parfois avec frissonnement interne et manvaise mine, ou dérangeant surtout le sommeil de nuit. - Brûlement et cramponnement dans l'estomac, ou rongement et douleur d'excoriation. - Inflammation, ulcération et ramollissement de la muqueuse de l'estomac.

Ventre. — Pression et plénitude dans la région du foie. — Élance-



ARGENTUM NITRICUM.

ments dans le foie et la région spiénique. — Tiraillements pressifs dans le ventre, comme par une ascite. — Doulour d'excoriation et d'ulcération dans le ventre. — Sensation d'une boule montante. — Coliques crampoïdes. — Sortie fréquente de vents,

suivie de soulagement de tous les symptômes.

Anns et Selles. — Selles diarrisciques muqueuses, verdâtres et très-fétides. — Diarrhées jaunâtres, d'odeur putride. — Après avoir mangé du sucre, diarrhée nocturne, aqueuse, avec beaucoup de borborygmes et de gargouillements. — Diarrhées muqueuses et sangumolentes, avec grande débilité. — Ulcération des intestins, phthisie intestinale. — Beaucoup de prurit à l'anus, forçant à se gratter jusqu'au sang. — Sortie d'accarides et de morceaux de ver solitaire.

Urines. — Envie fréquente avec émission abondante d'une urine d'un jaune pâle. — Pissement nocturne fréquent. — Sensation comme si l'urêthre était bouché par gonfiement, avec émission de quelques gouttes après avoir uriné. — Sensation de rétrécissement du méat urinaire, en urinant. — Douleur d'excoriation en urinant, et en dehors du temps de la miction. — Inflammation et gonfiement de l'urêthre avec écoulement muqueux, priapisme, miction sanguinolente et fièvre. — Hématurie.

Parties viriles. — Ulcères semblables au chancre, au prépuce. — Hypertrophie et dureté du testicule droit. — Pollutions fréquentes. — Manque de désirs sexuels et parties génitales ra-

cornies.

76

Parties de la femme. — Règles plus abondantes, avec meux de reins et douleurs dans les aines. — Métrorrhagies. — Avortement. — Engorgement vultueux des glandes mammaires, avec douleur d'exceriation.

Larynx, — Sifflement dans le rhythme du pouls, dans le larynx, après le repas, dans la position conchée. — Enrouement nocturne, avec expectoration de mucosités sanguinolentes, après quelques coups d'une toux sèche. — Toux excitée par un chatouillement dans la gorge. — La fumée de tabac est insupportable pendant la toux. — Toux avec vomissements la nuit. — Toux suffocante, après midi. — Excitation persistante à la toux, avec hémoptysie et oppression.

Poitrine. — Oppression avec soupirs. — Dyspnée avec angoine. — Accès de suffocation. — Pression et pesanteur dans la poitrine. — Palpitations violentes, particulièrement la nuit ansal.

ou avec nausées et défaillance.

Tronc. — Douleurs dorsales, nocturnes, avec tension et serrement. — Maux de reins riolents, comme par luxation, le matin, sou-lagés par la station et la marche. — Pesanteur paralytique dans la région lombaire jusqu'à l'articulation coxo-fémorale. — Endo-lorissement des glandes axillaires.

Extrémités supérisures. — Douleur estécope nocturne dans le



ARNICA MONTANA.

ANTIDOTES: Camph. ign. — On l'emploie comme antidote de : Amm. chin. cic. fer. ipoc. seneg. — Le vin en aggrare les effets.
Companen avec: Acon. amm ars. bell. bry. cans. caps. cham. chin. eic. cin. coloc. ouphras. fer. hep. ign. ipoc. merc. notr. n-vom. pais. rhus. rut. samb. abin. seneg. staph. suif-ac. veratr. — C'est surtout après acon. ipoc. reratr. que l'arnica sera souvent d'une grande utilité, lorsqu'il est indiqué. — Après l'arnica, conviennent quelquefois: Acon. ipoc. rhus. sulf-ac.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas on l'on pourra consulter ce médicament contre : - Affections surtout des personnes pléthoriques à face rouge; ou bien des personnes lymphatiques ou épuisées, à face pale, jaunatre, terreuse; Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement inflammatoire et érysipélateux des parties affectées; Atrophie des enfants?; Affections par suite de lésions mécaniques (chute, commotion, coups, etc.); Blessures, principalement par des instruments obtus; Morsures; Excoriations; Ecorchure des malades alités; Contusions; Luxations; Entorses et fractures; Accidents par suite d'un tour de reins; Epilepsie par suite de lésions mécaniques?; Trismus; Tétanos; Convulsions traumatiques; Sugillations; Piqures d'insectes; Furoncles; Cors (par application extérieure après les avoir extirpés); Cachexie par l'abus du quinquina; Paralysie apoplectique; Fièvre intermittente; Fièvre traumatique; Fièvre typhoide?; Alienation mentale; Congestion cérébrale, avec vertiges et perte de connaissance; Apoplexie sanguine; Céphalalgie congestive; Céphalalgie nerveuse; Migraine?; Commotion du cerveau et de la moelle épinière; Hydrocéphale aigue?; Ophthalmie traumatique; Hémorrhagies du nez et de la bouche; Odontalgie avec gonflement de la joue ; Hématémèse ; Splénalgie ; Coliques, surtout celles provenant d'un tour de reins; Péritonite puerpérale?; Diarrhée; Lientérie?; Gonflement inflammatoire des testicules; Hématocèle; Douleurs après l'accouchement; Inflammation des parties génitales, par suite d'un accouchement laborieux; Inflammation érysipélateuse des mamelles, et excoriation des mamelons; Coqueluche?; Grippe?; Pleurodynie; Pleurésie?; Hémoptysie; Gonflement inflammatoire des articulations, principalement des genoux et des pieds; Tumeur blanche?; Podagru, etc., etc.

Voir la note, page 15.

78

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tiraillement aigu, ou picotement formicant, ou douleurs paralytiques et sensation de meurtrissure dans les membres et les articulations, ainsi que dans les parties lésées. — *Douleurs de luxation. — *Douleurs rhumatismales et arthritiques. — Inquiétude dans les parties malades.



ARNICA MONTANA.

80

chant — *Vertiges avec nausées. — *Maux de tête pressifs, principalement au front. — *Compression crampoide au front, comme si le cerveau était contracté en masse dure, principalement pres du feu — Douleur comme si un clau était enfence dans le cerveau. *Tiradlements tressaillants et élancements dans la tête, principalement aux tempes. Douleur incisive à travers la tête. — «Douleur a la tête au-dessus d'un œil, avec vomussement verdâtre (après un tour de reins). *Chaleur et ardeur à la tête, avec absence de chaleur au corps. — l'esanteur et fai-blesse de la tête — Aggravation et apparition des douleurs de tête principalement en marchant, en mentant, en meditant et en lisant, *ainsi qu'après le repas. — Fournillement au vertex. — Fixité et immobilité du cuir chevelu.

Yeux. - *Douleur d'excornation aux yeux et aux paupières, avec difficulte de les remuer. - ° l'eux rouges, enflummes.

Brûlement aux yeux et econlement de larmes brulantes. Paupières goufières, ecchymosées. - *Pupilies contractees. *Yeux ternes, troul les et al attus. *Yeux procuments, ou on mortié fermes. - Regard tixe, anxieux. - *Obscurcissement de la vue.

Oreilles. - Douleur de contusion aux oreilles. - Tiraillement aigu dans les oreilles. - Elancement dans et derrière les oreilles - Durête de l'aux et bourdonnement devant les oreilles.

Nez. — Douleur de contusion au nez. — Fourm.liement dans le nez. — *Nez gonfle et ecchymosé — *Hémorrhagie nasale. —

Narines ulcerées ('oryza avec brûlement au nez

Visage. - *Face pale, creuse, con jaune et bouffie. - Chaleur an visage sans chaleur du corps. *Gonfiement dur, rougeur luisante et chaleur dune joue avec douleur pulsative. - Four-nullement autour des yeux, aux joues et aux levres - Eruption pustuleuse au visage, principalement autour des yeux. - *Sécheresse, chaleur brulante, gonflement et gerçure des lèvres. Ulceration des coins de la bouche. - Etat paralytique de la mâchoire inferieure. - Gonflement douloureux des glandes vous-maxillaires et de celles du cou - Trismus avec bouche fermee.

Denta. Mal aux dents avec gonflement de la joue et fourmillement aux geneives. - Tiraillement aux dents en mangeant.

Vacillement et allongement des dents.

Bouche. — Secheresse de la bonche avec soif. — Salive sanguinolente. — Sensation d'excoriation et démangeaison a la langue, — *Langue sèche ou chargée d'un enduit blanc. *Le matin,

odeur putride de la bouche.

Gorge. — Sensation comme s'il y avait quelque chose de dur dans la gorge. — Déglutition empéchée par une espece de nausée. — Bruit pendant la déglutition. — Brûlement dans la gorge, avec anxiéte comme par une chaleur intérieure. — Mucosites amères dans la gorge.

Appétit. - *Gout putride ou amer ou glaireux. - Soif d'eau, ou



ARNICA MONTANA. — ARSENICUM ALBUM.

42

tion au larynx. — Toux la nuit pendant le sommeil. — Accès de toux s'annonçant par des pleurs, et *toux chez les enfants après avoir pleuré et sangloté par caprice et méchanceté. — Même les bâillements provoquent la toux. — *Toux avec expectoration sanguinolente; ole sang est clair, écumeux, mêlé de masses congulées et de mucosités. — Même sans toux, expectoration d'un sang noir congulé, après chaque effort corporel. — *Impossibilité d'expectorer les mucosités; il faut avaler ce que la toux a détaché. — En toussant, élancement à la têle, ou douleur de meurtrissure à la poitrine.

Poitrine. - *Respiration courte, haletante, *difficile et anxieuse.
- Ralement dans la poitrine. - *Oppression de la poitrine et gêne de la respiration. - Souvent respiration lente et profonde.
- *Haleine d'une odeur putride. - *Elancements dans la poitrine et les côtés, avec gêne de la respiration, augraves en tous-

trine et les côtés, avec géne de la respiration, aggraves en toussant, en respirant profondément et par le mouvement. — *Douleurs de meurtressures et compression de la poitrine. — Battement et palpitations de cœur. — *Points douloureux au cœur avec accès de défaillance.

Tronc. — Douleurs de meurtrissure et de luxation au dos, à la poitrine et aux reins. — Fourmillement au dos. — Faiblesse des muscles du cou; la tête tombe en arrière. — Gonflement douloureux des glandes du cou.

Bras. Douleur de courbature et fourmillement aux bras et aux mains. -- Douleurs de luxation dans les articulations des bras et des mains. -- Tressaillement dans les bras. -- Veines gonfiées aux nuins, avec pouls plein et fort. -- Manque de force dans les mains en saixissant quelque chose. -- Crampes aux doigts.

Jambes. — Douleur de courbature ou de luxation, ou tiraillement aigu dans les différentes parties des membres inférieurs. — *Fuibleme douloureuse, paralytique, dans les articulations, principalement de la hanche et du genou. — Manque de force au genou, avec fléchissement en marchant. — Tension au genou, comme par raccourcissement des tendons. — Gonflement pâle du genou. — *Gonflement inflammatoire, érysipélateux des pieds, avec endolorissement et aggravation des douleurs par le mouvement. — *Gonflement chaud, douloureux, dur et luisant des gros orteils. — Fourmillement anx pieds.

ARSENICUM ALBUM.

ARS. — Arsenic. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. hommop., p. 80. — Doses unitées: 10, 40. — Darée d'action : 36 à 40 jours, dans quelques affections chroniques.

Antidores : Chin. fer. hep. 1900. n-vom. samb. veratr. — Contre l'empai-




glaces, des acides, etc.; Mal de mer; Souffrances par suite d'un bain de mer; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Hématémèse; Vomissement des ivrognes et des femmes enceintes; Affections gastriques et bilieuses; Melana; Gastrite aigue; Squirre de l'estomac?; Cholérine; Choléra asiatique: Bouffrances à la suite du cholera; Coliques; Coliques spasmodiques; Carreau des enfants; Ascite: Bubons scrofuleux; Diarrhées, même celle des enfants pendant la dentition, et celles à la suite de la petite vérole; Dyssenterie; Lientérie?; Souffrances hémorrholdales; Inflammation du rectum; Ischurie; Paralysie de la vessie; Dysurie; Inflammation et gonflement des parties génitales; Erysipèle au scrotum?; Papules au scrotum; Aménorrhée; Flueurs blanches; Cancer et squirre de l'utérus?; Nausées et vomissement des femmes enceintes; Grippe; Laryngites aigues et chroniques; Coqueluche?; Hémoptysic?; Symptomes phthisiques; Hydrothorax; Affections asthmatiques, Asthme spasmodique. Asthme de Millar?; Angine de poltrine : Affections organiques du cœur : Notalgie: Sciatique? : Uicères aux jambes; Tumeur blanche?; Inflammation phlegmoneuse des pieds; Coxalgie; Ongles décolorés; Goutte aux pieds; Rhagades aux mains.

Voy. la note, page 15.

84

SYMPTOMES GENERAUX. -- * Accès de souffrances avec anxiété. froid, chute rapide des forces, et besoin de se concher. — *Br4lement principalement dans l'intérieur des parties affectées, ou douleurs vires et tractives. — *Douleurs nocturnes qui sont reascuties même pendant le sommeil, et qui sont tellement insugportables qu'elles portent au désespoir et à la fureur. — *Ag-. gravation des souffrances en entendant parler, ainsi qu'après le repus, le matin en se levant, le soir au lit, en se couchant sur la 🕟 partie affectée, ou pendant le repos, après les exercices prolongés : soulagement par la chaleur extérieure, ainsi qu'en restant debout, ou par la marche et le mouvement du corps. — *Apparition des souffrances par intermittence ou accès périodiques. — · *Gonflement œdémateux, avec douleur brûlante aux parties affectées. — Grande paresse et horreur de tout mouvement. — *Manque de forre, faiblesse excessive et asthénie complète jusqu'à la prostration, quelquefois exvec paralysis de la machoire inférieure, yeux ternes et enfoncés, et bouche ouverte. - *Chate rapide des forces, et sensation de faiblesse comme par manque de nourriture. — *Impossibilité de marcher, et besoin de rester conché. - *Etant couché, on se sent plus fort, mais des qu'on se lève, on tombe de faiblesse. — *Amaigrissement et atrophie de tout le corps avec sueurs colliquatires, grande faibleme, face terreuse et yeux enfoncés et cernés. — *Accès de convulsions vio-



85

lentes; "spasmes et tétanos. — *Accès d'épilepsie, précédé de brûlement à l'estomac, pression et chaleur au dos qui remontent jusqu'à la nuque et au cerveau, avec vertiges. — *Enflure codémateuse et gonflement de tout le corps, principalement de la tête et du visage, avec grosseur du ventre et engorgement des glandes. — *Tremblement des membres, principalement des bras et des jambes. — Roideur et immobilité des membres, quelquefois avec douleurs vives, rhumatismales. — Paralysie et contraction des membres. — Accès d'évanouissement, quelquefois avec vertiges et enflure du visage. — Senantion de torpeur dans les membres, comme s'ile étaient morts.

Peau, — Desquazzation de la peau du corps. — *Peau sèche comme du parchemin, froide et bleudtre. — *Couleur jaunatre de la peau. — Elancements, prurit brûlant, et brûlement violent à la pean. — *Taches rougeatres ou bleuktres à la peau. -- *Pétéchies. — Taches enflammées, comme des morbilles, principalement à la tête, au visage et au cou. - Eruptions miliaires, rouges et Manches. — Boutone conoides, blanchâtres ou rougeatres, avec prurit brûlant. — *Eruptions urticuires. — Eruption de pustules noises, doulourenses. — Exuption de boutons galeux, petits et pruriteus. — *Eruption de petits boutous rouges, qui crèvent et passent en ulcères rongeants se convrant d'une croûte. — Pustules remplies de sang et de pus. — Taches dartreuses couvertes de phlyctènes et de furfures, avec douleurs brûlantes nocturnes. — *Ulcères à bords élevés et calleux, entourés d'une auréole rouge et luisante, à fond lardacé ou d'un bleu noirâtre, et arec douleurs brûlantes ou lancinantes, principalement lorsque les parties affectées se refroidissent. -- *Odeur fétide, suppuration ichoreuse, saignement facile, putridité et couleur bleuatre ou verdatre des ulcères. -- Charbon malin. -- *Croûtes minces ou chairs luxuriantes aux ulcères. — Manque de sécrétion dans les alcères. — Tumeurs inflammatoires avec douleurs brûlantes. — Verrues. — •Ulcères en forme de verrue. — Engelures. — *Varices. — Ongles décolorés. — «Tumeurs froides.

Semmeil. — Envie de dormir continuelle, avec baillements forts et fréquents. — *Insomnie nocturne, arec agitation et jactation continuelles. — Somnolence le soir. — *Coma vigil, souvent interrompu par des gémissements et des grincements de dents. — Sommeil non réparateur; le matin, il semble qu'on n'ait pas assez dormi. — Pendant le sommeil, sursants arec effroi, gémissements, paroles et querelles, grincements de dents, mouvements convulsifs des mains et des doigts, sensation d'un malaise général et jactation. — En dormant, on est couché sur le dos, la main sous la tête. — Sommeil léger; on entend le moundre bruit, quoique l'on rêve continuellement. — Rêves fréquents, pleins de menaces, de soucis, d'appréhensions, de repentir et d'inquiétude; rêves anxieux, horribles, fantastiques, vifs et facheux; rêves



d'orage, d'incendie, d'eaux noires et d'obscurité; rêves avec méditation. — *La suit, tressaillement des membres, chaleur et agitation, brûlement sous la peau, comme s'il y avait de l'eau bouillante dans les veines, ou froid avec impossibilité de se réchausser, étonssement au larynx, accès asthmatiques, grande agitation et angoisse au cœur. — *Réveil fréquent, la nuit, avec difficulté de se rendormir.

Fièvres. — Froid de tout le corps, quelquefois avec sueur froide, visqueuse. — *Frissons et horripilation, principalement le soir, au lit. ou en se promenant au grand air, ou après avoir bu ou mangé, et souvent avec apparition d'autres souffrances, telles que douleurs vives dans les membres, pendiculations, mal à la tête, oppression de la poitrine et géne de la respiration, tiruillement dans les membres, anxiété et inquiétude. — Chaleur unirerselle, principalement la nuit, et souvent avec anxiété, inquiétude, délires, pesanteur et embarras à la tête, étourdissements. vertiges, oppression et points dans la poitrine, rougeur de la peau, etc. — *Accès fébriles, principalement le matin on le soir, souvent arec frissons et chaleur peu déceloppés, soif ardente, ou adypsie complète, type quarte ou tierce, ou, quelquefois, quotidien; souffrances avant l'accès et sueurs après, en s'endormant; apyrexie (ou frissons ou chaleur) avec grande faiblesse, affections hydropiques, endolorissement des régions du foie et de la rate, mai à la tête, étourdissant ou lancinant, douleurs rives et tractives aux membres, au dos et à la tête, pression, plénitude, tension et brûlement à l'estomac et à l'épigastre, points dans la poitrine et dans les côtés, gêne de la respiration, anxiété, face bouffie, terreuse, etc. — *Pouls irrégulier, ou accéléré, faible, petit et fréquent, ou supprimé et tremblant. — *Sueurs fréquentes, colliquatives, ou froides et visquenses; *sueur la muit, ou le soir en s'endormant, ou le matin en s'éveillant ; sueurs partielles, principalement au visage et aux jambes. — Transpiration qui colore le linge et la peau en jaune. -- Pendant la sueur, pesanteur à la tête, bourdonnement des oreilles, et tremblement des membres.

Meral. — *Métancolie, quelquefois avec des idées religieuses, tristesse, soucis, chagrin, cris et plaintes. — *Anxiété, inquiétude et angoisses excessives qui ne permettent de rester nulle part, principalement le soir au lit, ou le matin en s'éveillant, et souvent avec tremblement, sueur froide, oppression de la poitrine, gêne de la respiration et accès d'évanouissement. — *Anxiété de conscience, comme si l'on avait commis un crime. — Angoisse inconscience, comme si l'on avait commis un crime. — Angoisse inconsolable, avec plaintes et lamentations. — Humeur hypocondriaque, avec inquiétude et anxiété. — *Peur de la solitude, despectres et de voleurs, avec envie de se cacher. — Indécision et humeur changeante, qui demande tantôt ceci, tantôt cela, et rebute tout après l'avoir obtenu. — *Découragement, décespoir, dégoût

86





de la vie, penchant au suicide ou *crainte excessive de la mort, qu'on croit quelquefois très-prochaine. — Trop grande sensibilité et scrupules de conscience, avec idées tristes comme si l'on avait offensé tout le monde. — Mauvaise humeur, impatience, dépit, disposition à se fâcher, répugnance pour la concernation, encie de critiquer, et grande susceptibilité. — Esprit caustique et moqueur. — Sur-impressionnabilité de tous les organes; tout bruit, toute convernation, toute lumière vive, sont insupportables. — Grande apathie et indifférence. — Grande faiblesse de mémoire. — Stupidité et hébétude. — *Délires avec grande afflucice d'idées. — Perte de connaissance et de seus; radotage, actions maniaques et fureur.

Tita. — *Pesanteur, sensation de faiblesse et embarras dans la tête, principalement dans la chambre, amélioration au grand air. Stupeur et étourdimement. — Vertiges, principalement le soir, en fermant les yeux, en marchant ou au grand air, et quelquefois avec chancellement et péril de tomber, ivresse, perte des sens, obscurciasement des yeux, envie de vomir, et mal à la tête. --*Douleurs pulsatives, oppressives, étourdissantes, ou tractives, lancinantes et brûlantes, à la tête, souvent seulement d'un côté, et principalement au-dessus d'un œil, ou à la racine du nes, ou à l'occiput, et quelquefois avec envie de vomir, –et bourdonnement des creilles. — Tension, serrement et douleur de meurtrissure dans la tête. — *Les maux de tête apparaissent souvent périodiquemens, et surtout après chaque repas, le matin, la nuit, et le soir au lit, et quelquefois ils sont insupportables, exvec pleurs et gémissements, -étant soulagés momentanément par l'eau froide, et se renouvelant d'autant plus fortement après. — Sensation, en remuant la tête, comme si le cerveau frappait contre le crane. --Craquement ou bruissement dans la tête. — * Endolorissement du cuir cherelu et des téguments de la tête, comme s'ils étaient ulcérés ou meurtris, augmenté fortement par le moindre contact. - Gonflement excessif de la tête et du visage. - Prarit rongeant ou brûlant, *éruptions croûteuses, pustules et ulcères rongeants au cuir chevelu.

Year. — Douleurs pressives, brûlantes et lancinantes dans les year, *aggrarées par la lumière, *ainsi que par le mouvement des year, et quelquesois avec besoin de se coucher ou avec angoisse qui ne permet pas de rester au lit. — *Year enstammés, rouges, avec sougeur de la conjonctive ou de la selérotique, et injection des veines de la conjonctive. — Gonsiement des year. — *Gonsiement instammatoire, ou ædémateur des paupières. — *Grande sécheresse des paupières, principalement aux bords, et en lisant à la lumière (des bougies). — *Larmes corrosives. — *Agglutination des paupières. — *Occlusion spasmodique des paupières, quelquesois par l'esset de la lumière. — *Photophobie excessive. — Taches et uloires de la cornée. — *Year convulsés,



proéminents; regard fixe et furieur. — Pupilles contractées. — Couleur jaunaire de la sclérotique. — Couleur jaune, taches ou points blancs et étincelles devant les yeux. — Faiblesse, obscurcissement et perte de la vue. — Yeux ternes et enfoncés.

Oreilles. — Serrement, douleurs vives, élancements, fourmillement voluptueux et brûlement aux oreilles. — Tintement, bruissement, bourdonnement et son de cloches dans les oreilles. — Sensation comme si les oreilles étaient bouchées, et dureté de l'ouis, surtout

pour la parole humaine.

88

Nos. — Douleurs ostéocopes au nes. — Gonfiement du nes. — Saignement de nez violent. — Desquamation de la peau du nes, en furfures. — Tumeurs noueuses dans les navines. — Ulcération au haut des navines, avec écoulement d'une humeur ichoreuse, fétide et d'un goût amer. — Odeur de poix ou de soufre devant le nez. — Éternument violent. — Grande sécheresse des navines. — *('orysu fluent avec obturation du nes, brûlement aux navines et

sécrétion d'un mucus séreux et corrosif.

Visago. — *Face pále, creuse et cadavéreuse. — *Couleur jaunátre, bleuåtre ou verdátre du visage. - *Teint plombé et terreux, avec taches et stries verdâtres et bleuâtres. - *Face décomposée, avec distorsion des traits, ou avec yeux cernés et enfoncés et nez pointu. — *Rougeur et bouffissure du visage. — Gonstement dur et élastique du risage, principalement au dessus des paupières, et surtout le matin. - Enflure du visage, avec accès d'évanouimement et vertiges. — Papules, boutons, *wicères croûteux, occuperose et dartres farineuses au visage. - Teint noirâtre autour de la bouche. — *Lèvres bleudtres ou noirâtres, osèches et gercées. — Fourmillement dans la lèvre excoriée, comme s'il y rampait quelque chose de vivant. — Bande brunâtre à la partie rouge des lèvres. — Peau rude, dartreuse autour de la *Eruption à la bouche et aux lèvres, au bord de la partie rouge. — *Nodosités dures et ulcères carcinomateux, avec croûte épaisse et fond lardacé, aux lèvres. — Lèvres excoriées, avec sensation de fourmillement. — Enflure et saignement des *(Fonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleurs de contusion, et endolorissement au toucher. — Paralysie de la machoire inférieure.

Dents. - Douleurs vives, pressives, ou tiraillements successifs dans les dents et les gencives, principalement la nuit, se propageant quelquefois jusqu'u la jone, à l'oreille et aux tempes, avec gonfiement de la jone et douleurs insupportables qui portent à un désespoir furieux, ou qui s'aggrarent lorsqu'on se couche sur le côté malade, et qui s'améliorent par la chaleur du feu. - Grincement convulsif des dents. - Sensation d'allongement et vacillement douloureux des dents, avec goufiement et saignement des gencives.

Bonohe. — *Mauvaise odeur de la bouche. — *Grande sécheresse de lu bouche, ou accumulation d'une salive quelquefois amère ou



89

canguinolente. — *Langue bleuktre ou blanche, — Torpeur et insensibilité de la langue, comme si elle était brûlée. — *Langue brunûtre, ou noirâtre, sèche, gercée et tremblante. — *Langue d'un rouge vif. — Ulcération de la langue au bord autérieur. — *Aphthes dans la bouche. — Parole rapide, précipitée.

Gerge. — *Grattement, douleur vive et brûlement dans la gorge. — Inflammation et gangrène de la gorge. — Constriction spasmodique de la gorge et de l'œsophage, avec impossibilité d'avaler. — Déglutition douloureuse et difficile, comme par paralysie de l'œsophage. — Semmation de grande sécheresse dans la gorge et la bouche, qui force à boire constamment. — *Accumulation de mucosités griektres ou verdâtres d'un goût salé on amer, dans

la gorge.

Appétit. — *Gout amer de la bouche, principalement après avoir bu ou mangé, ou bien le matin. — Gout astringent, putride, ou acide, dans la bouche. — Goût acide des aliments. — Goût fade ou trop salé des aliments. — Insipidité des aliments. — Goût amer des aliments, principalement du pain et de la bière. — *Adypaie complète, ou soif violente, ardente, étouffante et inextinguible, arec besoin de boire continuellement, mais peu à la fois. — *Désir de l'eau froide, des acides, de l'eau-de-vie, du casé et du lait. - Manque d'appétit et de faim, souvent avec soif ardente. - Dégoût insurmontable de tous les aliments, principalement de la viande et du beurre. — *Tout ce qu'on avale cause une pression dans l'œsophage comme si cela y était arrêté. Faim continuelle, avec manque d'appétit et prompte satiété. – *Après le repas, nausées, vomissements, rapports, douleurs à Pestomae, coliques et beaucoup d'autres souffrances. — *Après avoir bu, frusions ou horripilation, renouvellements des vomissements et de la diarrhée, rapports et coliques.

Estomac. — Rapports fréquents, principalement après avoir bu ou mangé, le plus souvent à vide, acides, ou amers. — Régurgitation de matières acres, ou de mucosités amères, verdatres. — Hoquet fréquent et convulsif, principalement la nuit. — Nausées fréquentes et excessives, quelquefois remontant jusqu'au con, avec envie de dormir, besoin de se coucher, sommeil, accès de défaillance, tremblement, horripilation on chalcur, douleurs aux pieds, etc. — Ecoulement d'eau de l'estomac, omme des pituites. - * l'omissements quelquefois très-riolents, et principalement après avoir bu ou mangé, ou la nuit, vers le matin; *vomissemente des alimente et des boissons, on des matières muqueuses, bilieuses ou séreuses, de couleur juunâtre, verdâtre, brunâtre ou moirâtre; *vomissement de matières sanguinolentes. — *En vomissant, douleurs violentes à l'estomac, sensation d'excoriation dans le ventre, cris, chaleur intérieure ardente, diarrhée et crainte de la mort. - *Ballonnement et tension de la région précordiale et de l'estomac. — Endolorissement excessif de l'épi-



gastre et de l'estomac, principalement au toucher. — *Pression dans l'estomac comme par une pierre, ou comme si le cœur devait éclater, et angoisse excessive dans la région precordiale, avec plaintes et lamentations. — *Sensation de constriction, douleurs crampoïdes, tiraillement, térébration et rongement dans l'estomac. *Sensation de froid, ou chaleur et brûlement insupportables dans l'estomac et la région précordiale *Les douleurs à l'estomac se manifestent principalement après le repas, ou la nuit. — Dartres au creux de l'estomac.

Ventre. — Compression dans la region du foie. Gonflement de la rate. — *Maur de rentre excessifs, principalement du côté gauche, et souvent avec grande angoisse dans le rentre — *Ballonnement du ventre. — *Gonflement du rentre comme dans l'ascite. — *Tranchées violentes, douleurs crampoïdes, fouillement, tiraillement, déchirement et rongement dans le ventre. — *Les coliques se manifestent principalement après avoir bu ou mangé, on la nuit, et sont souvent accompagnées de vomissement, ou de diarrhée, avec froid, chaleur interne ou sueur froide.

*Sensation de froid, ou brûlement manpportable dans le rentre. — Douleur de plaie dans le ventre, principalement en toussant et en riant. Gonflement et induration des glandes du mésentère. — Beaucoup de flatuosités, avec borborygmes et grondement dans le ventre — Flatuosités d'une odeur putride. Gonflement douloureux des glandes inguinales. — oUlcère nu-

dessus du nombril.

901

Selles. — Constitution, avec envie fréquente, mais sans effet, d'aller à la selle. — Ténesme, avec brûlement à l'anus. — Sortie involontaire et inaperçue des selles. — *Diarrhées violentes, avec selles fréquentes, nausées, vomissement, soif, grande faiblesse, coliques et tenesme. *Diarrhées nocturnes, et renouvellement de la diarrhée après avoir bu ou mangé. — *Selles brûlantes et corrosives; *selles muqueuses, bilieuses, sanguinolentes, seteuses, etc., de couleur verdâtre, jaunâtre, blanchâtre, ou *brunâtre et noirâtre; *selles fétides et putrides; *selles avec matières non digérees. Sortie de mucosites par l'anus, avec ténesme Chute du rectum, avec beaucoup de douleurs. — *Prurit, douleur d'excoriation et brûlement au rectum et à l'anus, ainsi qu'aux boutous hémorrhoïdaux, principalement la nuit. Élancements dans les boutons hémorrhoïdaux.

dans les boutons hémorrholdaux.

Urines. — *Rétention d'urine, comme par paralysie de la vessie.

Envie fréquente d'uriner, même la nuit, avec évacuation abondante.

Incontinence d'urine et évacuations involontaires, même la nuit, au lit. •Émission difficile et douloureuse des urines. •Urines rares, couleur jaune foncé. Urines aqueuses, verdâtres, brunâtres ou troubles, °avec sédiment muqueux.

•Urines sanguinolentes. • *Brûlement dans l'urêthre, en uri-

nant.



ARUM TRIPHYLLUM. -- ASA FŒTIDA.

92

Trenc. — Taches jaunâtres à la poitrine. — Douleur violente et brûlante au dos, fortement aggravée par le contact. — Douleurs tractives aiguës, dans le dos et entre les omoplates, avec besoin d'être couché. — Gonflement ædémateux et non douloureux du cou et de la mâchoire inférieure. — Dartres entre les omoplates.

Bras. — Douleurs tractives aiguës dans les bras et les mains. —
•Gonflement du bras, avec pustules noirâtres d'odeur putride.
— *Douleurs tractives, aiguës, la nuit, partant du coude et
répondant jusqu'à l'aisselle. — Tiraillement aigu et lancinant
dans les poignets. — Crampes dans les doigts. — •La nuit, sensation de plénitude et de gonflement dans la paume des mains. —
•Excoriation entre les doigts. — Gonflement dur des doigts, avec
douleurs ostéocopes. — •Ulcères au bout des doigts avec douleur
brûlante. — Ongles décolorés.

Jambes. — Crampes dans les jambes. — Douleurs tractives aigués dans les hanches, jusque dans les aines, les cuisses, et s'étendant quelquefois jusqu'aux malléoles, avec inquiétude qui oblige à remuer constamment le membre. — Douleur rhumatismale aux jambes et surtout au tibia. — Faiblesse paralytique de la cuisse. — *Douleur de brisement dans l'articulation du genou. — Raccourcissement des téndons du jarret. — *Dartres au jarret. — Crampes aux mollets. — *Ulcères brûlants et lancinants à la jambe. — *Fatigue des jambes et des pieds. — *Gonflement du pied, brûlant, dur et luisant, avec vésicules brûlantes couleur bleu noirâtre, sur le cou-de-pied. — *Vésicules rongeantes et ulcérées à la plante des pieds et aux orteils. — Douleurs à la partie charque des orteils, comme s'ils étaient usés par la marche.

ARUM TRIPHYLLUM.

ARUM-TR? - Voy. HALE, Remèdes américains.

Cette substance est souvent d'un secours inappréciable dans les Affections du larynx et de la trachée, à la suite de la fatigue de la voix, chez les chanteurs, les avocats, les prédicateurs, etc., surtout lorsqu'il y a forte accumulation de glaires, voix enrouée et incertaine, tantôt basse, tantôt haute, etc.

ASA POTIDA.

ASA. — Gomme résine de Férula. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Plurmac. hommop., p. 172. — Doses natiées : S. 6, 9. — Durés d'action : 4 à 6 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

Antidotes : Caus. chin. électric. — On l'emplois comme antidote de : Merc. puis?.





ASA FŒTIDA.

Compania Avec : Ant. Bur. come. chin. coff. con. more. n-vom. phos. plat. puls. rhus. rut. thui. tart. — C'est surtout après thui. et puls. que l'asse mérite la préférence lorsqu'il est indiqué. — Après l'ass, convicament quelquelois : puls. et caus.

CLIBIQUE. -- le laismat guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où es médicament pourra être consulté contre : --Affections scrofulouses et rachitiques ; Inflammations, ramollimement, déviation, suppuration et carie des on; Suppurations ichoreuses; Engorgement des glandes; Souffrances hystériques et hypocondrigques; Hémorrhagies?; Suites facheuses de l'abus du mercure; Danse de Saint-Guy; Otorrhée et dureté de l'oule après l'abus du mercurs ; Ophthalmis, osène et phisgmon du nes des sufants scrofuleux; Souffrances guetriques et bilieuses; Gastrite?; Œsophagite?; Carreau?; Ascite avec hydropisie générale, dépendant d'affections organiques dans le ventre; Affections aethmatiques des personnes scrofuleuses, provoquées par des efforts, le coït ou des repas trop abondants; Affections organiques et battements du cœur, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SETPTONIES GENERAUX. — Douleurs succadées, rhythmiques, le plus souvent tractives, aiguës, avec tiraillements successifs, ou bien pressives avec élancements sourds, ou bien encore douleurs vives qui se manifestent du dedans au dehors, améliorées ou changeant de nature par le toucher, et accompagnées de sensation d'engourdissement. — Douleurs dans les muscles fléchisseurs. — Les symptômes apparaissent étant assis et s'améliorent par le mouvement au grand air. — Palpitations et frémissements de quelques muscles et fibres musculaires. Grattement et térébration dans le périoste. - Inflammation douloureuse et ulcération des os. -- • Carie. - Gonflement chand et ronge des parties affectées. — "Gonflement des glandes. — Sensation de lourdeur dans tout-le corps.

eau. -- Ulceres avec bords durs, bleuâtres et très sensibles au

toucher. — *Pus séreux, fétide et sanieux.

Samuell. — Forte disposition à dormir. — Affluence de rêves généralement gais. - Sommeil non réparateur avec jactation et réveil fréquent.

Fièvre. — Sensation de chaleur au visage après le repas, sans soif. avec angoisse et envie de dormir. - Horripilation passagère. -

Pouls accéléré.

Moral — Inquiétude et angoissel hystériques et hypocondriaquee. - Vernstilité. - Mauvaise humeur et peu de goût pour le



ASA FORTIDA.

travail. — Grande irritabilité avec indifférence pour teutes choses.

Tête. — Confusion et tournoiement dans la tête. — Embarras de la tête avec forte pression et difficulté de penser. — Émoussement des sens sans perte de connaissance. — Maux de tête qui changent de nature ou se dissipent au toucher. — Tension étourdissante dans la tête. — Élancements obtus ou pression dans les côtés de la tête, les tempes et le front, comme celle d'un tampon qui presserait du dehors en dedans. — Douleurs constrictives dans la tête. — Congestion à la tête avec battements. — Douleurs crampoldes dans le front au-dessus des sourcils.

Yeux. — Douleurs aux yeux comme s'il y avait du sable dedans, avec sensation de froid. — Brûlement dans les yeux, avec traction des paupières comme par le sommeil. — Sensation pénible de sécheresse on sécheresse réelle des yeux. — Frémissement

des paupières. — Obscurcissement de la vue en écrivant.

Oroilles. — Douleurs pressives dans l'oreille. — Dureté de l'oute,

avec écoulement purulent.

Hea. — Douleurs pressives dans le nez et principalement dans les ailes du nez. — Tension avec sensation d'engourdissement dans les os du nez. — Ecoulement purulent par le nez, de matières

fétides, verdâtres.

94

Visage. — Douleurs à la face, généralement tensives, avec sensation d'engourdissement dans les os de la face, principalement à la pommette. — Sensation de plénitude pressive dans le visage. — Pression engourdissante au menton. — Douleurs tractives aigués à la mâchoire inférieure.

Bouche. — Lèvres gonfiées avec lancination brûlante. — Sécheresse de la bouche avec sensation de brûlure et douleur d'excoriation. — Sensation de sécheresse quoique la bouche soit humide.

Gorge. — Maux de gorge, comme si un corps étranger montait dans l'asophage avec pression. — Sensation de brûlure, de sécheresse et d'excoriation dans la gorge avec tension pendant la déglutition.

Appétit. — Goût généralement amer ou rance comme de la graisse.

Goût fade et dégoût comme après une indigestion causée par des aliments trop gras. — Aversion pour la bière, qui semble avoir

un gout muqueux.

Estomac. — Renvois comme après avoir mangé de l'ail, ou bien avec goût àcre et rance. — Pression à l'estomac avec tension et sensation comme si quelque chose montait dans l'œsophage, même après le repas. — Douleurs crampoldes, contractives, à l'estomac. — Douleur de brisement et sensation de plénitude à la région de l'estomac. — Sensation de brûlure à l'estomac et au diaphragme. — *Pulsation visible et sensible à l'épigastre. — Dérangement de l'estomac par des aliments gras.

Ventre. — Douleurs hépatiques généralement pressives ou lan-



ASARUM.

CLINIQUE. — En étudiant les symptèmes, on verra el l'on peut consulter ce médicament contre quelques cas de : Migraine ; Ophthalmie ; Affections gastriques et bilieuses ; Helminthiasis ; Lientérie, etc., etc.

Voyez la note, page 15.

96

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Susceptibilité excessive de tout le système nerveux. — *Douleurs tractives, aiguës, tiraillements enccessifs et traction crampolde, principalement dans les membres, avec vomissement et lientérie, après des opérations. — Grand abattement, prin ipalement après le diner, avec nonchalance et aversion pour le travail. — Faiblesse le soir et envie de vomir avec désir de se concher. — Grande aquité de tous les membres; il semble qu'on vole au lieu de marcher — Les souffrances se dissipent en se lavant le visage avec de l'eau froide. — Envie de dormir le jour. — On ne peut s'endormir le soir à cause d'un bouillonnement de sang. — Rêves facheux, désagréables, — Froid, frissons et frémissements. — Alternation de froid et de chaleur brulante — Humeur chagrine, inélancolique, — Tristesse avec disposition a pleurer. — *Grande surexcitation morale.

Tôte. - Embarros pressif avec tension et hébétude de la tête et incapacité de travailler — Les idées se perdent. — Vertige comme par avresse en se levant de son siège ou en marchant. — Douleurs a la tête provoquées ou aggravées par la fatigue intellectuelle — Traction ctourdissante ou pression dans la tête et principalement aux tempes, au front et an-dessus de la racine du nez. — Compression dans les parties laterales de la tête. — *Acces de cephalalgie au côté gauche de la tête, tous les jours vers 5 heures du soir. — Pulsations et battements dans la tête, et surtout dans le front en se baissant. — Tension du cuir chevelu avec endolorissement des cheveux.

Youx. — Douleurs dans les yeux comme si on écartait fortement les paupieres en lisant. — Douleurs vives, pulsatives dans les yeux. — Sensation du froid dans les yeux. — *Sensation de secheresse aux yeux ou brûlement et larmoiement, surtout le soir dans l'appartement. *Yeux enflammes avec larmoiement abondant. *L'air froid fait du bien aux yeux, mais le veut et la lumière du soleil sont insupportables. — Fixite des yeux. — Yeux ternes, abattus. — Tress villement des paupières. — Obscureissement de la vue — Rougeur de la conjonctive avec élancements dans les angles des yeux.

Oreilles. — Tension douloureuse, pressée à l'orifice du conduit auditif. Chaleur de l'oreille à l'extérieur. — Dureté de l'oule comme par obstruction ou resserrement du conduit auditif.



ASTERIAS RUBENS.

98

muant le bras. — Tiraillement avec sensation de faiblesse paralytique dans les articulations de la main et des doigts.

Jambes. — Douleur pressive, obtuse à l'articulation coxo-fémorale et à la cuisse, principalement en s'appuyant sur le pied et en marchant. — Crampes dans les cuisses. — Tiraillement au genou et dans les tendons du jarret. — «Lassitude des cuisses et des genoux avec marche chancelante. — Tressaillements successifs dans les mollets. — «Élancements au cou-de-pied.

ASTERIAS RUBENS.

AST. - Astérie rouge, Étoile de mer. - Roth. Mat. med., t. III, 246. :- Observateur : Petrez. - Hist. nat. et prép. Pharmac. homesop., p. 317. ASTIDOTES".

SYMPTOMES PARTICULLERS. — Augmentation des symptômes après midi, surtout vers le soir; paraît agir favorablement contre quelques cas d'épilepsie; besoin de grand air, avec anxiété et impatience dans la chambre; patience scrofuleux; Éruption de taches rouges, furfuracées, sèches et circulaires.

Sommeil plein de rêves d'une vivacité extraordinaire, comme si l'on voyait et touchait réellement les personnes dont on rêve.

Calorification augmentée pendant toute la durée d'action; grand désir de lotions froides et de boire froid.

Moral extraordinairement gai le soir; tristesse alternant avec excitation morale qui porte à vouloir travailler et agir beaucoup; sensation d'angoisse, comme par appréhension d'un malheur; irritation, colère et besoin de se quereller; envie de mordre; sensibilité morale avec grande disposition aux pleurs.

Tête pesante; congestion de sang, sensation de plénitude et chaleur à la tête; douleurs pressives au front; au-dessus de l'œil gauche, douleur délirante qui force à froncer le sourcil; au verter sensation de gêne surtout pendant un effort intellectuel; sensation au sommet de la tête comme si le crâne se brisait ou qu'on écrasat la tête; à la fin de la journée les douleurs de tête augmentent et forcent à se coucher; endolorissement de toute la boîte osseuse du crâne.

Youx facilement fatigués par la lumière; yeux tirés en arrière.

Oreilles : bruit de vagues, avec oule obtuse.

Hes saignant à plusieurs reprises.

Langue gonflée; embarras de la langue, et répugnance à parler; salive plus abondante; sensation d'irritation et d'adstriction à la gorge.





ASTERIAS. - AURUM FOLIATUM.

Appétit sculement pour les choses piquantes, les mets épicés, les liqueurs, le café, le thé, le fromage fort, etc.

Ventre alternativement goufié et diminué de volume; coliques avec frissons et beuffées de chalcur, ou suivies de diarrhée.

Sellos difficiles; constipation; sello liquide partant comme un jet violent; flux hémorrhoidal (pendant deux jours).

Urines plus abondantes et plus fréquentes; urinfi épaisse, visqueuse. — Appétit vénéries exulté, obsession de désirs sexuels.

Règles en retard; sensation de pression sur les organes inférieurs

du ventre; sensation d'angoisse sur la matrice, comme quelque chose qui pousse en dehors; douleurs tractives dans les seins; paraît agir très-favorablement contre les affections squirreuses ou concéreuses surtout du sein gauche.

Cour : anxiété causée par des battements onduleux dans la poitrine; sensation de plénitude dans la poitrine qui fait craindre la syncope; palpitations fréquentes; battements de cœur peu perceptibles et sourds, comme si le cœur avait cessé de battre.

Membres inférieurs faibles, avec diminution de la sensibilité;
oparalysie incomplète des membres inférieurs améliorée; douleur lancimante, comme de la goutte, aux orteils, avec chaleur
et rougeur de la peau, augmentation par la chaleur et sensibilité excessive au moindre contact.

AURUM POLIATUM.

AUR. — Or métallique. — BARREMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 82. — Doses usitées : 3, 9, 12, 30. — Durée d'action : jusqu'à 40 iours, dans qualques cas.

qu'à 40 jours, dans quelques ens.

Antidores : Belt. chin. cupr. marc. — On l'emploie comme antidate de :
Mere soig.

COMPAREN AVEC : Ass. bell. chin. cupr. merc. nitr-ac. puls. spig. — C'est surtout après l'usage de bell. chin. puls. que l'or convient de préférence, si toutefois il est indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Ictère ; Souffrances mercurielles (et syphilitiques); Convulsions et spasmes hystériques; Goutte noueuse?; Affections scrofuleuses; Affections hydropiques?; Inflammation et carie des os, principalement par l'abus du mercure; Rhagades; Mélancolie religieuse; Mélancolie par abus du mercure; Hypocondrie; Hystérie; Maux de tête hystériques; Patigue de la tête par des travaux intellectuels; Migraine; Ecostoses au crâne; Ophthalmies; Abein et fistule lacrymale; Taches de la cornée?; Amblyopie amaurotique;



AURUM FOLIATUM.

Otorrhée par carie des on de l'apparell auditif; Osène avec carie des os du nez; Affection carcinomateuse du nez; Gonflement et ulcăration du nez et des lèvres, principalement par des sujete scrofuleur; Prosopalgie inflammatoire par l'abus du mercure; Ulcération et carie du palais; Odontalgie congestive; Maladie des gencives; Boutons de mauvaise nature aux lèvres; Gastrite et gastralgie; Entérite et entéralgie; Hépatite; Induration du fois; Affections hémorrholdales; Engorgement de la prostate; Maladies de l'utérus; Vaginite; Hernie des enfante; Ischurie; Orchite; Induration des testicules; Chute et induration de la matrice; Asthme congestif; Hydrothorax et affections organiques du cœur, principalement celles par l'abus du mercure, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

100


SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs de meurtrissure avec tiraillements aigus et faiblesse paralytique dans les membres en général, et principalement dans les articulations, surtout en découvrant la partie affectée, le matin en se réveillant, et dans le repos, se dissipant lorsqu'on se lève. — Douleurs lancinantes dans les membres avec grand abattement. — *Inflammation des os avec douleurs nocturnes. — *Exostoses à la tête, aux bras et aux jambes. — Grande acuité et finesse des sensations avec sensibilité excessive à la moindre douleur. — Spasmes hystériques, parfois avec pleurs et rire alternatifs. — Grande sensibilité au froid, ou grand désir d'aller au grand air, même lorsqu'il fait manvais temps, parce qu'on s'y trouve soulagé.

Sommeil. — Envie de dormir après le repas. — Somnolence continuelle. — Sommeil noctume jusqu'à 4 heures du matin seulement. — Le matin, en se réveillant, fatigue et faiblesse. — Sommeil inquiet, réves anxieux, pénibles, fatigants. — Radote-

ries nocturnes en forme de questions.

Fièvre. — Friesone fébriles par tout le corpe, le soir au lit, non suivis de chaleur ni de soif. — Froid de tout le corpe avec couleur bleuâtre des ongles, goût nauséabond et envie de vomir suivi parfois d'un accroissement de chaleur. — Chaleur de la face avec froid aux mains et aux pieds. — Forte sueur générale, le matin de bonne heure.

Moral. — *Mélancolie avec inquiétude et désir de la mort. — Désir de la solitude. — Envie vrésistible de pleurer. — Désir de revoir les siens, comme une sorte de nostalgie. — Besoin de changer de place, d'aller et de venir. — *Grande angoisse qui va jusqu'à porter au suicide, avec contraction crampolde dans l'abdomen. — Scrupules de conscience excessifs. — On désespère de soi et des autres. — Mauvaise humeur et aversion pour la conversation. — Humeur grondeuse, querelleuse. — Colère et em-



AURUM FOLIATUM.

101

portement.—Alternation de gaieté, d'irritabilité et de mélancolie. — Humeur hypocondriaque. — Faibleme des facultés intellectuelles. — Faiblesse de la mémoire. — Exaltation reli-

gieuse.

Tôte. — *Fatigue de la tête par des travauz intellectuels. — Etourdissement subit avec perte des sens. — Violents étourdissements en se baissant. — Migraine tous les 3, 4 jours, avec élancements, battements dans un côté du front, namétes et vomissement de bile. — *Douleur de meurtrissure au cerveau, surtout le matin, ou pendant un travail intellectuel, en allant quelquefois jusqu'à rendre les idées confuses. — *Douleur dans la tête, comme si l'air traversait le cerveau, lorsqu'on ne la tient pas très-chaudement. — Brûlement dans toute la tête, plus fort à l'occiput. — Douleurs tractives aigues dans la tête. — Douleur battante et martelante dans un seul côté de la tête. — *Congestion de song à la tête. — *Bourdonnement dans la tête. — Douleur ostéocope dans le crâne, surtout étant couché. — *Exostoses à la tête. — Chute des cheveux. — Eruption de petits boutons blance our tout le cuir chevelu, avec chaleur et prurit. --- Fort brûlement continuel au sommet de la tête.

Your. — Douleur aux yeux aggravée par le toucher, comme si le globe de l'œil était premé en dedans. — Tension dans les yeux, avec diminution de la vue. — Douleur brûlante et rougeur aux yeux. — *Obscurcimements de la vue. — Taches noires devant les yeux. — Yeux très-proéminents. — Brûlement, élancements, tiraillements et pruvit aux paupières et dans l'angle interne des yeux. — Rougeur de la sclérotique. — Rougeur des paupières à l'approche des règles. — Agglutination des paupières le matin. — Ulcération des paupières, avec grande difficulté de les séparer le matin. — Sensation continuelle de sable dans les yeux. — Larmoiement continuel. — Flammes et étincelles devant les yeux. — Hémiopie; on voit les objets coupés en ligne horizontale.

Oreilles. — Douleurs aux oreilles, comme une tension intérieure. — Brûlement, picotement, prurit et suintement derrière les oreilles. — Brûlement et élancements dans les oreilles. — Carie des apophyses mastoïdes. — Ecoulement d'un pus fétide par les oreilles. — *Dureté de l'ouie *par hypertrophie des amygdales avec parole embarrassée. — *Bruissement dans les oreilles, sifflement, bourdonnement et bruit de cloches. — Gon-

flement des parotides.

Hes. — Douleur ostéocope du nez au toucher. — Picotements rongeants dans le nez; prurit et brûlement à l'extérieur. — Boutons rouges sur le nez. — Gonflement inflammatoire et rougeur du nez, suivis de desquamation. — Taches foncées, rouge brun, sur le nez. — *Carie des os au nes. — *Fosses nasales ulcérées et couvertes de croûtes épaisses. — *Écoulement par le nes, d'un pus fétide jaune rerddire. — *Obturation du nez. —



AURUM FOLIATUM.

Coryza fluent, épais comme du blanc d'ouf. Éternument fréquent. - Desquamation furfuracée de l'epiderme du nez. -Eraltation ou absence de l'odorat. Odeur douceatre putride. ou odeur d'eau de vie, devant le nez. - Prurit, brûlement,

élancements et cuisson dans le nez.

102

Visage. — Face bouthe, luisante comme par la sueur. — Rougeur de la figure. - Figure marbrée de plaques rouges et violettes. -- Figure vultueuse. - Inflammation des os de la face. --*Enflure de joue. - Gonflement des os du front, de la machoire supérieure et du nez. — * Eruption rouge, equi s'écaille, au front et au nez. — Gros boutons rouges sur la figure. — Traction dans les machoires avec enflure des joues. Douleur tensive a la machoire superieure. Boutons aux levres, avec brulement, élancement, picotement et forte demangeaison. - *Engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires.

Dents. - Odontalgie avec chalcur et congestion a la tête. - Dents vacillantes - *Ulcere aux gencives avec enflure des joues. -

Gencives rouges, gonflées et saignant facilement.

Bouche. - Odeur de la bouche fetide, comme du fromage fort. -Chaleur, cuisson et aphthes dans la bouche. - Géne pour manger. - (Salivation abondante) - Douleur terebrante an voile du palais. - Carie au palais, avec ulceres couleur bleuatre. *Tonsilles gonflèes et ulcerées. — Les boissons sorient par les narines. - Prurit, clancements, brulement, tiraillement, et grattement dans la gorge.

Appétit. - Gout laiteux ou douceatre. - Degoût pour les aliments, et surtout pour la viande. Grand desir de café. *Faim et soif excessives; désir de boissons froides, ou bien de boissons alcooliques. - Envie de vomir apres avoir mange, ou

même en mangeaut. - Hoquets. - Rapports aqueux.

Estemac. - Douleur a l'estomac, comme provenant de la faim. -Sensation d'un malaise indicible dans l'epigastre. Gonflement de l'epignstre et des hypocondres, avec douleurs lancinantes au toucher, - Brulement, tiraillement et douleurs sécantes à l'es-

tomac. Etouffements bientôt après le repas.

Ventre. -- Coliques avec sensation d'un grand malaise dans le ventre et besom d'aller à la selle -- Pression tensive et plenitude dans le ventre. Ventre ballonne. - Exostoses dans le bassin. - *Disposition des hermes à sortir, quelquefois avec dou-leurs crampordes et incarceration de flatuosites - Coliques rentenses nocturnes, avec pincements, grondements, et borbo-Tygines. - Emission fréquente de vents tres-fetides. - Chaleur et tiraillements dans le ventre. Sensibilité du ventre au toucher. - Pesanteur sur le pubis. - Douleur de tension dans le ventre pendant et avant les selles. - Brûlement et douleurs secantes a l'hypocondre droit. - Point douloureux dans l'hypocondre gauche. - Chalenr et sensibilité a l'hypogastre. --



AURUM MURIATICUM.

104

Trenc. — Douleurs généralement pressives ou tractives aigués, au dos, principalement le matin, et parfois tellement violentes qu'on ne peut remuer aucun membre. — Engorgement inflammatoire sous les aisselles. — Gêne pour tourner le cou, comme par le torticolis. — Chaleur dans les aisselles, douleur de brisure et chaleur dans les reins; brûlement depuis les reins jusqu'à la vessie.

Bras. - Douleurs pressives dans les bras et les avant-bras. Douleurs crampoldes et tractives aigués dans les os du carpe et
du métacarpe. - Douleurs tractives aigués, avec faiblesse paralytique, dans les os et les articulations des doigts. - Brûlement, élancements, picotements et fatigue dans les bras.

Jambes. — Douleurs vives dans les cuisses, surtout le matin et le soir. — Faiblesse paralytique et douloureuse des genoux, comme s'il y avait un lien serré au-dessus; ils sont faibles et fiéchissent.

- Douleurs tractives et tiraillements aigus, avec faiblesse paralytique, dans les os et les articulations des orteils. — Enfure des pieds. -- Rougeur et enfure des orteils.

AURUM MURIATICUM.

AUR-M — Muriate d'or. — Journal de Méd. homorop. du docteur Molin. — Hist. nat, et prép. Pharmac. homosop., p. 83.


AVIS CLINIQUES, ou cas pour lesquels on pourra consulter ce médicament : Hypocondrie; Affections hydropiques; Coryza; Eczéma; Couperose; Lupus des ailes du nez; Boutons cancéreux aux lèvres; Rougeur et gonflement des paupières; Ophthalmie aigua; Ophthalmies serofuleuses: Carie des os du nez; Gonflement des lèvres; Inflammation des gencives; Gastrite, gastralgie; Affections chroniques du foie; Gonflement scrofuleux des glandes du mésentère; Métrite; Leucorrhée; Hémorrholdes; Flux hémorrholdal; Vaginite; Gonflement des testicules; Catarrhe pulmonaire; Irritation chronique des voies respiratoires; Maladies du œur; Maladies des os; Carie; Affections mercurielles; Laryugite chronique chez les personnes syphilitiques, ou après l'abus du mercure.

Ce médicament remédie aux effets produits par le chagrin.

Sommeil. — Envie de domnir pendant le jour, même en travaillant : insomnie la nuit ; rêves pénibles ; réveil en sursaut.

Moral. — Tristesse; pleurs fréquents. — Paresse; dégoût pour toute espèce de travail. — Gaieté excessive, insouciance. — Caractère capricieux. — Ennui, contrariété sans motifs. — Dégoût de la vie, penchant au suicide.





AURUM MURIATICUM.

Tôta. — Brûlement dans le front. — [Brûlement presque continuel dans toute la tête, mais plus fort à gauche, tiraillements dans le côté gauche de la tête; par instants la tête est comme insensible]. — Étourdissements fréquents. — Sensation de fratcheur sur le sommet de la tête; battéments dans le côté gauche du front; tête lourde, pesante; la tête remue souvent. — Brûlements et élancements dans le derrière de la tête. — Douleurs, tiraillements et prurit chatouillant au front.

Yenx. — Rougeur et gonflement des paupières; brélement, élancements, picotement et cuisson aux paupières; agglutination des paupières le matin; larmoiement; [rougeur de la solérotique avec chaleur brûlante et picotements;] brûlement, picotements et démangeaison aux yeux; difficulté à tenir les yeux fermés. — Dé-

chirements dans l'œil gauche.

Oreilles. — Croûtes derrière les oreilles; brûlement et prurit derrière les oreilles, surtout la nuit. — Tintement dans les oreilles, suivi de surdité, comme si l'intérieur des oreilles était

large et vide.

Hen. — Rougeur et gonflement du nez; brûlement et prurit au nes; coryra jaune, épais; croûtes dans le nez, besoin continuel d'y porter les doigts. — Écoulement aqueux irritant fortement la lèvre et ayant une mauvaise odeur. — Bougeur et inflammation du nes avec prurit et desquamation; gonflement rouge avec narines ulcérées, croûtes sèches, jaunâtres, et sensation d'obturation dans le nez. — Ozène *avec écoulement de pus jaune et mouchement de sang.

Visage. — Figure rouge. — Figure pâle, marbrée de rouge. — Gonfiement des lèvres, brûlement et prurit aux lèvres. — Bouche pâteuse, mauvaise. — • Lèvres ulcérées et gonfiées. — Douleurs

tressaillantes aux dents.

Bouche. — Aphthes dans toute la bouche, brûlement, prurit et cuisson dans la bouche. — Rougeur et gonflement des gencives, surtout pendant la nuit. — Bontons sur les lèvres; ils s'accompagnent de cuisson et de démangeaison. — Soif; inappétence.

Gerge. — Grattement et picotement dans la gorge; difficulté à avaler. — Engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires.

Estemac. — Malaise et embarras à l'estomac après avoir mangé. — Envie de vomir après avoir mangé. — Renvois ayant le goût de pourri. — Brûlement, élancements et douleurs rongeantes et sécantes à l'estomac. — Digestions longues, — Bâillements fréquents après avoir mangé.

Ventre. — Sensibilité du ventre au toucher. — Coliques sourdes. — Tiraillements dans tout le ventre. — Brûlement dans l'hypocondre droit. — Chaleur et picotement à l'hypogastre. — Point dans l'hypocondre gauche, comme si l'on avait trop couru. — Étouffements, pour peu qu'on soit serré. — Sensation continuelle de gêne dans l'hypocondre droit. — Rougeur, chaleur,



AURUM MURIATICUM.

prurit et cuisson au nombril. — Éruptions de petits boutons rouges au-dessus du pubis. — Gonflement et ballonnement du ventre.

Belles. Diarrhée, surtout la nuit; selles grises, blanchâtres. — Hémorrhoïdes, avec écoulement de sang, quand on va à la selle.

Urines. — [Urines trop fréquentes.] — Urines peu abondantes; urines rouges, épaisses et contenant du sable. — Brillement et cuisson dans le canal de l'urèthre, en urinant.

Parties génitales. — Suintement continuel à la vulve; rougeur et gonfiement des lèvres. — Brûlement et prurit à la vulve; sensibilité excessive de la vulve; forte cuisson continuelle à la vulve; chaleur et prurit dans le vagin. — Gonfiement et tension dans les testicules. — Tiraillements le long des cordons spermatiques. — Chaleur et démangeaison dans le canal de l'urèthre. — Leucorrhée jaune clair coulant surtout le matin. — Quelques jours

corrhée jaune clair coulant surtout le matin. - Quelques jours avant les règles, sortie de gros boutons rouges aux grandes lèvres. -- Roideur dans les aines.

Larynx. — Toux criarde, fréquente; toux fréquente surtout la nuit; petite toux sèche, par quintes, surtout la nuit, suivie de chaleur à la gorge. — Toux forte, fréquente, avec expectoration blanche, mêlée de quelques filets de sang; toux continuelle, grasse, avec expectoration jaune, épaisse. — Parole difficile; voix rauque, criarde. — Sensation d'obturation dans le larynx. avec dyspnée.

Poitrine. — Respiration gênée. — [Douleur dans le côté gauche de la poitrine; elle est semblable à un point, change de place et ne dure pas continuellement.] — Palpitations; tiraillements et douleurs sécantes au cœur; brûlement et picotements au cœur. — Suffocations la nuit. — Élancements au-dessus du cœur.

Tronc. - Picotements dans les reins; fatigue douloureuse dans les reins. - Brûlement, picotements, douleurs sécantes et roideur dans le dos.


Extrémités supérieures. — Brûlement et élancements dans les bras et les avant-bras; roideur dans les bras; sensation pénible dans les épaules et les bras. — Brûlement et prurit dans les mains; difficulté à fermer les mains; roideur des articulations des doigts; secousses involontaires dans les bras. — Mouvements convulsifs dans les bras. — Gonflement du poignet, avec tension en renversant la main, et élancements en saisissant un objet. — Déchirement dans le doigt du milieu, après le repas.

Extrémités inférieures. — Clous aux fosses et aux cuisses; roideur dans les cuisses et les jambes; gonflement des genoux; chaleur, picotements et élancements dans les genoux; enflure des pieds, — Brûlement dans les pieds; douleurs sécantes dans les orteils en marchant; rougeur des orteils; rougeur et gonflement des orteils, avec brûlement, élancements et difficulté à poser les pieds

par terre.

100





AURUM SULFURICUM.

AURUM SULFURICUM.

AUR-SULF. - Sulfate d'or. - Journal de Méd. kommop. du docteur Molin. - Hist. not. et prép. Pharmac. homosop., p. 84.

AVIS CLABIQUES, ou cas contre lesquels on pourra consulter ce médicament: — L'hypocondrie, les névralgies faciales et dentaires, les ophthalmies, les inflammations aigués ou chroniques du nez, les maladies de la bouche, la couperose, l'érysipèle, les maladies des lèvres, les maladies du tube digestif, les affections hémorrholdales, l'incontinence d'urine, les maladies de l'utérus et de ses annexes, la chlorose, les maladies du cœur, les affections des seins, le goître, le catarrhe pulmonaire, l'engorgement des testicules, soit aigu, soit chronique, les maladies des os, les affections acrofuleuses, les suites de l'abus du mercure; il remédie, ainsi que les deux autres préparations d'or, aux indispositions causées par le chagrin.

SYMPTOMES. — Sommeil. — Sommelence pendant le jour, avec insomnie la nuit; agitation nocturne; rêves pénibles, effrayants; on rêve de voleurs, d'assassins, etc.

Moral. — Désir de la solitude; caractère sombre, soucieux, méchant; humeur désagréable; malhonnête; [pleurs continuels;]

chagrin, dégoût de la vie.

Tôte. — Brûlement et cuisson au cuir chevelu; forte démangeaison à la tête, surtout la nuit; afflux continuel du sang à la tête; étourdissements; chute des cheveux; la tête remue continuellement; élancements dans le derrière de la tête.

Yeur. — Rougeur des paupières; élancements, picotements et démangeaisons aux paupières; les paupières sont collées le matin; [ulcération aux paupières;] la lumière fait mal; orgelet vers l'angle externe de l'œil; battements dans les yeur. — Chute des cils. — Yeur brillants.

Oreilles. - Brûlement et élancements dans les oreilles. - [Bourdonnement continuel dans les oreilles.] - Douleurs sécantes et

fouillantes dans les oreilles. — Dureté de l'oule.

Ses. — Rougeur et gonfiement du nez; élancements et démangenisons au nez; [dartres aux ailes du nez;] coryza sec; éternuments fréquents; croûtes dans le nez; sensibilité vive du nez au moindre contact; battements et douleurs sécantes au nez.

Visage. — Boutons rouges à la figure; figure couverte de plaques rouges; pâleur de la face; prurit à la face; [visage fatigué, tire].



AURUM SULFURICUM.

Bonche. — Aphthes à la partie interne des jones seulement, avec cuisson et élancements; rougeur, saignement et gonflement des gencives; boutons sur les lèvres, avec chaleur et petits élancements; langue et gencives décolorées; soif vive, inappétence; lèvres crevassées, élancements, tiraillements et douleurs sécantes dans les dents; sensation d'engourdissement dans les dents; douleurs sourdes qui partent des molaires supérieures, montent dans tonte la tête, puis redescendent dans les dents.

Gorge. - Elancements et tiraillements dans la gorge; difficulté

d'avaler.

108

Estomac. — Nausées. — Envies de vomir peu de temps après avoir mangé. — Hoquet fréquent. — Rapports aqueux, sans goût. — Digestions excessivement longues; renvois aqueux, ayant le goût

des aliments. — Chaleur et élancements à l'estomac.

Ventre. — Ballonnement du ventre et sensibilité au toucher, sensation d'une boule qui roule dans le ventre. — Élancements dans différents points du ventre vers la ceinture. — Sensation comme si quelque chose se déchirait dans le ventre. — Élancements et tiraillements à l'hypocondre droit. — Douleurs sourdes à l'hypogastre. — Élancements à l'hypogastre. — Sensibilité de l'utérus au toucher.

Selles. — Constipation. — Selles semblables à des crottes de lapin. — Élancements, tiraillements, déchirement, prurit et douleurs

sécantes à l'anus.

Urines. — Urines jaunes, épaisses, ou rouges et sableuses. — In-

continence d'urines la nuit.


Parties génitales. — Chaleur, cuisson et élancements dans la verge; suintement à la vulve et autour du gland. — Rougeur et gonflement de la vulve. — Chaleur, élancements et prurit à la vulve. — Leucorrhée jaunâtre, épaisse, coulant surtout le matin. — (fonflement douloureux des testicules. — Suppression des règles. — Règles irrégulières, tantôt avançant, d'autres fois retardant. — Impuissance. — Érections fréquentes avec désir de coît, mais cessant de suite. — Pesanteur sur les parties chez les femmes; quand on est debout, il semble que quelque chose va sortir du corps. — Courbature, maux de cœur, nausées la veille de l'apparition des règles.

Larynx. — Toux seche. — Toux criarde par quintes, la nuit. —
Toux forte, avec expectoration d'un peu de sang pur. — Toux
grasse, avec expectoration jaunâtre. — Enrouement. — Toux
grasse, fréquente, surtout quand le temps est manyais. — Toux

grasse jour et nuit, avec expectoration jaunatre, fade.

Poitrine. — Respiration génée. — Élancements et picotements dans les clavicules. — Palpitations en montant, en courant; et après tous les mouvements violents. — Élancements au cœur. — Douleurs sourdes au cœur. — Suffocations la nuit.

Tronc. — Douleurs dans les parotides. — Douleurs en tournant le



BARYTA CARBONICA.

e up de succès evant et après baryt., si toutefois les symptômes de la maladie l'indiquent.

• CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Faiblesse physique et nerveuse, et autres souffrances des enfants et des vieillards; Souffrances à la suite d'un refroidissement; Affections scrofuleuses; Engorgement et induration des glandes; Atrophie des enfants scrofuleux; Tumeurs enkystées; Stéatome; Somnolence comateuse; Apoplexie, principalement chez les vieillards, mais aussi chez les ivrognes; Teigne; Alopécie; Ophthalmie et blépharite des personnes scrofuleuses; Prosopalgie inflammatoire; Dartres faciales; Croûte de lait?; Odontalgies, principalement celles par suite d'un refroidissement; Angines phlegmoneuses; Angine tonsillaire avec suppuration; Angine à la suite d'un refroidissement; Angine pendant la petite vérole; Angine couenneuse; Dyspepsie; Squirre de l'estomac?; Catarrhe des voies aériennes; Orthopnée paralytique des vieillards (après avoir administré tart.), etc., etc.

Voy. la note, page 15.

110


SYMPTOMES GENERAUX. - Douleurs dans les articulations et dans les os creux. - Pression crampoide, ou tiraillement avec faiblesse paralytique, ou bien tension comme par raccourcissement des tendons, dans différentes parties. - Douleurs tractives, aiguës, dans les membres, avec horripilation. - La nuit. tressaillement des muscles. — Secousses et tressaillements de quelques membres et de tout le corps, le jour. - Les symptômes se montrent surtout au côté gauche et lorsqu'on est assis; ils se dissipent par le mouvement, ou au grand air. - *Gonflement et . induration des glandes. - Lourdeur dans tout le corps. -Grand malaise et surexcitation de tous les sens. — Grande faiblesse qui ne permet pas de se tenir debout. - Besoin d'être conché ou assis. -- *Faiblesse intellectuelle, nerveuse et phy-*Amaigrissement, ou •bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre. - *Forte disposition à éprouver des refroidissements, qui occasionnent principalement des inflammations de la gorge.

Peau. — Sensation à diverses parties, comme des piques d'épingles brûlantes, démangeantes et formicantes. — La nuit, démangeaison et fourmillement insupportables par tout le corps. — Executation et suintement à plusieurs parties de la peau. — *Les lésions de la peau ne se guérissent que difficilement. —

"Verrues. -- Panaris.

Sommeil. -- Grande envie de dormir le jour. - *Somnolence so-





porcuse jour et suit. - Sommeil nocturne agité, avec réveil fréquent et rêves anxieux. - La nuit, bouillonnement du sang, forts battements de cœur et sensation au cœur comme s'il était excerié, avec grande anxiété et impossibilité d'être couché sur le

BARYTA CARBONICA.

côté gauche. — *Sommeil avec révasserie.

Fièvre. — Forte disposition frileuse. — Horripilation avec chair de poule et hérissement des cheveux, ou avec tension dans la face. — Horripilation qui parcourt le corps, partant de la face ou de l'épigastre, suivie d'une chaleur passagère par tout le corps. — *Sueurs nocturnes.

Meral. — *Humeur pleureuse. — Répugnance pour les personnes étrangères ou la société. — *Inquiétude anxieuse sur ses affaires domestiques. — Esprit scrupuleux, irrésolu, soupçonneux, avec méfiance de soi-même. — Peur et poltronnerie. — Éloignement pour le jeu (chez les enfants). — Accès de colère subit, à propos de bagatelles. — Activité incessante. — *Grande faiblesse de la mémoire de manière à oublier facilement. — *Les enfants

sont inattentifs à leurs études.

Tôta. — *Vertige avec nausées, —et mal à la tête *en se baissant. — Douleurs pressives à la tête, principalement dans le front, *au-dessus des yeux et de la racine du nez, ou avec tension à l'occiput, vers la nuque. — Douleurs lancinantes dans la tête, surtout à la chaleur du poêle. — Fouillement dans la tête avec sensation de vacillement du cerveau. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu. — *Disposition à se refroidir la tête. — Démangeaison et rongement au —cuir chevelu. — *Éruptions *et croûtes bumides ou sèches à la tête. — Tension du cuir chevelu, et chute des cheveux. — *Calvitie.

Year. — *Pression et douleur brûlante dans les yeux, surtout en se fatigant la vue, — *Inflammation du globe de l'œil et des paupières avec douleur d'excoriation, sensation de sécheresse et photophobie. — Gonflement des yeux le matin. — *Agglutination des paupières.— Trouble de la vue qui empêche de lire. — Points voltigeants et taches noires devant les yeux. — Étincelles devant les yeux dans l'obscurité. — •Éblouisse-

ment des yeux par la lumière.

Orelles. — Démangeaison aux oreilles. — Pulsation nocturne dans les oreilles, en étant couché dessus. — *Éruption aux oreilles et derrière les oreilles. — Parotides gonflées, doulou-reuses. — Dureté de l'ouie. — *Tintement et bruissement dans les oreilles. — Craquement dans les oreilles en avalant, en éternuant, et en marchant vite.

Non. - Épistaxis, surtout après s'être mouché. — Croûtes audessous du nez. — Odorat très-fin. — *Coryza fluent avec sécrétion abondante de mucosités épaisses. — *Sécheresse pénible

du nez.

Visage. - Face rouge foncé, avec lèvres pourpres, et fort bouil-



BARYTA CARBONICA.

lonnement de sang. — Sensation de gonflement et tension dans la face, comme si elle était recouverte de toiles d'araignée. — *Douleurs à la face arec gonflement tensif. — *Éruption à la face. — Lèvres sèches, gercées. — En serrant les machoires, douleur aigue dans l'articulation. — *Gonflement des glandes cons-maxillaires et de la lèvre supérieure.

Dents. — Maux de dents seulement le soir, au lit. — Tiraillements, battements et *secousses dans les dents, allant jusqu'à l'oreille et la tempe. — *Élancements brûlants dans les dents cariées, exertes par le contact des choses chaudes. — Manz de dents, avec les règles, avec gonflement rouge pâle des geneires et de la joue. — Saignement des dents et des geneires.

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Accumulation de salive dans la bouche. — Mauvaise odeur de la bouche. — Vésicules enflammées dans la bouche et sur la langue. — Gerçures à la

langue, avec douleur brûlante d'excoriation.

Gorge. - *Maux de gorge avec gonflement du palais et des amygdales, qui supparent. - Sensation comme si on avoit un tampon dans la gorge. - Étranglement et contraction dans la gorge. -- Élancements et douleur d'excoriation dans la gorge,

surtout pendant la déglutition.

Appétit. — Goût désagréable, ou amer, généralement le matin, avec langue fortement chargée. — Goût aigre, surtout arant et non aprex le repas. — Soif continuelle. — Appétit faible et prompte satiété, bien que les aliments plaisent au goût. — *Après le diner, douleurs à l'estomac, malaise, paresse et éloignement pour le travail. — *Faiblesse de la digestion. —

Grande gourmandise.

112

Retomac. — *Renvois après le repas. — Renvois fréquents à vide ou *aigres. — *Écoulement pituiteux de l'estomac. — Vomissement muqueux. — *Nausées, principalement le matin à jeun, et quelquefois comme par suite d'une indigestion. — *Douleurs à l'estomac, à jeun, après le repas, et en appuyant sur l'épigastre. — Sensibilité et douleur à l'epigastre à chaque pas que l'on fait. — *Pesanteur, plénitude et pression dans l'estomac et l'épigastre, même après avoir peu mangé. — *Douleur d'excoriation à la région de l'estomac, avec sensation, en mangeant, comme si les parties par lesquelles passent les aliments étaient toutes à vif.

Ventre. — Maux de ventre soulagés par des renvois, ou par la chaleur extérieure. — Tension et ballounement douloureux du ventre. — Coliques avec rétraction du nombril. — Pincements et tranchées dans le rentre, avec envie d'aller à la selle, comme pour une diarrhée. — Accumulation de flatuosités dans le ventre.

Selles. — *Selles difficiles oet noueuses, *ou dures et oinsuffisantes.
Selles dyssentériques, avec envie fréquente d'aller à la selle, sensation de malaise anxieux dans la région des lombes, et



114 BARYTA CARBONICA. — BARYTA MURIATICA.

les jambes, comme dans les os. — Démangeaison aux cuisses, même la nuit. — Élancements dans les articulations du genou. — Tension dans le tibia et les mollets. — Crampes dans les mollets et les orteils en étendant les membres. — Inquiétude et tremblement dans les jambes et les pieds. — Douleur dans l'articulation du pied, comme par une foulure. — «Sueur fétide des pieds. — «Cloères aux pieds. — «Gonfiement lymphatique, douloureux, à la partie charnue du gros orteil. — Douleur pareille à celle d'un cor, à la partie calleuse de la plante des pieds, surtout en marchant. — Cors avec élancements brûlants et pincements.

BARYTA MURIATICA.

BAR-M. — Muriate de baryte. — Hinnes. — Hist. nat et prép. Pharmac. hommop., p. 86. — Dose usitée : 30?.

CLINIQUE. — En étudiant les symptômes suivants, le médecin verra s'il peut employer ce médicament contre l'un ou l'autre cas des affections suivantes : — Affections des glandes; Scrofules; Éruptions croûteuses; Gastrite; Entérite; Diabète?; Gonorrhée chronique; Asthme humide; Hydropisie à la suite de la scarlatine, etc., etc.; Blennorrhée des poumons; Petite vérole et varioloïdes; Angines malignes; Inflammations arthritiques des articulations des mains et des pieds.

Voy. la note, page 15.


SYMPTOMES GÉHÉRAUX. — Grande faiblesse qui force à se coucher. — Faiblesse et prostration, allant presque jusqu'à la paralysie. — Syncope. — Roideur et insensibilité du corps, avec convulsions périodiques. — Lourdeur générale. — Tremblement des membres. — Tremblement convulsif. — Tressaillement à la face, ou dans quelques membres, ou dans tout le corps. — Accès périodiques de convulsions avec tressaillements et jactations excessives.

Peau. — Picotement à la peau. — Brûlement et picotement aux endroits exceriés. — Petites éruptions galeuses à la tête, à la nuque, à l'abdomen et aux cuisses. — Glandes enflammées et ulcérées. — Hémorrhagies.

Fièvre. — Chaleur sèche générale, la nuit et le jour. — Rougeur et chaleur de la face. — Pouls fréquent et plein. — Fièvre tierce.

— Transpiration augmentée. — Sueur froide.

Moral. — Forte anxiété avec gastralgie, nausées et vomiturition.



BARTTA MURIATICA. - BELLADONA.

Tôte. — Vertiges, tournoisment devant les yeux. — Tête embarrassée et lourde. — Céphalalgie avec vomissement. — Éruptions très-purulentes au cuir chevelu. — Éruptions croûteuses à la tête et au cou. — Éruption à la nuque.

Youx et Oreilles. — Youx fixes et immobiles. — Pupilles dilatées et insensibles, avec regard fixe. — Blennorrhée des yeux, des

oreilles et du nes. — Surdite en vomissant,

Visage et Dents. — Douleurs tractives dans les muscles de la face.
 Nodosité douleureuse au bout du nex avec un léger picotement. — Douleurs lancinantes, pulsatives, aux dents, surtout en se réveillant, après minuit. — Vacillement des dents.

Bouche et Gorge. — Gonflement des glandes salivaires et du palais. — Langue chargée. — Langue et bouche sèches. — Fétidité de la bouche comme par le mercure. — Goût putride de la bouche

et det aliments. — Perte d'appétit. — Soif. — Déglutition difficile.

Beteure et Ventre. — Envie de vomér. — Vomiturition. — Vomissement le matin avec anxiété. — Vomissement d'une petite quantité d'eau avec nausées. — Mal au cœur. — Pression à l'estomac, avec spasme. — Sensation de chaleur, montant de l'estomac vers la poitrine et la tête. — Douleur brûlante dans l'estomac avec vomissement. — Les membranes de l'estemac sont bleu rouge, avec taches rouges à la partie musculaire. — Le fond de l'estomac est enflammé avec ecchymoses isolées. — Malaise comme par des vers. — Douleurs brûlantes à l'abdomen. — Tuméfaction du foie.

Selles et Urines. — Selles muqueuses. — Selles faciles. — Diarrhée lente sans douleurs. — Urines fréquentes, involontaires et douleureuses. — Flux d'urines. — Sédiment blanchâtre de

l'urine. — Gonflement des testicules.

Parties génitales. — Émission fréquente de sperme. — Règles trop hatives. — Douleurs de meurtrissure dans la cavité pelvienne.

Poitrine. — Catarrhe avec chaleur. — Chaleur dans la partie supérieure de la poitrine. — Oppression. — Toux. — Battements de cœur accélérés. — Palpitations de cœur. — Le cœur bat même après la mort et pendant longtemps. — La cavité du cœur est remplie de sang coagulé.

Trenc et Membres. — Douleurs au dos. — Crampes dans les orteils. — Douleurs tractives dans les cuisses. — Tuméfaction des

mains et des pieds.

BELLADONA.

BELL. — Belladone. — HARNEMANN. — Hut. not. et prép. Pharmoc. homœop., p. 174. — Doses usitées. 12, 30. — Dures d'action : 4 et 5 jours dans les affections aiguês, et jusqu'à 8 semaines dans quelques affections chroniques.



BELLADONA.


ARTIBOTES: Coff. hyen. hep. vinum. (Contro des empoisonnements par de fortes doses: Coffea tosta). — L'application du vinnigre aggrave les souf-frances. Ce sont: Acon. cupr. fer. hyor. merc. plat. plumb. qui trouvent leur antidote en belladona.

Comparer avec: Acon. agar alum. mmm. arn. ars. sur. bar. calc. cauth. caus. cham. chin. ciu. coff. coloc. con. cupr. dig. dulc. far. hep. hyos. lach. merc. mitr-uc. op. phos. phos-ac. plat. plumb. puls. rhus. seneg. nep. sil. stram sulf. valer. — C'est surtout après hep. lach merc. et mitr-ac., que belladona est souvent convenable. Après belladona, conviennent quelquefois: Chin. con. dulc. hep. lach. rhus. seneg. stram. valer.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptônes, on verra les cas particuliers dans lesquels on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des personnes de constitution lymphatique on plethorique, avec disposition à l'engorgement des glandes on à des inflammations phiegmoneuses; maladies des enfants et des femmes, ainsi que des personnes à tempérament doux, yeux bleus, cheveux blonds, teint coloré et peau delicate, etc., etc.; Souffrances par suits d'un refraidissement; Affections à la suite d'une peur, d'une frayenr, ou d'un chagrin; Suites facheuses de l'abus de la valériane, du mercure, de la camomille ou de l'opium; Affections rhumatismales et arthritiques, avec ou sans fièvre inflammatoire et gonflement; ('ongestions sanguenes: Engorgement des glandes avec suppurations; Affections scrofuleuses et rachitiques; Atrophie des enfants scrofuleux; Cachexie par l'abus du quinquina : Ictère : Ergotisme ; Crampes, convulsions, tétanos, spasmes hystériques, éclampsie, épilepsie, danse de Saint-Guy et autres affections apasmodiques; Paralysies; Affections squirreuses et carcinomateuses; Ulcères scrofuleux et mercuricle; Charbons; Furoncles; Engelures; Piqures d'insectes; Pemphigus?: Erysipèles simples et phlegmoneux; Erysipèle vésiculcux (avant rhus); Scarlatine; Miliaire pourprée (après aconit); Rougeole : Métastase de la petite vérole sur les membranes du cerveau: Lethargie; Insomnie; Fièrres inflammatoires, avec affections nerveuses, gastriques, ou rhumatismales; Fièvres intermit-tentes; Fièvres lentes; Fièvres typholdes; Imbécillité, delirium tremens, alienations mentales, mélancolie, manie et autres affections morales, soit par suite d'une frayeur, d'un chagrin ou autres causes; Hydrophobie; Congestions cérébrales, avec vertiges; Apoplexie sanguine: Encéphalite, première période: Hydrocéphale aigue; Céphalalgie, aussi celle par suite d'un refroidissement; Migraine; Ophthalmies, aussi chez les personnes scrofuleuses ou arthritiques; Hémorrhagie oculaire; Ophthalmo-spaame; Strabisme?; Taches et ulcères de la cornée; Fongus médullaire aux yeux; Amblyopie amaurotique, aussi à la suite de travaux fins; Otite; Parotite; Dereté de l'oule, aussi par suite d'un refroidissement; Inflammation phiegmoneuse du nez : Hémorrhagie nasale : Prosopalgie nerveuse ;

116






BELLADONA.

Eruptions faciales boutouneuses ches les enfants et les adultes: Erympèle de la face; Croûte de lait?; Induration aquirreuse des lèvres; Odontalgie, principalement chez les femmes, et surtout les femmes eneciates; Dentition difficile des enfants; Salivation par suite de l'abus du mercure; Trismus; Glossite; Balbutiement; Angines phiegmenouses; Angines tonsillaire, pharyngée et uvulaire; Angine communes; Anoraxie, dyspeptie, vomimement et autres affections gastriqueur Hoquet convulsif; Hématémbre?; Gastralgie; Hépatite ; Ictère ; Coliques apaamodiques et flatulantes ; Entérite ? ; Péritonite?; Diarrhée, sans ou avec vomissement, par suite d'un refroidimement; Dymenterie; Hémorrholdes; Néphrite; Métrite; Dysménorrhée; Métrorrhagie; Chute, induration equirreuse et affection carcinomateuse (?) de l'utérus; Souffrances à la suite d'un avortement; Affections morales, odontalgie, gastralgie et coliques des femmes enceintes ; Douleurs spasmodiques, mais impussantes pour accoucher, avec crainte et tremblement chez les femmes d'une fibre rigide; Spasmes des femmes en couche; Adhérence du placenta; Tumeur blanche, nymphomanie et autres affections des femmes en conche ; *Péritonite puerpérale*, principalement celle à la suite d'émotions morales, on de suppression du lait; Fièvre de lait; Galactorphée et souffrances à la suite du sevrage; Erysépèle aux mamelles, principalement à la suite du sevrage; Gonflement, induration (et cancer?) des glandes mammaires; Ophthalmie, cris, convulsions et autres souffrances des nouveau-née; Affections catarrhales des voies aériennes : Aphonie : Grippe ; Toux, surtout la toux nerveuse et convulsive; Coqueluche; Croup?; Pneumonie; Asthme spasmodique, hystérique, congestif, etc., etc.; Hémoptysie; roidcur rhumatismale de la nuque; Coxalgie, etc., etc.; Luxation spontanée chez les enfants.

Voy. la note, page 15.

STRPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs lancinantes, ou déchirantes, pressives, dans les membres. — Douleurs de meurtrissure dans les articulations et les os. — Les douleurs s'aggravent principalement la nuit, on après midi, vers les 3 ou 4 houres. — Le moindre contact, et quelquesois aussi le mouvement, aggravent les souffrances. — Quelques-unes des souffrances s'aggravent ou apparaissent aussi après avoir dormi. — Tressaillement dans les membres, palpitations musculaires et soubresauts des tendons. — Sensations dans les muscles, comme si une souris les parcourait. — *('rampes, spasmes et mourements convulsifs et contorsion violente des membres; *accès de convulsions, avec cris et perto de connaissance; *convulsions épileptiques, avec orétraction des pouces. — *Accès d'immobilité et de roideur spasmodique du corps ou de quelques membres, quelquefois avec insensibilité, gonflement des veines, boufflesure et roufois avec insensibilité, gonflement des veines, boufflesure et rou-



BELLADONA.

118

geur du visage, pouls plein et accéléré, avec sueur abondante. -*Accès de tétanos, aussi avec renversement de la tête. — *Accès de spasmes, avec rires involontaires. — *Avant les accès de convulsions, formication, avec sensation de gonflement et de torpeur dans les membres; ou coliques et pression dans le ventre. s'étendant juaqu'à la tête; après les accès, oppression de poitrine, comme par un poids lourd. — Les accès se renouvellent par le moindre contact, ainsi que par la contrariété la plus légère. — Grande inquiétude dans la tête et les membres, principalement les mains. — *Tremblement des membres, avec fatigue et lassitude. - *Lourdeur dans les membres, avec lassitude, grande pareme et horreur de tout mouvement et de tout travail. — *Chute des forces, faiblesse paralytique et paralysie des membres. — *Paralysie et insensibilité de tout un côté du corps. — Accès d'évanouissement et de syncope, avec perte de tout sentiment et de tout mouvement, comme dans la mort. -- Bouillonnement de sang, avec congestion à la tête et fatigne jusqu'à s'évanouir. — Surexcitation et trop grande impressionnabilité de tous les organes. — Disposition à se refroidir facilement, avec grande sensibilité à l'air froid. - *Formication dans les membres. — *Congestions diverses, avec sensation comme si la

partie affectée allait éclater. Pean. — *Gonflement avec chaleur et rougeur écarlate de tout le corps ou de plusieurs parties, principalement du visage, du cou, de la poitrine, du ventre et des mains. — *Inflammation érysipélateuse, avec phlegmon, –qui, quelquefois, passe à la gangrène. — Gangrène et sphacèle de plusieurs parties. — *Plaques rouges, enflammées, et taches écarlates sur plusieurs parties du corps, "quelquefois avec pouls petit, accéléré, gêne de la respiration, toux violente, délire, mémoire plus vive, besoin de se frotter le nex, et pupilles dilatées. — Taches rouges couleur de sang, par tout le corps, principalement au vienge, au cou et à la poitrine. -- *Eruption semblable aux morbilles. --Eruption de pétéchies, avec prurit et rougeur de tout le corps. - Vésicules qui suintent des sérosités abondantes, et qui sont tellement douloureuses qu'elles forcent à crier et à gémir. - Eruption de pustules à bords blanchâtres, avec des escarres noires, et gonflement ædémateux de la partie malade. — Eruption rouge, squameuse à la partie inférieure du corps. Tumeurs et nodosités froides et douloureuses. — Douleurs d'excoriation, brûlement et tiraillement dans les ulcères, principalement au toucher, pendant le mouvement et la nuit. - *Gonflement rouge, chaud et luisant des parties malades. - Les alcères sécrètent un pus sanieux et sanguinolent. - *Furoncles. - Engelures. - *Gonflement douloureux des glandes.

Semmell. — *Envie de dormir continuelle, quelquefois avec obnubilation de la tête, pendiculations et baillement, et principale-



tion à s'effrayer facilement. - Radoteries, délires et manie, avec gémissements, disposition à danser, à rire, à chanter et à siffler ; *manle avec gémissements ou avec rires incolontaires; *délires nocturnes; *délires avec murmures; délires où l'on voit des loups, des chiene; delires furibonds; des incendies, etc., etc.; délires par acrès, et quelquefois avec fixité du regard. - Grande apathic et indifférence, désir de la solitude, horreur de la société et de tout bruit. -- Répugnance pour la conversation. -- Mauvaise humeur, caractère irritable, susceptible, avec disposition à se facher, a se quereller et à offenser. - *Folie, avec farces plaisantes et ridicules, gesticulations, actes de démence, manières impudentes. — *Fureur et rage, avec envis de frapper, de cracher, de mordre et de tout déchirer, et quelquefois avec grondements et aboiements, comme ceux d'un chien. - Accablement et faiblesse de l'esprit et du corps. - Horreur de tout travail et de tout mouvement. - *Démence, jusqu'à ne plus connaître les siens, illusions, des sens et visions effrayantes. - *Perte complète de la raison, stupidité, inadvertance et distraction, inaptitude à la méditation et *grande faiblesse de la mémoire*,

Tête. - Embarras de la tête, obnubilation et état d'ioresse, principalement après avoir bu et mangé, ou bien le matin. — *Accès de rertigen, uvec chancellement, tournoiement dunn la tête, hebetude, étourdissement, nausées, tremblement des mains, anxiété, et scintillement devant les yeux, principalement le matin en se levant, ou en se redressant, et en se baimant. — "Vertiges arec angoisse, chute et perte de connaissance, "ou avec lamitude ct fatigue avant et après l'accès. - *Stupeur et perte de connuissance. Me manière à ne reconnuitre les siens que tout au plus par l'ouïe, quelquefois avec pupilles dilatées et bouche et veux à demi suverts. - *Plénitude, pesanteur et pression violente dans la tête, principalement au front, au-deseus des yeux et du nez, ou dans un côté de la tête, *et quelquefois avec étourdissement, stupent et rensation, comme si le erdus allait solater, ou avec manyaise humeur et gémissements, traction des paupières et besoin de se coucher. - *Sensation de ballonnement et d'expansion pressire dans le cerceau. - *Douleurs vives, tractives et lancinantes dans la tête. -- *Elancemente dans la téle comme par des contemus. - Battements violents dans la tête. - *Forte pulsation des artères de la tête. - *Bouillonnement et conquation de sang à la tête, principalement en se baissant. . *Sensation de froid ou de chaleur à la tête. . .. *Sensation de fluctuation dans le cervean, comme s'il y avait de l'eau dedans. - Sensation, pendant les douleurs, comme si le crans était trop mince. - *Sensation d'un balancement lourd duns le cerceun, et accousses dans la tête, principalement en marchant vite et en montant. - Mans de tête quotidiens, depuis 4 heures après midi environ jusqu'au lendemain matin vers les

120



quelquefois avec brûlement. — *Élancements nocturnes au nez. — *Cionflement, *rougeur et brûlement au bout du nez. — *Ulcération douloureuse des narines. — Nez très-froid. — *Saignement de nez, "principalement la nuit et le matin. — *Hémorrhagie nasale et buccale. — *Grande sécheresse du nez. — *Odorat ou trop sensible, "surtout pour la fumée du tabac, "ou diminué. — *Odeur putride du nez. — Coryza fluent d'une seule narins ou alternant avec obturation du nez. — Odeur de hareng dans le

nez, pendant le corvza

122

Visage. -- *Face pále, alternant quelquefois subitement avec rougeur. — *Face creuse avec traits inquiets et air égaré. — *Chaleur brûlante du visage, quelquefois sans rougeur. — *Rougeur ardente et bouffissure du visage, comme après avoir bu du vin. — *Rougeur foncée, ou écarlate, ou bleuûtre du visage. 🕳 *Gonflement dur et rougeur bleuâtre du visage, principalement (de l'une) des jouce, et quelquefois avec brûlement, élancements, térébration et pulsations. - Taches écarlates ou couleur rouge foncé à la face. — *Eruption de boutons rouges aux tempes, aux coins de la bouche et au menton. - *Boutons purulents et croûteux, principalement aux joues et au nez. — Épaississement de la peau du visage. — Pression crampolde, douleurs vives et tractives aux pommettes. — •Douleur névralgique, **violente, incisive,** au visage, suivant le cours du nerf sous-orbitaire. — *Palpitations musculaires et mouvements convulsifs au vienge, principalement à la bouche qui est tirée vers l'oreille. — Induration et *gonflement des lèvres, oavec élancements par un temps rude. Rougeur foncée et sécheresse des lèvres.
 Boutons, croûtes et ulcères (avec auréole rouge) aux lèvres et aux coins de la bouche. - *Serrement convulsif des mâchoires avec impossibilité d'ouvrir la bouche. - Sensation comme si la machoire intérieure «'etait rétractée. — "Douleurs vives aux mâchoires; *élancoments et tension aux articulations sous-maxillaires. -- *Gonflement des glandes sous-maxillaires et de celles du cou -avec douleurs (lancinantes) nocturnes.

Dents. -- Grincement violent des dents. -- *Douleurs vives et tractives ou tiralliements successifs aux dents, quelquefois avec douleurs aux oreilles, et principalement la nuit ou le soir, pendant un travail intellectuel, ou bien après avoir mangé. -- *Le contact et le grand air aggravent les maux de dents. -- *Manx de dents avec fluxion à la joue. Térébration dans les dents cariées et écoulement de sang en y suçant. -- Gonfiement douloureux des gencives avec chaleur, prurit et pulsations, ou avec douleur d'ulcération au toucher. -- Saignement des gencives. -- Vésicules aux gencives avec douleur de brûlure.

Bouche. *Sensation d'une grande sécheresse, ou sécheresse réelle, excessive, étouffante dans la bouche. — *Écume devant la bouche, equelquefois de couleur rougeatre, rou d'une odeur d'œuis



plète de romir; vomissement des aliments ou de matières muqueuses ou bilieuses, ou acides et séreuses; ovomissement avec diarrhée ou avec vertiges, chaleur et sueur. — *Hoquet spasmodique, quelquesois avec sueurs et convulsions. — *Pression, douleurs crampoides et contractives, sensation de plénitude et ballonnement, à l'estomac et dans l'épigastre, principalement après avoir mangé, ou en mangeant. — Élancements, battements, pulsations et brûlement dans l'estomac et dans la région précordiale.

Inflammation de l'estomac et du duodénum.


Ventre. — Coliques avec constipation, flux abondant d'urine, rapports et envie de vomir. - Douleur violente dans le ventre, qui ne laisse reposer nulle part. - Elancements dans le côté gauche du ventre, en toussant, en éternuant et au toucher. -- Douleurs et brûlement aux hypocondres. *Pression dans l'abdomen comme par une pierre, "principalement an bas-ventre et aux aines. *Ballonnement et tension du ventre, principalement aux hypocondres. — *Douleurs crampoides contractives et constrictires, et pincement dans le rentre, surtout autour du nombril ou à l'hypogastre, avec sensation comme si l'une ou l'autre des parties était serrée ou saisie par des ongles ; les douleurs forcent à se plier, et sont quelquefois accompagnées de vomissement ou de ballonnement et saillie du colon en forme de bourrelet. — Fouillement dans le ventre. — Tranchées et élancements dans le ventre comme par des coutenux. — Chaleur et grande angoisse dans le ventre. - Borborygmes dans le ventre avec sortie fréquente de flatuosités sans odeur, - *Endulorissement de tout le ventre comme si tout y était excorié et au vif, et sensibilité douloureuse des téguments du ventre au toucher. — Elancements aux aines. — •Prurit au ventre.

Belles. — *Selles supprimées et constipation, "quelquefois avec ballonnement du ventre, chaleur à la tête et sueurs abondantes. — Selles dures, insuffisantes. — Envie fréquente d'aller à la selle arec ténesme et sans résultat. — Petites selles fréquentes, souvent avec ténesme. — Selles blanchâtres comme de la craie, ou rerdâtres; selles aqueuses *ou muqueuses. — Belles diarrhéiques, avec envie de vomir et douleurs pressives à l'estomac. — *Selles involontaires, "par paralysie du sphincter

de l'anus.

Urines. — Envie fréquente d'uriner. — *Émission fréquente d'urines abondantes, pâles et aqueuses, quelquefois avec *sucurs abondantes, soif, appétit augmente, diarrhée et obscureissement de la vue. — *Incontinence et émission involontaire d'urine, même la nuit et pendant le sommeil. — l'aralysie du col de la vessie. — *Urines troubles, couleur jaune, ou limpides, couleur d'or ou de citron, ou rares et couleur ronge brunâtre ou couleur de sang, ou couleur rouge vif. Dépôt rouge ou blanchêtre et épais dans les urines. — Sensation d'un mouvement dans la

124



manque d'haleine, amélioré au grand air. — En marchant, oppression crampoïde de la poitrine, avec besoin de respirer profondément. — *Pression dans la poitrine, avec douleur dans les omoplates et haleine courte. — Tension dans la poitrine. — *Élancements dans la poitrine, quelquefois comme par des conteaux, et principalement en toussant et en baillant. — Grande inquiétude et battements dans la poitrine. — *Battements de cœur riolents, qui répondent quelquefois jusqu'à la tête. — Palpitations de cœur en montant. — Tremblement du cœur, *avec


angoisse, oct douleur pressive.

126

Tronc. — Vésicules douloureuses, remplies d'eau, ou petites taches couleur rouge foncé à la poitrine. — Douleur de luration, douleurs rhumatismales et tractives, au dos et entre les omoplates. — Furoncle à l'épaule. — Élancements comme par des couteaux, dans les os de la colonne vertébrale. — Rongement dans l'épine dorsale, avec toux. — Roideur douloureuse et douleurs crampoïdes aux reins et au dos. — *Gonflement douloureux et roideur du cou et de la nuque. — Gonflement douloureux des glandes du cou et de celles de la nuque. — Douleurs vives aux aisselles. — Boutons rouges et purulents au dos et à la nuque. — Veines gonflées au cou. — Sueur acide, seulement au cou.

Bras. — Bras engourdis et douloureux. — *Pression tractive avec sensation de torpeur et douleurs vives aux bras. — Envie d'étendre les bras. — Torpeur et pesanteur des bras. — *Gonflement et rougeur écarlate des bras et des mains. — *A l'épaule, douleur tractive et pressive, parcourant rapidement depuis le haut jusqu'au bas du bras, et se manifestant surtout la nuit, diminuée par la pression extérieure, provoquée par le mouvement. — *Tressaillements douloureux, crampes et convulsions aux bras et aux mains. — Tremblement des mains. — Pression avec douleurs vives dans les os du carpe et du métacarpe. — Reideur arthritique des articulations de la main. — Luxation fréquente des articulations des doigts. — Rétraction des pouces.

Jambes. -- Elancement et douleurs brûlantes, s'aggravant par accès, à l'articulation coxo-fémorale, plus insupportables la nuit et augmentées par le moindre contact. -- Roideur à la hanche, après être resté assis, avec difficulté de se relever. -- Douleurs à la hanche qui forcent à boîter. -- Tremblement des genoux. -- Douleurs tractives dans les jambes, surtout aux genoux. -- *Pesanteur et paralysie des jambes et des pieds. -- Fléchissement des genoux et des pieds en marchant. -- Tension des tendons du jarret. -- Gonfiement des pieds. -- Fourmillement aux pieds.



128 BENZOIS ACIDUM. -- BERBERIS VULGARIS.

Gorgo comme rétrécie ou gonflée ; Déglutition difficile.

Goût amer du café et du lait; goût savonneux de l'eau; Hoquet; Vomissement de matières amères ou salées; nausées pendant la grossesse. — *Aigreurs d'estomac; *reuvois et vomissements acides. — *Manque d'appétit alternant arec boulimie; *soif continuelle.

Selles diarrhéiques, putrides et sanguinolentes; Selles diarrhéiques, chez les enfants, fetides, blanchâtres, aqueuses, très-copieuses

et débilitantes, avec urine d'un rouge tres-foncé.

Urines épaisses, sanguinolentes : envie fréquente d'uriner, avec grande irritabilité de la vessie : odeur aromatique et goût salé des urines : «Urine fortement colorée, couleur d'eau-de-vie, avec très-forte odeur : «Urine d'une pesanteur spécifique augmentée, descendant, sans mélange, au fond d'un vase où il y avait déjà d'autres urines : «Urine brûlante, corresive, d'une forte odeur et d'un rouge très-foncé, causant une douleur insupportable à son passage.

Bègles suivies de faiblesse ; Lochies de trop longue durée.

Toux courte et sèche, fatigante et presque constante; toux avec

expectoration de mucosités verdâtres.

Doigts couverts de taches rouges; Douleurs paralytiques dans les

articulations.

Membres inférieurs comme serrés par un bandeau; *Sciatique périodique, nocturne; Sensation de sécheresse dans l'articulation du genou; *Affection goutteuse des tarses; *Douleurs dans les articulations des orteils, avec gonflement léger et rougeur.

BERBERIS VULGARIS.

BERR. — Épine-vinette, — HESAE. — Hist. nat. et prép. Pharmac. hommop., p. 478. — Dose usitée : 20. — Durée d'action : Plusieurs comaines.
Antipore : Camph.

CLINIQUE. - Guidé par l'ensemble des symptômes, on verra si l'on pourra consulter ce médicament contre: - Affections rhumatismales des extrémités et d'autres parties; Céphalalgie et ophthalmie par suite de désendre dans les fonctions abdominales, ou en rapport avec des affections arthritiques et rhumatismales; Souffrances gastriques; Inserbées; Affections du foie et souffrances bémorrhoolales; Affections des voies urinaires et des parties géni-



BERBERIS VULGARIS.

frissons, commençant le matin, après le réveil. — Tête embarrassée comme avant un coryza. Sensation comme si la tête avait
augmenté de volume. — Sensation de gonflement a la tete. —
Douleurs pressives, tensives, au front, aux tempes et aux yeux. —
Cephalalgie au front et aux tempes, comme une pression de dedans en debors — Douleurs aigues, lancinantes, au front et aux
tempes. — Téguments de la tete comme tendus et gonfles.
Chaleur dans la tête après le diner et le matin. Sueur après des
efforts, en se baissant ou en restant debout. Petites taches
rouges au front et aux joues. — Démangeaison ou élancements
rongeauts dans les teguments de la tete et du visage. Pustules

aux teguments de la tete et au visage.

 180°

Youx. - Youx enfoncés, avec cercle bleu ou gris sale. - *Pression et sensation de brulure dans les youx — Sensibilité douloureuse des youx en loant à la lumière des bougies. Sensation de roideur avec pression dans les youx. — Élancements aux youx, venant d'autres parties (par exemple, du front), et se propageant vers les youx, et de la au front. — Brulement et secheresse aux youx, qui sont ternes. — Rougeur de la conjonctive avec vue troulde, comme s'il y avait un voile devant les youx, le matin après le lever. — Vue industincte, meilleure de près qu'à distance. Sensibilité des youx à la clarte du soleil. Douleurs vives dans le globe de l'œil et aux paupières. — Pesanteur aux paupières pendant le mouvement. — Douleurs brulantes ou rongeantes dans les paupières. — Mouvements convulsifs des paupières en lisant à la lumière des bougies.

Oreilles. — Demangeaison, tantot rongeante, tantôt brûlante, tantot lancinante, quelquefois avec petites pustules, a l'oreille exterieure. Petites tumeurs sius et derrière l'oreille (glandes souscutanées?) — Douleurs aignés et lancinantes dans l'interieur de

Foreille et a d'autres parties.

Nez. — Secheresse du nez — Cory za avec sécrétion, d'abord de sérosités jaunaires, ensuite de mucosités purulentes, blanchatres, jaunaires au verdatres, surtout le matin. Douleurs fourmillantes

ou rongeantes dans les narines.

Visage. — Chalcur bleuatre de la partie interne de la lèvre inférieure — Secneress des levres, et exfoliation de l'épiderme, avec croute plate, brunatre, sur les bords — Sensation de brûlure à l'exterieur des levres — Sensation de fournullement aux levres. — Petites pustules aux levres — Deuleurs aigués pressives, ou aigués lancinantes aux pemmettes et à la machine. — Grande pâleur du visage, teint gris sale, avec joues creuses et yeux enfoncés, enfoures d'un cercle bleuâtre ou gris nor. — Aspect tres-abattu, pendant longtemps.

Dents. De ulcurs tractives nigues et clancements aux dents, avec sensation comme si les dents etaient agacées ou trop grosses, ainsi qu'avec grande sensibilite des dents a l'air frais, surtout



BERBERIS VULGARIS.

 Urines épainies, jaunatres comme du petit lait ou de l'eau areileuse. — Urines d'un jaune foncé, avec sédiment abondant. — Urines rougeâtres, commo enflamméce, avec sédiment abondant. — Urines rougeatres, sanguinolentes, avec sédiment muqueux et farineux abondant, couleur rouge vif. - L'émission des urines est sourent accompagnée de douleur dans les cuisses et les reins.

Parties génitales. — Douleurs bràlantes, cuimntes au gland. — Sensation de froid au gland et au prépuce, quelquefois avec sensation de torpeur. — Sensation de faiblesse et d'insensibilité des parties génitales extérieures. La verge semble être recornie et rétractée. - Douleurs pressives, tractives, contractives, aux testicules et aux cordons spermatiques, avec contraction du acrotum, qui parait froid et racorni. - Douleurs d'excoriation an acrotum.

 Le mouvement excite ou aggrave la pluyart des affections des parties génitales. -- Douleurs cuisantes, brûlantes, lancinantes, tractives ou serrantes any cordons spermatiques, s'étendant jusque vers les testicules. - Gonflement du cordon spermatique, avec douleurs se dirigeant vers les tosticules. — Après le coît, semention de grande faiblesse dans les parties génitales. — Diminution de l'appetit vénerien. - Ejaculation trop prompte dans le coit.

Règles. - Jouissance tardive chez les femmes pendant le seit, et souvent accompagnée de douleurs incisives on même lancinantes. - Semestion de brûlure et d'excoriation dans le vagin, jusque dans les lèvres. — Règles pales, d'un sang séreux. — Pendant les règles, douleurs dans les parties génitales et les reins, ou donleurs violentes à la tête, avec sensation d'évanouissement. ---Règles peu abondantes, avec donleurs aigues, tractives, dans tout le corps, ballonnement douloureux du ventre, mai aux reins, élancements dans la poitrine, air abattu et douleurs violentes à la tête; ou avec mauvaise humeur, dégoût de la vie, abattements, douleurs cuisantes dans le vagin, sensation de brûlure et d'excoriation a l'anus, et douleurs dans les bras jusque dans les épanles et la nuque.

Laryax et Poitrine. - Enrouement avec endolorimement ou intlammation des glandes du cou. --- Sensation d'excoriation dans la poitrine. — Oppression de la poitrine, surtout la nuit, avec corvas fluent violent. — Douleurs laucinantes au centre de la poitrine, augmentées, en respirant profondément, avec toux sèche, courte. - Elancements douloureux dans le côté ganche de la poitrine. — Serrement avec clancements dans la région du occur. —

Battements de cœur.

Tronc. - Douleurs lancinantes entre les omoplates, augmentées par la respiration. - Douleurs tractives, aigues, dans l'épine dorsale. — Pustules au dos. — Sensation de tension, de roideur et de torpeur dans les reins, comme s'ils étaient gonfiés ou engourdia. — Douleurs pressives, tensives, tractives, aigues ou lancinantes, aux reins. - Semuation de pression tensive dans les reins,

132



BISMUTHUM.

134

RISMUTRUM.

BIS.—Bismuth (Bismuthum nitricum). — HARREMANN.— Hist. nat. et prés. Pharmac. homosop., p. 87. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 4 à 5 semaines.
Antidotes : Calc. cape. (nux-vom.)

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a employé ce médicament puissant que contre quelques cas de Gastralgie et de Prosopulgie.

SYMPTOMES GENERAUX. — Contractions crampoides de tous les muscles. — Douleurs pressives ou pressives et tractives à la fois. — Grande somnolence le matin après s'être levé. — Sommeil avec réveil en sursaut avec effroi. — Rèves voluptueux. — Lassitude quand on s'éveille la nuit. — Cuisson brûlante à la peau. — Froid glacial de tout le corps. — Forte chaleur. — Pouls petit, intermittent. — Mécontentement, humeur morose et plaintes. — Inconstance. — Aversion pour la solitude. — Délire. Delirium tremens. — Perte de connaissance. — Apathie et insensibilité morale.

Tôte et Youx. — Étourdissements le matin. — Vertiges comme si le cerveau tournoyait. — Vertiges violents, avec pression au front, rougeur de la conjonctive, avec trouble, pression dans l'estomac, pouls spasmodique, et bourdonnement des oreilles. — Stupeur avec brouillard devant les yeux. — Mal de tête, principalement au sinciput, s'étendant même jusqu'aux yeux. — Pesanteur pressive à la tête, surtout au front, au-dessus de la racine du nez et aux tempes. — Fouillement continuel et térébration au front, qui se propage jusqu'aux yeux et au bout da nez. — Contraction brûlante dans la tête, surtout au front et aux yeux. — Pression aux prunelles. — Chassie dans les angles des yeux.

Visage. - Face terreuse, maladive et défaite, avec yeux cernés. - *Douleur pressive aux pommettes. - Visage pâle, froid.

Dents. - Odontalgie pressive, tractive. — Gencives gonflées, avec douleurs d'excoriation. — Sensibilité douloureuse de l'intérieur de la bouche comme par excoriation. — Sécrétion continuelle d'une salive brunâtre, épaisse, d'un goût métallique. — Inflammation de toute la gorge. — Douleur brûlante dans la gorge, quelquefois insupportable. — Le matin, goût de sang dans la bouche, avec expuition de mucosités sanguinolentes. — Le soir,



BORAX VENETA,

sons; Ophthalmies; Hémorrhoïdes muqueuses; Otite; Otorrhée paralente; Affections scrofuleuses, Voy. la note, page 15.

SYMPTONES GENERAUX. — Douleurs lancinantes et tractives. — *Apparition et aggravation des souffrances par un temps maurais et humide, ou pendant et après le repas. — Souffrances pour avoir été en voiture on pour avoir mangé des fruits. — Inquiétude dans tout le corps qui ne permet pas qu'on reste long-temps à la même place. — Inquiétude, tremblement, nausées, étourdissement et vertiges après une conversation animée ou pendant la méditation. — Manque de force, surtout dans les articulations. — Accès d'évanouissement, avec fourmillement, tremblement des pieds et nausées.

Peau. — Peau maladire : toute lésion tend à s'ulcérer. — Inflammations érysipélateuses, avec gonflement et tension de la partie affectée, et fièvre. — *Tendance des anciennes blessures à suppurer. — Boutons blanchâtres, avec auréole rouge. — Éruptions

herpétiques. -- Vésicules purulentes et phagédéniques.

Sommeil. — Envie de dormir bien avant l'heure ordinaire, et sommeil du matin trop prolongé. -- Sommeil inquiet à cause d'un bouillonnement de sang, de colique et de diarrhée. — Réveil de trop bonne heure, avec difficulté de se rendormir, par chalcur et trop grande affluence d'idées. — *Cris anxieux des enfants pendant le sommeil avec mouvements convulsifs des mains.


Fièvre. — Frissonnement, horripilation, et froid avec tremblement, assoupissement et faiblesse, ou avec céphalalgie et douleurs ostéocopes au fémur, suivies de chaleur. — Froid, le plus souvent après midi; ensuite chaleur, avec mal de tête ou douleur aux hypocondres, quelquefois suivie de sueur. — Soif avant ou pendant le froid, ou bien après la sueur. — Chaleur le soir, au lit, avec frisson pour peu qu'en se découvre. — Moiteur du corps la nuit.

Moral. — Grande anxiété, surtout quand on est en voiture ou qu'on descend une montagne. — Peur d'être infecté de quelque maladie contagieuse. — Grande disposition à s'effrayer. — Irritabilite. — Disposition à se fücher, avec mauvaise humeur et

emportement. - Horreur du travail.

Tôto. - Acces de vertige, avec évanouissement. — Vertige avec plénitude dans la tête, surtout en montant un escalier, ou gravissant une élévation quelconque. — Mal à la tête, avec élancements dans les oreilles. — Mal à la tête, arec nausées et envie de romir, le plus souvent le matin à 10 heures. — Plénitude dans la tête, arec pression au-dessus des yeux. — Douleus pressives et tractives au front et jusque dans la racine du nez et

136



BORAX VENETA.

Peau du palais racornie et ridée. — Sécherense dans la gorge. — Mucontés tenuces dans la gorge avec expectoration difficile.

Appétit. — Goût amer dans la bouche en mangeant ou en avalant la salive. — Perte du goût. — Soif le matin. — Désir de boissons acides. — Farm et appétit médiocres, surtout au souper. — Nausées et inquiétudes pendant le repas. — Après chaque repas, bullonnement du rentre avec durrhée et coliques. — Plénitude et pression à l'estomac avec malaise et mauvaise humeur, après avoir mange des fruits (des poires et des pommes). — Colique avec disposition à la distribée, après avoir fumé du tabac.

Estomac. — Nausées arec envie de comer, en allant en voiture. — Vomissement de macosités augres le matin à jeun, ou après le déjenner. — Pression à l'estomac après chaque repas. — Dou-leurs contractives à l'estomac, ou sensation comme si l'on s'était donne un tour de reins, avec élancements dans la colonne verté-

brale et les reins.

138

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres, le plus souvent pressives et au côté gauche, et surtout pendant une promenade en voiture. Pression et élancements dans la région des roins. — Douleurs dans les hypocondres et le bas-ventre, comme si des corps durs et tranchants s'y remuaient. — Pincement dans le rentre avec diarrhée. — Accumulation de flatuosités dans le ventre et sortie fréquente de vents.

Selles fréquentes, molles ou diarrhéiques, avec pincements et borborygmes dans le ventre. — "Selles verdàtres (ches les enfants). "Diarrhée muqueuse — Écoulement abondant de glaires pâles, jaunâtres ou brunâtres, et de sang par l'anne, avec maux de reins. — Demangeaison, contraction et élancements

à l'anus et au rectum.


Urines. - Envie inutile d'uriner avec douleurs incisives à l'urèthre, et balionnement dans la région des reins. - Envie pressante d'uriner. - Émission fréquente d'urines, même la mit. - Féti-dité âcre de l'urine. - Cuisson dans l'urethre après avoir uriné et surtout au toucher, même hors le temps de l'émission des urines.

Parties viriles. -- Absence de l'appétit vénérien. - Érections .

avec tension doulourense, le matin en s'éveillant.

Bègles. — Règles trop hútives et trop fortes, de couleur rouge pâle. — Pendant les règles, douleurs pulsatives à la tête, bourdonnement dans les oreilles, nausces avec douleurs à l'estomac et aux reins, ou élancements et pression dans les aines. — *Flueurs blanches, corrosures et épaisses comme de l'amidon. — *Stérillé.
Douleurs aux mamelles en allaitant. — Écoulement du lait qui se caille promptement.

Larynx. - Douleurs tractives aigues au larynx jusque dans la poitrine avec envie de tousser. - Raucité dans la gorge avec élancements tractifs en toussant et en éternuant. Toux sèche.



140

BOUNAFA.

BOUNAPA.

BOUN. - Redix bounafor, Radix fernios glaucos? racine de bounafa. - Hist nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 476.
Antidores ?.

COMPARER AVEC : Bell. bry. puls.

CLINIQUE. — Quoique ce médicament n'ait encore reçu qu'un petit commencement d'études, les symptômes connus contiennent cependant des indications importantes qui justifient l'emploi qu'on en a fait jusqu'ici en pratique et d'après lequel on l'a trouvé efficace contre : — Ophthalmies chroniques; Gencivites; Gastrites; Catarrhes bronchiques chroniques; Vaginite chronique.

SYMPTOMES. — Ulcères indolents, chroniques.

Moral triste, abattu; grande disposition aux pleurs; crainte de la mort; impatience et colère; désir de la solitude; grande instabilité des pensées; répugnance pour toute occupation.

Tête entreprise ; accès fréquents de vertige ; chaleur brûlante dans la tête, surtout au front; accès de migraine ; sensation de froid

glacial à l'occiput.

Yeux collés, le matin ; cinflammation des yeux.

Nez rouge et sensible au toucher; ulcère dans le nez; croûtes brûlantes et démangeantes dans les narines.

Pace converte de petites papules rouges à pointes blanches, dans les favoris et la barbe du menton.

Dents attaquées de différentes douleurs, avec exacerbation nocturne; cinflammation des gencives.

Bouche pleine d'aphthes; sensation comme si l'on a'était brûlé la langue; mauvaise haleine; salive d'un goût amer.

Digestion lente avec renvois amers; forte soif.

Dans l'Estomac, sensation constante de chaleur avec tranchées; crampes d'estomac.

Ventre tendu et gonfié; ardeur brûlante dans le ventre; sensation

de chaleur et de pesanteur dans l'hypogastre.

Selles diarrhéiques, jour et nuit, mais plus fortes la nuit; évacuations jaunâtres, liquides, aqueuses, avec brûlement et rongement dans l'anus; hémorrhoïdes avec brûlements, élancements, rongement et picotement; coliques pendant et après les selles.

Bègles trop hátives et plus abondantes; leucorrhée d'un mucus blanc ou jaune, clair ou épais, avec sensation de chaleur et ron-



BOVISTA.

142

donce avec inquiétude et pensées sombres. — Grande susceptibilité. — Grande loquacité et caractère trop communicatif. — Faiblesse de la mémoire. — Distractions. — Gaucherie; on laisse tomber tout ce qu'on tient. — On se trompe en parlant et en écrivant.

Tôte. — Ivresse après avoir bu, même très-peu de vin. — Vertige étourdissant avec perte des sens. — Douleurs au centre du cerveau avec sensation comme si la tête avait augmenté de volume. — Mal de tête en s'éveillant, comme après un sommeil trop prolongé. — Mal de tête étourdissant avec chaleur dans les yeur. — Céphalalgie nocturne avec douleurs insupportables quand on lève la tête. — Douleurs pressives à la tête avec battements comme dans un abcès. — Céphalalgie compressive. — Douleurs vives dans la tête avec pesanteur et sensation de meurtrissure. — Sensibilité excessive du cuir chevelu au toucher. — Chute des cheveux. — Plaques exceriées au cuir chevelu.

Youx. — Tournoiement douloureux dans les youx, avec pression sensible dans les orbites. — Agglutination nocturne des paupières. — Yeux ternes, sans éclat et sans feu. — Les objets semblent être plus proches qu'ils ne le sont réellement.

Oreilles. — Ulcères dans l'oreille avec douleur en avalant. — Éruption croûteuse et humide aux oreilles. — Écoulement de pus fétide par les oreilles. — Diminution et dureté de l'ouie avec malentendus fréquents.

Mes. — Excoriation dans les narines. — Narines croûteuses avec douleurs brûlantes. — Obturation du nez qui gêne la réspiration. — Coryza fluent avec sécrétion de mucosités séreuses et embarras à la tête.

Visage. — Chalcur aux joues comme si elles allaient éclater. —
Visage alternativement pâle et rouge. — Extrême pâleur le
matin au lever. — Térébration et fouillement dans les pommettes. — Gonfiement fort pâle de la lèvre supérieure, du nes
et des joues. — Lèvres gercées. — Coins de la bouche ulcérés.
— Douleurs rhumatismales de la mâchoire inférieure, avec
gonfiement et douleurs pulsatives dans les glandes sous-maxillaires.

Dents. — Douleurs dans les dents incisives supérieures, suivies de gonfiement de la lèvre supérieure. — Odontalgie tractive, surtout dans les dents creuses, le soir et la nuit, soulagée par la chaleur et la promenade au grand air. — Térébration et fouillement dans les dents. — Les gencives saignent facilement, la nuit, ou en les suçant.

Bouche. — Accumulation de salive dans la bouche. — Sensation de torpeur dans la cavité buccale. — Bégayement. — Douleurs incisives à la langue. — Ulcères aux bords de la langue, avec douleurs d'exceriation. — Odeur putride de la bouche. — Mal à la marche amétic partie de la bouche. — Mal à

la gorge avec grattement et douleurs brûlantes.



BOVISTA. - BROMUM.

de force dans les mains, de sorte qu'elles laissent tomber les objets les plus légers. — Durtres humides au des de la main.

Jambes. — Fourmillement et engourdissement dans les jambes avec impossibilité de se tenir debout. — Elancements dans les articulations des genoux et des pieds. — Forte tension aux mollets et aux jambes, comme si les tendons étaient trop courts. — Crampes aux mollets le matin au lit. — Miliaire aux jambes.

BROMUM.

BROM. - Brome. - HERING, Archives de Stapf. - Hist. nat. et prép. Pharmac homogop., p. 88.

ARTIBOTES: Gaz ammoniae, ammoniae liquide, rapeurs alcooliques; contre les fortes doses allopathiques de cette substance : Op. magn. camph.

CÉNERALITÉS. — Les souffrances paraissent plus prononcées à la chaleur de la chambre, ainsi que dans la position couchée ou assise, et dans le repos en général; le mouvement les fait moins apercevoir; le grand air paraît les améliorer. — Plusieurs symptômes, surtout ceux du poumon, semblent plus prononcés du côté droit; d'autres symptômes affectent au contraire plutôt le côté gauche. — Roideur paralytique des membres supérieurs et inférieurs. — Fourmillement dans les doigts, avec tressaillements convulsifs dans les muscles du pied et autour des genoux. — Faiblesse, lassitude et grande fatigue, continuant même après la cessation des autres symptômes. — Tremblement général et impossibilité de rester debout.

Peau. -- Couleur jaune de la peau. -- L'application extérieure détruit promptement la peau, avec sensation d'un brûlement vio-lent et inflammation apres : appliqué sur des plaies, celles-ci prennent un mauvais aspect, et s'entourent de putréfaction verdâtre, d'odeur cadavérique. -- Sensation de quelque chose de vivant dans la peau, surtout aux bras et aux jambes. -- Furoncles aux bras et à la face. -- Augmentation de l'embonpoint. -- Engor-

gements scrofuleux,

144

Sommeil. — Baillements toute la journée, avec gêne de la respiration. — Grande envie de dormir le jour, surtout le soir, en lisant on en écrivant, et parfois avec la sensation comme si la tête était serrée dans un cercle. — Difficulté de s'endormir le soir. — Sommeil agité avec sursuits et beaucoup de rèves. — Rêves de morts, de cercueils, de meurtre, de querelles et de voyages. — Bouche ouverte pendant le sommeil. — Sommeil du matin très-prolongé, non réparateur et étourlissant.

Pièvre. — Frieson grelottunt avec baillement, pendiculations et



HROMUM.

146

For. — Boutons au nez et au fond de la langue. — Gonflement douloureux an coté gauche du nez, comme s'il allait se former une pustule. Croutes et écorchure dans les narines, avec gonflement des ailes. — Epistaxis, avec soulagement des sonffrances de la poitrine et des yeux. Sensation de plaie dans la narine comme si des poils étaient arraches, et qu'un rhume allat se déclarer. — Eternument ebranlant, suivi d'obturation du nez. — Corysa fluent, avec obturation et excornation surtout de la narine droite, et éternument fréquent. — Corysa opiniaire arec axeomation des bords des narines et de la peux au-dessous du nes. — Ecoulement de macosités jaunaires, tenuées.

Visage. - Sensation de chalcur, surtout au-dessous du nez, avec chatouillement, comme si une tode d'araignee couvrait cet en-droit. - Couleur pale de la face. Tressaillements convulsifs à la face, par suite du grattement et du brulement à la gorge. - Chatouillement et fourmillement aux joues et aux pommettes. Brûlement à la lèvre superieure, qui en meme temps parait très-

lisse. - Desquamation de la levre excorree.

Dente. — Battement dans les dents. — Douleurs dans les dents cariées, avec sensation en les serrant comme si elles étaient trop longues.

Bouche. - Boutons à la partie postérieure de la langue. - Sécrétion de salive augmentee. - Salivation. - Inflammation des

glandes salivaires (chez les animaux).

Gorge. — Brûlement et douleur d'excornation dans la gorge; brûlement jusque dans l'osophage et l'estouac. — État inflammatoire chronique de l'arriere gorge. — Inflammation des membranes de la gorge, avec exsudation de lymphe plastique. — «Mal à la gorge avec gonflement rouge rosé des anyydales, engorgement dur et chaud de la parotide droite; renachment de mucosités; élancements et pression dans la gorge pendant et hors le temps de la deglutition; deglutition difficile et augmentation des douleurs en avalant des liquides. — Rougeur rétiforme de la membrane muqueuse dans la gorge, avec de nombreuses excoriations.

Appétit et Coût. Goût acre ou acide dans la bouche. — L'eau a une saveur salée, le matin à joun. — Répugnance pour l'eau froide. Appetit augmenté et bonne digestion. — Desir de choses acides, après l'ingestion desqueiles les symptomes s'aggravent cependant, suivis de diarrhée. — Repugnance pour le tabac à

fumer, lequel produit des nausces et des vertiges.

Estomac. — Nausces et envie de vonnt, parfits avec brûlement dans la gorge, depuis la langue jusqu'a l'estomac. — Rapports fréquents, avec vomituritions repeters qui font remonter beautoup de glaires. — Augmentation de la secrétie n muqueuse, avec dégont et rapports frequents. — Rapports d'un gout d'œufs pourris. — Vomissement de mucosites sangumolentes ou de matières



BROMUM.

148

— Métrorrhagie passive. — Règles trop hâtives et trop fortes. — Suppression des règles. — Avant l'époque, maux de reins, sensation de faiblesse et manque d'appetit, ou bien élancements dans le bas-ventre, amélières étant couché dans une position courbée. — A l'entrée des regles, céphalalgie, particulièrement au front, avec sensation en se baissant, comme si les yeux allaient sortir de la tête. — Douleurs spasmodiques contractives a chaque époque, suivies de douleurs d'excoriation dans le ventre.

Engorgement des mamelles.

Larynx et Toux. — Inflammation du larynx, de la trachée-artère et des bronches, avec des stries rougeatres ou des rougeurs foncées, surtout la ou la membrane du larynx entoure la glotte. — Exsudation de lymphe plastique dans le larynx et la trachée-artère. — Enrouement et aphonie, avec forte sensation d'excoriation et de raucite dans la gorge — Sensation de froid au larynx, surtout en inspirant, après le déjeuner, et améliorée après s'etre rasé. — Sensation de contraction dans le larynx, autour de la fossette, comme si l'on pressait sur cet endroit. — Chatouillement dans le larynx, excitant la toux. — Toux rauque, sèche, creuse. — Toux fatigante, ne permettant point de parler.

Toux excitee par un chatouillement continuel dans le larynx, ou bien en inspirant profondément. — Toux avec accès de suffocation, comme par les vapeurs du soufre, avec céphalalgie sourde, pressive. — Toux spasmodique, d'un son croupal, sibilant, rauque, avec dyspnée et éternument. — Toux avec vomiturition. — Dans les expérimentations faites sur les manifères rongeurs, la toux ne s'étant jamais déclarée, le docteur Hering conclut de là qu'il ne faudra administrer le brôme ni contre le croup, ni contre la toux des personnes dont la position des dents aurait de la similitude avec celle des mammi-

feres rongeurs.

Poitrine et Respiration. - Oppression replente de la postrine, parfois avec toux, mal de tête et vertiges. - Respiration difficile, avec besoin continuel de respirer l'air, plus forte le matin, améliorce en marchaut, ainsi que le soir et la nuit. - Baillement continuel pendant la gêne de la respiration. - Sensation comme si la respiration était arrêtée par un obstacle au milieu de la portrine. - Sensation de plénitude dans la poitrine et la gorge, comme si un corps mon était entre les poumons et le sternum. -oGêne asthmatique par suite de la rougeole, chez une jeune fille, ne permettant ni de marcher vite, ni de monter l'escalier, sans produire un grand épuisement. Respiration très-difficile, avec bouche et nez pleins de salive et d'écume, larmoiement, toux, envie de romir, romiturition et vomissement écumeux, hurlement rauque (chez des chiens), battements de cœur irréguliers, grande faiblesse jusqu'à la prostration, tremblement et froid par tout le corps, selles liquides, pouls très-fréquent. -



150 BROMUM. — BRUCEA ANTIDYSENTERICA.

la plante du pied gauche, avec sensation de paralysie dans le genou et la hanche, et suivie immédiatement de mai de gorge prossif à côté du cartilage thyroide. — Chaleur dans les pieds. — Sensation de froid dans le gros orteil gauche, la nuit aussi, au réveil, avec fourmillement. — Douleurs dans les orteils du pied droit. — Les cors au petit orteil gauche deviennent douloureux et croissent rapidement.

BRUCEA ANTIDYSENTERICA.

BRU6. — Brucce. — Hering. — Hist. nat. et prép. Pharmas, homosp., p. 177. — Médicament peu connu.

extrémités. — Pincement à plusieurs endroits des membres. — Le soir, roideur aux articulations et douleurs tractives aiguês dans les membres, avec élancement dans la tête, aux oreilles et dans la poitrine. — Abattement. — Disposition à étendre les membres et à bâiller. — Grande lassitude en marchant. — Le soir, surexcitation nerveuse, tremblement et chancellement en marchant. — Irritabilité augmentant le soir.

Fièvre. — Disposition frileuse et aversion pour l'air frais. — Frissons et froid excessif. — Sueur en marchant, malgré les frissons

qui apparaissent principalement pendant le repos.

Sommeil. — Somnolence toute la journée, surtout étant assie, le matin, après le diner, et au plus haut degré après midi. — Somnolence le soir de bonne heure. — Sommeil plein de rêves avec bouillonnement de sang. — Sommeil troublé par des rêves confus ou affreux, effrayants. — Somnolence alternant avec manque d'appétit.

Moral. — Esprit abattu avec besoin de dormir. — Tacituraité et hypocondrie. — Humeur sombre, mélancolique, avec paresse et lassitude. — Humeur triste et sombre en s'éveillant le matin.

Tête et Yeux. - Pesanteur et embarras à la tête, avec somnolance disparaissant le soir. — Vertiges à faire tomber, le soir. — Pourmillement fouillant au sommet. — Le soir, mai à la tête après avoir marché longtemps au soleil. — Céphalalgie derrière les sourcils qui semblent être gonfiés. — Elancements dans la tête, empirés en marchant, surtout au soleil. — Mal à la tête empiré étant assis, ainsi qu'après avoir mangé. — Yeux ternes, gonfiés. — Yeux rouges aux angles, le soir. — Démangeaison aux paupières. — Le matin, yeux rouges, brûlants. — Sensation douloureuse aux yeux, comme par du sable, obligeant à les frotter.




152

BRYONIA ALBA.

BRY. — Bryone blanche. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosp., p. 478. — Doses usitées : 42, 30. — Durée d'action : 4 à 5 jours dans les affections aiguës; 30 jours dans quelques maladies chroniques. Anthores : Acon. cham. igu. n-vom. — La bryone est l'antidote de : Alum. clem. rhus. mur-ac. seneg.

Comparer avec : Acon. alum. arn. ars. cham. chin. clem. igu. led. lyc. merc. mur-ac. nux-vom. op phos. puls. rhus. squil. sen. — C'est surtout après acon. nux-vom. op. ot rhus. que la bryone fait du bien, lorsqu'elle se trouve indiquée. — Après la bryone, on trouvera quelquefois convenebles : Alum. rhus.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas particuliers dans lesquels on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des hommes adultes d'une constitution nerveuse, ou sèche, maigre et bilieuse; au tempérament colérique, teint brun, cheveux et yeux noirs ou bruns, caractère irritable, avec disposition à des inflamillations membraneuses, etc., etc. — Affections rhumatismales et arthritiques, avec ou sans fièvre inflammatoire et gonflement; Nodosités arthritiques; Affections hydropiques; Inflammations locales aigues (et chroniques); Souffrances par suite d'un refroidissement par un froid see (vent d'est); Suites facheuses d'une colère, d'efforts physiques (d'un tour de reins, etc.), et d'une vie sédentaire; Luxations spontanées; Convulsions et spassacs hystériques?; Tétanos et trismus?; Congestions actives; Paralysie; Tumeurs inflammatoires; Affections scrofuleuses; Engorgement et induration des glandes?; Ictère: Affections hydropiques; Eruptions phlycténoides; Dartres furfuracées; Pétéchies (morb. maculos.); Morbilles et affections à la suite de cette maladie; Symptômes précurseurs de la petite vérole et des varioloïdes; Suites fâcheuses de la suppression de la scarlatine; Inflammations érysipélateuses aux articulations; Eruptions miliaires des enfants et des femmes en couches; Somnambulisme; Fièrres inflammatoires, avec affections nerveuses, gastriques ou bilieuses, et forte excitation des systèmes sanguin et nerveux; Fièvres intermittentes; Fièvres typholdes, période inflammatoire; Céphalalgie à la suite d'émotions morales, ou après un refroidissement; Migraine; Encephalite (et meningite?), aussi quand elles proviennent de la congélation; Affection cérébrale à la suite du choléra; Hydrocéphale aiguë; Coryza et obturation chronique du nez; Epistaxis, aussi celle par suite de ménostasie; Prosopalgie inflammatoire; Fluxion à la joue; Gonflement scrofuleux des lèvres; Angine couenneuse; Hoquet convulsif; Anorexio et dyspepsie




154

— *Grande lassitude et faiblesse, surtout le matin ou en se premenant au grand air. — *Besoin de rester couché. — Accès d'évanouissement. — Sensation de faiblesse, surtout en se premenant à l'air.

Peau. — *Couleur jaune de la peau. — Peau molte, visqueuse. —
Brûlement et picotement par tout le corps, comme par des orties, après de légères émotions. — Inflammations *érysipélateuses, surtout aux articulations. — *Éruptions urticaires. — *Miliaire, surtout chez les enfants et les femmes en couches. — Nodosités dures dans la peau. — *Eruptions phlycténoïdes, avec démangeaison rongeante ou brûlante. — *Dartres furfuracées, avec démangeaison brûlante. — *Pétéchies. — Ulcères, avec sensition de froid, ou avec douleurs pulsatives ou cuisantes. — Engelures. — Cors, avec pression ou élancements brûlants, ou douleurs d'exceriations au toucher.

Sommeil. — Grand besoin de bâiller. — Grande sommolence le jour, surtout après le dîner. — Sommolence comateuse, interrompue par des délires anxieux. — *Insomnie, surtout avant minuit, causée par la chaleur; bouillonnement de sang et anxiété, surtout à la poitrine. — *Sommeil troublé par la soif, avec goût amer dans la bouche au réveil. — Impossibilité de rester couché sur le côté droit. — Sursauts, avec effroi en s'endormant et pendant le sommeil. — Sommeil inquiet, avec rêves confus et affluence d'idées. — En s'endormant, cris et délires dès qu'on a fermé les yeux, — *Rêves désagréables, chagrenants. — Rêves vifs des affaires de la journée. — *Délires nocturnes et rêvasserles, avec yeux ouverts. — Gémissements, surtout vers minuit, — *Somnambulisme. — Cauchemar.

Fièvre. - *Froid et frissons au corps, même au lit, le soir, ou accompagnés de douleurs dans tous les membres et de sueur froide au front. - *Frissons avec tremblement, souvent avec chaleur à la tête, rougeur du risage, et soif ; on suivis de chaleur avec sucur et soif. - Avant les frissons, vertiges et céphalaigie; puis frissonnement avec tension et traction dans les membres. Dégoût pour les aliments et les boissons pendant les frissons. - Chalcur d'abord alternant avec frissons, puis chalcur brûlante et soif; ensuite forte sueur. — *Chaleur universelle, sèche, extérieure et intérieure, presque toujours avec grand désir de boissons froides. — Pendant la chaleur, vertiges et céphalalgie. Accès fébriles avec froid et frissons prédominants, type tlerce, nausces et besoin de rester couché, ou avec douleurs lancinantes dans le côté et dans le ventre, et soif pendant les frissons et la chaleur. - Au début de la fièvre, toux sèche avec vomissement, élancements et oppression à la poitrine. — Sucur froide au front et à la tête. - Sueur abondante pendant qu'on se promène à l'air froid. — Sueur huileuse le jour et la nuit. — Sueur avec anxiété et inquiétude, respiration suspirieuse, toux courte et



Oreilles. — Douleurs contractives aux oreilles, avec diminution de l'oute. - Élancements dans les oreilles, pendant et après la promenade au grand air. -- Tumeur comme une bosse devant et derrière l'oreille. — Saignement par les oreilles. — Sensation aux oreilles comme si elles étaient bouchées. — *Bourdonnement aux oreilles. — *Tout bruit est insupportable aux oreilles.

Hen. — *Gonstement du nes avec sensibilité douloureuse au toucher et obturation du nes. — *Inflammation et ulcération des narines. — Ulcère dans les narines avec douleurs rongeantes. — *Saignement fréquent de nez, quelquesois le matin, ou lorsque les règles sont supprimées, ou même en dormant. — *Sécheresse et obturation du nez, parsois opiniâtres. — Coryza fluent avec pression lancinante au front. — *Coryza sec, parsois opiniâtre. —

Mucosités dures, séchant en croutes.

Visage. — *Couleur du visage pâle, jaune, terreuse. — *Visage rouge, brûlant. — Taches rouges au visage. — *Gonflement chaud, bleuâtre et brunâtre du visage. — Douleurs au visage, le plus souvent pressives, soulagées par la pression extérieure. — *Gonflement du visage, "parfois d'un seul côté, ou sous les yeux et à la racine du nez. — Gonflement de la joue, tout près de l'oreille. — Petites nodosités et indurations au visage, comme des glandes sous-cutanées. — *Lèvres gonflées et gercées, avec saignement et sensation de brûlure au toucher. — *Lèvres sèches. — Éruption aux lèvres avec cuisson brûlante.

Dents. — Maux de dents avec besoin de se coucher, augmentés la nuit par des choses chaudes; aggravés en restant couché sur le côté sain, soulagés en se couchant sur la partie affectée. — Odontalgie tressaillante et tiraillante, avec sensation comme si les dents étaient trop longues ou qu'elles branlassent, surtout pendant et après le repas. — Douleurs d'excoriation aux geneives

avec vacillement des dents. — Gencives fonguenses.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche, avec soif ardeute. — Accumulation d'une salive savonneuse et écumeuse dans la bouche. — Salivation. — Odeur putride de la bouche. — Langue *sèche, *chargée d'un enduit blanc, ou sale, ou jausse. — *Couleur foncée et rugosité de la langue. — Vésicules brûlantes au bord de la langue. — *Parole indistincte par sécheresse

de la gorge.

156

Gerge. — Mal à la gorge avec enrouement et déglutition difficile.

Douleurs d'excoriation dans la gorge en avalant à vide. — *Sensation de sécheresse et grande sécheresse dans la gorge. —

Pression dans le pharynx, comme par un corpe dur et pointu. —

*Élancements dans la gorge au contact, ainsi qu'en tournant la tête et en avalant. — Mucosités tenaces dans la gorge, ne se détachant que par des efforts.

Appétit. - *Perte du goût. - *Goût fade, pûtenx, putride. -



— *Coliques avec tension du ventre et écoulement d'eau comme des pituites. — *Ballonnement du ventre avec pression à l'épigastre, surtout après le diner. — Déchirement dans le ventre depuis les hanches jusqu'au creux de l'estomac. — Douleurs *crampoïdes, pincement, ou tranchées et élancements dans le ventre, principalement après avoir mangé ou bu (surtout du lait chaud), quelquefois avec selles diarrhéiques. — Gonfiement dur autour du nombril. — *Gonfiement hydropique du ventre. — Gargouillement et borborygmes dans le ventre, avec sortie de vents; quelquefois seulement le soir, au lit.

Selles. — *Constipation opiniâtre. — *Excréments gros avec évacuation difficile. — *Selles peu abondantes, mais dures et comme brûlées. — *Diarrhées arec coliques, "alternant quelquefois avec constipation et gastralgie. — Selles diarrhéiques d'une odeur putride, comme du fromage trop fait, ou avec évacuation de matières non digérées. — *Diarrhée le matin. — Diarrhées nocturnes, jaunâtres, avec douleur brûlante à l'anus. — Diarrhées colliquatives. — Colique constrictive pendant les selles. —

Selles diarrhéiques fréquentes, de conleur brunâtre (chez les nourrissons).

158


Urines. — Curines rares, rougeatres, brunatres et *chaudes. — Envie pressante d'uriner, avec incontinence. — Émission fréquente d'urines aqueuses. — Envie d'uriner, avec suspension de la respiration en levant des fardeaux. — Besoin d'uriner la nuit. — Émission involontaire d'urines chaudes quand on fait des mouvements. — Sensation de brûlure et douleurs incisives dans l'urèthre, avant d'uriner. — Sensation de rétrécissement de l'urèthre. — Élancements et douleurs brûlantes dans l'urèthre.

Parties viriles. — Miliaire rouge, pruriante, au gland. — Élance-

ments dans les testicules.

Règles. — •Règles supprimées. — Règles trop hâtives. — •Douleurs tractives, aigues, dans les membres, pendant les règles. — Écoulement de sang hors le temps des règles. — •Métrorrhagie d'un sang rouge foncé, avec mal aux reins et à la tête. — •Douleurs brûlantes au fond de la matrice, pendant la grossesse, augmentées par le mouvement, diminuées par la pression •et le repos. — Gonfiement de la lèvre, avec pustule noire et dure.

Laryax. — *Enrouement avec disposition à transpirer, toux et râlement dans la poitrine. — Envie de tousser, comme par des glaires; après, douleurs d'excoriation au laryax, augmentées en parlant ou en fumant du tabac. — *Toux, le plus souvent sèche, excitée par un chatonillement dans la garge, —ou comme causée par de la vapeur dans le laryax, avec besoin de respirer souvent. — Toux, comme par irritation de l'extomac. — *Toux crampoide, suffocante, surtout après minuit, on après avoir bu ou mangé, et souvent arec romissement des aliments. — Toux le matin avec écoulement d'eau comme des pituites. — *Toux qui



160 BRYONIA ALBA. — CACTUS GRANDIFLORUS.

la main, avec douleur brûlante. — Gonflement des mains. — Sensation de torpeur dans la paume des mains. — Douleurs lancinantes aux doigts en écrivant. — Gonflement chaud et pâle des articulations des doigts. — Tressaillement des doigts en remusant les mains.


Jambes. — Craquement et déboîtement du col du fémur, en marchant. - Douleurs tractives aux cuisses. - Elancements dans la cuisse, depuis la fesse jusqu'à la cheville du pied, avec douleurs insupportables au toucher et peudant le mouvement, ainsi qu'avec aueur par tout le corps. - Lassitude et manque de solidité dans les jambes, surtout en montant un escalier. — Paralysie des jambes. — *Roideur tensive et douloureuse des genoux. — Gonflement rouge et luisant des genoux, avec élancements violents, surtout en marchant. — Chancellement et fléchissement des genoux pendant la marche. — • Elancements tensifs et douleurs crampoides dans les genoux, avec *tension jusque dans les mollets. — •Douleurs vives dans les genoux, s'étendant jusqu'aux tibias. - • Elancements tensifs et tractifs dans les mollets jusque dans la cheville des pieds, avec gonflement rouge luisant des parties affectées. --- Crampes aux mollets, la nuit et le matin. — Lassitude des jambes en marchant et en restant debout. - *Gonslement des jambes, s'étendant jusqu'aux pieds. — "Ulcères putrides aux jambes. -- *Douleur de luxation à l'articulation du pied, en marchant. — "Gonflement des pieds, avec rougeur et chaleur, douleur de meurtrissure en étendant les pieds, tension en les remuont, et douleur d'ulcération au contact. — Elancements dans les pieds, la plante des pieds et les orteils, surtout en appuyant le pied. — Cors avec pression, ou avec elancements brûlants, ou avec douleur d'excoriation au toucher.

CACTUS GRANDIFLORUS.

CACT. - Cactus. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé, jusqu'ici, avec succès contre les affections suivantes : Prosopalgie du côté droit, pire après le moindre effort, supportable seulement en étant couché tranquillement au lit, et renouvelée par le vin, la musique, une forte lumière et le retard apporté à l'heure habituelle du repas. — Migraine, dans les mêmes circonstances, commençant le matin et arrivant, dans le courant du jour, à un degré insupportable, avec vomissement. — Péricardite, avec sensation de constriction au cœur comme par une main de





CACTUS. -- CALADIUM SEGUINEM.

sucur freide à la face et poule insensible. — Pulpitations de cour, en marchant, ou la nuit, en étant couché sur le côté gauche. — Dysandsorrhée, avec douleurs constrictives au cœur, coliques violentes venant surtout le soir, et forçant à crier et à pleurer; règles rares et s'arrêtant dans la position couchée. — Rhomatieme musculaire, avec métastase au cœur. — Fièvre intermittente, débutant à 11 heures du soir ou du matin, avec frison suivi de chaleur brâlante avec mal de title, étourdissement, coma, insensibilité, seif, respiration courte, impossibilité de rester couché; puis sueur abendante, avec soif inextinguible; enfin, apyrexie complète.

CALADIUM SEGUENUM.

CALAD. — Pédiveux vénénoux. — Hántag. — Hist. nat. et prép. Pharm. hommop., p. 480. — Dose usités : 30. — Durée d'action : jusqu'à 50 jours. Antmotus : Les mêmes.
Companies avec : Cope. earb-veg. chin. graph. ign. morc. nitr-ec. phosph.

STEPTOFIES GÉBÉRAUX. — Aversion pour tout mouvement, avec envie continuelle de rester couché. — Légères attaques d'évanouissement, après avoir écrit ou médité, ainsi qu'en se levant de la position couchée. — Diminution de tous les symptômes après un court sommeil le jour, et disparition du mal pendant la transpiration. — Chaleur brûlante sur de petites parties de la peau, avec besoin de les toucher du doigt. — Sensibilité douloureuse des piques de cousin. — A l'avant-bras ou à la poitrine, miliaire à gros grains avec prurit, et chaleur alternant avec oppression. — Souvent, sensation comme si des mouches coursient sur la peau, surtout à la face.

Semmell. — Envie de dormir, avec besoin de se coucher le jour, sans pouvoir dormir, et avec horripilation et embarras de la tête. — Assoupissement, et sommeil durant lequel on se souvient de tout ce qu'on avait oublié pendant la veille. — Sommeil trop léger pendant la nuit. — Gémissements et sanglots anxieux pendant le sommeil, avec violents mouvements convulsifs dans les

Fièvre. -- Fièvre avec douleur dans les oreilles et gonflement des glandes sous-maxillaires. -- Fièvre avec froid et soif, respiration haletante, rhume de cerveau et pulsations dans la poitrine. -- Le soir, fièvre avec sommeil qui cesse régulièrement à la disparition de la fièvre. -- Après la chaleur, sueur qui attire fortement les mouches.



CALADIUM SEGUINUM.

Moral. — Craintes et inquiétudes, surtout sur sa santé. — Angoisse avant de s'endormir le soir. - En se rasant, angoisse et peur de

se couper. Cris et pleurs comme ceux d'un enfant.

162

Tôte, Yeux, etc. Tête embarrassée avec teurnolement et nausées. - Quand on se couche ou qu'on ferme les yeux, vertige, comme si l'on était bereé. - Après avoir été couché, céphalalgie Bu côté sur lequel on a reposé. Chaleur à la tête, qui monts du bas vers le haut. - · Cuisson brûlante dans les yeux. Ouis extremement sensible, surtout quand on s'endort. - Accès de surdité légere et passagère. Bruissement dans les oreilles. -Rhume de cerveau le soir, avec douleur brûlante dans le nez et Mana de dents térébrants, avec Clancement éternument. jusque dans l'oreille.

Appétit. - Gout pâteux, herbacé, dans la bouche. Grand désir de fumer du tabac. Manque de soif avec aversion pour l'eau froide, et sécheresse du pharynx et de l'osophage. Sensation de vide dans l'estomac, sans faun, mais qui force à manger vite. —

Après le déjeuner, humeur maussade et tête entreprise.


Estomac. — Renvois a vide — En fumant, envie de vomér, et d'uller à la selle, ou bien vomissement aigre, émoussant les dents qui paraissent trop longues. - Renvois empêchés par des douleurs à l'estomac. — Nausées le matin avec vertige et elancements au creux de l'estomac. - Sensation de vacuité à l'estomac. -Cuisson brûlante dans l'estomac. - Pression et rongement au cardia. - Tranchées à travers l'épigastre. Elancements à l'épigastre et rétraction du creux de l'estomac, avec faiblesse et nausées. - Douleurs pulsatives et fatigantes à l'épigastre, après avoir marché.

Ventre. Urines. Tranchées crampoides dans la région ombilicale. - Battement et pulsations ou douleurs brûlantes à l'épigastre. - Sortie de petites flatu-sités d'odeur putride. - Selles de la consistance de la bouillie, et peu abondantes. Après la selle, sortie de mucosités, et écoulement d'une humeur séreuse de l'anus. - Après la selle, clancements au rectum. - Souvent envie d'aller à la selle; les selles sont jaunâtres, en forme de bouillie, — Térébration et fouillement dans l'anus et le sacrum Après les selles, sortie de sang par l'anns. -- Sensation doulourense de plé-

nitude dans la vessie, sans envie d'uriner.

Parties viriles. — Fail lesse des fonctions génitales. — Forte sucur au sacrum. Impuissance avec lascivité. Parties génitales beuthes, flasques, suintantes. Gonflement et excoriation du prépuce, avec rétraction apres le cost. - Secheresse et rougeur du gland, qui est comme parsemé de petits points rouges. -Manque de jouissance et d'éjaculation pendant le cort, ou éjaculation trop prompte et sans érection. Erections necturnes. -Boutons au mont venérien et a l'oreille.

Larynx. - Trachée-artère et larynx comme contractés, avec siffle-



CALADIUM. — CALCARBA CARBONICA.

168

ment en respirant profondément. — Toux, qui parait avoir ses siégé an-dessous du larynx. — Toux avec respiration génée, causé: par une pression à l'épigastre, ou empêchée par une sensation de pemateur à cette partie. — Tour nocturne, courde et faible, qui **empêche de dormir, même le matin.**

Palirino. — Oppression, surtout pendant les douleurs brûlantes à l'esternac. — Poirrine comme vide, surtout après l'expectoration des glaires. — Pulsation au-dessous du cœur. — Le matin, 🦛 🙉 levant, douleur de brisement dans les côtes et les reins.

Dos es Extrémités. — Maux de reins, comme par faiblesse. — Elagcements dans les cors.

CALCARRA CARBONICA.

CALG. — Chaux carbonatée, sous-carbonate de chaux provenant de l'écuille d'huntre. — Hausemann. — Hist. not. et prép. Pharmac. homosop., p. 90. — Durée d'action : 50 jours dans des affections chroniques.

Antidores : Camph. nitr-ac. nitr. spir. sulph. — Ce sout : Bis. chin. chin-sulf. nitr-ac., dont calcares est l'antidoté à son tour.

Companna Avec : Anac, alum. arn. ars. bar. bell. bis. chin. cupr. graph. kal. lyc. magn. more. nitr-ac. nux-vom. phos. puls. sep. sil. sulf. verstr. — C'est suriout après chim. cupr. nitr-ac. et sulf. que calcarea fers du bien, lorsqu'll est indiqué. Après calcarea, on trouvers le plus souvent convenables : Lyc. nitr ac. phos. et sil.

CLINIQUE. — Be laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas particuliers dans lesquels on pourra consulter ce médicament contre : - Affections des personnes à constitution plethorique ou lymphatique avec disposition à des blennorrhagies, des rhumes de cerveau et des diarrhées; ou bien d'individus de constitution faible, à nutrition maladive. — Souffrances à la suite d'un refroidissement dans l'eau; Différentes affections des enfants et des femmes qui ont les règles abondantes; Suites facheuses d'un tour de reins; Souffrances après avoir fait abus du quinquina Souffrances des irrognes; Nodosités goutteuses et autres souffrances arthritiques; Danse de Saint-Guy?; Convulsions épileptigues (après l'action de cuprum); Spasmes hystériques; Obésité des jeunes gens; Paiblesse physique et nerveuse, par suite de mastur bation; Faiblesse musculaire, difficulté d'apprendre à marcher atrophie et autres souffrances des enfants scrofuleux; engorge ment et suppuration des glandes; Carie, ramollissement, déviation et autres affections des os; Affections rachitiques; Luxation spontances; Arthrocace?; Polypes; Tumeurs enkystees; Eruption chroniques; Dartres croûteuses et humides; Eruptions scrofu leuses; Ulcères fistuleux; Verrues; Rhagades, surtout chez le ouvriers travaillant dans l'eau; Varices; Eruptions urticuire



164

chroniques; Fièvres intermittentes, et suites fâcheuses de la suppression de ces fievres par le quinine; Fièvres lentes; Mélancolie; Hypocondrie et hystérie : Delirium tremens ; Ivr ignerie , Migraine ; Céphalalgie, par refroidissement, ou a la suite d'un tour de reins; Fatigue de la tête à la suite de travaux intellectuels; Teigne; Chute des cheveux, surtout chez les femmes en couches, ou à la suite de graves maladies aigués; Fontanelles des enfants trop longtemps ouvertes; Ophthalmies, même celles par l'introduction d'un corps étranger, ou chez des personnes scrofuleuses, ou chez les nouveau-nés, Blépharophthalmie; Taches, ulcères et obscurcissement de la cornée?; Fongus hématode dans l'œil?; Amblyopie amaurotique; Fistule lacrymale; Hémorrhagie des yeux?; Otite?; Otorrhée parulente, aussi celle qui provient de la carie de l'appareil auditif; Polype dans l'oreille; Dureté de l'oute, aussi celle par suite de la suppression d'une flèvre intermittente par le quinine; Parotite; Gonflement scrofuleux du nez; Polype nasal; Anosmie; Cancer au nez?; Coryza avec établissement tardif du flux catarrhal; Coryza et obturation chronique du nez; Prosopalgie, Dartres et autres éruptions faciales: Croûte de last; Odontalgies, aussi celles des femmes enceintes, ou qui ont les règles trop abondantes; Dentition difficile chez les enfants, avec ou sans convulsions; Ulcères fistuleux aux gencives?; Grenouillette; Amygdalite et autres angines phlegmoneuses, Goître; Anorexie; Dyspepsie, vomissements, augreurs, pyrosis et autres affections gastriques; Induration et autres affections du foie; Affections abdominales chroniques; Carreau; Ténia; Coliques; Spasmes abdominaux; Bubons scrofuleux: Constipation opiniâtre: Diarrhées des enfants scrofuleux, ou bien pendant la dentition; Diarrhée des individus phthisiques; Disposition chronique à avoir plusieurs selles par jour; Affections vermineuses; Souffrances hémorrhoïdales, et suites fâcheuses de la suppression du flux hémorrhoidal; Catarrhe de la vessie; Hématurie?; Polype de la vessie; Calculs urinaires, Faiblesse des fonctions genitales, dysménorrhée et aménorrhée des personnes pléthoriques; Flueurs blanches; Metrorrhagie; Chlorose, Stérihté; Abortus: Tranchées trop prolongées, apres l'accouchement; Faiblesse, chute des cheveux et autres souffrances des femmes en couches; Odontalgie des femmes enceintes; Fievre de lait; Excoriation des mamelles; Galactorrhee ou agalactie; Ophthalmie, faiblesse musculaire, et aigreur des nourrissons; Laryngite chronique avec ulceration, Catarrhe chronique et blennorrhée des poumons; Symptômes phthisiques (phthisie tuberculeuse); Déviation de la colonne vertébrale; Coxalgie; Luxation spontanée; Goutte aux mains et aux piede, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. -* Crampes et contractions des mem-





bres, surtout des doigts et des orteils. — Douleurs de luxation. Douleurs pulsatives. — *Lancinations et douleurs tractives dans les membres, principalement la nuit ou en été et au changement du temps. — Accès de torpeur et phlissement de quelques parties du corps qui paraissent comme mortes. — Grande **facilité à se donner** des tours de reins, qui souvent sont suivis de manx de gorge ou de roidenr et gonflement de la nuque avec mal à la tête. — Engourdissement facile des membres. — Bouillonnement de sang, principalement*ches les individus pléthoriques*. et souvent avec congestion à la tête et à la poitrine. — Tremail-lements dans différents membres. — *Convulsions épileptiques, parfois la nuit, avec cris. — Tétanos partiel, précédé d'une espèce d'aura tetanica. - *Les symptômes s'aggravent ou se renouvellent par le travail dans l'eau, ainsi que le soir, la nuit, le matin, après le repas et tous les deux jours.—Souffrances périodiques et intermittentes. — *Grande agitation qui force à se mouvoir constamment et à beaucoup marcher. — Tremblement fréquent de tout le corps, augmenté au grand air. — *Douleur de meurtrissure aux bras et aux jambes, ainsi qu'aux reins, surtout en se remuant et en montant un escalier. — Malaise général le soir, comme avant-coureur d'un accès de fièvre intermittente. — *Manque de force, abattement, principalement le matin de bonne heure. — Fatigue et faiblesse nerveuses, souvent avec pâleur du visage, battement de cœur, vertige, frissons, maux de reins, etc. - Evanouissement, surtout le soir, arec obscurcissement des yeux, sueur au visage et froid au corps. — *Grande fatigue après avoir parlé ou après une marche modérée au grand air, ainsi qu'après le moindre effort, et souvent avec transpiration facile et abondante. — Vif désir de se faire magnétiser. - Abattement excessif, quelquefois avec violents accès de rires spasmodiques. — Bouffissure du corps et du visage avec ventre gros chez les enfants. - Amaigrissement, quoiqu'on mange de bon appétit. — Grand embonpoint et forte obésité. — *Disposition à se refroidir et grande sensibilité à Pair froid et humide. — En se promenant au grand air, tristesse avec pleurs, mal à la tête, ballonnement du ventre, battements de cœur, sueur, grande fatigue et beaucoup d'autres souffrances.

Pean. — Frémissement visible de la peau depuis les pieds jusqu'à la tête, suivi d'étourdissement. — Démangeaison brûlante, mordicante. — Éphélides. — Éruption urticaire, le plus souvent disparaissant à l'air frais. — Éruption de taches lenticulaires, rouges et élevées, avec forte chaleur, beaucoup de soif et manque d'appétit. — Peau chaude et sèche pendant le mouvement. — •Peau du corps rude, *sèche et comme couverte d'une espèce de miliaire.—•Enduit furfuracé de la peau.— Éruptions et dartres humides, croûteuses, ou en forme de grappes avec douleurs de



velu. — Sensibilité douloureuse de la racine des cheveux. — Chute des cheveux. — *Tumeurs au cuir chevelu equi entrent

en suppuration.

168


Yeux. - *Pression dans les yeux. - *Prurit et élancements dans les yeux. - *Cuisson, brûlement et douleurs incisives dans les yeux et les paupières, surtont en lisant le jour ou à la lumière des bougues. Sensation de froid dans les yeux. - Yeur enflammés avec rougeur de la sclérotique et secrétion abondante de mucosités. — Ulcères, taches et obscurcissement de la cornée. - *Cornée trouble et bleuâtre. - Suintement de sang par les yeur. - Inflammation et gonflement des angles des yeur. -Fistule lacrymale, suppurante. - Les year pleurent, surtout au grand air ou de bon matin. - *Frémissement des paupières. -*Gonflement rouge et épais des paupières, avec sécrétion abondante de chassie et agglutination nocturne — Occlusion des paupières le matin -*Pupilles fortement dilatées. *Trouble de la rue, comme s'il y avait un brouillard, un voile ou du duvet devant les yeux, principalement en lisant ou en fixant attentivement un objet. Obscurcissement de la vue en lisant ou après le repas — En lisant, on voit un point noir qui semble accompagner les caractères. - *Grande photophobie et éblouissement par une lumière trop vive. — *Presbyopie.

Oreilles. Elancements dans le oreilles. *Pulsation, battements et chaleur dans les oreilles. — Inflammation et gonflement de l'oreille interne et externe. • Ecoulement purulent par les oreilles. — Éruption humide sur et derrière les oreilles. — •Polype aux oreilles. *Bruissement, bourdonnement, tintement ou roulement, quelquefois alternant avec musique dans les oreilles. — *Craquement et odétonation dans les oreilles en avalant et en mâchant. — Accès de sensation d'occlusion de l'oreille et de dureté de l'ouïe. — *Gonflement inflammatoire

des parotides.

Nes. — Inflammation du nez avec rougeur et enflure, principalement au bout. — *Narines ulcérées et croûteuses. — Epistaxis, principalement le matin et la nuit, et quelquesois jusqu'à la défaillance. — *Odeur sétide du nez. — *Odorat émoussé ou excessivement sensible. — *Sécheresse pénible dans le nez. — *Obturation du nez par un pus jaunaire et sétide. *Coryza sec, même le matin, avec éternument frequent. Coryza fluent excessis. — Coryza alternant avec tranchées. — Odeur sétide devant le nez comme du sumier, des œuss pourris ou de la poudre à canon.

Visage. — Couleur jaune de la face. — *Face pâle, creuse, avec yeux enfoncés et cernés. — Plaques rouges sur les joues. — Chaleur, rougeur et bouffissure de la face. — Érysipèle à la joue. — Ephélides sur les joues. *Prunt et éruption au visage, principalement au front, aux joues et dans la région des favoris,



169

quelquefois humide et croûteuse, avec chaleur brûlante. —
Croûte de lait. — Douleurs aigués dans la face et les os de la face. — Gouslement de la face sans chaleur. — Éruptions et croûtes aux lèvres et autour de la bouche. — Lèvres gercées. —
Tonsiement de la lèvre supérieure. — Commissures des lèvres ulcérées. — Accès de torpeur et de phlissement des lèvres qui paraissent comme mortes. — *Gonstement douloureux des

glandes sous-maxillaires.

Dents. — "Manx de dents aggravés ou excités par le courant d'air, ou par l'air froid, ou en prenant quelque chose de chaud ou de froid, ou par le bruit, ou bien pendant et après les règles; les douleurs sont pour la plupart lancinantes, térébrantes, contractives, pulsatives, ou rongeantes et fouillantes avec sensation d'excoriation. — Maux de dents la nuit, comme par congestion de mng. — Sensation d'allongement et de vacillement des dents. — Odeur fétide des dents. — *Sensibilité douloureuse des gencives avec élancements. — Saignement facile et gonflement des gencives, avec battements et pulsations. — Ulcère fistuleux aux gencives de la mâchoire inférieure.

chement continuel d'une salive acide. — Vésicules dans la bouche et sur la langue. — Contraction crampoïde de la bouche. — **Sécheresse de la langue et de la bouche, principalement la nuit et le matin au réveil. — Gonflement de la langue, quelquefois d'un seul côté. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Brûlement et douleur d'excoriation sur la langue et dans la bouche. — Langue difficile à remuer, avec parole embarrassée

et indistincte. - *Grenouillette sous la langue.

Gerge. — Mans de gorge, comme par un tampon ou un gonfiement dans le gorier. — Constriction dans la gorge et rétrécissement crampoide du gosier. — Excoriation du gosier avec douleur lancinante, et pression en avalant. — Gonfiement inflammatoire du gosier et de la luette, qui sont d'un rouge foncé et couverts de vésicules. — Gonfiement des amygdales, avec sensation de rétrécissement de la gorge en avalant. — Mal à la gorge après s'être

donné un tour de reins. - *Renaclement de mucosités.

on aigre on métallique, surtont le matin. — Insipidité ou goût fade ou aigre des aliments. — Soif ardente ou continuelle, surtout pour les boissons froides, et souvent avec absence totale d'appétit. — *Faim peu après avoir mangé. — Boulimie, généralement le matin. — Dégoût prolongé pour la viande et les aliments chauds. — *Répugnance pour la fumée du tabac; désir de choses salées, de vin et de friandises. —Faiblesse de la digestion. — Après avoir pris du lait, nausées ou régurgitations acides. — Après le repas, chaleur ou ballonnement du ventre, avec nausées ou mal à la tête, au ventre et à l'estomac, ou bien



170

renvois et econlement d'eau comme des pituites, ou abattement et envie de dormir. — Renvois avec gout des uliments ingérés, ou amers, ou acides.

Estomac. - Pyrosis après chaque repas, et renvois bruyants et continus. Régurgitation de matières aigres. - Nausées fréquentes, surtout le maten, le soir, ou la nuit, quelqueseis avec horripilation, obscurcissement de la vue et defaillance. Vomissements acides. - * l'omissement des aliments, ou de mucosites amères, souvent avec tranchees et douleurs crampoïdes dans le ventre. - Vomissement neir, ou de sang. - *Ecoulement pitulteux de l'estomac, parfois après le repas. - Les vomissements se manifestent principal ment le matin, la nuit ou après le repas *Douleur pressive ou pincements à l'estomac, ou douleurs crampoides et contractiv s, principal ment après le repas, et souvent avec vomissement des aliments. - Crampes d'estomac, la nuit. - *Pression à l'estomac même etant a jeun, ou en toussant, ou avec pression aux hypocondres, ou bien encore avec serrement comme par une griffe, en marchant. - Pincements, tranchees et pression noctarne a l'epigastre. Ball innement et gouflement de l'épigastre et de la region de l'estomac, avec sensibinte douloureuse de ces parties au toucher. Douleur d'excoriation et brûlement à l'estomac.

Ventre. Douleurs generalement lancinantes, ou tensives, ou pressives, avec gonflement et induration de la région hepotique. Tiraillement douloureux depuis les hypocondres jusqu'au dos, avec vertige et obscurcissement de la vue. Tension dans les deux hypocondres. - Impossibilité de supporter des rétements serres autour des hypocondres. Tension et Lallonnement du ventre. - Tranchees fréquentes et clancements dans les cotes du ventre, chez les enfants. Coliques avec douleurs crampoides et rongeantes, surtout après midi, et quelquefois avec vomissements des aluments. - *Accès frequents de tranchees, principalement dans l'épigastre. -- *Elancements ou pincements et pression dans le ventie, meme sans diarrhée. - Les maux de ventre se manifestent principalement le matin, le soir on la nuit, zinsi qu'après le repas. Sensation de froid dans le ventre. -Doulear d'excernation et bralement au ventre, "Gonflement et induration des glandes du mésentère. -- *Grosseur et dureté du ventre. *Incarcération de flatuosités. - *Pression des ents vers l'anneau ingumal, comme si une hernie allait s'établir, avec bruit et borborygmes. - Pression douloureuse, tressaillements, tranchées et élancements, ou pesanteur et traction dans les aines. - Gonflement et sensibilité douloureuse des glander ingumales.

Belles. *Constipation. - *Selles tardires, dures, en petite quantité, et souvent avec matieres non digerees. - Envie inutile d'ailer a la selle, quelquefois avec douleur. -- Selles difficiles, et





seulement tous les deux jours. - Relachement du rentre, fréquent ou continuel : deux selles par jour - Selles comme de l'argile, peu abondantes et neucuses on séreuses, ou en forme de bouillie - Selles blanches, quelquefois avec stries de sang et douleurs hépatiques au toucher et en respirant. Diarrhée pendant la dentition. - Selles involontaires et écumeuses - Diarrhée d'odeur aigre, ou setide et jaunatre chez les enfants. -Sortie d'ascardes et de ténia. - Chute du rectum pendant les selles. Avant la selle, grande irascibilité, - Apres la selle, abattement et courbature des membres. Ecoulement du sang par l'anus pendant et hors le temps des selles. — Gonflement et *sortie fréquente des boutons hémorrhoidaux, surtout pendant les selles, avec deuleur brûlante. - Crampes, ténesme et contraction du rectum. - Brulement au rectum et à l'anus, avec démangeaison et ofourmillement. - Eruption brûlante, en forme de grappe, à l'anus - Excoriation à l'anns, entre les fesses et les cuisses. - Chute du rectum, avec douleur brûlante.

Urines. - Ténesme de la vessie. - Emission d'urine trop fréquente, même la nuit. - Pissement au lit - Urines foncées sans dépôt - Urine couleur rouge de sang, ou rouge brunâtre, d'une odeur âcre, mordicante, fetide, avec sédiment blanc et farineux. - Presement de sang. - Ée ulement de sang par l'urêthre.

Sortie als adante de mucosités avec les urines. - Polype de la vessie. *Brûlement dans l'urêthre, pendant et hors le temps

de l'emission des urines.

Parties viriles. Inflammation du prépuce, avec rougeur et douleur brûlante. Pression et douleur de mourtrissure dans les
testicules. *Faiblesse des fonctions génitales, et absence de
l'appetit vénérien. *Exaltation de l'appétit vénérien, avec
idees voluptueuses et lasences — Manque ou *trop grande fréquence de pollutions. *Erection de trop courte durée, et émission de sperme trop tardive et trop faible, pendant le coit. —
*Lancinations et brûlement dans les parties genitales pendant
l'émisse in du sperme dans le coît — Après le coît, embarras de la
tête et faiblesse. Écoulement de la liqueur prostatique après

les selles et l'emission des urines.

Règles. *Regles trop hâtives et trop abondantes. Avant les regles, seins gentles et douloureur, fatigue, mal à la tête, disposition à s'effrayer, coliques et frissons. *Pendant les regles, congestion à la tête, avec chalcur au dedans, ou tranchées dans le ventre et douleurs crampoides dans les reins, ou bien vertiges, mans de tête, mans de dents, nausées, e le pres et autres incommodités. *Avortement. — Sensation voluptueuse dans les parties génitales, avec ejaculation. — *Econlement le sang hors le temps des regles. *Metrorrhagie. Elancement, à l'orifice de la matrice, et douleur pressive dans le vagin. — Chute de la matrice avec pression sur les parties. — Polype de la matrice.



- *Démangeaison à la vulve. — Inflammation et gonflement de la vulve, avec rougeur, écoulement purulent et douleur brûlante. — «Varices aux grandes levres. — «Leucorrhée avant les règles. — *Leucorrhée avec démangeaison brûlante, ou bien comme du lait, coulant par accès et pendant l'émission des urines. — Douleur d'exceriation et d'ulceration aux mamelons. — Gonflement inflammatoire des mamelles et des mamelons. — Gonfle-

ment des glandes du sein.

172

Larynx. •Cleération du larynx. — Sécheresse du larynx. —

*Enrouement frequent ou de longue durée. — *Accumulation
abondante de mucosités dans le larynx et les bronches. — Toux
sans expectoration, excitee par un chatouillement dans la gorge
et souvent accompagnée de vomissement. — *Toux courte le
jour, comme par du duret dans la gorge. — Toux provoquée en
jouant du piano ou en mangeant — *Toux le soir, au lit, ou la
nuit, pendant le sommeil, ou le matin, et généralement violente
*et sèche, quelquefois même spasmodique. — Toux, avec expectoration de mucosites épaisses ou jaunâtres et fétides, généralement la nuit ou le matin. — *Expectoration de matières purulentes en toussant. — *Toux avec expectoration de sang,
douleur d'exceriation dans la poitrine, vertiges et marche mal
assurée. — *En toussant, pression à l'estomac, élancements et
secousses dans la tête, ou douleurs dans la poitrine.

Poitrine. Etouffcment en se baissant, en se promenant au vent et en se conchant. — *Besoin de respirer profondément. — Sensation comme si la respiration était arrêtée entre les omoplates. - *Oppression de la poitrine, comme par congestion de sang, avec tension, ou soulagée en rapprochant les omoplates. — Respiration sibilante. - *Haleme courte, principalement en montant. Oppression anxieuse de la poitrine, comme si elle était trop étroite et ne pouvait assez se dilater. - *Grande gêne de la respiration. - Sensation de fatigue dans la poitrine après avoir parlé. - Anxiété dans la postrine. - Pression sur la poitrine. - *Elancements dans la postrine et les côtés, surtout pendant le mouvement, en respirant profondément et en se couchant sur le côté affecté. — Coups dans la poitrine Sensibilité et douleur d'excoriation dans la postrine, surtout en inspirant et au toucher. — *Brûlement dans la poitrine. — *Buttements de cœur, même la nuit, ou après le repas, quelquefois avec anxieté et mouvements tremblants du cœur. — Elancements, pression et contraction dans la région du cœur. — Elancements picotants dans les muscles de la pertrine.

Tronc. *Douleurs de luxation aux reins, au dos et à la nuque, comme après s'être donne un tour de reins — Douleurs lancinantes dans les reins, le dos et les omoplates. — Douleurs nocturnes dans le dos. — Douleurs dans la region des reins en allant en voiture. — Traction entre les omoplates, et douleur pressive




CALCAREA PHOSPHORICA.

174

sant quelques gouttes d'acide phosphorique dans de l'eau de chaux, jusqu'à formation d'un dépôt qui ensuite à été lavé, desséché et trituré. Ceux qui veulent se baser sur les symptômes suivants doivent se procurer le médicament préparé de la même manière.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - En se promenant au grand air, pendant un temps venteux, vertiges et traction dans la nuque. -*Souffrances rhumatismales de toute nature. — Douleurs à diverses parties du corps, traversant les muscles jusque dans les articulations. - Les reins, les genour et les pouces sont attaqués de préference. - Sommeil le soir, de bonne heure, avec réveil fréquent la nuit. - Insomnie jusqu'à 2 et 3 heures après minuit. - Reveil de bonne heure avec érections. Rêres de royages. -Rêves fréquents, quelquefois avec réflexions, rêves de périls et d'incendies. - Horripilation passagere, fréquente. - Veines enflées. — La chaleur de l'appartement paraît insupportable. — Prurit brûlant par tout le corps. — Après un bain froid dans le fleuve, corps tout rouge, comme une écrevisse, avec prurit et brûlement, comme par des orties. - Formication par tout le corps. - Olicères. - Carie. Sentimentalité qui fait qu'on est facilement ému. - Mauvaise humeur et éloignement pour le travail. - Violence avec disposition à faire des reproches. - Irascible, prompt à la colère et s'indignant facilement en entendant parler des torts que d'antres ont commis. Grande violence à la moindre contradiction. - Une nouvelle facheuse fait qu'en est tout à fait hors de soi-même. Mauvaise humeur, répugnance pour la conversation et besoin de rester tranquille après une nouvelle fächeuse.

Vertiges avec nausées. - Mal à la tête avec Tête. - Gorge. flatuosités dans le ventre. - Tête entreprise, lourde et douloureuse le matin au réveil. Sensation douloureuse de plénitude à la tête, comme si le cerveau était pressé contre le crâne, augmentée par le mouvement et le changement de position, soulagée en restant couché tranquillement. — Pendant les maux de tête, face et tête chaudes, avec paresse et mauvaise humeur. - Les maux de tête s'aggravent au grand air, ou lorsqu'on se baisse. --Prurit au cuir chevelu, tous les soirs. — Plus myope qu'autrefois, avec trouble de la vue par de petites taches rondes, grisatres. -Prurit aux yeux, comme s'il y avait du sable ou un poil dedans. - Your très-affectés, quand on calcule ou écrit à la lumière des bougies. - Douleur dans l'œil, comme à la suite d'un coup. -Couperose au visage; boutons rouges, remplis d'un pus jaunâtre, avec douleurs lancinantes au toucher. - Douleur dans les yeux et dans le nez, comme s'il s'y était introduit un corps étranger. -Accumulation de croutes jaunes, sèches, dans le nez. - Coryza fluent dans la chambre froide, obturation du nez au grand air. --



CALCARRA PHOSPHORICA.

175

Coryna fipent violent, avec excoriation des narines. — Petit ulcère à la cloison du nex, avec douleur d'excoriation. — Éternument fréquent, avec écoulement de mucosités par le nex, et salivation. — Mouchement de sang. — Sensation dans une dent cariée, comme s'il y était entré quelque chose, avec sensibilité douloureuse au contact de la langue. — Accumulation d'une salive acide dans la bouche — Sensation de contraction dans la gorge. — Mal à la gorge, le matin au réveil, aggravé en avalant. — Langue chargée d'un enduit blonc, surtout le matin, avec crevasses, comme des gerçures, et goût fade après avoir mangé des glaces. — Contraction dans le côté gauche de la bouche et des gencives, comme par quelque chose de dur, ou comme si un souffle frais sortait des dents cariées. — Douleur d'excoriation dans la gorge, avec engorgement de l'amygdale droite, amélioré en la mouillant avec des fruits. — Forte accumulation de glaires dans la gorge,

avec renaclement fréquent et douleur d'excoriation.

stemac. — Urines. — Après avoir mangé des glaces, coliques autour du nombril, et langue blanche et gercée. — Fort désir de café et de vin. — Nausées avec vertiges, embarras de la tête, et confusion des idées. — Après avoir pris du café, nausées, pyrosis, tête entreprise et douloureuse, et manvaise humeur excessive. — **Douleurs aiguës** dans l'estomac, avec grande faiblesse, mal à la tête et diarrhée; le moindre morceau qu'on mange renouvelle les douleum d'estomac. — Avant le repas, crampe violente à l'estomac, comme après avoir mangé quelque chose de dur, avec senmation de fadeur et de mal au cœur. — Coliques violentes avec ballonnement du ventre, et forte accumulation de flatuosités, ou avec mal à la tête. — Tranchées autour du nombril, comme une colique flatulente, se renouvelant après avoir bu de l'eau froide. – Sortie difficile de vents sans soulagement. — *Selles avec flutuosités abondantes. — Diarrhée avec évacuation de matières purulentes. — Diarrhée très-fétide. — Selles molles, mêlées de sang noirâtre. — Muçosités couleur jaune de safran, sortant après une selle jaune clair, mais bien moulée. — Sortie des hémorrholdes, avec battement et douleur d'excoriation. — Emission fréquentes d'urines abondantes, avec lassitude et fatigue. - · Urines foncées et quelquefois chaudes. — Besoin d'uriner la nuit, suivi, le matin, d'un mauvais goût à la bouche. — Elancements dans l'urèthre, hors le temps de l'émission des urines. — Jet des urines éparpillé, avec douleur incisive en urinant. — Orifice de l'urèthre comme collé et enflammé, avec émission nouvelle d'un jet, après avoir uriné. — Envie fréquente d'uriner, avec arrièreémission d'une partie des urines. - Le soir, après s'être couché, besoin fréquent d'uriner. — Après l'évacuation des selles et des urines, les parties génitales sont comme fatiguées. — Le matin, exaltation de l'appétit vénérien, avec jouissance extraordinaire dans le cost. - Petits boutons au acrotum, avec douleur d'exco-



176 CALCAREA PHOSPHORICA. - CAMPHORA.

riation en y touchant. - Fortes érections en allant en voiture. -

Après le coît, faiblesse dans les jambes.

Poitrine. — Membres. — Respiration profonde, suspiriouse, — Craquement dans le sternum. Douleur dans les reins au moindre effort corporel, quel juefois tellement violente qu'elle force à crier. — *Douleurs rhumatismales à l'epante et au bras (gauche), parfois avec gonfiement de la partie malade, et chaleur fébrile. — Endolorissement, torpeur et *paralysie du bras (gauche). — Paralysie des articulations de la main et des doigts. — Douleurs dans les articulations des mains et des doigts, surtout aux pouces, equelquefois par refroidissement. — Douleurs riolentes aux genoux, aux hanches et aux reins, aggravees par le mouvement et surtout par la marche. — Douleurs ostéoropes dans les bras et les jambes. — Tension dans le jarret, comme si les tendons étaient trop courts en étendant la jambe, et améliorce en marchant. — Engourdissement facile des musles de la fesse, avec inquiétude dans les jambes, forçant à les remuer constamment.

CAMPHORA.


CAMPH. — Camphre. — HABNEMANN. — Hist. nat et prép. Pharm. homosop., p. 181. — Doses natides : 0, 6, 12. — Durée d'action : souvent quelques minutes seutement

Antidores: Op. ditr spir.
Companer Avec: Canth. cham. cocc. hyos. kal. laur. op. puls. rhus. stram.
veratr.

CLINIQUE. — On n'a encore employé ce médicament que contre pen de maladies, telles que le Choléra, la Gruppe, quelques cas d'Épilepsie, des affections hydropiques, des Frères typhoïdes (après rhus), des Enc(phalites (par un coup de soleil?), et comme antidote palliatif de plusieurs substances vegetales. Contre les effets toxiques de l'opnum, du cocculus, des contharides et du muse, ainsi que contre les effets du spongia, il paraît avoir une vertu spécifique. — Les effets du nitre paraissent augmenter par l'emploi du camphre. On a encore conseillé le camphre contre les Crampes de postrine causées par les eupeurs de l'arsenie et celles du cuirre, ainsi que contre quelques espèces de Pneumonies par refroidissement, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. *Conrulsions et crampes de différente nature. — *Tétanos, avoc perte de connaissance et vomis-



CAMPHORA.

177

bouffie, mouvements convulsifs des membres et même de la langue, des yeux et des muscles de la face, transpiration chaude et visqueuse au cuix chevelu et au front : après l'accès, somnolence comateuse. — Malaise, relichement et lourdeur dans tout le corps. — Affaissement de toutes les forces. — Accès d'évanouissement. — Craquement dans les articulations. — Lancinations rhumatismales dans les muscles. — Difficulté à remuer les membres. — Sensibilité douloureuse du périoste de tous les os. — Souffrances par suite d'un refroidissement. — La plupart des symptômes apparaissent pendant le mouvement, ou bien la nuit, et sont aggravés par le froid, le grand air, et le contact. — Souvent les symptômes disparaissent dès qu'on y porte son attention. — Grande horreur du grand air, avec besoin de se vêtir trèschaudement.

Pean. — Peau douloureusement sensible, même au plus léger contact. — Inflammations érysipélateuses. — *Peau bleuatre et

froide, avec froid du corps. — Sécheresse de la peau.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour. — Somnolence comateuse, avec paroles incohérentes. — *Insomnie nocturne par surexcitation nerveuse. — Ronflement et jactation pendant le

sommeil. — Rêves anxieux, pleins de jalousie.

Fièvre. — Sensibilité excessive à l'air frais, et facilité à se froidir. — *Froid de tout le corps, avec pâleur mortelle du visage, frissons et claquements de dents. — Chaleur du corps, avec rougeur du visage, surtout aux joues et au lobe de l'oreille. — Chaleur universelle, qui devient excessive en marchant. — *Pouls remarquablement petit et lent, ou excessivement accéléré et plein. — Sensation de sécheresse de toute la peau du corps. — Le sang ne se porte que difficilement aux parties éloignées du cœur.

Meral. — Anxiété, avec humeur pleureuse. — Humeur querelleuse et contrariante. — Émoussement des sens. — Perte de connaissance. — Délires. — Fureur. — Perte de la mémoire. — Pensées jalouses. — Découragement désespéré. — Grande précipita-

tion

Têto. — Étourdissement comme par l'irresse, surtout en marchant. — *Vertige et pesanteur de la tête qui oblige à la pencher en arrière. — Mal de tête, comme si le cerveau était meurtri et en plaie. — Mal de tête sourd, au-dessus de l'os frontal, avec envie de vomir. — Mal de tête constrictif, surtout à l'occiput et au-dessus de la racine du nez, fortement aggravé en se baissant, étant couché ou par le toucher, et se dissipant dès que l'on pense à son mal. Coups incisifs dans la tête après s'être couché. — Douleur térébrante dans les tempes. — Mal de tête pulsatif la nuit, avec élancement dans le front et chaleur du corps. — Congestion à la tête. — Inflammation du cerreau. — Spasmes qui tirent la tête de côté ou en arrière.



CAMPHORA.

178

Yenz. — Inflammation des yenz. — Taches rouges aux panpières.

Tremblement des paupières. Yeux hagards et convulsés en haut ou enfoncés. — Retrécissement des papilles. — Ol seurcissement de la vue. — Visions d'ébjets étranges — Photophobie. — Tout paraît trop éclairé et trop brillant — Les lettres se confondent en lisant; puis, cercle lumineux devant les veux.

Oreilles. - Chaleur et rougeur des oreilles, surtout aux lobes. Abrès dans le conduit auditif, rouge foncé et avec douleur pres-

sive lancinante.

Visage. — Face de pâleur mortelle ou rouge foncé Erysipèle à la face. — Distersion convulsive des traits. — Serrement convulsit des mâchoures. — «Face froide et blevitre.

vulsif des mâchoires. — Face froide et bleuatre.

sous-maxillaires, avec sensation d'allorgement des dents.

Coups aigus dans les racines des dents incisives. Vacillement douloureux des dents. — Maux de dents continuels, remuants et térebrants dans les molaires, et aggravés par le vin et le café, l'eau froide et l'air libre — Les maux de dents cessent pendant le coît. — En s'exposant pendant les maux de dents au grand air, un élancement passe des dents à l'œil.

Bouche Halane fetide le matin. - Ecume à la bouche. - Accumulation abondante d'une salive visqueuse et muqueuse.

Gorge. — Mal de gorge en avalant, comme par excerittion de la gorge, se faisant sentir même la nuit. — Chaleur brûlante dans la gorge, depuis le palais jusqu'à l'estomac — Saveur plus pronocce de tous les aliments, et surtout du bouillon. — Ameriume du tabac et des aliments, principalement de la viande. — Dégoût et répugnance peur la fumée du tabac. — Soif excessive.

Estomac. Envies de vomir, suivies d'accès de vertige. — Vomissements de bile ou de sang. — Au debut des vomissements,
sueur froide, principalement au visage. — Sensation de brûlute
et chaleur a l'estomac. Douleur de meurtrissure à l'épigastre.

- «Forte pression à l'epigastre. — «Vomissements matutinaux
de mucosités aigres. — «Grande sensibilité du creux de l'estomac

nu toucher.

Ventre. — Crampes dans le ventre. — Douleur tractive de meurtrissure dans tout le côté droit du ventre. — Sensation de plénitude dans l'bas-ventre. — Sensation de froid ou chaleur brûlante à l'épagastre et au lagere tre

lante à l'épigastre et au bas-vertre.

Selles. Constipution. - Selles difficiles, comme par inactivité des intestins, en par rétrécissement du rectum. - Selles noi-

ratres.

Urines. — Rétention des urines. — Urines coulant lentement et par un jet minee. — Urine d'un vert jaunâtre, trouble et sentant le moisi — Pessement de sang. — Douleur brûlante pendant l'émission des urines. — «Urine épaisse et rouge, avec sédiment trouble et epais. — Tenesme de la cessie avec ischuric convulsive.



CAMPHORA. - CANNABIS SATIVA.

179

Parties viriles. — Absence de l'appent venérien, et impuissance.

Poitrine. — Respiration profonde et lente. — *Oppression de poitrine suffoquante, et construction du larynx, comme par la vapeur du soufre. — Accumulation excessive de mucosites dans les voies aériennes — Crampes de pottrine. — Battements du cœur que l'on part entendre frapper vers les côtes, surtout après le repas. — Tremblement du cœur.

Tranc et Membres. Tensi a et roideur dans la nuque, en remuant le cou. Lancinations tractives entre les omoplates, pendant le monvement des bras. — Mouvements convulsifs des bras, qui decrivent des cercles. — Pression et tiraillement aigu au bras et a l'avant-bras. — Froid glacial des mains. — Douleurs de brasen at aux cuisses et aux genoux. — Douleurs crampoides et tiraillements aigus dans les jambes et le cou-de-pied. — *Crampes aux mollets — Tiraillement aigu a l'extremite des orteils et sous les ongles, en marchant. — Grande faiblesse des jambes.

CANNABIS SATIVA.

CANN. — Chanves cultivé. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharm. homorop., p. 183. — Dones usitées. 0, 3, 12, 30. — Durée d'action : 2, 3 pours dans des maladies aigués, 2, 3 somances dans quelques cas de maladies cur miques.

COMPARER AVEC . Arn. bey. canth. nex-yom. op. petrol. puts. stann.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra e meulter ce medicament contre : — Souffrances hysteriquest; Convulsions?; Souffrances a la suite de fatigue et d'efforts physiquest; Mamo et autres affections morales?; Ophthalimes scrofulcuscs!, Cataracte; Obscurcissem ut et taches de la cornec; Affections gastriques et bib uses?, Castralgie?; Induration du foic; Coliques, Aseite enkystee!, Constipation opiniàtre; Cystite, nephrite, dysurie, hematurie et autres affections des coies urinaires; Calculs urinaires. Gonorrhée aigue; Flucurs blanches?, Steribte; Avortement; Affections catarrhales des voies aériennes, Pincumonie; Soudirances asthmatiques; Cardite, etc., etc. Voy. la note, page 15.

EYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs tractives aigués et contractives pressives, arcc sensation de paralysie, ou coups et élancements profonds à diverses parties, ou bien sensation comme si ou ctant pruce avec les doigts. — Tiraillement rhumatismal pen-



CANNABIS SATIVA.

dant le mouvement, comme si c'etait dans le périoste. — Abattement général avec chancellement et endolorissement des genoux. — Grande fatigue pour avoir parlé ou écrit. Tétanos, principalement des membres superieurs et du tronc. Plusieurs symptômes sont aggraves ou provoqués par le toucher, le grand

air et la chaleur, ainsi que la nuit et apres minuit.

Peau. Brûlement violent sur toute la peau, surtout aux pieds, aux mains, au ventre, puis prurit qui force à se gratter toute la nuit.

Sommeil — Envie invincible de dormir le jour. - Le matin, en se réveillant, on est plus fatigue que le soir avant de se coucher. — Insomme la nuit. — Grande auxiété de cœur, la nuit, avec picotement et seusation de brûlure par toute la peau, comme par de l'eau bouillante. - La nuit, forte chaleur, et sueur.

Fièvre. — Horripilation et frissonnement avec soif. — Froid extérieur et malaise. — Froid du corps avec chaleur au visage. — Pouls lent et à peine sensible. — Chaleur brûlante de tout le

corps, la nuit.

180


Moral. — Tristesse et indifférence. — On est fortement blessé par le moindre mot. — Disposition a s'effrayer facilement. — Mame, tantêt gaie, tantêt sérieuse ou furieuse. — Irrésolution et incertitude à cause d'une imagination très-mobile. — Le soir et le matin les pensées se confondent, au point de ne savoir plus soimème ce qui est vrai et ce qui n'est que fictif. — Grande distraction au point de ne plus savoir ce que l'on fait. On se trompe souvent en écrivant. — Les idées se perdent. — Les mots manquent.

Tête. — Accès de vertige en marchant et en se tenant debout, allant jusqu'à faire tomber de côté — Tournoiement continuel de la tête, comme si elle remuait constamment. — Bouillonnement dans la tête en écrivant. — Mal de tête comme s'il y avait une pierre qui pressat dessus. — Pression et tension dans les tempes. — Compression dans le sinciput, depuis les bords de l'orbite jusqu'aux tempes — Congestion à la tête avec battement au cerreuu, joues rouges et chaudes. — Sensation au cuir chevelu, comme de quelque chose qui y manquât, et sensation fréquente comme des gouttes d'eau froide tombant sur la tête. — Boutons douloureux au cuir chevelu, à la nuque et derrière les oreilles, avec douleur aux yeux et mal à la gorge.

Yeux. — Douleur pressive aux globes des yeux. — Pression sur les paupières, avec difficulté de les lever — Tiraillement crampoide dans les yeux, — Faiblesse et trouble de la vue pour les objets, soit eloignés, soit rapprochés. — *Taches et obscureissement de la cornée — Vision comme d'un cercle dentelé de flammes blanchâtres. — Points lumineux et zigzags verticaux

devant les yeur.

Oreilles. - Battement et pression dans les oreilles. - Bruissement



CANNABIS SATIVA.

181

dans les creilles, et sensation comme s'il y avait une peau devant.

— Boutons enflammés et gouflement purulent dans l'oreille.

Hon. — Gonflement du nes avec rougeur cuivrée. — Chalcur et additions du nes. — Épistaxis précédés d'une sensation de chalcur dans le nes.

Vinage. — Paleur de la face. — Rougeur de la jone gauche, avec paleur de l'autre pendant le mal aux dents. — Fourmillement, démangeaison et cuisson au visage, comme par du sel. — Palpitation des muscles de la face. — Chaleur de la face et rougeur des joues. — Gencives d'une dent cariée, gonflées, enflammées et douloureuses. — Dents émoussées.

Bouche. — Sécheresse de la bouche avec salive visqueuse et absence de soif. — Parole embarrassée; tantôt ce sont les mots qui manquent, tantôt c'est la voix. — En parlant, forte anxiété produite par des douleurs au dos. — Mal à la gorge, a vec élancement aux oreilles. — Douleurs d'excoriation à la gorge, avec sensation de sécheresse.

Estemac. — Renvois à vide. — Régurgitation de matières deres et d'une aigreur amère. — Nausées avec appétence pour les aliments. — Vomiturition avec strangulation depuis l'épigastre jusqu'à la gorge. — Vomissement de bile verte. — Vomissement de muco-sités aigres, après avoir pris du café. — Appétit augmenté le soir. — Le matin, au lit, envie de vomir, surtout étant couché sur le côté droit. — Le mal de cœur interrompt le sommeil. — Pyrosis. — An toucher douleur à l'estomac, comme s'il était ulcéré. — Accès de violentes crampes d'estomac, avec pâleur et sueur du visage, pouls presque éteint et respiration râlante. — Pression, pincements et tranchées à l'épigastre et au-dessus de l'estomac.

Ventre. — Douleur de meurtrissure dans les intestins. — Gonfiement dur et douloureux de la région hépatique. — Douleurs cramposdes dans l'épigastre. — Pulsation dans le ventre comme du dedans au dehors. — Secousses douloureuses dans le ventre, comme s'il renfermait quelque objet vivant. — Ébranlement des intestins, comme s'ils étaient détachés, lorsqu'on remue les bras. — Tuméfaction partielle du ventre, comme par une ascite enhystée.

— Coups et pression vers le dehors, dans la région des aines. —

Maux de ventre améliorés en buvant de l'eau froide.

Selles. — Diarrhée accompagnée de manz de ventre crampoïdes. — Pression vers le dehors dans le rectum. — Sensation comme d'un suintement d'eau froide par l'anus. — *Constipation et selles dures. — Selles molles avec ténesme et beaucoup de vents. — Selles liquides, jaunâtres, sortant comme s'il n'allait sortir qu'un vent.

Urines. — Envie pressante d'uriner avec douleur pressive. —
*Difficulté d'uriner comme par paralysie de la vessie, et strangurie nocturne. — «Rétention d'urine opiniatre. — Obturation des voies urinaires par des mucosités et du pus. — Urine trouble, blanche ou rougeatre et comme mêlée de sang on de pus. — Incontinence



CANNABIS SATIVA.

d'urine. — *Jet d'urine éparpillé. «Émission goutte à goutte d'une urine rare et sangumolente — *Douleur brûtante dans l'urèthre et la vessie, avant et pendant l'émission des urines — *Urèthre enfiammé et douloureux au toucher. — *Éconlement jaune et muqueux par l'urethre. «Sortie d'une pierre en urinant.

Parties viriles. — Parties génitales froides. — *Prurit et gonficment inflammatoire du prépuce, du gland et de la verge, avec
rougeur fonces et éphymosis. Pression dans les testicules, et
tension dans le cordon spermatique, en se tenant debout. Gonflement de la prestate. — *Erections avec d'aleurs tensives. —
Répugnance pour le coit, ou forte excitation de l'appêtit venerien,
— Fortes érections après le coît. — Erections saus appêtit venerien. — Sensation d'étranglement dans le testicule droit, avec
gonflement du testicule et du cordon spermatique; le serotum
paraît, à sa partie supérieure, rempli de petites modosités.

Regles. - Ster.lite. Avortement, avec convalsions.

Larynx. — Extinction de la voix Accumulation de inucosités tenaces dans le larynx, avec grattement et gène de la respiration. — Toux violente et sèche. • Toux avec expectoration verdatre

et viequeuse.

188

Poitrine. — Géné de la respiration, comme s'il y avait un poids sur la poitrine, avec sifflement dans les bronches. — Respiration courte et oppressée. — *Respiration difficile, et qui n'est possible qu'en se tenant debeut. — Géne de la respiration, et oppression de poitrine avec inquiétude dans la gorge. — Respiration ralante. — Gêne anxiense de la respiration, avec élancement entre les omoplates. — *Elancements au fond de la poitrine, surtout en respirant, en parlant, ou pendant le mouvement. — *Inflammation des poumons, avec vonussement verdatre et delire. — Coups douloureux dans la region du cour. Gêne douloureuse et tension au cœur, avec bottements de cœur et anxiéte. — Battements de cœur se faisant sentir plus bus qu'à leur place ordinaire. — flammation et prarit du mamel me dez un la mme.

Trono. - Douleurs dans le dos que empéchent de parler et suspendent la respiration - Douleur lancimante entre les omoplates.

Pressun vers le delt irs, dans les reins et le cheevy.

Bras. - Douleurs de meurtressure dans l'epaule et le bras pendant le mouvement : Crampes dans les mains et les donts - Paiblesse paralytique subite de la main, avec tren hiement en saisis-

sant un objet et impossibilité de le teuir solidem nt.

Jambes. — ('rampes dans les cuisses, les mollets et les jarrets.

Faiblesse, chaucell ment et douleurs des genoux — Déboitement de la rotule, en montant un escalier. — Pulsation et l'uleur extensive dans les jueds et les articulations du jued, comme après une marche forcre. — "Un traction spasmodique du tendon d'Achille avec douleurs violentes.

CANTHARIS.

CANTH of all a Condition of the Assertion of the Assertio by July thus 8 to oph one gover

We do

CLINIQUE. mannes et a stres all services. Emerghalite gastrite, hepatite et autre, milananate et localisse, Amygdalite et autres angines I deginonenses?, Acphrite, cystite, urethrite, hematurie et autres affections des voies urinaires; Gonorrhée cordée; Satyrianis? Prinpisme?; Cardites et endocardites rhumatismales; Coralgie; Pièvres intermittentes, etc., etc.

SYMPTOMES GENERAUX - Douleurs brulantes comme par carente de les cavités du corps. - Riancements aigus vers l'interieur, a différentes parties. — Douleurs tractives, arthritiques dans les membres, avec affection des voice urinaires, et Anteliorées par le frottement. — Douleurs violentes, avec gémissements et lamentations. - Sensation de sécheresse dans les articulations. - Manque de flexibilité de tout le corps. - Abattement et faiblesse, avec sensibilité excessive de toutes les parties du corps, tremblement et besoin de se coucher. Prostration des forces, allant jusqu'a la paralysia. Convulsions, tétanos. — Les sonffrances se manifestent principalement au côté droit et s'améliorent dans la position conchee. - Les symptomes se renouvellent tous les sept jours.

Pean, Vésicules pruriantes, avec douleur brûlante au toucher. - Inflammations étysipélateuses. - Douleurs tractives aigués dans les ulceres, avec suppuration plus abondante.

Sommeil. - Forte envie de dormir, surtout après midi, avec baillements et pendiculations. - Insomnie sans cause apparente. -Le nuit, demi-sommeil, avec reveil frequent.

o. - Fierre qui ne se manifeste que par le froid. - Froid et Duscment, avec chair de poule et paleur de la face. - Soif lement après les frissons. - Sueur d'odeur d'urine. - Abattement et humeur pleureuse. - Inquietude anxieuse,



CANTHARIS.

avec agitation qui force a se remuer constamment. — Manque de confiance en soi-même. — Pusillanimité et tunidité. — Disposition à se facher et a se mettre en colère. — Acces de rage, avec cris, coups et abolements, renouveles en se tatant le gosier, et par l'aspect de l'eau. — Dehres. — Vesanie. — Manie, avec actes et

gestes extravagants.

184

Tête. Vertige, avec perte de connaissance et brouillard devant la vue, principalement au grand air. — Maux de tete qui interrompent le somment de nuit. Lancinations pressives dans la tete, qui disparaissent en marchant. Douleurs tractives aigues dans la tete, avec vertige. Congestion a la tete Battement au cerveau et chalcur qui monte a la tete. — Sensation de trûlure a la tête, comme si, en dedans, tout etait à vif et en plaie, avec inflammation du cerveau. Tiraillement, secousses et rongement dans les os de la tête. Maux de tete, comme si on tirait les cheveux. — Herissement des cheveux. — Maux de tete, comme venant de la nuque et voulant sortir par le front.

Yeux. Douleurs aux yeux, avec sensation comme si les paupieres etaient excoriees, principalement lorsqu'on les ouvre. Inflainmation des yeux, avec cuisson brulante. Couleur jaunâtre des

yeux. Les objets semblent etre colorés en jaune.

Oreilles. Inflammation des oreilles, qui sont brulantes.

Nez. Gonflement du nez, même a l'interieur, avec rougeur et chaleur brûlante Odeur fetide et nauséabonde devant le nez. — Coryza de longue duree, et catarrhe, avec fort écoulement de

mneosites visqueuses par le nez.

Visage. Paleur du visage. Face creuse, hippocratique, avec traits qui expriment l'angoisse et le desespoir. — Couleur jaunatre de la face. — Inflammation érysipelateuse et desquamation des joues. — Rougeur brulante et gonflement de la face. — Gonflement d'un seul côte de la face (le côte droit), avec teusion. — Gonflement et inflammation des lèvres — Gerçure et exfoliation des lèvres — Trismus.

Dents. Maux de dents généralement tractifs, aggravés en mangeaut — Fistule aux gencives. - Ulcération des gen-

cives

Bouche. Gout de poix de cèdre dans la bouche. - Inflammation de la membrane muqueuse de la bouche — Inflammation phlegnameuse le l'intérieur de la joue. — Aphthes dans la bouche. — Salivati na ceamouse, avec stries de sang. — Écume a la bouche. — Sang ceagule venant dans la bouche — Gonflement inflammatoire et suppuration de la langue. — Faiblesse des organes de la parole, et parole languissante.

Gorge. - Mal de gorge en avalant - Déglutition difficile, avec etranglement dans la gorge et régurgitation nocturne des aliments. - Déglutition empéchée, surtout pour les liquides. -





Brûlement dans la gorge en avalant. — Inflammation et ulcération des amygdales et de la gorge. - Douleur brûlante dans la gorge, aggravée en buyant de l'eau.

Appétit. Perte du goût. - Goût de poix dans la bouche et la gorge. - Soif par sécheresse des lèvres, avec répugnance pour toutes les boissons. - Manque d'appétit, avec dégoût et répu-

gnance pour toutes sortes d'aliments.

Istomac. Renvois, avec sensation brûlante, comme du pyrosis, aggravée en buvant. Renvois sauglotants qui semblent prendre la direction inverse et retourner vera l'estomac. Vomissement des aliments ingérés. Vomissements de matières bilieuses et muqueuses, ou de saug. Grande sensibilité de la région précordiale. Plénitude pressive, avec anxiété et inquiétude dans l'estomac. Douleurs cuisantes et brûlantes à l'estomac. Infammation de l'estomac.

Ventre. — Inflammation du foie. — Élancements et contraction dans l'hypocondre droit. — Grande sensibilité de l'abdomen au touster. — Douleur brûlante dans le ventre, depuis le gosier jusqu'au rectum. — Douleur brûlante au-dessus du nombril, en toussant, en éternuant, en se mouchant, avec taches jaunâtres à la partie affectée. — Inflammation des intestins. — Gonflement hydropique du ventre. — Incarcération des flatuosités sous les hypocondres.

Belles. — Constipation et selles dures. — Diarrhée avec évacuation de metières écumeuses ou de mucosités verdâtres, avec tranchées après les selles et douleur brûlante au rectum. — Diarrhées dyssentériques, avec évacuation nocturne de mucosités blanchâtres et de morceaux solides comme de fausses membranes, avec stries de

sang. — Selles sanguinolentes.

Urines. — Rétention d'urine avec douleurs crampoldes à la vessie. — *Envie pressante et inutile d'uriner, avec émission douloureuse et goutte à goutte. — *Émission difficile des urines, en jet mince et éparpillé. — Augmentation de la sécrétion des urines. — Urine jaune pâle ou *couleur foncée et rouge. — Écoulement de mucosités sanguinolentes de la vessie. — *Pissement de sang, goutte à goutte. — Urines purulentes. — *Cuisson brûlante en urinant. — *Douleurs incisives dans l'urèthre avant, pendant et après l'émission des urines. — *Douleurs vives, lancinantes et incisives, tiraillements successifs, et pulsations dans les voies urinaires. — *Inflammation et "ulcération des reins, de la vessie et de l'urèthre. —*Grande sensibilité douloureuse de la région de la vessie au toucher.

Parties viriles. — Tiraillements dans le cordon spermatique en urinant. — Inflammation et gangrène des parties génitales. — Gonflement douloureux des testicules. — Appétit vénérien fortement exalté avec érections douloureuses, fréquentes et de longue durée, comme par priapisme. — Éjaculation facile pendant des



CANTHARIS. - CAPSICUM ANNUUM.

caresses amourenses - Spermatorrhée. - Après le coît, douleur brûlante dans l'grèthre.

Règles. Regles trop hàtives et trop fortes, avec sang noir et douleurs pendant l'écoulement — Sortie de môles, de fœtus et du placenta. — *Genflement du col de la settrice. — *Flueurs blanches corrosites, arec sensation brulante en urmant, et excitation de l'appetit venerien. — Inflammation des ovaires.

Laryax. Enrouement, avec renhelement douloureux de mucosités visqueuses, abondantes, venant de la portrine, et avec élancoments inclusifs dans la trachee-artère. Inflammation du laryax.

— Sensation de faiblesse excessive dans les organes de la respiration, en parlant et en respirant profondément. Voix faible,
timide et tremblante.

Poltrine. Respiration difficile et oppressée, par constriction de la gorge et sech resse du nez. Suspension de la respiration, en montant une mentagne, avec calement dans la portrine et nausées.

Elancements dans la poitrine et les cotes. Douleur brulante dans la poitrine, d'où il se detache parfois de petits calilots de parte.

sang. - Battements de ceur

186

Trono et Membres. Douleurs tractives aigués dans le dos. — Sensation de constriction dans la colonne vertebrale. — Emprosthotonos et opisthotonos. Douleurs tractives aigués dans les bras Manque de force dans les mans. "Douleurs dans les hanches avec sonffrances spasmodiques dans les voies urinaires. — Douleurs tract ves, aigués, terebrantes dans les jambes, depuis les pieds jusqu'aux hanches. — Tremblement dans les jambes,

CAPSICUM ANNUUM.

CAPS. — Piment, poivre long ou poivre de Cavenne. — Hannemann. —

Hist nat et prép Pharmac homosop, p. 184. — Dones unitera 9, 30 —


Durée d'action pasqu'à 20 jours dans quelques cas de maladies chroniques

Antihore Camph — Le capacium est antidote de . Calad. et chin.

Comparer avec . Arn. bell. Calad. chin. cm. ign. n-vom puls. verate.

CLINIQUE — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra le cas où l'on pourra consulter ce médicament centre : — Affections des personnes d'un tempérament flequatique : Nostalgie : Migraine et exphalalgie hysterique? : Amblyopie amaurotique? ; Névralgie faciale : Stomacace : Dyssenterie : Diarrhee : Toux catarrhale : Fièrres intermittentes, aussi après l'abus du quinquina etc., etc.

Voir la note, page 15.



CAPSICUM ANNUUM.

181

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs pressives. — Douleum tractives dans les membres, excitées par le mouvement. — Douleur de luxation et roidour dans les articulations, avec craquement, surtout au commencement de la marche. — Crampes dans le corps, avec roidour des bras et des jambes, fourmillement et sansation d'engourdissement. — Répugnance pour le mouvement. — Les symptômes se manifestent principalement le soir et la nuit, et s'aggravent par le grand air, le contact et le froid, ainsi qu'au commencement du mouvement, et après avoir bu ou mangé. — Grande sensibilité à l'air frais et au courant d'air. — Insees, mie sans cause apparente. — Sommeil plein de rêves.

Pièvre. — Frissons fébriles et froid de tout le corps, avec mauvaise humeur augmentant avec le froid, on bien avec anziété, étourdimement et hébétude de la tête. — Frisson venant du don. — Froid et frissonnement chaque fois après avoir bu. — "Fièrre avec prédominance du froid et avec soif, chaleur brûlante et souffances muqueuses. — "Frissons avec forte soif, puis chaleur

sans ou avec soif et avec sueur,

Haral. — Disposition à s'effrayer. — Mécontentement. — *Résistance opiniâtre. — *Forte disposition à prendre tout en mauvaise part, à se mettre en colère, même pour des plaisanteries, et Maire des reproches. — Humeur capricleuse et excessivement changeante. — Émoussement de tous les sens. — Irréflexion et maladresse. — *Nostalgie avec rougeur des joues et insommis. —

Disposition à plaisanter et à dire des bons mots.

Têta. — Tête entreprise. — Ivresse comme par des boissons spiritaeuses. — Maux de tête, comme su le crâne allait éclater, en marchant ou en remuant la tête. — Accès de maux de tête semilatéraux, pressifs et lancinants, avec nausées, vomissements et perte de la mémoire, aggravés par le mouvement des yeux. — Douleurs lancinantes, ou tractives aigués, surtout dans les côtés de la tête. — Douleur d'écartement pressif dans le cerveau, comme par plénitude. — Maux de tête pulsatifs. — Prurit rongeant au cuir chevelu, avec douleur à la racine des cheveux et au cuir chevelu après s'être gratté.

Youx. — Pression dans les yeux, comme par un corps étranger qui s'y serait introduit. — Inflammation des yeux avec rougeur, douleur brûlante et iarmoienent. — Yeux proémments. — Trouble de la vue, surtout le matin, comme si quelque chose nageait sur la cornée, se laissant améliorer pour quelques instants par le frottement. — Vue entièrement éteinte, comme par amaurose.

Oreilles. - Douleurs tractives aigués dans les oreilles. - Démangeaison et pression au fond du conduit auditif. - Gouflement douloureux derrière l'oreille. - Diminution de l'oute.

Yen. — Epistaxis, surtout le matin, au lit. - Boutons douloureux sous les narines. Coryxa sec. avec fourmillement et chatouille-

ment dans les narines.



CAPSICUM ANNUUM.

Visage. — Rougeur de la face alternant souvent avec pâleur. —
Beaucoup de petits points rouges à la face. — Dartre rongeante,
pruriante sur le front. — Douleurs à la face, dans les os, où elles
sont aggravées au toucher, ou dans les nerfs, ou elles s'aggravent
lorsqu'on s'endort. — Pression sourde à la pommette, — Éruptions ulcerées et gerçures aux lèvres. — Gouffement des lèvres.

Bents. Douleurs aux dents, comme si elles étaient agacées ou allongées - Tiraillement dans les dents et les gencives. Gon-

flement des gencives.

188

Gorge. Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue. — Salive visqueuse dans la bouche. — Mal de gorge, avec deglutition douloureuse et tiraillement dans le pharynx. — (ontraction

crampoide de la gorge.

Appétit. Goût aqueux et fade. Goût aigre de la bouche et aussi du bouilion. — Absence d'appétit. Désir de prendre du café, avec envie de vomir après en avoir pris. Pyrosis. — Enrue de vomir ressentie généralement dans l'épigastre, avec pression de la partie.

Estomac. Douleur à l'estomac qui est ballonné. — Sensation de froid dans l'estomac. — Douleur brûlante à l'estomac et à l'épigastre, surtout immédiatement après le repas. — Élancements à l'épigastre, en respirant vite et profondément, en parlant et au

toucher. - Gonflement du creux de l'estomac.

Ventre. - Ventre ballonné jusqu'à éclater, avec tension pressive et suspension de la respiration. - Tiraillements et mouvements dans le ventre. - Fortes pulsations dans le bas-ventre. - Coliques renteuses. - Sortie d'une hernie venteuse par l'anneau inguinal.

Selles. — Ténesme. Petites selles dyssentériques, avec évacuation de matières muqueuses et sanguinolentes, précédées de coliques venteuses. - *Diarrhées nocturnes, avec douleurs brûlantes à l'anus. — Hémorrhoides aveugles, avec douleur pendant les selles.

Urines. - Ténesme de la vessie. - Envie fréquente, *pressante et presque inutile d'uriner. Douleurs brûlantes en urmant. - Contractions crampoïdes et incisives au col de la vessie. Douleurs incisives et lancinantes dans l'urèthre, hors le temps de l'émission des urines. *Écoulement purulent par l'urèthre, comme une gonorrhée. Écoulement de sang par l'urèthre.


Parties viriles. Impuissance et parties génitales froides. — Érections matutinales par trop violentes. — Pendant des caresses

amoureuses, tremblement de tout le corps.

Laryax. *Enrouement. *Tour plus molente le soir et la nuit, avec douleurs à d'autres parties du corps, surtout a la tête et à la vessie, comme si elles allaient éclater, ou avec pression dans la garge et les oreilles, comme si un abces aliait s'y ouvrir.

— Toux apres avoir pris du café — Toux, avec haleine fétide et goût désagréable dans la bouche.

Poitrine. - Besoin de respirer profondément. - Géne de la respi-



CAPSICUM ANNUUM. — CARBO ANIMALIS.

ration, parfois comme provenant de l'estomac. — Douleur constrictive dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine en respirant. — Douleur pulsative dans la poitrine, qui suspend la respiration et qui est augmentée par le mouvement.

Tronc et Membres. — Douleurs tractives argués dans le dos. —
Roideur de la nuque. — Tension dans les genoux et roideur dans
les mollets, en marchant. — Roideur des bras et des jambes, avec
fourmillement, comme quand ils s'endorment.

CARBO ANIMALIS.

CARB-AN.— Charbon animal.— HAHNEMANN.— Hist. not. et prép. Pherm. homosop., p. 92. — Doses usitées : 24, 30. — Durée d'action : jusqu'à 40 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANYMOTE : Camph. (voir carb-veg.).

Company avec : Carb-veg. et les médicaments qui se increant incesits cons

COMPARER AVEC : Carb-veg., et les médicaments qui se trouvent inscrits sous cotte rubrique.

- CLINQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que coutre quelques espèces de Gastralgie, Induration des glandes, Métrorrhagies, Nodosités arthritiques, Aphthes des enfants, Induration de la langue, Bubons syphilitiques, etc.

culations et les muscles des membres. — Douleurs brûlantes. —
Douleurs nocturnes dans les articulations. Brisement, manque de force et craquement dans les articulations, qui fléchissent facilement. — Roideur arthritique et nodosités goutteuses dans les articulations. — Tension dans quelques membres, comme par raccourcissement des tendons. — Contraction spasmodique de plusieurs parties. — *Disposition à se donner des tours de reins. —
Torpeur de tous les membres, surtout de la tête. — *Grande fatigue et faiblesse, produite surtout par la marche, avec transpiration facile, principalement en mangeant ou en se promenant au grand air. — *Sensibilité excessire au grand air, et surtout à l'air froid de l'hiver. — Bouillonnement de sang et disposition à *échauffer facilement.

Pean. — Prurit par toute la pean du corps, surtout le soir au lit. — Infiammations érysipélateuses. • Engelures. — *Gonfiement des glandes, dur et douloureux. — Gonfiement des parties extérieures, avec douleur brûlante.

Sommeil — Sommeil tardif, et insomnie nocturne, causés par inquiétude, angoisse, bouillonnement de sang et crainte d'étouf-

189



CARBO ANIMALIS.

for. - Visions effrayantes avant de s'en lormir. - Sommell avec recasseries, pleurs, jactation et gemissements sourds.

Pièvre. — Frissons, surtout le soir, au lit, avec transpiration pendant le sommeil. — Frond excressé aux pieds et aux mains, le soir. — Chaleur nocturne. — *Transpiration facile le jour, surtout pendant le repas, ou en se promenant. — Suour affaiblissante et fetide, surtout la nuit et le matin, principalement aux cuisses. — Sueur qui teint le linge en jaune

Moral Nostalque et sentiment triste d'abandon, avec lurmes. Peur et épouvante, surtent le soir. *Découragement et désespoir. - *Desposition à s'effrance. Alternation de gaieté et de
tristesse, ou d'irascibilité et de mauvaise humeur tacitume. -

Confusion d'idees et hebetude, surt ut le matin.

Tête. *Vertige, surtout le soir ou le matin, et parfois avec nausées en sa relevant, apr s'être reste longtemps couché, on bien eucore avec obscureissement des yeax, en remusut la tête. - Maux de tête, le matin, comme apres une debauche. Maux de tête à l'air frais, et aggraces par un temps humide - Pesanteur, surtout à l'occipat, avec tête entreprise. *M inc de tête pressifs, même apres le repas, et qui forcent a fermer les paupores. - *Congestion et chaleur interieure à la tête. Sensation de vacillement du cerveau à chaque mouvement - Sensation de torpeur à la tête. - Douleurs tractives, aigues, dans les teguments lu cête droit de la tête. Tensi in de la peau du front et du sommet de la tête. - S'usibilité l'a cur chevelu à la pression du chapeau - *Croûtes et éruptions à la tête.

Yenx. Sensation comme si le glob de l'ord ctait detaché de l'orbite, avec faiblesse de la vue - Presimire avec dilatation

des pupilles, eFengus hématode dans l'orbite.

Oreilles. - "Ecoulement pur les oreilles - Confusion de l'ouie; les sons y arrivent indistincts. - "Brussement dans les oreilles. Conflement du pari ste derrière l'oreille. - Conflement des

parotides.

190


Nez. Bout du nez rouge et gercé avec doubeur brûlante. — Nez goufie avec boutous croûteux (comme au commencement d'un cancer') — Desquamation de la peau du nez. — Sensibilité douloureuse des os du nor — Epistaxis, precédée de vertige ou de mal de tête pressif — *Obturation du nez. — *Coryza sec. Coryza fluent avec perte de l'odorat, eternument et bâillements fréquents.

Visago. Taches à la fuce, qui sont lisses, épaisses au toucher et de couleur rose. Elancements any poinmettes aux machoires et aux dents. Eruption sans douleur et comperose à la face. Conflement de la bouche et des lèvres, avec denleur brulante Ampoules aux levres. Lèvres ger-

cees saignantes.

Dents. - Odontalgie tiralilante en mangeant du pain, ou avec pul-





CARBO ANIMALIS.

sations sourdes après avoir bu froid. — Vacillement excessif des dents. — *Douleurs tractives aux gencives. — Gonfiement rouge et douloureux, et valgnement des gencives. — Vésicules purulentes aux gencires.

Bouche et Gorge. — Fétidité de la bouche. — Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue. — "Sécheresse de la langue et du palais. — Mai de gorge comme par exceriation, avec grattement et élancements depuis le gosier jusqu'à l'estomac. — Accumulation de mucosités dans la gorge, avec touseotement et real-element. — "Induration partielle de la langue.

Appétit. — *Ameriume dans la bouche, surtout le matin. — Goût selde et muqueux. — Répugnance pour la graime et la fumée du tabac qui causent des nausées. — *Grunde faiblesse de la digestion, au point que presque tous les aliments commune des souffrances.

**Rencois avortés avec goût des aliments ou bien **acité. —

**Rencois avortés avec douleur. — Pyrosis avec grattement dans la gorge. — *Hoquet après le repas. — *Écoulement d'une eau aigre par la bouche. — *Nausées, surtout la nuit. — *Fadeur à l'estomac, comme si on allait tomber en faiblesse. — Pituites de l'estomac. — **Pression à l'estomac, comme par un poids, à jeun, et le soir après s'être couché. — *Douleurs crampoides et contractives à l'estomac. — *Douleur brûlante à l'estomac. — *Serrement à l'estomac comme par des griffes. — Gargouillement bruyant dans l'estomac.

Ventre. — Douleur au foie comme par excorlation, au toucher. —
*Pression et tranchées à la région hépatique. — Ventre ballonné
et tendu. — Constriction et serrement, comme par des griffes,
dans le ventre. — Tranchées et élancements dans les aines. —
Hernie inquinale. — *Gargonillements bruyants dans le ventre.
— *Incarcération de flatuosités. — Venta fétides. — Bubons
syphilitiques.

Selles. — Envie inutile d'aller à la selle, il ne sort que des veuts. — Selles dures, noucuses. — *Selles fréquentes le jour. — Avant la selle, traction depuis l'anus jusqu'à la vulve. — Pendant les selles, douleurs dans les reins. — Boutons hémorrholdaux, brûlants. — Douleurs brûlantes et *élancements à l'anus, et au rectum. — Excoriation et suintement à l'anus. — Sortie de ténis. — Suintement visqueux au périnée. — En allant à cheval on s'écorche facilement à l'anus.

Urines. — Envie pressante d'uriner avec émission plus abondante.
 —Émission d'urines la nuit. — Émission d'urine involontaire. —
 •Urines fétides. — Urines brûlantes.

OUrines fétides. — Urines brûlantes.

Parties viriles. — Absence de l'appétit vénérien. — Pollutions fréquentes, suivies de faiblesse et d'inquiétude anxieuse.

Bègles. — Règles trop hâtives. — Leucorrhée brûlante, suimnte rou qui teint le linge en jaune. — Lochies séreuses et fétides. —



192 CARBO ANIMALIS. — CARBO VEGETABILIS.

*Nodosités et indurations douloureuses aux glandes mammaires. —

·Inflammation érysipélatense des mamelles.

Larynx. — Oppression de poitrine, surtout le soir et la nuit. — Extinction de la voix la nuit. — Enrouement matutinâl. — Toux rauque, avec douleur d'excoriation dans la gorge. — Toux nocturne, sèche. — Toux suffoquante, surtout le soir après s'être endormi. — Toux matutinale avec expectoration, excitée par une sensation de sécheresse dans la gorge. — Toux avec expectoration purulente, et élancements dans le coté droit de la poitrine.

Poitrine. — Respiration baletante. — Ralement dans la poitrine le soir au lit. Gene de la respiration, surtout le matin et après le repas. — Constriction suffoquante de la poitrine, surtout le matin au lit. — Élancements dans la poitrine comme par un abcès, surtout en inspirant. Sensation de froid dans la poitrine. — *Battement de cœur, le matin, le soir et en chantant à l'église.

Trons. Douleurs nocturnes au dos. Pression et élancements dans les reins, surtout en respirant profondément. Douleur brûlante dans le coccyx, au toucher. Douleur brûlante dans le dos. - Induration des glandes du cou avec douleur lancinante. - Dartres sous l'aisselle Suintement sous l'aisselle. - Induration des glandes axillaires.

Bras. — Douleurs osteocopes, fouillantes dans les bras. Pression sur les épaules. - Douleur de luxation au poignet. Torpeur et engourdissement des mains et des doigts. Tension doulourouse

Elance-

et oroideur arthritique des articulations des doigts, ments dans les doigts,

Jambes. *Douleur lancinante dans la hanche, qui force à boiter, avec élancements. - Tension et raccourcissement dans les sines qui ne permet pas d'étendre les jambes. - Tension dans les jarrets et le cou-de-pied, avec contraction des parties. - Douleur d'excoriation dans les genour - Crampes dans les mollets, les jambes et les orteils. - *Tiraillements et élancements dans les jambes - Fléchissement facile des pieds et des orteils en marchant. Froid aux pieds. - Gonflement inflammatoire des pieds et des orteils, comme s'ils avaient eté gelés, avec chaleur et douleur. -- Douleur brûlante aux orteils.


CARBO VEGETABILIS.

CARB-V. — Charbon végétal. — HAHREMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac homoop., p. 93 — Doses usitees : 12, 30. — Durce d'action : jusqu'à 40 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES Arsen, cham coff. lach. - Ce medicament est ant dote de :

Chin. lach mere vinum.

Comparer avec : Aut. ars. cale. carb an chm. coff. fer. graph. kal. lach. lyc. merc natr. n-vom. puls. rhod. sep. strum zur - C'est surtout



après : Kol. foch. n-rom. sep. que le charbon fera da bien loraqu'il nera indiqué. — Après le charbon, on trouvera quelquefois convenables : Ars. hal. merc.

CLINIQUE. — Se laismant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : --Buites facheuses de l'abus du mercure et du quinquina; Affections scorbutiques; Faiblesse par perte d'humeur ou à la mite de graves maladies aigues; Torpeur nerveuse avec manque de réaction de la force vitale (contre les médicaments); Paralysies; Suites fâcheuses d'un tour de reins ou d'une promenade en voiture ; Souffrances par suite d'un temps chaud (et hamide); Sensibilité aux changements de temps; Affections rhumatismales; Varices; Engelures?; Indura- -tion des glandes?; Gale miliaire ou humide; Eruptions urticaires; Ulcères putrides; Abcès lymphatiques; Taches de naissance; Anévrismes: Ictère: Fièvre typhoïde, dernière période avec extinction presque complète de la force vitale ; Fièvres intermittentes, particu**lièrement** celles que l'abus du quinquins a rendues opiniâtres; Céphalaigies, surtout celles par suite d'une débauche ou par suite d'un échauffement ; Migraine ; Chute des cheveux à la suite de graves maladies aigues; Ophthalmie pour s'être trop fatigué la vue; Hémorrhagie des yeux ; Otorrhée purulente ; Parotite épidémique ; Coryna fluent; Hémorrhagie nasale; Dartres humides à la face; Boutons à la face chez les jeunes gens; Affection scorbutique des gencives; Stomacace; Angine à la suite des morbilles; Embarras gastrique par suite d'une débauche ; Gastralgie des nourrices ; Gastralgie avec aigreurs ou produite par stagnation du sang dans le système de la veine-porte (après l'usage de nux-vom.); Choléra asiatique avec absence totale du pouls; Coliques par le mouvement de la voiture; Coliques flatulentes on hémorrhoidales; Diarrhées putrides on muqueuses; Hémorrhoïdes avengles et fluentes; Pissement au lit ches les enfants; Diabète?; Coliques menstruelles; Flueurs blanches; Disposition à l'avortement avec varices aux parties; Infiammation des mamelles; Catarrhe et enrouement, aussi à la suite des morbilles; Grippe; Laryngite chronique (avec ulcération); Toux convulsive; Asthme flatulent; Orthopnée paralytique; Phthisie tuberculeuse (première période); Pneumonie chronique?; Pneumonie asthénique, avec expectoration rouge brun et écumeuse, etc., etc. Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs avec anxiété, chaleur et découragement complet, ou avec accablement après l'accès. — Tiraillements aigus et douleurs tractives, arthritiques, avec faiblesse paralytique, principalement dans les membres, et souf-frances par des flatuosités; ou avec gêne de la respiration lorsque

193



194

c'est la poitrine qui est attaquée. — Douleur de luration dans les membres ou sensation comme si l'on s'était donne un tour de reins — Douleurs brâlantes dans les rembres et les os. — l'ulsations à différentes parties du corps. — Souffrances pour s'être donné un tour de reins ou pour avoir éte en voiture. — Tremblement et secousses dans les membres, le jour. — *Enqourdissement facile des membres. — La plupart des symptômes apparaissent pendant la marche au grand air. — 'Amaignessement surtout du visage. — Brosement de tous les membres, surtout le matin lorsqu'on vient de se lever. — Grande faiblesse des muscles fléchisseurs. — *Accablement excessif, allant souvent jusqu'a la défaillance, même le matin au lit, ou bien au commencement de la marche — Chute rapule des forces. — Accablement general vers midi avec besoin de s'appuyer la tête et de se reposer. — Paralysie et absence totale du pouls. — *Facilité à se refraider.

Peau. S. usation de fourmellement par toute la peau du corps.

Prurit universel le soir en se rechauffant dans le lit. So neation brûlante a différentes parties de la peau — *Eruption de petits boutens semblables a la gale imiliaire. — *Eruptions uriteaires.

- Dartres. — Stries d'un brun rougeatre. — Ulceres saus douleurs au bout des doigts et des orteils. *Ulcères fetides et saignant facilement avec d'uleurs brulantes et écoulement d'un pus corrosif et sanieux.

*Engelures *Varices — *Reseaux vemeux formés par une dilatation des vaisseaux capillaires, avec hémerrhagie violente après la plus legere lesson. — *Gonflements lymphatiques avec supparation et douleurs brûlantes. — *Induration les glandes.

Sommeil. — *Forte envie de dormir le jour, ise dissipant par le mouvement. — *Sommeil dans la matince ou le soir de bonne heure — Sommolence comateuse avec râle. — Sommeil tardif et *mommie causee par une agitation dans le corps. — La nuit ou le soir au lit, mal a la tête, angoisse avec oppression de poitrine, tressaillements et douleurs dans les membres, froid aux mains et aux pieds, etc — Rêves frequents, fantastiques, auxieux

et terribles, avec jactation on avec sursauts et effroi.

Fièvre. *Franconnement et frond au corps. — Frisson fébrile le soir et la nuit, suivi de chaleur passagere. — Fievre avec soif sculement pendant la periode de froid, ou avec sueurs abondantes, suivies de frischs. Etat febrile avec somnelence comateuse, rale, su ir fronde au visige et aux extremites, face hypecratique, peuls petit et favent — "Al serie du peuls. Etat febrile le soir, avec chel ur au visigle et chaleur brulante aux mains et aux pieds — "Acces frequents de chaleur passagère "Sueur nocturn". — "Sueur motatinale acide. "Sueur froide aux membres et au visage

Moral. Inquictude et anxiété, surtout le soir. - Peur de spectres, surtout la nuit. - Timidité, irrésolution et embarras en



195

société. — Désespoir avec humeur pleureuse et découragement avec désir de la mort et tendance ausuicide. — *Disposition à s'effrayer. — *Irascibilité et emportement. — Faibleme de la mémoire, subite et périodique. — Lenteur de la marche des idées.

— Idées fixes. — •Aversion pour le travail.

Tota. — Vertige après le plus léger mouvement de la tête, ou après avoir dormi, ainsi qu'en se baissant et en marchant. -- Vertiges avec namées, obscurcissement des yeux, tremblement, bourdonnement d'orelles, et même perte de connaissance. — • Mouss de Acte par échauffement. — Mal de tête avec tremblement de la machoire. -- Maux de tête nocturnes. -- Tension orampoide dans le cerveux, ou sensation comme par contraction des téguments de la tête. — *Lourdeur de la tête. — Mai de tête pressif, sertout au-dessus des yeux, dans les tempes et à l'occiput. — - Douleur tractive dans la téte, partant de la nuque, avec nausées. — Elancement au vertex. — *Battement et pulsation dans **la tête, surtout** le soir, ou après le repas, avec congestion de sang et chaleur, ou sensation brûlante à la tête. -- Les maux de tête s'étendent souvent depuis la nuque jusqu'au cerveau, chraggravent quelquefois après le repas. — Douleurs tractives aigués dans les téguments de la tête, surtout à l'occiput et au front, souvent **partant des** membres. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu **à la pression extérieure (par exe**mple celle du chapeau). — Facilité **à se refroidir la tête.** — Chute des cheveux.

Your. — Douleurs dans les yeux, après s'être fatigué la vue. —
Douleurs dans les muscles des yeux, en regardant en l'air. — Prurit,
estimus, chaleur, *pression et douleur brûlants dans les yeux et
les angles des yeux. — Agglutination nocturne des paupières. —
Saignement des yeux, souvent avec forte congestion à la tête. —
Frémissement et tremblement des paupières. — *Myopie. —

Pupille insensible.

Oreilles. — Otalgie le soir. — Le soir, rougeur et chaleur de l'oreille à l'extérieur. — Manque de cérumen. — *Écoulement d'un pus fétide par l'oreille. — Obturation des oreilles. — Tintement et bourdonnement dans les oreilles. — Gonfiement des parotides.

Nes. — *Démangeamon du nez, avec chatouillement et fourmillement dans les narines. — Croûtes et rougeur au bout du nez. — *Obturation du nez, surtout vers le soir, ou écoulement séreux sans corvea. *Corvea riolent, avec enrouement et raucité de la poitrine, fourmillement et chatouillement dans le nez. et envie inutile d'éternuer. — *Epistaxis fréquente et continue, surtout la nuit et le matin, avec pâleur du visage, ou bien après s'être baissé, ou avoir fait des efforts en allant à la selle.

Visage. — *Pâleur de la face. — Teint jaune, -grisatre ou verdâtre. — *Face hypocratique. Douleurs tractives, tiraillements algus, térébrations et douleurs brûlantes dans les os de la face. — Gonflement de la face et des lèvres. — *Dartres à la face. —



Furoncies devant l'oreille et sous la màchoire. -- Boutons rouges au visage (chez les jeunes gens) Lècres gercées -- Vésicules purulentes aux levres. Commissures des levres pleérées. Éruptions comme des dartres, au menton et aux commissures des

lèvres. - Tressaillements de la levre superieure.

Dents. *Man. de dents, avec tiraillement ou douleurs tractives, aiguës, en *contractives, rongeantes ou pulsatives, *provoquées en prenant quelque chose de chaud ou de froid, ainsi que par des aliments trop salés. *Vacillement opiniatre des dents. — *Decollement, rétraction, excoriation et ulcération des gencives — *Saignement des geneives et des dents.

Bouche. — Chaleur et *sécheresse, ou accumulation d'eau dans la bouche. — Apreté dans la bouche et sur la langue. — Excoriation de la langue, avec difficulte de la remuer. •Inflammation

de la muqueuse buccale.

196

Gorge. Mal de gorge, comme par gonflement interieur. — Sensation de constriction dans la gorge, avec deglutition empêchée. — Cuisson, *grattement *et douleur brûlante dans la gorge, le palais et le gosier. — Douleur d'excoriation dans la gorge en toussant, en se mouchant et en avalant. — Renâclement de mu-


cosites abondantes qui se detachent facilement.

Appétit. — *Goût amer. *Goût salé de la bouche et des aliments. — Absence d'appétit, ou soif et faiminmodérées. *Dégoût chronique de la mande, du lait et de la graisse. Désir d'aliments sales ou sucrés. *Après le repas, mais surtout après avoir pris du lait, fort ballonnement du ventre, *aigreurs dans la bouche et rapports aigres. *Sucur pendant le repas. — Grand échauffement après avoir bu du vin. — Après le dîner, embarras a la tête et pression à l'estomac, ou mai de tête, lourdeur

dans les jambes et anxieté morale.

Estomac. *Renvois à vide ou amers. — Renvoi des aliments, et surtout des aliments gras. — *Renvois aigres, surtout après le repas. — Pyrosis. — Hoquet, après chaque mouvement. — *Nausées surtout le matin, après le repas ou la nuit. — *Nausées continuelles. -*Ecoulement d'eau de l'estomac, comme des pituites, même la nuit — «Vomissement de sang. — Pesanteur, plenitude et tension à l'estomac. — *('rumpes d'estomac contractives, ou pressures et brûlantes, avec accumulation de flatuosités et grande sensibilité de l'épigastre. — Sensation de grattement et de tremblement à l'estomac. — «Les maux d'estomac s'aggravent ou se renouvellent par la frayeur, les contrarietés, un refroidissement, ainsi qu'après le repas, ou la nuit, et surtout après avoir pris des aliments flatulents, *ou bien encore par l'allaitement. — *Pression au creux de l'estomac, comme si le cœur allait être écrasé, «surtout chez les nourrices.

Ventre. *Douleur de meurtrissure dans les hypocondres, et surtont dans la région hépatique, principalement au toucher. —



197

*Douleur lancinante sous les côtes. — *Tension, pression et clancements dans la région hépatique. — Elancements à la rate. - *Gêne des vétements autour des hypocondres. - Douleurs dens la région ombilicale, au toucher. — Pesanteur, plénitude, *ballonnement et tension du rentre, avec chaleur dans tout le corps. — Coliques par le mouvement de la voiture. — Pression et crampes dans le ventre. — Douleurs dans le ventre, comme par un tour de reins ou par luxation. — Douleur brûlante et facte angoisse dans le vénire. — Pincement dans le ventre, partant du côté gauche, et se dirigeant vers le côté droit, avec sensation de faibleme paralytique dans la cuisse. — Production abondante de flatuceités, surtout après le repas, et quelquefois avec sensation de torpeur dans le ventre. — Coliques venteuses, crampeides, surtout la nuit. -- • Borborygmes et mouvements dans le ventre. — *Sortie immodérée de flatuosités, -d'odeur putride. — •Pour peu que l'on mange, aggravation des souffrances abdomimales. — Les maux de ventre sont souvent accompagnés d'inquié**tude et** de pleurs.

Selles. — *Constipation. — Selles insuffisantes. — Selles difficiles, sans être dures, arec besoin pressant, douleur brûlante à l'anus et douleurs semblables à celles de l'enfantement, dans le ventre. — *Selles liquides, *pâles ou *muqueuses. — Écoulement de muçosité et de sang au lieu d'une selle, avec cris (chez les enfants). — *Évacuation involontaire de matières d'une odeur putride. — Écoulement de sang par l'anus, avec toutes les selles. — Diarrhée après avoir mangé des fruits. — Après la selle, mal de ventre passif. — *Boutons hémorrhoïdaux, *douloureux, gros et de couleur bleu foncé. — Hémorrhoïdaux, *douloureux, gros et de couleur bleu foncé. — Hémorrhoïdes fluentes. — Élancements, *démangeaison et douleurs brûlantes à Panus. — Sortie de ténia. — Écoulement par l'anus et le rectum d'une sérosité visqueuse et corrosive, surtout la nuit. — Excoriation et suinte-

ment du périnée.

Urines. — *Diminution de la sécrétion des urines. — *Envie fréquente, anxieuse et pressante d'urmer, jour et nuit. — *Pissement au lit. — Urine rouge, comme si elle était mêlée de sang, et excessivement foncée. — *Urine rouge foncé avec un nuage de couleur foncée. — Urines abondantes d'un jaune clair, ou épaisses blanchâtres. — *Cuisson en urinant.

Parties viriles. — Affluence extraordinaire de pensées volupsucuses. — Pollutions par trop fréquentes. — *Ejaculation trop prompte dans le colt. — Taches lisses, rouges et suintantes sur le gland. — Écoulement de liqueur prostatique pendant les selles. — Prurit et suintement près du scrotum, à la cuisse, — Pression dans les testicules.

Règles. — *Règles trop hâtives et trop fortes, ou trop faibles.

avec sang pâle. — Avant les règles, crampes dans le ventre et
maux de tête. — Pendant les règles, vomissement et douleurs



198


dans les dents, la tête, les rems et le ventre. — *Prurit, brûlement, excoration, caplithes et conflement à la vulve. -- Écoulement par le vagin, blanc de lait, épais et jaunatre, verdâtre et corrosif. — Leucorrhee avant les regles. — clutammation des mamelles.

Larynx. — *Enrouement prolongé et rancité de la voix, surtout vers le soir. — *Le matin et le soir, enrouement, aggravé par une conversation prolongée, et principalement par un temps froid et humide. — Grattement, fourmillement et chatouillement dans le larynx. — Toux excitée par un fourmillement dans la gorge, ou avec douleur brulante et sensation d'excoriation dans la poitrine. — *Toux crampoide, avec ou sans voiniturition et vomissement, journellement trois ou quatre acces, ou bien le soir longtemps de suite. — Toux le soir, avant de se coucher et au lit. — En toussant, elancements douloureux dans la tête. — *Toux avec expectoration de mucosités verdâtres, ou d'un pus jaunâtre. — Toux avec crachement de sang et douleur brûlante dans la poitrine. — Expectoration rougeatre, ecumeuse, dans la pneumonie asthénique.

Poltrine. — Géne de la respiration et *respiration courte, en marchant. — *Grande gène de la respiration et oppression de poitrine. — Acces d'étouffement causes par des flatuosités — En respirant, battements douloureux dans la tête. — Crampe de poitrine, avec couleur bleue de la face. — Bescin fréquent de respirer profondément. — Manque d'haleine, surtout le soir, au lit. *Douleur brûlante, elancements et pression dans la poitrine, — *Compression et constriction crampoide dans la poitrine, avec face bleuatre. — La poitrine est prise, avec sensation de plenitude et anxieté. *Douleur d'excornation dans la poitrine — Sensation de fatigue dans la poitrine. — Douleur brûlante dans la region du cour, avec congestion à la poitrine, et violents battements d'eccur. — Douleurs rhumatismales, tractives, tiraillements aigus et pression à la poitrine — Taches brunâtres sur la poitrine.

Tronc. — Douleurs rhumatismules, tractives, tiraillement aigu et élancements dans le dos, lu nuque et les muscles du con. — •Elancements continuels aux reins, surtout en faisant un fanx pas. — •Roideur de l'épine dorsale — Boutons pruriants au dos. — Prurit, excoration et suintement sous les aisselles. — Roideur de la nuque.

Bras. - *Deuleurs tractives aigues et brûlantes dans les muscles et l'articulation de l'épaule. - *Tiraillements et douleurs tractives aigues dans les avant-bras, le poignet et les doigts. - Relachement des muscles, des bras et des mains, en risnt - Tension dans les articulations de la main, comme si elles étaient trop courtes. - Contraction crampolde des mains, - *Chaleur des mains. - Faiblesse paralytique des poignets et des doigts,



CARBO VEGETABILIS. - CASTOR EQUI.

109

surtout en saisissant un objet. — Éruption granulée fine et preriante aux mains. Bouts des doigte ulcérée.

Jambes. — Terpeur et insensibilité des jambes et des pieds. —

Douleur tractive et paralytique dans les jambes. — *Tiraillement aigu et douleurs tractives brûlantes dans la hanche et les
genoux. Forte tension et douleur crampoide dans les articulations coxo-femorales, les enisses et les genoux. *Anévriene au
jarret, avec douleur tensive et pulsation. *Dartres au genou.

— Crampes aux jambes et à la plante des pieds, et *la nuit
dans les mollets. — *Ulceres fétides et saignant facilement, aux
jambes Torpeur opinitaire des pieds. — *Transpiration des
pieds. - *Rougeur et gonflement des orteils, avec douleur lancinante, comme s'ils avaient éte gelés. Ulcération du bout des
orteils.

CASTOR EQUI.

CAST-EQ. — Châtaigne des chevaux, — Héning. — Gazette homoropathique d'Angelourg. — Hist, not. et prép. Pharmac, homorop., p. 321.

STAPTOMES. — Sommeil agité, avec beaucoup de rêves. — Rêves de sa mère malade, de fruits verts sur les arbres (en hiver). — Syncope. — Un vieux cheval proud l'air de vingt ans plus jeune.

- Rire extraordinaire à propos de choses non risibles.

Tête. - Greilles. - *Céphalalgie avec vertiges et nausées, eaigreurs et anorexie; Pression dans les tempes du dedans au dehors;
Engourdissement du cuir chevelu à l'occiput, avec sensation
comme si l'occiput était plongé dans de la glace. - Derrière les
oreilles, éruption de pustules formant un cercle de la grandeur
d'un écu.

Mes. - Pression douloureuse dans l'os. - Corysa fluent avec faim continuelle, même après le repas.

Face. — Autour de la bouche, peau converte d'une quantité de verrues (chez un cheval, et guéri par thuy.).

Dents. — Douleurs dans les dents du côlé gauche.

Bonche. — Mamelles. — Bouche pleine de salive, immédiatement après le repas. — Renvois d'air fréquents; Selles promptes, précédées de coliques, et accompagnées d'émission de vents fétides. — Mamelons pleins de crevasses, pendant la nutrition; Mamelles gonfiées, avec endolorissement au toucher et en descendant l'escalier; Prurit violent dans les mamelles, jusqu'à devenir folle, avec rougeur de l'aréole, etimamelons douloureux et plussecs qu'à l'ordinaire.



CASTOR EQUI. - CASTOREUM

Dos. — • Faiblesse dans la colonne vertébrale; — • Douleur dans le coccyx, chaque soir étant assis. — * Dans la pourrine, douleurs lancmantes.

Bras. Donleurs errantes dans le bras droit; Douleur de foulure, dans les articulations carpiennes; les ongles se cassent pour pen qu'on les heurte.

Membres inférieurs. - Douleurs dans les genoux et le tibia; Douleur dans le jarret droit en ployant le genou; Furoncles nombreux, petits, aux jambes. Ongles des orteils très-cassants, et se renouvelant après être tombés sans cause.

CASTOREUM.

CAST. — Castoreum. — HARTLAUB ET TRINKS — Hist. nat. et prép. Pharmac. hommop., p. 321. — Médicament encore peu connu.

CLINIQUE. — Ce médicament n'a encore été employé que contre quelques cas de vomissement des femmes enceintes.

SYMPTOMES. — Sommeil de nuit inquiet, avec agitation anxieuse et sursauts avec effroi — Secousses des membres après qu'on s'est endormi. — Rèves anxieux et effroyables. — Predominance de froid et horripilation — Accès de frissonnement, avec froid glacial dans le dos. — Grande tristesse et susceptibilité excessive avec pleurs faciles.

Tête. — Douleur au vertex et battement dans la tête, comme s'il y avant un ulcère au cerreau, aggrarée par le contact et la pression extérieure — Plénitude et pesanteur de la tête, comme si elle allait éclater. — Douleurs tractives aigués, dans le front et

les tempes.

200

Your. Pression dans les yeux, le soir, avec faiblesse de la vue. —

Douleur brûtante dans les yeux, en fixant un objet éloigné. —


Larmoiement et agglutination nocturne des yeux. Étoiles, nuages, et, en fixant un objet éloigné, brouillard devant la vue. —

Susceptibilité de la vue à la lumière du soleil et à celle des bougies.

Oreilles. Tiraillement aigu dans les oreilles. - Tintement, bruissement et gargouillement dans les oreilles, se dissipant dès

qu'on y fouille avec le d sigt.

Nes. — Obturation du nez. — Écoulement de mucosités aquenses, acres, corrosives, par le nez.



CASTOREUM. -- CAUSTICUM.

201

Dents. — Maux de dents en mangeant, provoqués par les choses froides, et soulagés par les choses chaudes. — Odontalgie avec douleurs tractives aigués, ou tiraillements successifs, provoquées ou aggravées par le toucher. — Gonflement des gencives, la nuit, avec tiraillement aigu dans les tempes.

Douche. — Odeur fétide de la bouche, dont on s'aperçoit soi-même
 — Tiraillement et tressaillements dans la langue. — Douleur

brûlante dans la gorge, comme par pyrosis.

Botomac. — Soif ardente. — Renvois amers. — Régurgitation d'une aigreur amère. — Dégoût et nausées continuelles. — Vomissement de mucosités blanches, amères. — Sensation de plénitude et de pesanteur à l'estomac. — Sensation d'engourdissement à l'estomac. — Sensation de contraction et douleur d'ulcération à l'épigastre.

Ventre. — Maux de ventre des plus violents, avec rougeur de la face et baillements, soulagés par la chaleur extérieure, et en se repliant sur soi-même. — Plénitude et ballonnement douloureux

du ventre, surtout après le repas.

Selles. — Envie pressante d'aller à la selle. — Diarrhées accompagnées de frissons et de baillements, avec brûlement à l'anus, et précédées de mal de ventre avec grondement et borborygmes. — Selles de mucosités sanguinolentes.

Urines. — Emission fréquente d'urine, avec soif ardente, jour et nuit. — Après l'émission des urines, envie de vomir et dégoût.

Règles. — Règles trop hátives, avec douleurs à la tête et aux reins, et teint pale et maladif. — Leucorrhée brûlante.

Politrine. — Respiration difficile, profonde et lente, ou courte et oppressée. — Haleine courte en montant. — Pression à la poi-trine. — Sensation de pesanteur à la poitrine, surtout en respi-

rant profondément.

Membres. — Douleurs, comme d'excoriation dans les reins et le dos. — Douleurs tractives dans la nuque. — Tiraillement nocturne dans les épaules et les bras. — Mains chaudes, avec gonflement des veines. — Faiblesse des membres inférieurs.

CAUSTICUM.

CAUS. — Causticum. — HABREMARN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 93. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 50 jours dans les maladies chroniques.

ANTIDOTES: Coff. coloc. n-vom. nutr-spir. — Ce médicament est antidote de:

Asa. coloc. — Le coffeu tosta et le phos. en aggravent les souffrances

Comparen avec: Amm. asa. bell. calc. cham. coff. coloc. ign. lyc. merc.
natr. n-vom. phos. phos. ac. rhus. sep. sulf. veratr. — C'est surtout après:
Asa. empr. et sep. que le causticum fait du bien loraqu'il est indiqué. —
Après l' causticum, on trouvera quelquelois convenables: Sep. stann.



202

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections rhumatismales et arthritiques, surfout l'arthrite chronique: Spasmes et convulsions des enfants et des personnes hysteriques, Convulsions epileptiques (après l'usage de cuprum); Danse de Saint-Guy; Paralysies, surtout celles qui ne se manifestent que d'un seul cote, ou colles qui sont la suite d'une repercussion de quelque sécrétion morbide ou de quelque éruption. telle que la gale, etc : Gale : Tumeurs enkystées : Verrues : Excoriation de la peau; Dartres humides; Varices; Melancolie, hypocondrie et hysteri, Migraine : Ophthalmies, aussi chez les personnes scrofuleuses; Blepharophthalmie; Amblyopie amaurotique: Cataracte: Otite et Otorrhee purulente: Durete de l'ouie; Coryza chronique, avec obturaten lu nez. Prosopalgio: Paralysie de la face; Odontalgies rhumatismales et arthritiques, Affection scorbatique des geneives; Fistules des geneives; Paralysie des organes de la parole et mutisme; Paralysie des organes de la déglutition. Embarras gastrique, par suite d'une indigestion; Hématemese?; Gastralgie, Grosseur du ventre chez les cufants; Constipation; Hemorrhoules; Fistule an rectum; Incontinence d'urine; Dysmenorrhee; Spasmes hystériques; Flueurs blanches; Excoriation des mamelons; Agalactie; Excoriation et convulsions des enfants; Catarrho et enrouement opiniatres; Aphonie, Larvagite chronique (avec consomption); Grippo; Asthme spasmodique?, Affections organiques du cœur, Goitre; Faiblesse des jambes chez les enfants; Raccourcissement et induration des muscles ?, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - *Douleurs arthritiques et rhumatismales, tractives et dechirantes, surfout dans les membres. -Tradlement agu et violent dans les articulations et les es, soulage a la chaleur du lit. Haccourcessem nt des tendons, et roidear dans les muscles fléchisseurs des membres : Contraction crampoide de plusieurs membres. Porpeur et palissement de quelque partie ca de toute la moitie gauche du corps. — Paralystes - *Secousses et mouvements ensulsifs. *Accès de convulsions saved cris, monvenents violents des in indres, griffcements de dents, s'urire ou pleurs, yens a domi fermés, regard fixe et emission involentaire des urins, les acces se ren my llent par l'eau it side, et sont pre edes de mal de ventre et de tele, émission frequente des arines, trascibilité et places après l'acces, les yeux se ferment. = *Conculsions ep leptiques, tion des sympt daes géneralement le soi, est au grand air, tandis que ceux qui ont apparo au grand air se dissipent dans l'appartement. - Le café semble aussi aggraver tous les symptomes.



203

Les symptomes primitifs tardent plus a se manifester que chez les autres médicaments a longue action. - Souffrances semilatérales. *Inquiétude insupportable par tout le corps, le soir, et en etant assis, avec anxiete au cour. -- Le soir, grand abattement et accaldement de tout le corps. Faibleese paralytique, avec tremblement et chancellement des membres. - Grands susceptibilité aux courants d'air, *et au frond

Pean. - Prarit violent, surtout an dos et aux mollets, - *Eruptions ressemblant a la gale. - Eruptions miliaires et urticaires. - Darres provientes et humides - Vésieules rongeantes. *Exerciation cher les enfants. - Cora aux pieds douloureux. -

*Verrues, aussi avec douleur et inflammation. - l'anaris. -

Varices douleurcuses

Sommeil. - Euroe de dormer le jour, comme par somnolence comatense Insomme nucture causée par anxiété, inquiétude, chaleur seche et autres meommodites avec sursante fréquents. - aureauts en s'endormant. Mouvements fréquents des bras et de jambes pendant le sommeil - * Réves ancieux de choses facheuses ou de querelles, ou confus et voluptueur avec paroles et rires. - La unit, vertiges, maux de tete, sécheresse de la touche et pesanteur douleureuse des jambes.

Fierre. - Forte fralosité. - Frissons nocturnes, avec douleurs dans le dos et suivis de sueur génerale. - #Sueur abondante pendant la marche en plein air. - *Sueur nocturne, quelqui-

fois d'odeur acide.

Moral. - * Melancolie et pensées chagrines, jour et nuit. avec pleurs. - *I ristesse hypocondriaque. - *Inquiétude, appréhencions et grande angoisse - Anxieté de cœur - Peur surtout la nuit. Dehance de l'avenir - *Decouragement. - Irancibilité et emportement, avec forte susceptibilité de caractère. -Esprit querelleur et ergoteur. - Peu de gout pour le travail -*Disposition à s'effrayer — Faiblesse de la mémoire. — Distrac-

tion. — Facilité à se tromper en parlant.

Toto. - Embarras dans la tête, comme si elle était comprimée .--Ivresse, il semble qu'un va tomber - Vertige avec sensutem de fashieure dans la tete et anxiete. Accès le maux de tête avec nausces. Mux de tête le matin, quelquefois en se reveillant, avec sensation de meurtrissure dans le cervenu. Douleur nocturno dans la tête, comme par un abcès au cerveau Mul de tete a pred et pressif qui rend sombre, et se fait ressentir principalement au front ou à l'occiput. - * Douleurs lancinantes, surtinet et us les tempes : Fauillement et coups subite lans la tête. - tongestion à la tête, avec bouillonnement et bruit intérieur. - Douleurs ten ives on compressives dans la tête. - Les maux

de tete ne se manifestent quelquefe is que d'un seul côté (a gauche). - Chaleur et sensation de brûlure dans la tête. - *Roudeur ct



diancements à la tête. — Tension au cuir chevelu. — Sensation de torpeur à l'occiput.

Youx. - Douleur dans les yeux, comm: si la prunelle se dilatait. - Pression dans les yeux, comme par du sable, aggravee quel-quefois par le toucher. - Prunt, cuisson et douleur brulante dans les yeux. *Inflammation des yeux et des paupières. -*Ulcération des yeux. — *Larmoiement. — Agglutination noc-turne des paupières. — Difficulté d'ouvrir les yeux, avec sensation comme si les paupières étaient gonflées. - Fremissement visible des paupières. - Obscurcissement des yeux, sonvent subit, et quelquefois comme si les yeux etaient recouverts d'une peau - Vue trouble, comme s'il y avait decant un voile ou un brouillard - *Filets noirs qui semblent voltiger devant les yeux.

*Lumieres et etincelles devant les yeux. - Photophobie. -

Verrues anciennes dans les sourcils.

204


Oreilles. Otalgic avec douleur pressive vers le dehors. - Elancements et douleur d'excoriation dans les oreilles. - Gonflement de l'oreille actérieure, avec elancements et douleur brûlante. -Ecoulement d'un pus fétide par l'oreille. Prurit au lobe de l'oreille comme par une dartre. - Fort résonnement des sons dans l'oreille avec durete de l'ouie. - *Grondement et bourdonnement, roulement et *bruissement dans les oreules et la tête. Sensation d'abturation dans les oreilles,

Nez. — Demangeaison an bout et aux ailes du nez. - * Eruption au bout du nez. Verrues anciennes sur le nez. - Mouchement de sang tous les matins - Epistaxis. - Perte de l'odorat.

*Obturation du nez. - *Coryza sec, chronique. - Coryza fluent, avec toux nocturne, enrouement rauque et maux de tête. - Ecoulement de mucosités fetides par le nez. Eternument matutinal.

Visage. - Coulcur jaune de la face, surtout aux tempes, avec lèvres bleuatres — Sensation brûlant aux joues, et surtout aux pommettes et aux machoires. *Douleurs arthritiques et tensives dans les os du visage, aux pommettes et aux mâchoires. -Gonflement des joues avec douleurs pulsatives. - Sensation de tension et de gonflement sous la machoire, qui empêche de l'ouvrir. - Eruptions de boutons rouges a la face. - Paralysie semi-laterale de la face, depuis le front jusqu'au menton. Crampes dans les levres. — Excoriation et cruption aux lèvres, et aux commissures des levres. - Dartre a la levre inférieure. -Douleur tiraillante tensive dans les machoires, avec difficulté d'ouvrir la bouche. - Gonflement inflammatoire du menton, avec douleur brulante. - Trismus.

Dents. Odontalgie provoquée par l'introduction de l'air en ouvrant la bouche. - Douleur d'excoriation, on douleurs tractives et tiraillement aigu, *battements ou élancements dans les dents. - * Vacillement douloureux et allongement des dents.



CAUSTICUM.

205

Fistule aux gencives.
Vlcération prolongée des gencives.
*Sensibilité douloureuse, gonflement et saignement facile des consières.

Rencises:

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — *Accumulation de mucosités dans la bouche. — Douleur d'excoriation et de brûlure dans la bouche, au palais et au bout de la langue. — Balbutiement, parole embarrassée, sifflante et très-indistincte. — Paralysie de la langue. — Distorsion de la bouche et de la langue en parlant.

— Ulcère brûlante à la partie intérieure de la lèvre supérieure.
Gerge. — Mal à la gorge en faisant des efforts, comme si elle était déchirée intérieurement. — Douleur d'excoriation, âpreté, grattement et douleur brûlante dans la gorge. — Douleur lancinante dans la gorge en avalant. — Besoin continuel d'avaler, avec sensation de gonfiement ou de rétrécissement du gosier. — Difficulté d'avaler, par paralysie des organes de la déglutition. — Sensation de froid qui remonte dans la gorge. — Sécheresse de la gorge. — *Accumulation de mucosités dans la gorge et au fond du palais, avec expuition par le renâclement.

Appétit. — Goût putride, gras, rance ou amer. — Soif ardente pour les boissons froides et la bière. — *Répugnance pour les douceurs. — Dès le commencement du repas, perte de l'appétit et dégoût. — Sensation comme si on s'était donné une indigestion. — *Soif ardente avec manque d'appétit. — Après avoir mangé du pain, pression à l'estomac. — Après chaque repas, pression dans tout le ventre, ou dans l'estomac, ou bien nausées et ballonnement du ventre, ou bien encore frissonnement ou chaleur au

Timee.

Renvois avortés, avec strangulation dans le gosier. — *Nausées surtout après et pendant le repas, ou bien le matin. — *Sensation de fadeur comme si on allait tomber en defaillance. —
Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. — Vomissement d'une cau acidulée, suivi de rapports acides. — oVomissement des aliments. — Vomissement nocturne d'un sang coagulé.
— Douleurs à l'estomac, avec chaleur à la tête, augmentées par
tout mouvement prompt, soulagées par la position couchée, et
avec horripilation quand les douleurs s'aggravent. — *Pression, serrement comme par des griffes, construction et douleurs
crampoïdes dans l'estomac et l'épigastre. — *Douleurs lancimantes à l'épigastre.

Ventre. — Pression des vétements sur les hypocondres. — Tension et élancements dans la région hépatique. —Maux de ventre le matin. — *Pression dans le ventre et le bas-ventre. — Ballonnement du ventre, douloureux et tensif. — Gonflement du nombril, douloureux au toucher.— Ventre gros ches les enfants. — Douleurs contractives dans le ventre. — Facilité à se refroidir le ventre, d'où il résulte diarrhée ou pression à l'estomac. —



206

*Incarceration de tiatuosités avec selles dures. - Émission fré-

quente de vents petits et fétides.

Solles. - *Constipution chronique. - Envie fréquente et mutile d'aller a la selle, avec douleurs, anxiéte et rougeur de la face. -Les selles s'evacuent plus facilement en se tenant debout. Selles noueuses ou d'un moule tres-mince. -- «Selles visqueuses et luisantes, comme de la graisse, ou de couleur claire et blanchatre. Diarrhée le soir et la nuit. Diarrhée apres s'etre refronti le ventre - Ecoulement de sang et douleurs incisives dans le rectum pendant les selles. Après les selles, anquisse. avec battement de cœur et l'rulement a l'anus, - *Demangene son a l'anus A l'anus, sortio des boutens hémorrhoidaux qui sout durs, gonfles et douloureur, et qui genent les selles. La marche et la meditation aggravent les douleurs hemorrhoïdales jusqu'a les rendre insupportables. Pression sur les boutons hemerrholdaux du rectum, de manière à les faire sortir. -Fistale au rectum. - Abces a l'anus. Douleur d'excoriation et suintement a l'anus.

Urines. - Lance frequente d'urmer, avec soif et emission pou abondante. - Emission plus abondante des urines. - Emission des urines la nuit, et pissement au lit. - *Emission d'urme incolontaire jour et nuit, meme en toussant, en éternuant et en marchaut. - Urme acre et corrosive, on pale, aqueuse, couleur brun fonce ou rougeatre. Mucosites filantes dans les urines. Les urines se troublent dans le repis - Sensation de brûlure en

urmant Ecoulement de sang par l'urêthre.

Parties viriles. Augmentation de l'appetit vénérieu. —
«Manque d'erections, — *Poliutions frequentes. Écoulement
de liqueur prostatique après les selles — Ejaculation d'un sperme
sanguinolent pendant le cost — Pression et élancements dans les
testicules. — I lecres et croûtes pruriantes à la partie intérieure
du prepuce. — Taches rouges à la verge. — Secretion abondante
du sin gina derrière le gland — Prurit au scrotum, au gland et

ви ристисс.

Régles, - Règles ret ardées, mais plus abondantes, avec écoulement de sang en gros caillots. - Avant les règles, mélancolie, mans d'reins et colques. - eRegles par trop fables. - Pendant les règles, mans de reins, tranchées et paleur de la face. - Excoristion entre les jambes, a la vulve. - eRépugnance pour le coit, che, la jemme. - Cran pas de la matrice. - eLeucorrhée abondante, avec odeur des règles, ou qui coule la nuit -- eMandens excorres, gerces et entourés de dartres. - eManque de serretion du fait.

Larynx Euronement ranque, le matin et le soir. — *Enrouement prol mge. av se voix faible et étouffée. Extinction de voix par faiblesse des muscles du larynx. - Sensation d'exceriation au larynx, hors le temps de la deglutation. — Renaclement de





maconités abondantes, surtout le matin. — Toux avec haleine courte, et gêne de la respiration. - Toux excitée par la parole et par le froid .-- Toux matutinale ou nocturne .- * Toux courte, provoquée par un chatouillement et une sensation d'excoriation dans la gorge. — "Toux sèche, creuse, ébranlante, avec sensation de brûlure et d'excoriation dans la poitrine. - Râlement dans la poitrine, en toussant. — Douleurs dans les hanches, en toussant. — •Impossibilité d'expectorer les mucosités qui se détachent en toussaut.

Politrine. — *Haleine courte. — Accès d'asthme spasmodique. Accès d'étouffement, en parlant et en marchant vite. - Gêne des vêtements sur la poitrine. -- Pression sur la poitrine. -- Élancoment à la poitrine et au thorax, en respirant profondément et pendant un travail corporel. - Accès de compression crampolde et de constriction à la poitrine, avec étouffement. *Battements de cœur. — Oppression de cœur, avec mélancolie. — Elancements au cœur.

Trens. — Maax de reins qui rendent le moindre mouvement donloureusement sensible. — Maux de reins pressife, en étant assis. --- Roideur douloureuse dans le dos, surtout en se levant de son ziége. — Tiraillement et douleurs tractives aigués dans les omoplates. — Prurit et fourmillement dans le dos. — Rordeur et ten**mon à la nuque.** — Eruption miliaire à la nuque, entre les omoplates. — Dartres pruriantes et humides à la nuque. — «Gonflement

gottreux des glandes du cou.

Beas. — Douleurs dans les bras, la nuit. — *Douleurs tractives et ... tiraillement aigu dans les bras et les mains. — Monvements convalsifi et secousses dans les bras. — Démangeaison et éruptions aux bras. — Verrues aux bras. - Pression sur les épaules. -•Douleurs lancinantes à l'avant-bras, depuis les doigts jusqu'au coude. — *Bensation de plénitude dans les mains en saisissant un objet. -- Douleurs tractives dans les mains et les articulations des dolgts. --- Faiblesse spasmodique et tremblement des mains. Palimement et torpeur douloureuse des doigts. — *Raccourcissement et induration des tendons des doigts. — Dartres pru-

riantes aux doigts.

Jambes. — Douleur de luxation dans l'articulation coxo**fémorale, avec impossibilité de** marcher et de rester debout. — Douleur de brisement dans les cuisses et les jambes, le matin au Itt. - Roideur tensive dans les articulations des jambes et des piede. - *Douleurs tractives et tiraillement aigu dans les cuieses, les jambes, les genoux et les piede, avec gonflement des parties. - Marche incertaine et facilité à tomber, ches les enfants. — Peau marbrée, aux cuisses et aux jambes. — Tension et douleur crampoide aux jambes et aux mollets. — Crampes dans les pieds. — *Douleurs au cou-de-pied, aux malléoles, à la plante des pieds et aux orteils, en marchant. — Douleurs névralgiques



CAUSTICUM. - CEPA.

208

a la plante des pieds. Raccourcissement du cou-de-pied, avec douleur tensive en s'appuyant dessus — *Froid aux pieds. *Gonflement des pieds. *Douleurs dans les varices. Four-millement à la plante des pieds. - Vésicules rongeantes et ulcérations aux talons. Panaris au gros orteil.

CEPA.

CEP. — Allium Cepa, oignon. — HERING. Études pathogéneuques de l'Amerique du Nord, p. 423 — Hist. nat. et prep. — Voy. Pharmac. homicop, p. 487 Antibotes Nilom, cham. acon.

Companier avec Phos. n-vom, cham. puls. sant. - Incompatibles. Allum. equil. aloes.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament dans les affections suivantes. — Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques; Syncopes, Léthargies; Empoisonnements; Suites facheuses de l'ivresse. - Tannes; Taches; Rougeole; Urticaire; Scarlatine, Verrues; Cors, Ongles cassants, Abcès; Charbons; Engorgements glandulaires. — Fièvres intermittentes; Fièvre jaune: Fièvres pestilentielles. — Apoplexies; Céphalalgies catarrhales; Calvitie. Lippitude; Ophthalmies catarrhales; Ecchymoses, ul-. cères, taies, dans les yeux, Cataracte?; Amaurose commençante?.-Otalgie; Otorrhée; Dysécée; Bourdonnement d'oreille. - Epistaris; Coryza fluent. (Erystpèle facial; paralyste de la face à gauche). - Stemacace ; Scorbut , (Gontlement de la langue ; Glossoplegie). Angines; Conflement des amygdales. Ulcères à la gorge, Angines caturrhales; Catarrhe du pharynt et des fosses nasales. - Gastricisme; Coliques des enfants; Coliques gastriques, Coliques nerveuses, spasmodiques; Coliques des gourmands; Coliques des ivrogues : Colique néphrétique. — Ascite ; (hernies incarcérees). — Constipations; Diarrhées; Affections vermineuses; Rhagades à l'anua, Hémorrhoïdes. - Catarrhe vésical; Calculs urinaires, Calculs dans les ureteres, Coliques nephrétiques; Rétentions d'urine. Spasmes du sphincter de la vessie, Faiblesse de la vessie, Polyurie.

Accouchements laborieux?, Délivrance tardive?; Tranchées utérines trop fortes ou trop prolongées. Phlegmasse blanche des femmes en couche?. — Catarrhe du larynx, Enrouement, Croup, Bronchite; Catarrhe bronchique. — Asthme. — Panaris; Engelures; Podagra.

Voir la note, page 15.



CEP4.

209

mide et froid, tel que les vents d'ouest et de nord-ouest les amenent; Suites facheuses de l'usage de crudités froides (des concombres, de la salade), osouffrances peur aver un les pieds me a'lles, avoir marché dans l'hun idite, avoir uspire un air inipur ou bu de l'eau malsame -- el onvient autant aux temperaments phicematiques et froids qu'aux natures colenques et bilienses Chez les enfants affections de la tete, ophthalmies, rhume de cervenu et écoulement continuel du nez angines; t'ux : rale muqueux; coliques et flatuosités; affections vermineuses; senffrances unnaires, surtout chez ceux qui desirent beaucoup le grand air, ainsi que chez ce ar où les flux catarrheux et muqueux predominent ou ont été supprimes concordant en cela le plus avec cod, et phosphor). Chezles carlbards caphalalgies, ophthalmies; patrine embarrassee; astlane catarrhal; sanfrances néphretiques, vésicales, urinaires, affections gastriques et intestinales, surtout lorsqu'il s'y jeint de la fribaité ou un grand désir d'aller au grand air (concorde en cela avec kul-hydr.) grand air ameliorés . *souffrances catarrhales; *cephalalgie; *larmotement : *flux nasal , douleurs rhumatismales, tournant a la chambre chaude, s'aggracent céphalalgie : edontalgne; éternument et toutes les souffrances catarrhales - Le froid ameliore l'odontalgie ; la chaleur l'aggrave. Après midi : souffrances gastriques Le soir s'aggravent la plujart des souffrances, surtout les épiphénomiques du rhume de cerviau dans la tête, les yeux et le nez; les douleurs dans les oreilles, les sents. les machoires, la region stemucale, le fue, le bassir la vessie, les reins et les membres, les rapports, les horborignes, les emissions de vents, les mictions fréquentes, les sanffrances asthmatiques, les expectorations et la hevre. Le maten manyais gout de la bouche, langue chargee, ainsi que la cavite buccale et la gorge; maux de ventre, emission de vents cracautions alrines. - l'ôtés du corps a la partie superieure, souffrances d'abord a droite, puis a grache, à la partie inferieure, d'abord à ganche, puis a droite la droite, d'uleurs au-les-us de l'oil. fourmillement); a quuche, flux nasal opt thalmic catarrhale, dokleurs dans l'arne, le rentre et la perteine douleurs néphretiques : vhumatismes principalement la parte inferieure, a gauche; dans la partie superieure du corps a drette — Dans la position assise : douleur au dessous de l'épaule froite; - mal de ventre : douleur dans la region publenne - Drus la position couchée : douleur plus forte dans le côté gauche, bourdonnement d'oreille, mal aux dents. - *Deuleurs articulaires. Sensation de faiblesse et lassitude forçant a se coucher.

Pesu Prestement dans la peau, comme par des epingles: prurit violent, bien que sourd. Rougeur de la peau. - Plaie difficiles a guerr. - «Contusions: »brûlures, »places vénimeuses et autres lésions traumatiques. - «Verrues. - «Rougeole.)



210 CEPA.

Sommeil. — Bâillement avec mal de tête et gastralgie: bâillement et sommeil profond. — Sommeil agité et cuvie de dormir le matin — Rêces /requents : d'orages sur mer; de vagues elevées; de la

proximite d'eau; prêves peuil les des convalescents.

Symptômes fébriles. Frisammement et horripilations dans le dos, surtout la nuit, passant de laut en bas, avec miction plus frequente; puis, chaleur et soif. *Chaleur alternant avec froid, dans les affections catarrhales; chaleur, avec les borborygmes et le rhume de cerveau; chaleur avec soif. Fievre intermittente, renouvelee chaque fois par des marches forcees, avec aggravation vers le matin et chaleur suns soif. Sueur; facilement excitée; abondante, au creux des aisselles et la paume des mains. — Pouls: accelere, plein (lent et dur).

Moral et Intellect. Etourdissement, hebétude, timidité. -Peur que les souffrances ne deviennent insupportables, - Désespoir, avec les coliques (même que recat); chumeur tres-mélanco-

lique dans les affections catarrhales.

Tôte. — Embarras de la tête, pression, plénitudes, pesanteur surtout à l'occiput et derrière le sommet, avec chaleur, pendant le rhume de cerveau, et le scintillement des yeux. — Sensation d'engourdissement comme dans les os du crâne, coup électrique à travers la tête; elancements depuis le sinciput, ou de l'interieur de la tête vers l'oreille; douleur a la tempe, en clignant des yeux.

- Céphalaigie catarrhale, douleur au front.

Youx. — Douleurs filitormes passant des yeux à l'oreille; douleur comme si l'œil était attache a une corde et qu'il fût tiraillé. — Yeux mats, ternes, avec sensibilité a la lumière, pendant le coryza. — Dans les yeux brûlement; cuissen comme par de la fumée; irritation qui force à les trotter; rougeur, surtout de l'œil gauche, avec prurit, elancements et sensibilité — Gonflement autour des yeux — Ophthalmie catarrhale. Dans les sourcils : prurit, chaleur, élancements. *Larmoiement abondant (larmes douces)

Oreilles. - Douleurs, tressaillements, passant de la gorge vers l'entrée de l'oreille et aux alentours. - Tintement d'oreille;

bruits lointains; bourdonnement; bruissement.

Nex. Éternument, le soir, en entrant dans la chambre chanffée.

*Dégouttement du nez, ecculement aqueux, avec eternument, euisson acre et excoriation du nez et de la levre superieure.

*Coryca fluent, avec larisoiement, mal a la tete, chaleur, soif, manque d'appetit, toux, tremblement des mains, aggravation le soir dans la chambre chauffée, amelioration au grand air.

Face. C'halenc a la face. Douleurs feleformes, dans la mâchoire supérieure droite, au-dessus de l'œil droit vers la racine du nez, de la joue passant vers l'œil Paralysie du côté gau-

che de la face. Erysipele tacial.

Dents. - Douleurs dans les molaires, dans la chambre chaussee.



pendant un vent froid et humide; augmentation par les boissons froides, amélioration par l'enu froide, ainsi que par le cure-deut et en suçant avec la langue. Dents d'un jaune sale.

Bouche et Gorge. Odeur fetide de la bouche et de la gorge. —
Langue sale, chargee de nucosités. Secheresse dans la bouche,
a la racine de la langue, au voile du palais et dans la gorge. —
Sensation d'engourdissement ou de torpeur dans la gorge, en
arrière. — *Douleur dans la gorge, comme s'el y avait là une
pelotte; douleurs a la racine de la langue; nu palais; vers l'entrée
de l'oreille, se dirigeant vers l'oreille. Renaclement de mucosites en marceaux de soir; provenant des fosses nasales et avec
mauvais gout de la bouche

Gastricisme. Mauvais goût de la bouche. — Peu d'appétit; beaucoup de soif. - Des nausées remontent, comme d'un coup, de la gurge. Dégout, nausées; au fond de la gurge; remontant le gosier; dans l'estomac, avec fadeur, en se redressant de la position couchee Rapports: pendant la chaleur; avec bal-

lonnement du ventre et borborygmes. - Vomissement.

Estomac. Estomac comme vide; sensation de faiblesse dans l'estomac. - Pression au cardia, en arrière. - Douleur au pilore, sous le sternum, a droite. -- Pression a l'estomac et baillement.

Ventre. — Douleur pressive dans la region du foie, avec horripilation au dos et froid. — Dans la région de la rate: sensation de contraction; elancements en étant couché. — Dans le ventre: tranchées filiformes, se dirigeant vers le milieu; coliques dans la region ombilicale, plus fortes dans la position assise, moindres en marchant, sensation comme a la suite d'un coup, à gauche; ardeur fugace, chaleur, douleur violente à gauche, en lois (vers l'endroit d'une hernie), avec envie d'uriner et émission brûlante.

Ventre ballonné et tete entreprise, avec envie inutile d'aller à la selle, ballonnement et borborygmes, avec envie inutile d'aller a la selle, chaleur, colique, respiration gènee, gêne des vétements et cessatun apres l'emission des vents — Vents tres-fetides; émission abendante de vents sans odeur, — °Coliques pour avoir mange des concombres, de la salade. — °Coliques des enfants.

Anus et Selles. *Duarrhées apres minuit, vers le matin ; dans la matines - Évacuations difficiles ou entierement arrêtées ; envie inutile d'aller a la selle. — Elancements dans le rectum ;

dechirement dans l'anus, cuisson, reptation.

Voies arinaires. Pression violente sur une petite place dans le bassin, a droite, douleur incisive, violente, comme par de petits coute aux. Pression brulante d'abord dans la vessie, puis dans la region sacrale; douleur dans la region renale, surtout a gauche; douleur dans l'aime, pression et d'autres douleurs dans la région publienne et dans l'anneau inguinal gauche, dans la région publienne et dans celle de l'uterus. Sensation de faiblesse dans la vessie et l'urethre; sensation de chaleur dans ces parties.



CEPA. - CHAMOMILLA VULGARIS.

- *I'rines aboudantes, pendant les affections catarrhales, les paralysies, etc.; umnes ecumeuses, irisees, arines touges, avec cavi ~ frequentes et brulement dans l'urethre

Parties viriles. Appetit vénemen augmenté, vessie et prostate douleureuses après le c st - Tiraillement dans les cordons sper-

matiques; brûlement au glan l

Régles. - Regles plus ab indantes. - Acconchements favorisés. Larynx. (hatouillement dans le larynx; enrouement; toussotement en respirant l'air froid ; *toux, enrouement et coryen, dans la manyaise saison; ralement muqueux et poitrine embarrassée.

Poitrine. * Respiration génée, par une pression dans le milieu de la portrue - Dans la postrine ; *pression, en haut ; élancements et brûlement, dans le milieu du côté gauche, en respirant profondément

Trono. Maux de reins, lorsque les garde-robes retardent. -Horripilation dans le dos; douleur sous l'omoplate droite, après avoir éte assis : élancements dans les lombes. - Elancements au

Cell

212

Membres thoraciques. - Douleurs dans les bras, surtout dans l'avant-bras gauche; sensation paralytique dans les articulations. - Sensation d'engeurdissement dans l'articulation du coude Mains seches et rouges; tremblement de la main gauche. droite Panaris.

Membres pelviens. - Faiblesse dans les hanches. - Pouleurs dans l a cuisses, au-dessas du genou, articaire aux cuisses. tion paralytique dans le genou. - lux preds, pluques écorchées: douleurs dans l'articulation du pied et le gros orteil.

CHAMONILLA VULGARIS.


CHAM. - Camomille commune. - Habbenank - Hist, nat. et prep. Pharnine, homogon , p. 487 Doses unitées 12, 30. - Durée d'action quelques JOUTS.

Arribores - Acon. core coff ign, n vom puls. - La comomille est antidote de : Alum bor, coff color ign n vom, puls, si un

Companie avec Acon, alim night we are her hell, bry compl. caps, caus chin cin cocc coff entire for graph hell hyos ign spec kil, led lye magn magn in more a vom pete, phos puts chab, thus sass sep stram, suit Cest p inappalment sprès magn, que la camomille fait du hien, forsou'elle se transce a diament sprès magn, que la camomille fait du hien, forsqu'elle se trouve maiquee.

CLINIQUE. Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra employer ce médicament centre : Différentes affections des femmes et des enfants, principalement des femmes en couches et des nouvenu-nes; Rustes facheuses de





CHAMOMILLA VULGARIS.

l'abus du café et des palliatifs narcotiques ; Souffrances par suite d'un refroidissement ou d'une colère; Affections rhumatismales. avec fièvre ; Accès de convulsions et de spasmes, principalement chez les nouveau-nés, les enfants pendant la dentition, les femmes enceintes ou en couches et les personnes hystériques; Accès de défaillance et de faibleme hystérique ; Convulsions épileptiques ; Catalepsie; Surexcitation nerveuse; Atrophie et amaigrissement des enfants scrofuleux?; Gonflement inflammatoire et induration des glandes; Eruption miliaire (des enfants)?; Excoriation de la pequ (chez les enfants); Disposition de toute lésion à s'ulcérer ; Inflammations érysipélateuses ; Ictère ; État soporeux avec fièvre ; Fièvres in**flammatoires** et nerveuses, avec délire; Fièvres intermittentes; Migraine et céphalalgie bystérique et nerveuse; Céphalalgie catarrhale, par suite d'une transpiration supprimée; Ophthalmie et blépharophthalmie des nouveau-nés, ainsi que par suite d'un refroidissement (et chez les sujets arthritiques?); Hémorrhagie oculaire ; Blépharo-spasmes; Otalgie; Parotite; Erysipèle à la face; Odontalgie, avec gonflement de la joue ou des glandes sous-maxillaires ; Manx de dents par l'abus du café ou par suite d'un refroidissement ; Dentition difficile, avec diarrhée, fièvre ; convulsions, etc.; Affections **bilieuses et gastriques, soit par suite d'une colère ou de toute autre** cause; Gastralgie, aussi pour avoir fait abus du café; Aigreurs des enfants; Hépatite aigne; Coliques spasmodiques et flatulentes; Entérite?; Péritonite?; Sortie des hernies inguinales?; Diarrhées muquenses ou bilieuses; Choléra?; Dyssenterie?; Diarrhée par suite de dentition ; Lientérie?; Métrite?; Métrorrhagie, aumi après l'accouchement; Spagnes abdominaux des femmes enceintes et en conches; Coliques menstruelles; Douleurs trop violentes après l'acconchement ; Symptômes précurseurs (et suites fâcheuses?) de l'abortus; Péritonite puerpérale; Suppression du lait; Fièvre de lait; Excoriation des mamelons; Erysipèle aux mamelles; Induration des glandes mammaires; Convulsions, cris, coliques, diarrhée et excoriation des nouveau-nés; Toux catarrhale, arec enrouement, principalement chez les enfants et par suite d'un refroidissement en hiver, ou par suite des morbilles; Affections inflammatoires des voies sériennes? (Laryngite? Bronchite? Trachéite?); Croup; Coqueluche?; Toux suffoquante chez les enfants?; Accès d'asthme spasmodique on flatulent, principalement chez les enfants; Sciaique ; Crampes aux mollets ; etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs rhumatismales, tractives, principalement la nuit, au lit, avec état paralytique et senmation de torpeur dans les parties affectées, et besoin de les remuer constamment; soulagement par la chaleur extérieure. — *Douleurs avec soif, chaleur et rougeur (de l'une) des joucs et



CHAMOMILLA VULGARIS.

214


sueur chaude de la tête, même au cuir chevelu, -- *Douleurs pulsatives, comme dans un abcès. - *Surexcitation et surimpressionnabilité de tout le système nerveux, avec senmbilité excessire à toute douleur, qui paraît insupportable, et porte au desempoir. - *Grande sensibilite au grandair, 'et principalement au vent, -*Membres comme roides et paralysés. Grande fublesse et caducité; des que la douleur commence, il y a chute des forces jusqu'à tomber en défaillance - * Acces d'évanous sement, avec sensation de mollesse et de fadeur dans la region précordiale. - Accès de catalepsie, av e face hippocratique, extrémités froides, veux à demi fermés, pupillos dilatées et ternes ... * Accès de spasmes et de convulsions, avec face renge, bouffie, et mouvements convulsifs des yeux, des paupières, des levres, des museles de la face et de la langue - Convulsions épileptiques, avec rétraction des pouces et ecume levant la bouche, precedées de coliques, ou suivies d'un état soporeux. - Grande envie de rester couché; l'enfant ne veut ni marcher, ni être porté sur les bras. - Craquement et douleur de brisure aux articulations

Peau. - *Eruption "miliaire, *avec prurit et démangeaison nocturnes. *Peau maladive, toute lesion tend à s'alcèrer. Dans les ulceres, fourmillement, demangeaison, brûlement et élancements tressaillants, avec sensibilité excessive au contact. * *Couleur jaune de la peau. •Gonflement inflammatoire des

glandes, Execuriations chez les enfants.

Sommeil.— Sommolence le jour, sans pouvoir dermir lorsqu'en se couche. — *Etat soporeux et coma rayd, avec douleur tiraillante à la tête et envie de vomir, ou "avec agitation febrile, respiration courte et soif. — *Insomme nocturne, avec accès d'angoisse, visions et illusions de la vue et de l'ouie. *En dormant, sursuuts avec effroi cris, jactation, pleurs, paroles, radoteries, gemissements, aspiration rouflante et "écurtement continuel des cuisses — Rèves[fantastiques, vifs, querelleurs et ficheux, avec figure morose et meme — Délires nocturnes

Fièvre. Horr pilation avec chalcur intérieure. *Alternation continuelle de froid ou d'horripalation partielle, avec chalcur partielle, dans différentes parties du corps. *Chalcur universelle, surtout le soir, ou la muit, au lit, avec un rieté, soif, rongeur des joues, transpiration chaude de la tête, au front et ou cair chivelu, et quelquef is, principalement en se découvrant, mêlée de frissons ou d'horr pilation. *Après ou pendant la chalcur, sueur reide et qui cause une demangement à la peau. *Chalcur bridante et rongeur (souvent sculement de l'une) des joues, principalement la muit avec gémissements, jactation et froid ou chalcur au reste du corps — Chalcur brûtante avec sueur et delires furibonds, la nuit surtout — Fievre intermittente avec exacerbation nocturne, pression au creux de l'estomae, envie de vomic, en vomissements bilieux, coliques, diar-



CHAMOMILLA VULGARIS,

rhées et émission douloureuse des urines. — Sueur nocturne, en dormant.

lieral. -- *Accès d'une grande angolese, comme el le cœur allait éclater, avec inquiétude excessive, agitation, exaspération et jactution, gémissements et pleurs, accompagnés souvent aussi de coliques tractives ou de pression au creux de l'estomac. — *Disposition à pleurer et à se fücher, avec grande sensibilité aux offenses. — *Humeur querelleuse et colère. — Méchanceté chez les enfants, --- *Surexcitation morals, avec grande disposition à c'effrayer. --- Humeur hypocondriaque. --- *Le malade ne peut supporter ni que d'autres lui adressent la parole, ni qu'on l'interrompe dans as conversation. — Taciturnité et répugnance pour **la conversation.** — Etat de distraction et d'inadvertance, comme al l'on était plongé dans la méditation, avec conception difficile comme si l'on n'entendait pas bien. — Espèce de stupidité et d'apathie pour le plaisir et pour les choses extérieures, comme des rêves éveillés. — Désir de différentes choses, dont on ne veut plus dès qu'on les possède. -- En parlant et en écrivant, on se trompe facilement. — «Délire» frénétiques et faribonds.

Tôto. — Ivresse et chancellement, le matin, en se levant. — *Vertiges en se redressant. — Vertiges arec défaillance. — *Vertiges avec obscurcimement des yeur. — *Vertiges principalement de matin, ou le mir, ou après le repas, ou après avoir pris du café. — Mal à la tête le matin en s'éveillant, ou pendant le nommeil, qualquefois avec sensation comme si la tête allait éclater. — Dou-leur de meurtrissure, et *pesanteur pressine dans la tête. — *Tirnillements, élancements et battements dans la tête, souvent senlement semi-latéranz. — Craquement dans un côté du cerveux. — *Sueur chande, visqueuse, au front et au cuir chevelu. — Douleur tressaillante au front, principalement après le repas.

- *Congestion pulsative à la tête.

Year. — Douleur de plaie dans les angles des yeux. — Élancements, brâlement et chaleur dans les yeux. — *Yeux enflammés oet rouges, avec douleurs pressives, principalement en remuant les yeux et en seconant la tête. — Grande sécheresse du bord des paupières. — o'Inflammation du bord des paupières. — o'Gonflement et rougeur des paupières avec sécrétion muqueuse, chassie dans les yeux et agglutenation nocturns. — o'Couleur janne de la sclérotique. — Ecchymose dans l'œil et chémorrhagie oculaire. — o'Ceclusion spasmodique des paupières. — *Tressaillement des paupières. — *Yeux convulses. — Papelles contractées. — *Scintillement devant les yeux. — Vue trouble, plus souvent le matin que le soir. — Obscurcissement semi-latéral de la vue, en regardant quelque chose de blanc. — Photophobie.

Oralisa. - *Otalgie avec douleurs tractives et tensires. - *Elanacments étendus dans les orcilles, principalement en se baissant, avec disposition à se facher pour des riens et à prendre tout en



CHAMOMILLA VULGARIS.

mauvaise part. Tintement et *bourdonnement des oreilles. - Sensation comme si les oreilles étaient bouchées et qu'un oiseau y grattat et voltigeat. * Sensibilité de l'ouie : la musique parait insupportable — *Gouflement inflammatoire des parotides, ainsi que des glandes sous-maxillaires et de celles du cou. - *Ecoulement par les oreilles.

Nez. - Coryza avec obturation du nez. Ulceration et inflamma-

tion des narines - *Epistaxis. - Odorat très-sensible.

Visage. — *Face chaude, ronge, brulante, on rongeur et chaleur d'une joue, arce froid et paleur de l'autre, eou face pale, creuse, nvec distorsion des traits par la douleur. — *Enflure du visage. — *Érysipèle à la face, avec gonflement dur et bleuatre d'une joue. — Gonflement d'une tempe avec douleur au toucher. — *Fluxion sur la joue. *Kides au front *Sueur chaude et visqueuse, au front. — *Douleurs lanc, nantes, tractives et pulsatives dans un côté du visage. — Mihaire rouge aux joues. — Couleur jaune de la peau du visage. — *Mouvements convulsifs des muscles de la face et des levres. — *Lecres gercees, excorices et ulcérées. — *Crampes dans les machoires avec serrement des dents.

Dents — *Odontalgie, le plus souvent semi-latérale, et principalement la nuit à la chaleur du lit, avec douleurs insupportables qui portent au desespoir, gonflement, chaleur et rougeur de la joue, ogonflement brulant des geneives et engargement dou-loureux des glandes sous-maxillaires. *Les douleurs sont ordinairement tractives et tressaillantes, ou pulsatives et lancinantes ou fouillantes et rongeantes dans les dents creuses, et elles apparaissent frequemment après avoir bu ou mangé chaud (ou froid), et principalement après avoir pris du café. — Vacillement des dents.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche et de la langue, ou écoulement d'une salive écumeuse. — *Odeur putride de la bouche. — Langue rouge et fendillee, ou chargée d'un enduit épais et jaunâtre. — Vesicules sur et sous la langue, °avec douleurs lancinantes. — Aphthes dans la bouche. — *Mouvements convulsifs de


la langue

216

Gorge. — Mal a la gorge avec gonflement des parotides, edes tonsilles et des glandes sous-maxillaires. — Douleurs au pharynx, lanemantes et brûlantes, avec sensation comme s'il y avait un tampon dans la gorge. - Umpossibilité d'avaler des aliments solides, surtout étant couché. — Chaleur brulante dans la gorge, depuis la bouche jusqu'a l'estumae — Rougeur fincee des parties affectees. — Les aliments s'arretent à la fossette du cou.

Appétit - Gout putride ou muqueux. Gout acide de la bouche et du pain de seigle - *Gout amer de la bouche et des aliments.

Les aliments ne peuvent pas passer. *Degout ou désir prononcé du café, quelquelois avec envie de vemir, ou même vomis-



CHAMOMILLA VULGARIS.

sement et accès de suffocation après en avoir pris. — Après avoir mangé, chaleur et sueur du visage, ballonnement et plénitude de l'estomac et du ventre, rapports et envie de vomir. — *Soif

excessive de boissons froides.

Asperta qui aggravent les douleurs de l'estomac et du ventre. — Renvois aigres. — «Régurgitation des aliments. — Envie de vomir après avoir mangé, et principalement le matin. — Malaise et sorte de mollesse à l'estomac, comme si on allait s'évanouir. — *Vomissement des aliments et de matières aigres avec des mucosités. — *Vomissements amers, bilieux. — *Pression excessivement douloureuse à la région précordiale, comme ni le cœur allait être écrasé, avec cris, sueur et angoisse. — *Gastralgie pressive, comme par une pierre dans l'estomac, avec gêne de la respiration, principalement après avoir mangé, on la nuit, avec inquiétude et jactation, et renouvelée ou soulagée par le café. — *Douleur brûlante au creux de l'estomac et aux hypocondres.

Ventre. — *Tension et plénitude anxieuse aux hypocondres et à l'épigastre, avec sensation comme si tout se portait vers la poitrine. — *Colique flatulente avec ballonnement du ventre et affiuence des flatuosités vers la hypocondres et à l'anneau inguinal. — *Coliques excessivement douloureuses, tiraillements et tranchées dans le ventre, quelquefois le matin au lever du soleil. — Sensation de vacuité dans le ventre, avec mouvements continuels dans les intestins, et cercles bleus autour des yeux. — *Tranchées brûlantes dans l'épigastre avec gène de la respiration et pâleur du visage. — *Élancements dans le ventre, principalement en toussant, en éternuant et en le touchant. — «Sensibilité douloureuse du ventre au toucher, avec sensation d'ulcération au dedans. — *Pression vers l'anneau inguinal, comme s'il allait en sortir une hernie. — *Spasmes abdominaux.

Anns. — Constipation, comme par inertie du rectum. *Diarrhées, principalement la nuit, avec coliques spasmodiques, le
plus souvent avec selles muqueuses blanchâtres, ou aqueuses,
ou jaunâtres et verdâtres, ou de mucosités mélées d'excréments,
comme des œufs brouillés, ou selles chaudes, corrosives et d'une
odeur fétide, comme des œufs pourris, ou évacuation de matières
non digérées. — *Hémogrhoïdes avec crevasses très-douloureuses

et ulcérations à l'anus.

Urines. — Envie d'uriner avec anxieté. — En urinant, démangesison et brûlement dans l'urèthre. — oUrines chaudes, jaunâtres, avec sédiment flocouneux, ou urines troubles, avec sédiment jaunâtre. — Émission involontaire ou jet faible des urines. — Excoriation au bord du prépuce.

Eègles. — Règles supprimées avec gonfiement et douleurs pressives au creux de l'estomac et au ventre, douleurs comme celles de l'enfantement et hydropisie générale. — *Coliques men-



CHELIDONIUM MAJUS. CHINA.

Tranchees alternant avec selles molles. ments sourds au-dessous du nombril, forçant à se replier sur soi-

Selles et Urines. - Selles dures, noueuses et difficiles. - Dearrhes muqueuse la nuit. - l'rines pales, fréquentes, abondantes ou en trop petite quantite.

Regles. Règles trop fortes ou en retard. - Disparition du lait

des mamelles.

230

Poitrine. - Respiration difficile et oppressée - Toux accompagnee

Pression a la poitrine en respirant.

Decharement pressif dans le dos, comme si les vertebres lombaires allaient se briser, seulement en se courbant en avant on en arrière.

Paralysic des muscles du bras, avec mouvements difficiles et douloureux. - Veines gonflees aux mains. Dougts

morts avec ongles bleuatres.

Jambos. - Paralysie de la cuisse et du genou, en appuyant le pied - Tractions paralytiques depuis la hanche jusqu'aux orteils. - Crampe et contraction de la plante des pieds. - Acces de torpeur, påleur et froid aux pieds, qui sont comme morts. -Roideur des cous-de-pied.

CHINA.

CHIN. Quinquina BAHNEMANN — Hist nat. et prép. Pharmac. hommop., p. 189 — Doses usitées : 9, 12, 30 Durée d'action : jus-qu'à 41 jours dans quelques cas de maladies chroniques

Antidotes Arn. ara bell, case caps carbet, cin fer, spec, merc, natr.


natr in para, sep, sulf, veratr — Le quinquina est antidote de Ars. asa,
aur cupr fer, hell, spec, merc sulf veratr — Le selen, en aggravo les

effets COMPANIER AVEC Amm are are as abar, bell, bry cale caps carb-v. cham ein eupr. dig. fer graph, hell hep i d. ipre lach merc, mur-ac. nate nate in n-com phos, phos ac puls thus, samb sep sil stanu.

nutf thus cerate Cest surfout après Ars spec, merc phos ac, et
verate que le quinquine sait du bien lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. —

Après le quasquina conviennent quelquefois : Ars. bell. pals veratr.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des personnes d'une constitution maigre, sèche et bilieuse, ou leucophlegmatique avec disposition à des affections hydropiques ou a des catarrhes, à des rhumes de cerveau et autres ecoulements muqueux, ou a des diarrhees; Affections surtout du sexo feminin; Affections rhumatismales; Suites fâcheuses d'une colère, d'un refrot-



dissement, d'un coryra supprimé ; Suites facheuses de l'abus du tha. de Chine ; Souffrances des ivrognes? ; Inflammations asthéniques : Buites facheuses de abus du mercure; Souffrances arthritiques; Arthrocace?; Hydrarthre?; Affections hydropiques; Souffrances du système lymphatique; Ictère; Chlorose?; Hémorrhagies, surtout celles par suite de faiblesse; Atrophie; Faiblesse, surtout à la suite de pertes débilitantes (perte de sang, de sperme ou d'autres humeurs) ou après de graves maladies aiguës: Danse de Saint-Guy ? ; **Bouffrances à la suite de la petite vérole ou des morbilles ; Fièvres** avec affections bilieuses, gastriques, muqueuses et rhumatismales; Fièvres intermittentes; Fièvres des marais; Fièvres typholdes, même avec symptômes de putridité; Fièvres lentes; Hypocondrie surtout celle par suite de perte d'humeurs; Céphalalgies rhumatismales, catarrhales et congestives; Migraine; Céphalalgie par suppremion d'un rhume de cerveau ; Ophthalmie aussi chez des personnes acrofuleuses; Amblyopie amaurotique, surtout après des excès de hoissons alcooliques ou par suite de perte d'humeurs; *Hémorrhagie* nasale (on buccale); Prosopalgie et odontalgie rhumatismales ou congestives; Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques, surtout par suite de perte d'humeurs ou de fortes maladies aiguës; Cholérine ; Affections bilieuses ; Ictère ; Hépatites aigués et chroniques?; Engorgement et induration du foie ou de la rate; Splénslgie?; Coliques aussi à la suite des morbilles; Coliques spasmodiques et flatulentes : Tympanite ; Ascite et ascite enkystée ; Affections vermineuses ; Entérite chronique avec diarrhée sans douleur ; Diarrhées, aussi celles à la suite de la petite vérole; Diarrhée par faiblease; Lientérie; Souffrances hémorrholdales; Satyriasis?; Impuissance; Flueurs blanches; Métrorrhagies, surtout celles par suite de faiblesse : Catarrhe des voies aériennes : Grippe : Pleurésie : Pneumonie; Bronchite: Hémoptysie; Pneumonie chronique avec suppuration; Catarrhe suffoquant?; Gonite; etc., etc. **Voir la note, page 15.**

STAPTONIES GÉNÉRAUX. — *Tiraillements tensifs ou déchirements tressaillants et lancinants, surtout dans les os longs des membres, avec douleurs paralytiques et faiblesse des parties affectées. — Douleurs déchirantes, rhumatismales dans les membres, en commençant à marcher. — *Douleurs et souffrances provoquées ou aggracées par le toucher, la nuit ou après le repas. — Inquiétude dans les parties affectées, qui force à les remuer. — Sensation de torpeur dans diverses parties. — Engourdissement des parties sur lesquelles on est couché. — *Gonflement arthritique, dur et rouge de quelques parties. — *Gonflement hydropique de quelques parties ou de tout le corps. — *Gonflement érysipélateux de tout le corps. — *Grande faiblesse générale arec tremblement, marche difficile et grande disposition à la trans-



CHINA


paration pendant le mouvement et le sommeil . Vivacité plus qu'adinaire avec your fives "Mouvements convulsifs des membres - "Aurexcitabilité de tout le système nerveur -Aversion pour le travail du corps et de l'esprit Evaneuissements - Acces d'asi hyrie. - Atrophie et amagrissement. surtent des bras et des jambes - *Grande susceptibilité aux courants d'air et souffrances en s'y exposant tant soit peu. -Lourdeur de tout le corps.

Peau. Sensibilité excessive de la peau de tout le corps. *Couleur jaune de la peau Peau flasque, sèche Elancements térébrants et batt-ments dans les ulcères : Prurit brûlant ou rongeant, surtout le soir au lit, quelquele is avec éruption le boutons u de taches saillantes, comme par des piques d'orties,

Sommell. Ennie de dormir le jour, souveut avec battement de cour. - Baillement fréquent, avec pandiculations - *Nommeil turdif et insomme, à cause d'une grande affluence d'idées --Révasseries en s'end-rmant - "Insomme avec mal de tête presof ou boul mic. *Semmeil agité, nen réparateur Sursauts avec effroi en s'endormant — En dormant, on est couché sur le dos, la tête renversee et les bras etendus sur la tête avec respiration lente et avec pouls plein et acceleré : Gemissements et rouflements pendant le somme l, même chez les enfants -"Rèves pénibles, effrayant :, qui agitent même encore après le *Rêves desordonnés, insensés, après minuit, avec une

sorte d'hébétude au réreil.

Flovro. - *Fressons arec harripilation, on tremblement febrile, ordinairement saws suif = *Froid du corps, avec congestion à la tête, el sleur et rengeur du visage, et frent chand - Augmentation générale de la chaleur, avec veines genflees, sans soif - *Frissons aree mal à la tête, nausées, adipere, vertiges. congestion à la tête, pâleur du risage, fr id aux mains et aux pieds, vomiturition de glaires, etc. Frissons plus forts, après avoir bu. - *Chaleur, avec sécheresse de la houche et des lerres qui sont brûlantes, rougeur du risage, mal à la tête, fa'm maladivo, delire, pouls plein et accéleré. - Chaleur, avec picotements ça et là, et soil a dente. Chaleur avec besoin de se decourrir, on avec fri hel up by qu'en se decourre. Pièvres quotidiennes et doubles quotidiennes, on tierces, de Lutant principalement le soir, on apres midi, on le matin, par des frissons aver treachlement, suivis de chaleur et de sueur nocturne. - Prèvres avec douleurs pressives et congestion à la tête, end dorissement et gontlement du feje et de la rate, gouts, rapports et vomissements amera et biliens, couleur jaunitre de la peau et du visage, teux courte, convulsive, grande fa blesse, deuleurs aux membres, et point douleureux dans la paitrine. *Les accès febriles sont frequemment précédes de souffrances, telles que battement le cœur, cternument, angoisses, nausées, soif exces-



CHINA.

sive, boulimie, mal à la tête, coliques pressives, etc. — *La soif n'a ordinairement lieu qu'avant au après les frissons, ou pendant la sueur, rarement pendant la chaleur et presque jamais pendant les frissons. — Pouls petit, faible. — *Transpiration facile pendant le sommejl et pendant le mouvement. — *Sueurs nocturnes affaiblissanted — Sueurs huileuses le matin.

Meral. — *Apathie et insensibilité morale. — *Abattement hypocondriaque. — *Grande anxiété. — Caractère trop scrupuleur. — Découragement. — Mécontentement; en se croit malheureux et tracassé par tout le monde. — Irascibilité excessive arec pusillanimité et impossibilité de supporter le maindre bruit. — Désobéissance. — *Mépris de toutes choses; tout paraît fade. — Maussaderie, avec pleurs faciles ou avec irritabilité. — *Peur de chiens et d'autres animaux, surtout la nuit. — *Grande abondance d'idées et de projets, avec marche leute des idées. — Hordance d'idées et de projets, avec marche leute des idées. — Hordance d'idées et de projets, avec marche leute des idées. — Hordance d'idées et de projets, avec marche leute des idées. — Hordance d'idées et de projets, avec marche leute des idées. — Hordance d'idées et de projets, avec marche leute des idées. — Hordance d'idées et de projets de leute des idées de leute des idées de leute des idées de leute des idées de leute de leute des idées de leute des idées de leute de leute des idées de leute de leute de leute des idées de leute de leu

reur du travail.

Tota. — Embarras sourd de la tête, comme par des veilles pro-Rongées. - Vertiges en relevant la tête, surtout à l'occiput, comme si la tête allait fléchir en arrière. -- Vertiges, avec nausécal - Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements. — *Mal à la tête comme par un coryza supprimé. — Lourdeur de la tête avec abattement. -- Céphalalgie au front, en ouvrant les yeux. — *Douleurs de meurtrissure au cerveau, avec térébration premive au sommet de la tête, aggravées par la méditation et la conversation. - *Mal de tête pressif, surtout la nuit, avec insomnie, ou le jour, et aggravé par le grand air. --*Douleurs aiguës, tressaillantes ou pressives à la tête.— *Mal de tête comme si la tête allast éclater. - Douleurs lancinantes à la tête, avec fortes pulsations dans les tempes. — *Congestion à la tête, avec chaleur et plénityde. — Mouvements et battements douloureux au cerveau, shligeant à hausser et baisser alternativement la tête. — *Manx de tête augmentés par le toucher, le mouvement et la marche, ainsi que par un courant d'air ou par la marche contre le vent. — Les maux de tête ne siégent souvent que d'un seul côté. — *Sensibilité de l'extérieur de la tête et même de la racine des cheveux au toucher. – Mal à la tête, comme si l'on arrachait les cheveux ou que le cuir chevelu se contractat. — Pression lancipapte aux bosses frontales. — Sueur du cuir chevelu.

Year. — Douleur aux yeux, comme par une pression aux hords de l'orbite. — Douleur comme si un grain de sable s'était introduit dans l'œil, pendant le mouvement. — Cuisson pénible dans les yeux. — Inflammation dans les yeux, avec chaleur, rougeur, douleurs brûlantes et pressives, et aggravation le soir. — Yeux ternes. — Yeux proéminents. — Cornée terne, comme s'il y avait de la fumée au fond de l'œil. — Couleur jaunâtre de la selérotique. — Larmoiement, avec fourmillement à la face in-



CHINA.

terne des paupières. Faiblesse de la vue qui ne permet de voir que le contour des objets peu éloignés. — En lisant, confusion des caractères qui paraissent pâles et entourés d'un bord blanc. - *Pupilles dilatees et peu sensibles. - Cécité, comme par amaurose. - *Scintillements, points noirs voltigeants, et

obscurcissement devant les yeur Photophobie.

Oreilles. - Déchirements dans les creilles, le plus souvent à l'oreille extérieure - Elancements, *bourdonnement et tintement dans les oreilles. Dureté de l'oule. Rougeur et chaleur de l'oreille extérieure et surteut des lobes. Eruption dans la conque de l'oreille.

Noz. - Nez chaud et rouge. *Sangnement du nez et de la

bouche. *Caryza avec éternument. *Epistaxis.

Visage. - Chalcur et rougeur du visage, surtout des joues et du lobe des oreilles. - *Teint pale, terreux, parfois janue noiratre. *Visage abattu avec yeux enfoncés et cernes, et nex pointu = *Visage bouffi. - *Douleurs rhumatismales au visage. - *Lèvres dessechées, notratres. - *Lèvres gercées. -Gonflement des lèvres. Pustules brulantes, demangeantes, aux lèvres et a la langue. - Douleurs et gonflement des glandes sous-maxillaires.

Odontalgie avec douleurs tressaillantes ou tractives provoquées par le grand air ou le courant d'air. *Douleur sourde et pénible dans les dents cariées. — *Odontalgie pulsative. *Les maux de dents se manifestent principalement après le repas et la nuit, et sont soulagés par une forte pression ou en serrant les dents; un leger contact les aggrave excessivement. - Dents branlantes ne causant de douleurs qu'en mâchant. - Dents recouvertes d'un enduit noir.


Bouche. Sécheresse de la bouche. Bouche pâteuse, avec goût fade, aqueux — "Langue fendillée, noire ou "chargée d'un enduit jaune ou blanc. Lancinations brûlantes dans la langue. Gonflement douloureux de la langue vers la racine. Manque

de la parole Ecoulement de sang par la bouche.

Gorge. Sécheresse de la gorge. Elancements dans la gorge, surtout en avalant, provoqués par le moindre courant d'air. --

Gonfiement du palais et de la luette.

Appétit. - *Gout fade, muqueux ou aqueux, surtout après avoir bu. - Gout trop salé, ou *insipidite des aliments. Gout dou-ceâtre dans la bouche. *Gout acide ou amer de la bouche, ceatre dans la bouche. ninsi que des aliments et des boissons. — *Répugnance pour les aliments et les boissons avec sensation de plénitude. - Goût zigre du café et du pain de seigle. Goût amer de la bière et du pain de froment. - Dégout pour le beurre, la bière et le café. - Grand désir de vin - Dégout de l'eau avec desir de la bière. - *Soif ardente; on boit souvent, mais peu à la fois. Boulimie, avec gout fade dans la bouche, nausées et envie de vomir.



CHUNA.

225

-- Voracité. — Appétit seulement pendant qu'on mange, avec indifférence pour tous les aliments. — *Désir de divers aliments et convoitise confuse de friandises, sans qu'on sache exactement laquelle. — Après chaque gorgée d'une boisson, horripilation ou frissons avec chair de poule, élancements dans la poitrine ou coliques. — Renvois aigres et dérangements de l'estomac, après avoir pris du lait. — *Grande faiblesse de la digestion; *après le repas le moins abondant, malaise, envie de dormir, grande plénitude de Pestomac et du bas-ventre, lassitude et paresse, goût fade de la bouche, humeur hypocondriaque et mal à la tête. — *Renvois amers, acides ou sans goût, surtout après avoir mangé. — On ne digère pas du tout, après avoir soupé tard.

Insternac. — *Renvois, surtout après le repas, le plus souvent amers, acides ou sans goût. — *Renvois avec goût des aliments. — *Pyrosis, accumulation d'eau dans la bouche, vomitprition et pression à l'estomac, dès que l'on a mangé la moindre chose. — *Vomissements acides, de glaires, d'eau et d'aliments. — *Vomissements de sang. — *Pression à l'estomac et douleurs crampoides, surtout après avoir mangé. — Sensation d'excoriation et pression

à l'épigastre, surtout le matin.

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres. — *Douleurs lancinantes et pressives dans la région hépatique, surtout au toucher. *Dureté et gonflement du foie. — *Gonflement et dureté de la rate. — *Elancements dans la rate. — Tranchées dans la région ombilicale, avec horripilation. — Forte presison, comme par un corps dur et plénitude dans le ventre, surtout après chaque repas. - *Gonflement hydropique du ventre avec souffrances asthmatiques et toux fatigante. — Gonflement partiel du ventre, comme par une ascite enkystée. — * Ballonnement excessif du ventre, comme par une espèce de tympanite. — Dureté du ventre, comme par induration des viscères. — Colique avec soif inextinguible. — Coliques excessivement douloureuses; douleurs crampoides et constrictives dans le ventre. — Inflammation et ulcération des viscères abdominaux. — Coliques pressives, lancinantes (sous le nombril), surtout en marchant vite. - *Incarcération des flatuosités; elles ne sortent ni par en baut ni par en bas. — *Coliques venteuses dans la profondeur du bas-ventre, avec contraction des intestins et affinence de fiatuosités jusque dans les hypocondres. — Sortie de vents fétides. — Pression vers l'anneau inguinal, comme si une hernie allait sortir.

Selles. — Selles peu abondantes et s'évacuant lentement. — Évacuation difficile de selles molies, comme par inactivité des intestins. — «Selles fréquentes, de la consistance de la bouillie, ou écumeuses. — *Évacuations putrides ou bilieuses. — *Diarrhées muqueuses, aqueuses, jaunâtres. — «Diarrhée après avoir mangé des fruits. — *Selles diarrhéiques, avec excrétion de tous les aliments non digérés. — «Diarrhées sans douleur», mais nvec



CHENINUM SULFURICUM.

229

duad, digit, ferr. ign. ipec, merc mosch, m-mosch n-vom, op puls, sulf. tart, veratr.

Antidotes . Voyez parini les medicaments ci-dessus.

AVIS CLINIQUES. - Rhumatismes aigus?; Douleurs et affections arthritiques?: Nécralgies, surtout avec periodicité ou intermittence? A Symptomes scrofuleux?, Hemorrhagies?, Spasmes periodiques de la tete, du visage et des bras?, Eclai psie?; Épilepsie 2; Paralysie, Apoplexie, même sércuse; Hemplegie ?; Asphyxie et; Faiblesse, surtout apres des maladies aigues, des fievres, des rhumatismes?: Faiblesse et amaigrissement chez les vieillards; E. ysepèle, Erysipele gangreneux?, Hydroposte?; Ictere?; Soutes de la morsure de la vipere ?; el'heères ichoreux. - Esprehure des malades alites (decubitus)?, Ulcères carcinemateux; Fières intermittentes ???; Fièvres des cufants, Fièrres automnales avec splenalgie?. Fierres intermittentes avec inflammations, hydropisie, affections hépatiques? Fièrres pernicieuses?, Fièrres exanthématiques?; Fi vres hectiques?; Fièrre jaune; Fièrres nerveuses. éréthistiques ou torpides?; Fièvres typhordes avec pétechies et affection prédon inante des systèmes cérebral et nerveux; Fièvres lentes?; Debrum tremens: M.graine, Céphalalgie rhumatismale, nerveuse, périodique ou intermittente?; Hydrocephale aigue?; Héméralopie??; Prosopalgies intermittentes ?; Affections scorbutiques des geneives?. Angines, surtout avec deglutition difficile. constriction, hydrophobic'r; Dyspepsies, nerveuses, ou avec amaigrissement, fièvre étique, etc., ou encore avec vemiturition, romissements, coliques?; Colique renteuse?; Metéorisme, Selles involontaires ??; Rétention d'urine ??; Incontinence d'urine, Symptômes de la pierre??. Diabète?; Metrorrhagies?; Flueurs blanches?; Avertement?: Convulsions des femmes enceintes, ou pendant les couches ??, Frevre pucrpérale ? : Coqueluche ??, Croup ??; Phthisie laryngee??; Toux grasse?; Toux grasse à la suite de la rougeole; Phthisie muqueuse?; Phthisie adynamique avec expectoration purulente abondante, manque de force, fievro vers le soir, et sueurs nocturnes?: Souffrances asthmatiques sans toux?: Augine de cœur??; Pulsations de cœur intermittentes??, Myélite?, Marasme dorsal, surtout après des pertes seminales????, Paralysie des membres (supérieurs ou inferieurs); Scintique??

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Agit premièrement sur le système nutritif, puis sur les autres ; affecte principalement le canal intestinal, puis le cerveau, les organes génitaux et urinaires ; enfin, les extrémites et la peau. Douleurs pressures ; élancements ou douleurs incisires, d'ul urs pulsatives, tensives, brû-





CHININUM SULFURICUM.

lantes et expansives. — Déchirements tractifs ou tressaillants.— Craquement dans les articulations. - Déchirements, surtout dans les jambes : tressaillants dans les membres, tractifs dans les mains, les pieds, le front, etc. — Aggravation des symptômes tous les deux jours, on bien tous les jours à la même heure. — Tous les deux jours, il y a (entre autres) : Traction dans le front avec anorexie et selles en forme de bouillie; douleur frontale le soir, ou bien après midi et avec chaleur, soif et sueur. - Crises merveuses; surexcitation nerveuse, avec anxiété, lassitude, et mêmes symptômes hystériques. — Spasmes dans les membres; convalsions du côté gauche, avec vomissement de bile, diarrhée, congestion à la tête et céphalalgie effroyable. — Paralysie, d'abord d'un seul côté, puis générale. — Lassitude : avec baillement continuel; avec incapacité de travailler et horreur du travail; avec tremblement des membres; grande faiblesse et caducité. — Amaigrissement, même avec fièvre bectique, anorexie, constipation, ventre tendu, pression dans la région ombilicale, nausées, vomiturition et démence ; Amaigrissement et hydropisie. Tremblement des membres, surtout des pieds, avec endolorissement des malléoles, tremblement avec froid général.

Pean. — Peau flasque, on très-sensible au toucher. — Inflammations gangréneuses; rougeur livide de la peau, avec formation d'une membrane gélatineuse, on de croûtes superficielles. — Formation d'une croûte épaisse, livide et humide, qui devient noire et sèche, aux bords d'abord rouges et suintants, puis jaunâtres

et se ramollissant.

Bommeil. — Bâillement fréquent, surtout le soir; ou bieu avec pendiculations, frissons, oppression, bras meurtris, douleur au dos, et sensibilité des vertèbres cervicales et pectorales à la pression. — Envie de dormir le jour. — Sommeil profond et non ventaurateur, agité, avec sueurs débilitantes, jactation et rêves extraordinaires. — La nuit au lit, forte chaleur, avec grande soif, mal de tête et tintement d'oreilles; insomnie parfois avec sueur abondante, ou bien avec chaleur sèche, picotement dans la

peau et sueur à la face.

Symptômes fébriles. — Froideur des membres parfois avec tremblement, sensation de froid avec tremblements intérieurs, face pâle, envie pressante d'uriner, et urines pâles le soir. Frissons, même par un temps chaud; frisson grelottant après midi, avec chaleur à la face et urine spastique déposant des cristaux; frisson le soir, avec pouls accéléré, fréquent, sécheresse de la bouche, soif, sommeil agité, et dépôt couleur de brique dans les urines. — Accès fébriles avec vertiges, éblouissement, douleur frontale, amertume du pain, nausées, vomissements, diarrhée, coliques, frisson violent, forte chaleur, bâillements, éternument et sueur abondante; accès violents avec frisson grelottant, sueurs abondantes, hémorrhagies et douleurs dans l'hypocondre gauche



CHININUM SULFURICUM.

Accès de la durve d'une heure, composé de pâleur, frisson et harrimbation, avec levres et ongles bleuatres et pouls spastique et e ntracte, puis chaleur general avec r ugeur d'ha face, pouls plus developpe qu'il n'était d'abord) et soif, cann sueur legere. Pendantles frissons, paleur du visage cephalalgie, tintement d'oreilles, soif, appetit augmente, selles difficiles, douleure uses, et grand accablement moral, Chaleur exteriours avec secherose de la bouche et de l'arriere-gorge, e ustipation apmatre, et disposition a tember en marchant dans les rues, ou ben avec sueur à la postame, raugeur de la face, mouvements convulsifa des muscles, et pails frequent. - Chalear qui passe à la sucue, principalement le soir. - Pouls : lent, surtout après inidi, ou dans les accidents peri diques, plein ou petit, mais souple et lent; /réquent, comme les battements de cœur; acceléré, surfout le matin, ou une houre apres le dincr (d'est-a-dire, apres le diner pris a mi li, comme en a l'nabitude de le taire en Allemagno ou ce me licament a éte etu lie) Sueurs faciles a provoquer, visqueuses, ruisselantes a la poitrine, debilitarites, avec epuisement prompt, apres chaque effort.


Moral. Anxiete par acces, grande angoisse, parfois le matin au lit et forçant a se lever plus tot qu'on ne voudrait; — ou bien apres minuit, avec cris et besein de se lever. — Grand accablement moral; mélancolie tacitume de couragement, envie de pleurer et desespoir. — M cosité et mauvaise lamour avec baillement et horreur du travail. — Grande paresse avec l'assituée — Excitation comme après avoir pris du cafe ou comme causee par le

vin. Gran le gaiete.

230

Intelligence finale, avec faiblesse qui fait tomber, grande chaleur a la peau, secheresse de la bouche et de la gorge, et constipation. Incapacit de prenoncer les substantifs, et réflexi n lente - Sensation de ride dans la tete, avec chaleur it la face, soif, ou fintem let dans les croilles; - toto entreprise, aver baardonnenant dans le desans, au avec ivresse et laardeur; - stapem avec cephalalgie dans le côte gauche lu front, espèce d'rage dans la tite, emp chant presque de marcher, avec impossibilite de diriger les membres à volonte - Delires, -Forte exaltation et espèce de demence - Vertiges, en se baissant, tournoyants, comme si la têt allait tomber en arriere. aggraves par le me evement, mein tres lorsqu'on est carche; comme par ivresse, avec board on mout dans les oreilles, chaleur à la peau, et peuls accelere, avec cephal dgie et étourdissement. Tête. - Cephalalyce suct at le sice, ca bien en n'archant au soleil; avec lassifud , baill n'eat, cuvie de dormir, et morosite; douleur sourde, avec stadite, at goisse, sueur, tremi lement des membres, et pours lent, du cote gauche surtout, avec palsation des arteres temporales, grande excitation du corps, face pale, soif violente, nausées, faiblesse des pieds, et sueur generale; dans





la tempe gauche, avec besoin de se concher et amélioration 🗪 appuyant la tête sur des endroits frais, - Céphalulgie frontale : le matin en se réveillant; le soir surtout; - après midi, avec lourdour de la tête, et chaleur à la face ; — avec tintement dons les oreilles et chaleur générale, ou bien du côté gauche, avec vertiges, appétit augmenté, soif, rapports, nausées, flatnosités, et grande lassitude; — douleur au front et dans les tempes, avec pulsation des antères temporales, chaleur à la tête, tintement dans les oreilles, soif fréquente, urines abondantes, anxiété et grande lassitude. — Pression dans la tête; dans l'occiput, éveillant la amit et disparaissant en se levant ; dans le front et les erbites, aggravée en tournant la tête ou les yeux; depuis le matin jusqu'an soir, avec chaleur au front. — Douleur expansive, surtout dans la région temporale, aggravée par le mouvement et au grand air ainsi que la nuit, avec sommeil dérangé. — Pulsation dans la tôte. — Bouillonnement vers la tête, le soir, surtout avec pulantion des artères, douleur comme si la tête allait éclater, chaleur à la face, vertiges, tintements et bourdonnement dans les oreilles, dureté de l'oule, étincelles devant les yeux, pouls accéléré et fréquont, sommeil agité et plein de rêves, et sortie fréquente de vants par le haut et le bas. — Sensibilité du cuir chevelu.

Your. — Sensibilité des yeux avec larmoiement. — Vue trouble comme par un brouillard, avec sécheresse des yeux. — Étincelles devant les yeux; taches noires, et parfois l'un ne voit qu'un seul côté des objets; obscurcissement de la pue, surtout en fixant un

objet; - Amaurose passagère.

Orailles. «- Tintement dans les oreilles; bourdonnement, surtout dans l'oreille gauche, parfois jusqu'à la surdité de ce côté; dureté de l'ouie, parfois avec mal de tête violent.

Hes. — Saignement fréquent au nez; — éternument fréquent.

Pace. — Couleur pâle, mauvaise mine; air souffrant, avec yeux enfoncés. — Fuce terreuse, avec blanc des yeux sale, et yeux ternes. — Teint ictérique. Rougeur de la face, parfois avec chaleur autour des yeux et larmoiement à l'aspect de la clarté. — Chaleur de la face, surtout le soir, ou bien comme après avoir pris du café. - Lèrres bleuâtres; éruption à la levre supérieure.

Boncho. — Sécheresse: avec chaleur, soif, odeur animale de la bonche, et sensation de constriction dans l'esophage; — de la bonche et de l'arrière-gorge, avec constination et intelligence faible. — Grande pâleur de la cavité buccale; érosion aux gencires et aux parois de la cavité buccale, avec douleur violente et croûtes gangréneuses. — Accumulation de mucosités dans la bouche, avec angine nocturne; sécrétion de salive augmentée; salivation. — Langue chargée de mucosités blanches, jaunes dans le fond; — enduit épais d'un blanc jaunûtre; — anduit jaunâtre, surtout à la racine, ou bien avec langue soche.

Gerra. - Douleurs dans la gorge : en avalant, le matin en se



CHINENUM SULFURICUM.

232


Tevant; en avalant et en remuant le cou, violentes le matin; chatouillement dans le gosser et le larynx; quattement dans la gorge, quelquefois avec élancements, on bien avec voix rauque (apres midi), sensation de secheresse dans la fossette du cou, avec sensation comme s'il y avait un corps étranger; brûlement de la gorge. — Accumulation de mucontés resqueuses dans la gorge, quelquefois surtout la nuit, réveillant et forçant à tousser.

Appétit et Goût. Goût amer, quelquefois avec langue nette, pâteux, fade; gout de terre; empyreumatique. — Le pain parat amer. Absence d'appétit, quelquefois durant plusieurs jour; indifférence pour les aliments et les boissens; absence d'appêtit avec faim plus forte. — Fort appétit avec goût desagréoble des aliments, ou bien avec forte soif (quelquefois surt et le soir). — Faim avec abattement, comme par le jeûne, avec ben appetit ou manque d'appétit; forte faim quelquefois après un repas copieux, se transformant en fudeur et nausces; faim après le souper, accompagnée de nausées, houlimie, quelquefois la nuit.

Symptômes gastriques. Renrois apres le repas, avec pression dans le ventre et l'estomac et oppression de la poitrine; à vide, quelquefois avec nausees; amers. — Hoquet et vomiturition — Nausees: avec renvois (à vide ou amers), mouvements dans le ventre et émission de vents; après le repas avec renvois violents. — Dégoût avec maux de tête; dégoût avant le repas; avec nausées, vomissement, cephalalgie, insomnie, bouleme nocturne, appêtit diminué, et langue chargée, jaunâtre, sèche; après le repas, avec vomissement et amertume crossante de la bouche; nausées avec envie de vomir. Vomissement: pendant une fièvre intermittente; avec pression à l'estomac; arec dégoût, pyrosis, sensation de capstriction à l'estomac, et enflure du ventre qui dure plusieurs jours; vomissement fade après midi.

Estomac Plénitude d'estomac et tension du ventre. Pression à l'estomac : avec vomiturition, borborygmes dans le ventre et selles liquides; après tout aliment, même le plus leger, agitant la nuit; dans le creux de l'estomac, avec diminution de l'appétit — Cardialgie (crampes d'estomac), quelquefois arec envie de vomir. — Douleur tiraillante dans l'essophage, avec borborygmes dans le ventre et émission de vents — Sensation de chaleur dans le creux de l'estomac et la région précordiale jusque dans le duodenum, avec renvois à vide, ardeur dans l'estomac partant du cardia et s'étendant jusque dans le ventre 'et la poitrine.

Hypocondres. — Dans les hypocondres : tension, pression dans les précords. — Dans la région hépatique : douleurs, quelquefois surtout vers le soir ; pression soulagée, en appuyant dessus : sensation comme d'ulceration sous-cutanée : qonflement. — Dans la région splénique : douleur sourde se dissipant en appuyant dessus ; douleur pressire, tension qui oblige a desserrer les vête-



CHININUM SULFURICUM.

ments (quelquefois dans les deux hypocondres); clancements, gonflement, avec élancements douloureux en marchant et en appuyant dessus. — Gonflement et dureté des régions splénique et hépatique, avec élancements, surtout en respirant profondé-

ment, en éternment, etc.

Fentre. — Douleurs dans le haut du ventre, depuis la région de l'estomac jusqu'à l'ombilic, aggravées en appuyant dessus; coliques violentes, coliques le matin vers la région de l'estomac; déchirements dans le ventre avec pouls fréquent, petit, irrité. — Tranchées dans le ventre : sans évacuation, dans le haut du ventre, quelquefois avec forte lassitude ; dans le haut du ventre et la région ombilicale, quelquefois le soir avec vents et monvements dans le ventre; avec selle diarrhéique fétide, en bouillie, et émission de rents fétides, quelquefois surtout le matin en se levant. - Ballonnement du ventre, quelquefois avec tension. renvois et émission des vents. -- Tension du ventre avec douleur en pressant dessus, quelquefois, le soir surtout, avec incarcération de flatuosités, ou bien avec émission de vents fétides. — *Coliques flatulentes, ogonflement météorique. — Mourements dans le ventre comme pour une diarrhée, avec émission de vents, forts mouvements dans les précords avec ballonnement du ventre, borborygmes dans le ventre, émission de vents. — Inflammation de longue durée de la membrane muqueuse des intesties. - Phthisie intestinule, avec nausées, vomiturition, absence d'appétit, ventre tendu, pression persistante dans la région ombilicale, constipution, amaigrissement, flèvre étique et aliénation.

Selles et Auns. — Constipation opiniatre, avec forte chaleur de la peau, sécheresse de la bouche et du palais, imagination affaiblie et chute dans la rue, momentanée, alternant avec selles fréquentes, selles blanches en bouillie. — Selles dures, manquantes, paresseuses, quelquefois hachées; selles molles, difficiles à éva-cuer, quelquefois arec besoin ou bien avec sensation comme si un objet remontait depuis la main jusqu'à l'épaule. — Besoin d'aller à la selle, quelquefois sans effet ou bien avec tranchées et suivi d'une évacuation. — Evacuation abondante, molle : quelquefois apec émission de rents abondants, ou bien (le matin après le lever), avec selle fétide. - Plusieurs selles dans la journée; diarrhées, quelquefois avec tiraillements et douleurs incisives Faiblesse des intestins abdomidans les intestins grêles. naux, avec langue nette ainsi que les premières voies. — A l'anus, sensation de chaleur gagnant le reste des intestins abdominaux. - Augmentation des mouvements hémorrhoidaux, prurit au rectum et ténesme : écoulement de sang artériel par l'anus; flux de sang par le rectum.

Voice urinaires. — Besoin d'uriner avec émission abondante d'une urine comme de l'eau. — Augmentation de sécrétion et



CHININUM SULFURICUM.

d'émission d'urme. — Urine : saturée, qui dépose des cristaux. comme du petit-lait; pâle, claire, avec besoin fréquent; prévédée de bullonnement du centre, avec géne de la respiration, chez les hydropiques; abondante, saturée, qui est trouble on bien a une très-forte odeur d'urine. Diminution des urines, quelquefois saturées et avec des cristaux. - Urine trouble, rouge, ou bren d'une forte odeur d'urine, se troublant promptement, avec flocons muqueux, derenant jumenteuse avec sédiment jaune sablonneux et sédiment couleur d'argile et gras ; se décomposqué facilement, avoc cristaux. — Comme de l'eau (spastique), quelquefois avec cristaux. - Urme écumeuse, avec sédiment fin, blanc jaunâtre, en se refroidissant. — Sédiment : blanc jaunâtre, d'odeur forte; couleur d'argile, d'une urine claire comme do l'eau; jaune rougeatre dans les urines abondantes; forte, couleur de brique. — Gravelle. - Cristaux dans les urmes : abondants avec sédiment jaunatre; clairs comme de l'eau, avec sédiment couleur d'argile venant d'une urine claire comme de l'eau; avec sédiment jaune rougeatre et urines plus abondantes; dans une urine saturée et plus rare. — Apres avoir urmé, le soir, cuisson contractive à l'orifice de l'urêthre.

Parties génitales. — Appétit vénérien, supprimé, diminué. — Pression douloureuse se portant vers les aines. — Règles trop hâtives. — Pendant les règles, saisissement et serrement dans le ventre, remontant de l'ombilie dans la poitrine, avec pression se portant vers les aines. — Écoulement de sang par le vagin avec ardeur et turgescence de cette partie à la suite de leucorrhée

pendant la menstruation.

234

Larynx. — Enrouement, tous les après-midi (4 heures), avec constriction, ou bien gonflement qui ferme la gorge, irritation qui fait tousser, géne de la respiration, douleurs dans le front, chaleur à la tête, pouls accéléré, fréquent, mou, pression dans le haut du ventre, et surtout à l'hypocondre gauche, émission de vents fetides, urino saturée qui forme des cristaux et douleur d'une vertèbre pectorale en appuyant dessus. — Irritation qui faut tousser, dans lu gorge, quelquefois avec expectoration difficile; forte toux tout le jour, ou bien le soir, difficile à détacher jour et nuit; toussieulation sèche; toux grasse; expectoration de mucosités gélutineuses en toussant.

Poitrins. Respiration courte et gênée, en se donnant beaucoup d'exercice; oppression de poitrine; respiration gênée, avec ballonnement du ventre, disparaissant rapidement après avoir uriné.

— Accès d'étouffement nocturne (angin. ademat. lymph.), vers minuit, avec gonflement de la gorge, qui est presque fermée, respiration génée, ronflante, haletante, sueur sur tout le corps, avec frisson général (surtout au dos); pouls leut, petit, mou; douleur en appuyant sur une vertèbre pectorale; accumulation de mucosités dans la bouche; forte faine, qui oblige à manger; émis-



CHININUM SULFURICUM. — CHLORUM.

sion abondante de vents; sommeil paisible après l'accès et disposition des symptômes à reparaître par une toux soutenue. --Douleurs de poitrine, au côté droit, toute la matinée, douleurs au travers de la politime. — Pression dans le côté gauche de la poitrine, douloureuse surtout en respirant profondement, et en retirant le bras en arrière, soulagée en appuyant le bras et en se courbant en avant. — Sensation comme el on était saist par une main derrière le sternum. — Elancemente dans la poitrine : vers le cœur, immédiatement après le repas; dans le côté gauche *de la politime,* empêchant de respirer profondément ; qui semblent vouloir sortir de la poitrine, surtout en étant couché ou assis, se dissipant en marchant ou detant debout; dans le côté droit de la poitrine, remontant vers l'épaule, coupant la respiration, et soulagés en se penchant en avant; douleurs lancinantes au-dessous du sternum, en respirant profondément et par des mouvements rapides. - Palpitations de cœur. - A l'extérieur de la poltrine, élancements picotants dans la peau (quelquefois au dos et aux cuisses, le soir), en marchant au grand air, suivis de tranpiration à la poitrine et au dos.

Das. — Boins. — Extrómitós. — Sensibilité douloureuse des rertèbres pectorales, en appuyant dessus, surtout pendant le frisson de la fièvre. — Au cou, douleur des deux côtés des nerfs jugulaires, se portant vers le larynx, avec sensibilité à la pression; gonflement indolent au cou. — Au bras, sensation après chaque selle, comme si des gouttes glissalent depuis la main jusque sons l'aisselle. Paralysie des extrémités supérieures ; Teraquement de l'articulation de l'épaule; déchirements et tirnillements dans les mains. - Paralysie des extrémités inférieures : déchirements dans les jambes; sensibilité douloureuse des malléoles et tremblement des membres; gonflement œdémateux des pieds.

CHLORUM.

CHLOR. - Chlore, - Archives de Stapf. - Hist. nat. et prép. Pharmac.

homocop., p 96.
ANTIBOTES: Contro des effets toxiques: le blanc d'auf?, du lait?, de la farme?, de la magnésie?, de la craic?, des vapeurs d'alcool?, de l'alcool pris sur du sucre?, de l'hydrogène sulfurenz, attenué. — Sert d'autidote contre l'acide hydrocyanique et les hydrosulfates des substances ammonia-

GENERALITES. - Paraît exercer une action particulière sur le système des membranes muqueuses. — Ches les personnes habituées aux vapeurs du chlore, les effets de cette substance consistent en faibleme et disparition de la graisse. - Enroidis-



CHLORUM.

286

sement des membres — Tremblement. — Lassitude. — Envie de rester couché. — Faiblesse dans les extrémites inferieures. — Au grand air : larmoiement; amélioration des souffrances de poitrine, et du frissonnement ainsi que de la fievre en se promenant. — Horripilations plus fortes au soleil. — Le maten. Réveil vers les 3 heures, avec angoisse, gout de la bouche, comme dans la fièvre, faiblesse dans le ventre, diarrhee; eternument; larmoiement; roideur des membres, difficulté de se lever; humeur trascible. — Après mult — Eculement du nez, plus indisposé après le repas. — Le soir. Moins d'appétit; coryza subit, attaque de toux; horripilation, frissonnement. — Paraît agir plus promptement quand il est pris le soir.

Peau. — Peau du nez e mine execriée. — Applique sur la peau, le chlore produit une sensation semblable à la piqure d'insectes, avec transpiration abondante, congestion de sang à la peau, et même éruption de petites nodosités et de vesicules. — Produit des éruptions dartreuses et des sueurs critiques, — Gale et dar-

tres. - OUlcères fétides et carcinomateux.

Sommeil. — Sommeil tardif, après chaque excitation de l'esprit, les premiers jours: plus tard, sommeil le soir de bonne heure. — Le matin, difficulté de se lever et mauvaise humeur. — En s'eveillant le matin vers les 3, 4 heures, sensation comme si une grave

maladie allait se déclarer.

Pièvre. Frissons, harripilation et grelottement le soir dans la chambre chaude — Horripilation le matin, plus forte au dos et augmentée au soleil. — Fievre le matin vers les 10 heures jusqu'à 2 heures du soir; horripilation froide à la partie antérieure des bras, du dos et des cuisses, avec trouble de la vue, et mal de tête avant l'acces; puis, après le repas, augmentation de la chaleur et malaise qui force à se coucher, quoique la promenade dans la chambre produise plus tard du soulagement. — Chaleur pendant et après le repas, avec humeur très-irascible — Chaleur dans l'estomac et dans les voies aériennes. — Fièvre et rhume de cerveau. — Produit des crises par la sueur. — Typhus?, ofièvre scarlatine?, osueur chez les phthisiques améliorée.

Moral très-fatigué, jusqu'au point de craindre de devenir fou, de ne pouvoir faire face a ses affaires, tout paraît confus, avec impossibilité de se rappeler rien. Grande difficulte de se rappeler le nom des personnes qu'on voit, ou bien de se rappeler les personnes en voyant leurs noms. — Accès d'une grande augoisse — Très-mauvaise humeur et grande irascibilité, surtout

le matin.

Tôte. Vertiges et étourdissements - Sensation douloureuse et futigante dans le vertex et le long du côté gauche de la tête, avec besoin de se coucher. — Mal de tête avec le rhume, avec les horriphlations, et après le repas.

Youx. - Larmoiement, surfout au grand air, le matin au réveil et



CHLORUM.

237

pendant le rhume. — Yeur proéminents. — Vue trouble pendant la fièvre.

Oreilles. — Tintement dans les oreilles.

Non. — Membrane muqueuse du nez sensible. — Sensation comme si les angles du nez étaient excoriés. — Écoulement d'une eau corrosive du nez. — Sécheresse du nez, ou sensation d'une sécheresse étouffante; avec excitation à la toux dans le larynx, se transformant plus tard en coryza. — Corysa violent, avec forte affection de la membrane muqueuse du nez et de la bouche. — Écoulement de la narine droite, avec obturation de la narine gauche. — Le soir, subitement, écoulement de sérosités corrosives du nez, avec obturation du nex, larmoisment et sécheresse de la langue, du palais et de l'arrière gorge. — Le matin, violent éternument, après le coryza du soir. — An bout de vingt-quatre heures, le coryza se transforme en sécrétion d'un mucus jaune, comme ceiui d'un rhume mûr.

Face. — Teint plus coloré. — Face boulle.

Dents. - Sensation de plénitude dans les dents.

Bouche et Gorge. Membrane muqueuse de la bouche fortement affectée. Excoriation et petits ulcères dans la bouche, la gorge et le pharynx, avec rougeur. — Impossibilité d'avaler. — oUlcères putrides à la gorge?, cangines, malignes?. — Sécheresse dans la bouche, à la langue, au palais et dans la gorge, sans soif; beaucoup de glaires dans la bouche. — Salivation.

Appétit et Goût. — Appétit pour le vin angmenté. — La fumée du tabac répugne et produit une sensation mordicante à la langue et de la sécheresse à la gorge. — Vomissement de matières

brun verdâtre, cris et mort (chez un chien).

Estomac. — Agit sur la membrane muqueuse de l'estomac comme un excitant. — Aigreurs de l'estomac chez les ouvriers en chlore. — Après la mort, membrane muqueuse de l'estomac d'un rouge noir ou cerise; au pylore, taches noires avec des croûtes ou des trous; ulcères d'un bord jaunâtre au fond de l'estomac.

Ventre. Faiblesse dans le ventre le matin. — Affections non inflammatoires du foie?. Après la mort, couche épaisse et jaune (de bile) dans le duodenum et le jejunum. — La qualité de la


bile se trouve altérée.

Selles. — Selles diarrhéiques, le matin surtout.

Urines. — Envie fréquente d'uriner. — Urines plus abondantes.

Partice génitales. — Impuissance subite, voire même répugnance complète pour toute jouissance sexuelle; les plus fortes excitations laissent froid (après la cessation de la cause, totalement enlevée par lycop., ce qui prouve combien il était absurde de vouloir nier l'action du lycopode, comme certains soi-disant critiques avaient en l'arrogance de le faire. (Note du docteur Hering.) — Syphilis?.

Laryan et Tour. - Accès de suffocation et toux, mivis souvent



CHLORUM. — CICUTA.

d'un rhume opiniatre. - Irritation violente dans le laryne, la trachée-artère et les bronches, avec oppression et pression à la poitrine, impossibilité d'avaler, sensation d'un plus grand bien à l'air libre (cependant sans diminution de l'oppression et de la constriction), grande angoisse qui ne permet de prononcer que des paroles entrecoupées, respiration difficile, forte affection de la membrane muqueuse du nez et de la bouche, accumulation de mucosités dans la bouche, coryza violent, face bouffie, yeux proéminents, toux spasmodique (allégée par la respiration d'acide hydrosulfurique). - Sensation d'étranglement et de constriction de la poitrine (par la respiration du chlore). - Inflammation de la membrane muqueuse des bronches. - Produit des kémoptysics, la phthisie et la mort, lorsqu'il est respiré en grande quantite; en moins grande quantité, il produit la toux et des oppressions, ou bien une sensation de chaleur dans les voies aériennes et des expectorations plus faciles. — Spasme dans la glotte.

Poitrine. — Oppression de la poitrine, gêne de la respiration, construction de la poitrine et accès de suffocation, parfois avec tous violente. — Après la mort, cœur rempli de sang veineux, les plèvres convertes de fausses membranes, et contenant des sérosités rougeâtres.

Trono. — Mouvements convulsifs violents du cou et de la colonne vertebrale, tirant la tête en arrière. — Le matin, moins de roideur au dos, comme autrefois, mais roideur dans tous les membres.

Extrémités inférieures. - Faibleme dans les cuisses.

CICUTA.

. ClC. — Cigué d'eau. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 191. — Dose usitée : 80. — Durée d'action : jusqu'à 4, 5 semannes dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES . Arn. tabac (en cas d'empoisonnement). — La cigué est antidote de : On.

Go: Op.

Comparen avec : Ara. con. lyc. merc. op. puls. thui. sil. verstr. -- C'est surtout après lach que la ciguë se montre efficace, lersqu'elle est d'ailleurs indiquée.

CLINIQUE. — Se laiseant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Convulsions, spasmes hystériques, épilepsie, éclampsie, catalopsie, tétanos, trismus, et autres affections spasmodiques, surtout chez les femmes et les cufants, ou par abus de l'opium; Suites ficheuses de l'introduction de corps étrangers (d'une écharde, etc.), dans les parties molles; Durtres humides et croûteuses; Congestions et autres



CICUTA.

affections cérébrales, aussi par suite de commotion du cerveau; Teigne; Amblyopie amaurotique, avec affection cérébrale; Hémorrhagie des oreilles; Durett, de l'ouie; Osène?; Dartres faciales; Croûtes de lait?; Cancer aux attres ?; Ulcères dans la bouche (après l'emploi de laches.); Triumus; Bégaiement?; Affections gastriques; Affections vermineuses, avec convulsions; Paralysie de la vessie?; Convulsions des femmes en couches; Crampes de la poitrine, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTORES GRARAUX. — Douleurs d'excoristion, ou comme si l'on s'était donné des comps, à différentes parties. — *Tremblement des membres. — *Secousses, comme par des étincelles électriques, dans la tête, les bras et les jambes. — *Contorsions crampoldes et tressaillements des membres. — *Contulsions générales et attaques d'épilepsis, quelquefois avec cris, pâleur ou couleur jaune du visage, servement des mâchoires, étourdissement et distorsion des membres, suspension de la respiration, et écume à la bouche; après l'accès, le corps reste insensible et comme mort. — État d'insensibilité et d'immobilité, avec perte et connaissance et de forces. — *Accès de catalepsie, avec relâchement de tous les muscles, et absence de la respiration. — *Tétaeos. — *Douleurs tractives dans les membres.

Pean. — Démangenison brûlante par tout le corps. — *Éruptions purulentes, avec croûtes jaunâtres et brûlantes. — Boutons leuticulaires d'un rouge foncé. — Prurit brûlant par tout le corps.

Semmeil. — Insomnie et sueur nocturne. — *Demi-sommeil, avec mouvements inquiets et rèves confus. — Réveil fréquent, avec sueur forte mais qui soulage. — Rêves vifs des événements de la journée.

Pièvre. — Frussons et désir perpétuel d'être auprès du feu. -

Froid aux enisses et aux bras, avec fixité du regard.

Meral. — Anxiété et grande facilité à être vivement affecté en entendant des récats tristes. — Gémissements, plaintes et hurlements. — Mécontentement et mauvaise humeur. — Sonpçons et tnéfiance, avec misanthropie. — Disposition à s'effrayer. — Manie, avec danses, rires et gestes ridicules. — Démence. — Étourdis-

cement et absence d'esprit.

Tête. — Vertiges et chancellement au point de tomber. — °Vertiges tournoyants en se redressant dans le lit, avec obscurcissement de la vue. — Ivresse. — Mal de tête au-dessus des orbites. — Accès de céphalalgie semi-latérale, avec nausées. — Pesanteur de la tête, avec étourdissement. — Pression stupéfiante au front. — Diminution des douleurs à la tête, en se redressant et en émettant des vents. — °Mal à la tête, comme par commotion du cerveau. — *Éruptions suppurantes au cuir checelu, avec



CICUTA.

240

douleurs brûlantes. Tressaillements et secousses spasmodiques

à la tête, qui flechit en arrière.

Yeux - Douleur brulante dans les yeux. - *Pupilles ou trèsrétrécies, ou dilatées. *Perte momentanée de la rue, avec vertiges en marchant. - Regard fixe, parsois avec une sorte d'absence d'esprit. - *Vacillement de tous les objets devant la vue.
- *Mobilité des caractères en lisant. - *Diplopie ou obscurcissement des yeux, quelquesois alternant avec dureté de l'ouïe. Cercle lumineux et coloré autour de tous les objets que l'on voit.

*Photophobie. *Agglutination nocturne des paupières.

Oreilles. Sensation d'excoriation et douleur de contusion derrière les oreilles. *Eruptions purulentes devant, derrière et sur les oreilles. — Écoulement de sang par les oreilles. — Ouie indistincte, quelquefois alternant avec obscurcissement des yeux.

Nez. — Douleur d'excoriation et de meurtressure à l'aile du nez. — Croûtes dans les narmes. — Écoulement jaunâtre par le nez. — Obturation du nez, avec sécrétion abondante de mucosités.

Visage. — Páleur et froid du visage, avec mains froides. — Joues pâles, avec yeux cernés et abattus. — Rougeur et gonflement de la face et du con — *Éruption à la face, confluente, purulente et d'un rouge foncé, avec boutons leuticulaires sur le front. — Croûtes brûlantes avec serosites jaunâtres sur la lèvre supérieure, les jones et le menton — Ulcère douloureux aux lèvres. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires. — *Trismus. — *Disposition à grincer des dents.


Bouche et Gorge. — Écume devant et dans la bouche. — Pustules blanchâtres, douloureuses au toucher, et ulcères au bord de la langue. — Parole embarrassée, avec mouvements convulsifs de la tête et des bras à chaque mot que l'on prononce. — Mutisme.

Impossibilité d'avaler ; la gorge est comme fermée.

Appétit. Manque d'appétit à cause d'une sensation de sécheresse dans la bouche. *Satiété et pression dans l'estomac,
après la première bouchée. — Grand désir de manger du charbon. Soif ardente, surtout pendant les crampes — Après le
repas, coliques, tranchées, pression a l'épigastre et envie de dormir.

Estomac. - Hoquet violent et bruyant. - Régurgitation amère et jaunâtre en se baissant, et suivie d'une sensation brûlante dans la gorge. - Nausées le matin et pendant le repas, quelquefois avec mal à la tête. - Vomissement de sang. - Vomissements, alternant avec spasmes toniques dans les muscles de la poitrine et mouvements convulsifs des yeux. - Pression brûlante a l'estomac. - Douleurs pulsatives à l'épigastre, qui est fortement ballonné. Oppression et anxiété dans la région de l'éniquetre.

Ventre. — Collegues avec convulsions, comme par des vers. —
Trunchées, immédiatement après le repas, avec envie de dormir.
— Pincements et borborygmes dans le ventre. — Accumulation



CICUTA. - CINA.

de flatuosités avec angoisse et manvaise humeur. — Donleur d'ulcération dans les aines.

Selles et Urines. — Constipation. — Selles liquides et par trop fréquentes. — Rétention d'urine. — Besoin fréquent d'uriner. — Urines involontaires comme par paralysie de la vessie.

Poitrine. — Enrouement. — *Respiration génée et manque d'haleine. — Toux avec expectoration abondante. — Pression sur la poitrine, comme par un poids, avec gêne de la respiration. — *Spasmes toniques dans les muscles de la poitrine, alternant avec vomissement. — Chalcur dans la poitrine. — Douleur de meurtrissure et d'excoriation à l'extrémité inférieure du sternum. — Douleur de brûlement aux mamelons.

Dos. — Renversement spasmodique du dos. — Tension au-dessous des omoplates. — Douleur d'ulcération aux omoplates. — Tension comme par une plaie dans les muscles du cou, en renversant la tête en arrière. — •Gonflement du cou.

Bras. — Douleur de meurtrissure ou d'excoriation dans les articulations de l'épaule et dans les avant-bras. — Sensation de pesanteur et manque de force dans les bras. — *Tressaillements et mouvements convulsifs dans les bras et les doigts. — Doigts morts.

Jambes. — Tressaillement incolontaire des membres inférieurs. — Roideur douloureuse des jambes. — Tremblement des jambes.

Fléchissement des pieds pendant la marche.

CINA.

CIN. — Armoise d'Alep 'non de Judée). — Harnemark. — Hust. nat. et prép. Yoy. Pharmac. bommop., p. 192. — Doves usuées : 9, 30. — Durée d'action 14 à 21 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

Antidotes . Spec ?. — On l'emploie comme antidote de : Chin.

Companea avec : Arn. bell. bry. catc. caps. cham chin. ser. bep. ignat. ipec. phos. sabad. — C'est surtont après arn et hyos. que le cina se montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des enfants; Faiblesse par suite de perte d'humeurs; Atrophie?; Affections scrofuleuses; Convulsions, épilepsie, éclampsie, et autres affections spasmodiques; Fièrres intermittentes, aussi celles des marais; Affections cérébrales, encéphalite, hydrocéphale aiguê des enfants; Amblyopie amaurotique, aussi par suite de la masturbation; Taches de la cornée; Affections gastriques;



Affections vermineuses. Pissement au lit; Coqueluche, principalement chez les enfants scroful-ux ou souffrant de vers, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

dans les membres — Pression et serrement avec laucinations obtuses ou déchirements crampoides, tirallements et tressaillements, en élancements brûlants dans diverses parties. Conculsions et distirsion des membres. Convulsions épileptiques nocturnes, survies de mal a la tête — Convulsions épileptiques avec cris, renversement sur le dos, et mouvements violents des mains et des pieds. — Roideur tétanique de tout le corps. — La pression extérieure aggrave ou renouvelle les souffrances. — Sensibilité dout ureuse de teus les membres au mouvement et au toucher. — La plupart des souffrances apparaissent la unit, on en étaut assis, et s'aggravent le matin et le soir. — «Lourdeur dans les membres.

Sommell. Baillement fréquent, avec tremblement et horripilation. *Insomme nocturne, avec agitation, pleurs, cris, cha-

leur et angersse.

Fièvre. - Horripilation fréquente avec tremblement, même auprès du feu. *Frèvres quot diennes on étierces, *avec boulimie nausces, langue nette, diarrhées, pupilles dilatées et amaignessement. Frissons le soir - él'erte chaleur febrile avec delire, jactation et agitation. *(haleur, surtout à la tête, avec paleur on couleur jaunatre de la face et yeux cernes, fou avec rougeur des prais. Après la fievre, mal à la tête. Sueur front et aux mains

Moral. *Hum or pleureuse et plaintes. L'enfant pleure lorsqu'on le touche. Inquietu le perpetuelle, avec dont de toutes sortes de choses qu'on rebute quelques instants après. — Grande ang asse et anxiete, en se promenant au grand air. Pelice.

Tôte. Mal a la tete, alternant avec pression dans le bas-ventre.

— Pression étourdissante comme par un fardeau qui pese sur la tete, surteut en se promenant au grand air Céphalalgie déchirante, tractire, aggravee par la lecture et la meditation.

Douleurs si ardes lans la tête, avec yeux fatigues principalement le matin en eveillant.

Yeux. Pression aux yeux en les fatigant par la lecture. —
Mouvements convulsifs les muscles des sourcils. Trouble de la
tue en lesant que disposité es se feott int les yeux. *Papilles
délatées *Vue fa,b! av plot phelie et pression dans les

y ux, com me aid a sable 'y cta't introduit,

Nos. Episteri. Besoon de mettre les do gts dans le nez. — Écoulement d'pas par le nez. Eternament violent, qui provoque une sensation de pression dans les tempes, et semble devoir



244 CIMICIFUGA RACEMOSA. — CINNABARIS.

la main et des doigts. — Faiblesse de la main; elle laisse tont échapper. — Douleurs paralytiques et crampoides, et tiraillements dans les jambes. — Extension crampoide des jambes.

CIMICIFUGA RACEMOSA.


CIMIC. - Christophoriane en grappes. - Voy. HALE, Remedes américains.

Employé avec succès contre les affections suivantes :

Conculsions épileptiformes, pendant ou peu avant l'apparition des règles - Chorée, aggravee pendant les règles, et affectant surtout le côté gauche. Nymphomanie et autres alienations mentales, avec forte surexcitation du système nerveux et du moral. -Méningite cérébrospinale, avec céphalalgie violente, comme si à chaque pulsation du cœur un coin était poussé de la nuque au vertex, avec dos roide, spasmes cloniques et toniques, douleurs violentes dans le globe des yeux et langue enflée. - Prosopolgie, surtout lorsqu'il y a en même temps affection des ovaires la phthisie tuberculeuse, contre les congestions et inflammations pulmonaires, à la suite d'un froid, avec toux sèche et fatigante : ainsi que contre la diarrhée et les sueurs nocturnes Pleurodyme du côté droit, aggravée par le mouvement jusqu'à faire pousser des cris. - Métrorrhagie avec sang coagulé et couleur foncée, douleurs dorsales violentes jusque dans les hanches et les cuisses, humeur pleureuse, surexcitation nerveuse, convulsions hystériques et douleurs violentes dans la tete et le globe des yeux, aggravees par le moindre mouvement. - Suppression des règles, à la suite d'un froid ou d'une emotion merale, avec douleurs rhumatismales dans les membres, céphalalgie violente ou crampes utérines. norrhée avec les mêmes symptômes indiqués a la Métrorrhagie (ci-dessus). - Secatique, lorsqu'il y a affection des ovaires ou de l'atérus - Rhumatonne articulaire des membres inférieurs, avec forte chaleur et enflure des parties affectées. — Douleurs violentes, aigues, dans la tête, les yeux, les oreilles, ou dans le ventre, pendant la grossesse ou à la suite d'une fausse couche.

CINNABARIS.

CINN. — Cinabre - Suifure rouge de mercure. HARNEMANN. — Hist. nat et prép Voy Pharmac. homosop, p. 97. — Doses unitées : 9, 30. — Durée d'action : jusqu'à 3 semaines, dans quelques eas de maladies chroniques.



CINNABARIS.

245

CLIRIQUE. — On n'a encore employé ce médicament que coutre des Excroissances sycotiques, des Flueurs blanches et des Coryzas corrosifs.

SYMPTOMMA GARAGIA. — Froid dans les articulations. —
Tiralliements et horripilation dans les bras et les jambes. —
Douleurs paralytiques dans les membres, avec paresse et envie de
dormir. — Insomnie nocturae qui capendant na fatigue pas. —

Cauchemar après minuit.

Tôte et Nea. — Accès de céphalalgie violente et affreuse, au sinciput et aux tempes, soulagés par la compression de la tête. — Bourdonnement stupéfiant dans la tête, peu après le diner et le soir avant le coucher. — Élancements aux téguments de la tête. — Sensibilité doulourense du crâne et des cheveux au toucher. — Inflammation des youx avec élancements pressifs et larmoiement continu, en les firant sur un objet. — Violent coryna fluent avec sécrétion de sérosités brûlantes.

Bouche et Appétit. — Sensation brûlante, contractive au palais. — Salivation. — Sécheresse et chalcur nocturne dans la bouche et la gorge, avec forte soif. — Contractions pressives dans la gorge, en avalant à vide. — Manque d'appétit avec dégoût pour tous les aliments. — Après le repas, sensation désagréable de gonfement de tout le corps, avec serrement à la poitrine et à l'estomac. — La nuit, chalcur qui monte de l'estomac vers le cou et la tête, et se dissipe quand on se redresse dans le lit.

Selles et Urines. - Selles molles, fréquentes, précédées de pincements dans le ventre. - Diarrhées nocturnes opiniatres, sans coliques. -- Douleur d'excoriation dans l'urêthre en urinant.

Parties génitales. — Gonflement de la verge. — Gonorrhée bâtarde avec rougeur et gonflement du prépuce. — Eruption granulée au gland. — *Condylomes. — Appêtit vénérien fortement exalté et grande disposition au cost acec appêtit prononcé pour le boire et le manger. — Fortes érections le soir au lit. — Eusure fétides et corrosives, entre le scrotum et les cuisses, en marchant.

Poltrine. — Toux sèche, à traits isolés, en étant couché. — Douleurs pulsatives et lancinantes dans la poitrine, surtout en mar-

chant.

Trone. — Déchirement dans le côté du dos, même la nuit en se remuant dans le lit, soulagé par la chaleur du seu. — Douleurs

de luxation dans les vertèbres du cou.

Hembres. — Déchirements dans les bras, en écrivant, soulagés par la chaleur du feu. — Fort élancement dans le bras. – Tressaillement douloureux dans la jambe, le soir, après s'être endormi.



CISTUS CANADENSIS.

246

CISTUS CANADENSIS.

CIST. - Ciste hélianthème. - Hering. - Hist nat. et prép. Voy. Pharmac, homœop., p. 194 - Doses usitées : 1 souffrances serofuleuses, 15 faffections des voies aéricunes.

(affections des votes aéritunes.

Comparent avec Bell carb-veg phos, médicaments qui peuvent être administrés en alternant avec le ciste, lorsqu'ils sont d'ailleurs indiqués.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou ce médicament pourra être consulte contre : — Engorgement des glandes avec suppuration, ulcères et autres affections scrofuleuses; Affection scorbutique des gencives; Otorrhée purulente; Carie de la machoire; Laryngite chronique, etc., etc. Voy. la note, page 15.

BYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Le soir, douleurs aur genoux, à la main droite et à l'épaule gauche — Aggravation des souffrances le matin. — Douleurs tractives dans les parties musculeuses des mains et des extrémités inférieures, avec douleurs aux articulations de la main, des doigts et des genoux. — Douleurs dechirantes et tractives dans toutes les articulations, surtout dans celles des genoux et des doigts. — Clandes engorgées et ulcérées. — Douleur de meurtrissure et sensation de lassitude dans tous les membres. — Pieds froids. — *Disposition frileuse — Frissons violents avec tremblement, suivis de chaleur fébrile, avec oreilles rouges et gonflées et engorgement des glandes du cou. — Chaleur avec soif qui force a boire abondamment. — Prurit sur tout le corps sans éruption. — ('haque alteration aggrave fortement les souffrances. — Suites facheuses d'un chagrin.

Tête et Yeux. Mal pressif a la tête avec pression au-dessus des yeux et au front. Sensation de pesanteur au-dessus des yeux. -- Elancements à l'œil gauche. -- Sensation à l'œil comme si quel-


que chose y tournoyait, avec élancements.

Oreilles. - Gontlement depuis l'oreille jusqu'a la joue - Gonflement dans l'interieur des oreilles. Oreilles bouchées par gonflement, avec ecoulement. Ecoulement de sérosités et d'un pus fetide par les oreilles.

Non. Sensation de brûlure dans la navine gauche. Inflammution et gonflement douloureux de la navine. Éternument sans

coryza mautre cause.

Visage. Sensation comme si les muscles du visage se tiraient de côte. Chaleur et ardeur dans les os du visage. Chaleur pas-



CISTUS CANADENSIS. -- CLEMATIS ERECTA. 24

eagère au visage. — •Érysipèle vésiculaire au visage. — •Carie de la machoire inférieure.

Bouche et Gorge. — Gencives gonfiées, décollées, saignant facilement et d'un aspect dégoûtant. — Mal à la langue, qui paraît comme excoriée. — «Sécheresse de la langue et du palais. — «Démangeaison périodique dans la gorge. — «Chatouillement et douleur d'excoriation dans la gorge, surtout le matin. — Sensation continuelle de sécheresse — et de chaleur dans la gorge. — Sensation insupportable à la gorge, en avalant la salive pour soulager la sécheresse. — «Sensation comme s'il y avait du sable dans la gorge. — «Amélioration des maux de gorge après le repas. — «Douleurs dans la gorge en respirant à l'air frais. — «Sensation de molleuse dans la gorge. — «A chaque émotion, élancements dans la gorge, obligeant à tousser. — *Expectoration difficile de mucosités très-tenaces.

Esterno, Sellos. — Nausées fréquentes. — Douleurs à l'estomac après le repas. — Élancements à l'hypocondre gauche. — Flatue-sités abondantes et sensation de malaise dans le ventre. — Diarrhée passagère. — Diarrhée après avoir mangé des fruits.

Poitrine. — Haleine fétide. — Douleurs au larynx. — Pression sur la poitrine. — Sensation de plénitude dans la poitrine. — Le soir, après le coucher, fourmillement par tout le corps, avec respiration difficile et anxiété soulagées par l'air frais. — Toux excitée par des élancements dans la gorge. — Expectoration de mucosités amères.

Trenc et Membres. — Sous l'omoplate, tache rouge, douloureuse au toucher et suivie d'une éruption érysipélateuse, avec douleurs brûlantes qui s'aggravent au toucher. — Le soir, douleurs violentes à l'épaule et à la poitrine, avec envie de les soulager en y frappant du poing. — Engorgement et suppuration des glandes du cou. — Douleurs à l'épaule. — Douleurs de luxation au poignet, avec douleurs tractives et rongeantes. — Après midi, douleurs violentes à la main, empêchant de s'en servir. — Douleurs aux doigts en écrivant. — Douleurs déchirantes à la cuisse en marchant. — Douleurs aux genoux et à la cuisse en marchant et en étant assis. — Le soir, élancements violents dans l'orteil.

CLEMATIS ERECTA.

CLEM. — Clématite droite. — RAENEMANN. — Hust. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop, p. 196. — Doses unitées: 6, 30. — Durée d'action : jusqu'à 6 semaines, dans quelques cas de maladles chroniques.

Antidores: Bry. camph.

COMPARER AVEC : Bell. bry rhus. sass.



CLEMATIS ERECTA.

248

CLINIQUE. — Se laissant gui ler par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce médicament contre :

— Souffrances par l'abus du mercure; Rhumatisme articulaire; principalement pur suite de gonorrhées supprimées; Éruptions de dartres croûteuses; Exercissances fongueuses?; Ulteres carcinomateux?; Mélancolie?; Migraine et autres especes de céphalalgies?; Teigne?; Ophthalmies chroniques; Cancer aux lèvreu?; Rétrecissement de l'urethre, orchite, engorgement et induration des testicules et autres affections des voles urmaires et des parties genitales, par suite d'une gonorrhée supprimes i tionorrhée chronique?; Engorgement et induration des glandes; Nodosités arthritiques; Cancer au sein?; etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNERAUX. — Monvements convulsifs des muscles a diverses parties du corps. — Relâchement des muscles. — Grand amagrissement. — Fatigue de tous les membres, surtout après le repas, avec battoment dans toutes les artères. — Réson-

nement dans tout le corps apres s'etre couche.

Peau. Eruptions miliaires opiniatres. Eruptions vésiculaires au corps. — Dartres squamenses, avec ecoulement d'un pus sanieux, jaunâtre et corros, f, et avec rougeur, chaleur et goulement de la peau. Dartres opiniâtres, rougeatres et suntantes, avec demangenison insupportables à la chaleur du lit. Les dartres sont rouges et hum des pendant que la lune croit, mais pâles et sèches à la lane decreissante. Douleur brulante ou fourmillement et pulsati n dans les alectes, avec clane, aients dans les bords au toucher. Pastales galeuses par tout le corps.

Sommeil. Forte envie de dormir, le jour, meme le matin après s'etre levé. Insemule le soir et la nuit Sommeil, avec rêves frequents, agitation et jactation. Le matin, sensation comme

si l'on n'avait pas assez dormi.

Fièvre. - Frevre quarte, qui consiste en horripilation, suivie de sueur. - Sueur au reveil, avec sensibilité de la peau, telle qu'en ne peut supporter d'être decouvert.

Moral. Tristesse et aj prehensions. Morosité. - Aversion pour

la conversation, Indifference.

Tête. Le matin, embarras et lourdeur de la tête. — Tension pressive dans le front et les côtés de la tête, ainsi que dans les os du crâne. — Pression f millant dans le cerveau — Terébration dans les tempes. — Martell men, c. oup dans la tête. — Butons purulents au front, douloureux au tencher. — Douleurs brûlantes, in saives dans la peau du front. — Éruptions a la tête; phlyetenes suintantes à l'occipat et a la nuque

Yenx et Oreilles. Pression sur le globe de l'æil. Cuisson dans les yeux et aux bords des paupieres, surtout en les fermant.



CLEMATIS ERECTA. - COCCULUS.

de la poltrine et du ventre. -- Élancements dans la poltrine,

aggravés en inspirant.

250

Membres. -- Pustules pruriantes autour du cou, avec exceriation apres s'etre gratté. -- Dartre humide depuis la nuque jusqu'à l'occiput. - Clenflement des glandes axillaires. -- Presson on tiraillement dans les muscles des brazet des mains. -- Nodosités netherit ques aux articulations des deigts -- Eruption de pustules dans la region des lombes. -- Dechirements dans les cuisses. -- Partres squameuses à la cuisse. -- Faroncles à la cuisse. -- Vesicules rengenntes aux mains et aux doigts, avec gonflement : l'eau froide aggrave les souffrances.

COCCULUS.


COCC. — Coque du Levant. — HARNEYARY. — Illit. nat. et prép. Voy. Pharmae, homos p. p. 197. — Doses antees 15, 30 — Dures d'action : 20 a 30 pours, dans quelques cas de maladies chromiques.

ANTIDOTES . Camph. p vom . On I emplore comme ant date de : Cham. cupr.

ign. Il vom,

Companen avec : Ant ars. carb veg cham, roff, colch cupr, ign icd ipec, merc, mosch, matr, matr, m, nite n vom oleand, puls, rhus selan sass stram, tart, vecatr — C'est sartout apres spec, que le coccutus convient, lorsqu'il est a ailleurs indiqué.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des personnes osurtout des femmes, d'un tempérament doux et flegmatique, ou bien d'un temperament bilieux et colerique; Souffrances par suite d'une colere : Suites facheuses de l'abus de la camonulle; Affections cause is par le menvement d'une verture, d'une balançoire ou d'un navire; l'arblesse nerveuse; Syncope chez les personnes livateriques; Paralipue surtout dos membres inférieurs, avec exaltation du système nerveux; Spusmes et contuixions, surtout chez l's femmes hysteriques et mal réglees; Canvulsions traumatiques. Affections arthritiques; Danse de Saint-Guy; Fièvres, avec affectious biliouses on gratriques, inclue par l'abus de la camemille, Ficeres lentes avec fa blesse nerveuse, surtout après de fortes maladies aigues, des hevres typhoides, le chol ra, etc. ; Congestion cérébrale et apoplexie, même par suite d'evacuations sanguines; Maraine et cephalalgie hysterique; (Esophagite t; Affections gastriques et bilicuses, aussi celles causees par les monvements de la voiture, etc.; Mai de mer, Gastrulger, aussi par suite de fail-lesse; Colques spasmodiques et flatulentes; Hernies ingrunales , chez les enfants), Coliques menstruelles, Dysmenorrhee, avec souffrances pasmodiques, fineurs blanches, crampes de la matrices et autressouf-



COCCULUS.

frances des femmes vierges ou qui n'ont pas en d'enfants; Ténesme de la vessie chez les femmes enceintes; Crampes de poitrine; Palpitations de cour; Tabes dorsalis?; Goutte aux mains et aux piages Goutte arthritique, etc., etc.

Voyes la note, page 15.

CYMPTOMES CENERAUL. - Tiraillements et déchirements paralytiques, par accès ou continus, dans les membres et dans les es. — Mouvements convulsifs des muscles à diverses parties. — Douleurs estécoopes, fouillantes, dans les membres. — Douleurs de meurtriasure, même dans les organes internes. — *Sensation de vacuité où de construction dans les organes internes. — Sensibilité douisureuse des membres au plus léger contact. — Roideur douloureuse at craquement des articulations. — *Bouffrances semi-latérales. - Douleurs rhumatismales, avec gonflement chaud des parties affectées. — Douleurs lancinantes dans les tumeurs froides. — Engorgement et induration des glandes. — Hémorrhagies. - *Crampes et convulsions des membres et de tout le corpe, «quelquefois provoquées par des ulcères, ou des plaies, doulouremement sensibles au contact, ou en casayant de faire usage des parties affectées. — Mouvements convulsifs des membres et des muscles, comme dans la danse de Saint-Guy, --oPendant les accès de convulsions, face rouge, bouffie et chaude. — Tremblement des membres. — Attaques d'épilepsie. — * $Pa ext{-}$ ralgries, principalement senu-latérales, avec insensibilité des parties affectées. — *Aggravation des souffrances par le sommeil, **la parole, le b**oire et le manger, mais surtout en prenant du café ou en fumant du tabac, ainsi que par l'air froid. - Faiblesse et pertes des forces, après la moindre fatigue corporelle, le mouvement ou l'interruption du sommeil.---Manque d'énergie vitale. - *Evanouissement. - Engourdissement, tantôt des pieds, tantôt des mains, par accès passagers. — Le grand aur est *insupportable*, qu'il soit chaud on froid. --- •Amaigrissement.

Peau. - Fort prurit, surtout le soir, en se déshabillant, ou la nuit au lit. - Boutous rouges et semblables à des grains de millet, avec démangeaisen à la chaleur. - Éruptions de boutons durs et noueux, avec auréole rouge et douleur brûlante. - Taches vincuses, rouges, à la poitrine et aux sôtés du cou. - *Couleur pâle

de la peau.

Sommeil. — Besoin opinistre de dormir, le matin. — Bàillement spasmodique. — Sommeil tardif par suite d'une grande affluence d'idées. — Demi-sommeil, comme un coma vigil. Sommeil interrompu par une angoisse et une inquiétude affreuses. — Pendant le sommeil, sumants, cris, mouvements convulsifs des mains, det yeux et de la tête. — Rêces oncieux, effraquents



COCOULUS.

252

rèves de mort, de maladies, etc. Pear de revenants, la nuit. -

Sommeil non reparateur, avec réveil fréquent.

Pièvre. - Frisson et sensation de froid avec tremblement. Le soir, frissons et horripilations au dos. Fievre, avec disposition frileuse, bien que la peau soit chande au toucher -- (haleur brûlante et rougeur des joues, souvent avec froid aux pieds. -- Fièvre, avec douleurs crampoides a l'est mac et faiblesse paralytique dans les reins. Transpiration facile pendant le mouvement, avec grande fatigue. -Sueurs la nuit et le matin. - Pouls plein, dur et fréquent.

Moral. *Préoccupation et réflexions tristes et mélancoliques, comme si l'on avait eu à souffrir des offenses. Chumeur hypocondriaque; désespoir. *Forte appréhension anxieuse, inquietude et peur de la mort. *Disposition à s'effrayer. — *Susceptibilité excessive. — Disposition à prendre tout en mauvaise part et à se facher. Manie. On se trompe sur la durée du

temps; il passe trop vite Pleurs frequents.

Tête. — Obnubilation de la tête, surtout après avoir bu ou mangé.

— Hébetude dans la tête, augmentee par la lecture ou la méditation — Vertige comme par veresse, ou en se redvessant de son lit, avec envie de dormir qui force a se recoucher. — Accès de vertiges, avec nausées et perte de connaissance. — Mal à la tête avec envie de dormir, ou romissements et douleurs de meurtrissure dans les intestins. — *Houleurs pressives, violentes, surtout dans le front. — *A chaque mouvement, mal à la tête, comme si les yeux devaient être arrachés de l'orbite, avec vertiges.

*Mul à la tête, qui est comme vide et creuse, ou sensation de constriction dans le cerveau. — Douleurs pulsatives, tantôt au sommet de la tête, tantôt dans les tempes. — Tremblement convulsif de la tête.


Youx. - Pression et douleur de meurtrissure dans les yeux, et difficulté d'ouvrir les paupières, la nuit. Rotation convulsive du globe des yeux pendant les spasmes. - Pupilles fortement dilatées. Inflammation des paupières. Yeux proémments, vitreux. Trouble de la vue, avec taches noires devant les yeux.

- Fantômes devant les yeux

Oreilles et Nez. - Bourdonnement dans les oreilles, avec dureté de l'ouïe et sensation comme si les oreilles étaient bouchees. - Conflement des parotides. - Conflement du nez, parfois semi-

lateral. — Coryza avec narines ulcérées

Visage et Dents. — *Visage d'un rouge ardent, boulli et chand, surtout aux joues. — Chaleur fuguee aux joues. — Cercles bleus autour des yeux. — Visage contracté convulsivement. — Crampes a la pommette et dans les masseters. — Gonflement et induration des glandes sous-maxillaires. — Douleurs dans les dents cariées, seulement en mangeant. — Vacillement des dents, avec gonflement des gencives.



cocculus.

Bouche et Gerge. — *Séchereme de la bouche; mus soif. — Écume devant la bouche, formant des bulles.—Langue chargée d'un enduit jaune. — Sécheresse de la gorge. — Sensibilité excessive du palais; les aliments semblent tous être trop forts ou trop salés. — Constriction dans le gosier, qui semble être paralysé. — *Douleur brûlante dans l'usophage et jusque dans la gorge, avec goût sulfureux dans la bouche.

Appétit. Gott métallique, enivreux. — Godé acide, surtout après le repas, ou en toussant. — Godt acide du pain. — Godé amer de tabac. — Désir de boissons froides et surtout de bière. — Soif pendant le repas. — *Dégoût excessif pour toutes les boissons ou tous les aliments, sans exception. — Répugnance

pour tous les acides. — Boulimie.

*Renvois avec envie de vomir. — *Renvois à vide, ou létides et putrides. — *Accès de nausées, jusqu'à faire perdre connaissance. — Envie de vomir, en se redressant dans le lit, qui force à se recoucher. — Envie de vomir pendant le repas, ou par suite d'un refroidimement, avec accumulation abondante de salive. — •Vomissements et nausées partie mouvement de la voiture, ou sur mer. — Sensation de plentude dans l'estomac, avec gène de la respiration. — *Violentes douleurs crampoides, serrement comme par une griffe, et crampes à l'estomac, quelquefois après le repus. — Oppression anxieuse et pincement à l'épigastre,

avec géne de la respiration.

Ventre. — Douleurs de meurtrissure dans les hypocondres. —


*Douleur premire dans la région hépatique, aggravée par la toux on en se baiseant. — *Élancements dans la région hépatique. —

Douleurs abdominales, comme si les intestins étaient meurtris, ou comme par un aboès intérieur, à chaque mouvement. — Pression comme par une pierre dans la région ombilicale et dans le bas-ventre. — Sensation dans le centre comme s'il était creux et vide. — *Ballonnement du ventre. — Pincements contractifs dans la partie supérieure du ventre, avec suspension de la respiration. — *Douleur brûlante, tiraillements et déchirements dans le ventre. — Douleurs crampoides dans le ventre. — *Coliques venteuses, crampoides, surtout la nuit, aggravées en touseant ou en se penchant en avant. — *Disposition à la sortic des hernies inquinales.

Selles et Urines. — Constipation, avec ténesme. — Selle dure, difficile. — Selle diarrhéique d'odeur putride. — *Selles molles, jaunes et equi brûlent à l'anus. — Urine aqueuse, avec envie pressante. — *Envie fréquente d'uriner, même chez les femines.

enceintes.

Parties viriles. — Prarit au scrotum. — Douleur tirquillante de meurtrissure dans les testicules, au toucher. — Grande sensibilité et excitation des parties génitales, avec désir du coît. — Après



Region - Region are econisment about the Regies doundareases, are econlement aboudant d'un sang cosgue, survey a bemore set pressures, flatter than des regles, arec congues spin-modiques et pressives, flattatites, faiblesse paralytique, of Present in Marce, et me assamente, accès de naulytique, c, P a celo llance, et me avements e nvulsifs des membres pusqu's men abondantes, irregulieres, avec leucorrhee dans les intervalies - (Metrorrhagie) o Leculement de mucodans les manufentes par la mirice, pendant la grossesse -Leucorrhee comblable a de I cau dans laquelle on aurait lavé de le vand entreme. d'un sorosité sanieuse et purulente. oCrampes de matrice

Largar. - Ioux fatigante, par oppression de poitrine qui ne se manifeste que p ndant la toux. Tour periodique, de quatre nuts l'une, vers manuit ou 2 heures du matin, avec constriction

dans la gorge qui force a tousser

Poitrine. - Suspension de la respiration, qui s'arrête dans la fossette du con, comme par constriction de la gorge. - Respiration courte, intermittente l'ression sur la poitrine comme par une pierre. - Crampes de joits ne avec s'apirs et genussements. - *Construction tensive de la postrine, quelquefois d'un seul côté, avec gen de la respiration - trargouillement et sensat on de caçade l'ens la podrine. Fatigue de la poitrine par la lecture a haute verx. - Congestion a la poitrine avec anxiété. - *B ettement de cœur. - l'aches rouges sur la postrine.


Trong. — Décharements paralytiques au c reins — Tirantements et déchirements dans le dos, surtout en parlant, en marchant et en se naissant. -- Elancements entre les omoplates et dans les reins. - Craquement des ve tebres du con pendant le mouvement. - Faiblesse des mascles da con, la ne peuvent pas sup-

porter la tête. - Taches rouges au con.

Bras. - Lancinations dans l'uticu. ition de l'épaule et dans le bras. pendant le repos. - Dinleurs lancon entes dans le bras, proveuant fun do.gt blesse. - Convulsions da bras avec rétraction des pouces. *Paralysie des bras - Palpitation des muscles du bras. - Douleur de meurtrissure dans les os du bras, 1 indant h mouvem at disagreement chard of arthretique des mouns. - Engenransem nt ou enaleur et froid alternant de l'une a l'autre main - l'orpeur des mains, - Contractions crampoid a ct to a Hement des doigts.

Jambes. - *Paralysic des membres inferieurs, provenant des reins - Déclar ment tractas dans les peteras, a s pieds et les orteils. - Douleur de n' urtresante lans les cu saes, pendant le mouvement - Crangement are genous, pendant le mouvement. - Gonflement inflammatoire du genou avec lancinations pus-





COCCULUS. - COCCUS CACTI

sugères. — Sensation brûlante aux pieds. — Gonflement chaud et pruriant des pieds, quelquefois aussi le soir. — Engourdissement des pieds. — Froid et transpiration des pieds.

COCCUS CACTL


(2) CG-GAC. — Coccinella Indica, Cochenille du Nopal ou Mexique. — Hist. 1911. et prep. Voy. Pharmac. homosop., p. 315. — Durce d'action : dans les affections aigués, 25 à 18 heures au plus ; dans les affections chroniques, plusieurs semaines

CLIMIQUE. — Médicament qui pourra devenir très-important lans les affections des membranes muqueuses, certaines mélancolus et misanthropies, les affections des organes urmaires, genitaux et respiratoires, comme dans les ophthalmies, stomatices, bronchites muqueuses, ainsi que dans certaines affections spismodiques. — Nous exterons ci-apres les symptômes les plus importants et qui paraissent être particulierement caractéristiques de ce médicament.

SYMPTONIES OSSÈRAUX. — Douleurs brûlantes, lancinantes, enisantes, dans les membranes maqueuses des yeux, de la langue, de la gorge, des bronches et de l'urethre, douieurs crampoides dans l'asophage, l'estomac, le rectum, les reins et la vessie; mouvemente convulsis; aggravation des souhrantes par le mouvement et la chaleur; diminution par le repos, le troid, les lotions fraiches, l'air libre. — Sommeil agité, interiompu par des douleurs védeales et envis d'uriner, avec reves vus de beaucoup de personnes, de palais et de societes choisies uans lesquelles on se trouve déplace, ou de tendres relations ain ureuses.

Fièrre, consistant en horripilation et frissons frequents; chaleur a la face, pendant les douieurs vesicaies. — Moral morose, inauvaise humeur, après quelques instants d'un grand bien-être, avec humeur gaie.

- Dents. - l'éte pesante, avec pression comme par congesn de sang, augmentée par le mouvement de la tete et diminuée le froid et dendetions froides. - L'eux douloureux, comme la présence d'un corps étranger, avec enfiure des paupières. Desles comme bouchées, avec pression et tiraillement; doupulsatives, pressives et lancinantes dans les oreilles, jusque a bouche et la gorge; bourdonnement. - Nez sec, avec sion d'ebturation catarrhale et sécrétion comme dans un



COCCUS CACTI. — COFFEA.

le matin; toux sèche; toux grasse avec expectoration de mucosités jaunâtres ou rerdâtres, ou épaisses, gluantes et albuminouses; brûlement dans le larynx après chaque quinte de tous : toux nocturne, avec ou sans expectoration; augmentation de la toux par la chaleur de la chambre et celle du lit, amélioration par l'eau froide prise par petites gorgées; toux provoquée par le nettolement des dents. - Expectoration de mucosités abondantes, albumineuses, blanchâtres ou jaunâtres, d'un gout sale, parfois avec vomiturition, ou même avec vomissement des aliments après les repas; expectoration de mucosités, toux le matin, avec expectoration de mucosités jaunâtres ou grisatres et rougeatres, épaisses, globuleuses, et d'un goût aigre ou aigredoux et nauséabond. — Coqueluche?.

Politine et Respiration. — Haleine chaude. — Élancements rayonnants et pression dans la poitrine; géne de la respiration comme si le thorax était trop étroit, avec besoin de respirer profondément. — Cœur battant plus fort par moments; palpitations comme après une frayeur, avec pulsation dans la poitrine, à la tête et dans l'oreille, la nuit. — Pression et douleur fouillante d'écorchure au cœur; sensation comme si tout poussait vers le

çœur,

Dos et Membres. -- Tension, pression, élancement et déchirement dans les lombes, la nuque, le cou, le bras, les mains et les doigts, jusque dans les régions des reins, ainsi que dans les hanches, les cuisses, les jarrets, le tibia, les mollets et les orteils, et augmentant le matin et par le mouvement. — Picotement et élancements comme par des échardes de verre ou des courants électriques, aux cuisses, an genou et sous les ongles des doigts et des orteils, augmentant tellement par le mouvement que la démarche devient impossible.

COFFEA

COFF. — Café eru, Coffea arabica, Coffea cruda — Archives de STAPF. — Hist. nat et prép. Voy. Phaemac homosop., p. 191 — Doses usitées: 3, 10, 50. — Durée d'action : jusqu'à 10 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Acon. cham ign. n-vom. — Le café est antidote de psoricum et

de toutes les autopsorines.

Comparen avec : Acon agar, ang are, bell, bry, canth, carb-veg, canst. cham. cocc. coloc. con. ign. kat. laur. mang. merc. n-vom. op. phos. phos-ac. puls. rhus. sep. sulf. valer.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -



Arradges excessivement doulourouse

Arradges excessivement doulourouse

Arradges excessivement doulourouse

Arradges excessivement doulourouse

Prodrom

Arradges excessivement; Prodrom

Andrew

Arradges excessivement; Prodrom

Andrew

Arradges excessivement; Milion

Sulter farheuses d'une joie mattendue ou excessive

prodrome. Suites farheuses d'une joie mattendue ou excessive

mittente. Suites farheuses d'une joie mattendue ou excessive

mittente. Suites farheuses et sereuses?: Migraine?: Cephalalgie en

Apopleries sangumes et sereuses?: Migraine?: Cephalalgie en

Apopleries

graphones generally. *Surimpressionnabilité double reuse des parties affectées. Grande mobilité des muscles, agilité de tout le corps. — *Surexeitabilité morale et physique. Aversion pour le grand air, avec malaise et exacerbation de symptômes pendant une promenade en plein air. — Conculsion avec grincements de dents et froid aux membres. — *Insome par exaltation de l'imagination, affluence d'idees et visions fattatiques. Besoin de se coucher et de fermer les yeux, bien que l'on ne puisse pas dormir — Fort frissonnement avec augme tation fébrile de la chaleur du corps. — Fièvre avec angols inconsolable. — Herripilation avec coliques et agitation violent — *Pleurs, hurlements, cris, jactation et découragement, su tout pendant les acces de douleur. — o('ris des enfants, Anxiété de cœur et de conscience avec appréhensions — *Viveité et loquacite exaltées — Vivacité et exaltation de l'image.

nation, avec acuité des facultés intellectuelles.

Tôte — Gorge. Maux de tête, comme si le cerveau était meu tri — Céphalalque semi-laterale, comme si un clou était enfon dans l'os parietal — Pesanteur de la tête. — Congestion a la têt surtout en parlant. — Your vifs, rouges, avec vue plus distinct — Sensibilité excessive de l'ouic, les sons de la musique semble être trop forts et trop aigus. — «Dureté de l'ouie avec bourdons ment d'oreilles — Épistaxis, avec lourdeur de la tete. — Chale du visage, avec rougeur des joues — * Tiraillements successif et douleurs vires dans les dents avec inquietude, anxiété pleurs, surtout la nuit et après le repas. * Mal de gorge or sensibilité douloureuse et genflement du voile du palais.

Estomac — Selles. — Gout de noisette ou d'amandes douc dans la bouche. — La fumée du tabac paraît particulièremes agréable. — Sensation de faim immodérée. — Soif augmenté surtout la nuit. — «Vomissement bilieux. — Crampes d'estoma avec douleurs pressives lancinantes. — Anxiété et opprossion la région de l'épigastre ; les vêtements génent. *Douleurs add

minales qui product inscient d'accest, surfaut chez les femmes, « S'll me l'action moiss, « S'Il reché, coussi pendicut la destitation.

Urines et Parties génitales. « Limisi e d'urine abondante, surt est vers minuit. « On a le écoit tien de l'applies vénérien, avec fluscidité en fert excit tien d'en est e générale. « Excitation immédée e les moties genérale de le forme, avec prurit y luptueux, fort est en tien en en en et ée ul anent fréquent de sung. » Meta relegée.

Poitrine et Mombres. El manamant, decadée, sèche, avec forte excitation dans le lavanzet instations auxieuses. — Accès de sufficentiem, « Tremblement des nains, pendent que l'on tient un objet. Contractions caure des les les doites — Crampes dans le mellet en plient le geneue. — Char pes a la plante des pieds en tendant le con-le-piol. — Tremblement des pieds.

COLCHICUM AUTUMNALE.

COLCH. — Colchique, Safran des prés, Safran bâtard. — Archives de STAPF. — Hist. nut. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 199 — Doses usitées: 3, 10 30. — Durée d'action: jusqu'à 30 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: N-voin. puls. cocc.

COMPARER AVEC: Acon. chin. cocc. merc. natr-m. n-vom. op. puls. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Affections rhumatismales et arthritiques; Paralysies; Affections hydropiques; Fatigue nerveuse par suite de veilles prolongées; Surexcitation nerveuse; Otorrhée purulente à la suite des morbilles; Gastrite?; Ascite?; Affections gastriques; Dyssenterie; Coliques flatulentes surtout chez les personnes hystériques; Affections des voies urinaires et des reins; Crampes de la poitrine; Hydrothorax, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirement rhumatismal et arthritique dans les membres et autres parties du corps, surtout par un temps chaud. — Élancements tressaillants dans les muscles et le périoste des membres, surtout par un temps froid. — Tressaillement fréquent du corps. — Élancements dans les articulations. — Faiblesse paralytique des muscles. — Douleurs accompagnées de faiblesse paralytique et de paralysie réelle. —



COLCHICT M AUTUMNALE,

Les souffrances sont singulièrement conflowents hade per la intellectuelle, le contact, une lumière aggraveus par la fatigue intellectuelle, le contact, une lumière aggraveus par la fatigue de la visade de porc. Engagement 350 approvent par la tarigue la visude de porc. Exacerbation des an P voice de la nuit jusqu'à l'aurore. Affaissement general, et par sorte, sensibilité douloureuse de tout le sement general. Le peut se bouger sans gémir. Fatigue nerveuse et faiblesse par le travail de nuit.

Prurit, comme par des orties. Fourmillement à différentes parties, comme après avoir été gelé. Éruption d'un

rouge pourpre a la face, aux bras et aux cuisses.

Frevre rhumatismale, avec courbure douloureuse des arraulations des mains et des pieds, douleurs aux épaules, aux hanches et aux reins, racine de la langue douloureuse en avalant, sacurs acides.

Envie de dormir le jour, avec inaptitude au travail. Insomnie par surexcitabilité nerveuse. Réveil fréquent.

avec effroi. - Chaleur nocturne, avec forte soif.

Moral. - Grand abattement. Mauvaise humeur. - Les souffrances paraissent insupportables. - La moindre impression extérieure met hors de soi. Faiblesse de la mémoire. Oubli et distraction.

Tôte. Pression à l'occiput, pendant des efforts intellectuels. -Many de tête crampoides, surtout au-dessus des yeux. - Déchirement semi-latéral dans la tête. - Fourmillement dans le front et aur la tête

Year. Douleurs dans les yeux, comme un tiraillement fouillant dans la profondeur du globe. Gonflement des paupières inférieures. Suppuration des glandes de Meibomius. Traction visible dans la paupière inférieure.

Oreilles. - Otalgie, avec clancements déchirants. - Fourmillement dans les oreilles, comme si elles avaient été gelées. Sensation d'obturation des oreilles.


"Ecoulement purulent par les

oreilles, avec douleurs tractives.

Nes. Douleur pressive dans les os du nez — Douleur d'excoriation a la cloison des narmes, aggravée par le toucher. - Sensibilité excessive de l'odorat. - Coryza opiniatre, avec renaclement de mucosités visqueuses et abondantes, provenant du nez.

Visage. Traits du visage defigurés. Aspect maladif, triste, souffreteux. Visage tacheté de jaune. Gontlement ædéma-teux de la face. Sensation d'écartement dans les os de la face.

Sensation dans les masseters, comme si on les elargissait, avec difficulté d'ouvrir la bouche Tractions et tressaillements successits dans les muscles et les os du visage. Déchirement semilatéral dans la face, jusque dans l'oreille et la tête. - Fourmillement dans la peau du risage, comme s'il avait été gelé, -Lèvres gercées. Dechirement dans la lèvre inferieure, - Douleurs crampoides dans l'articulation de la mâchoire.



COLCHICUM AUTUMNALE.

261

Dents. — Odontalgie, avec douleurs déchirantes. — Sensibilité des dents, lorsqu'elles se touchent en fermant la machoire. — Douleurs aigues dans les gencives.

Bouche. — Chabur dans la bouche. — Déchirement dans le palais. — Salivation séreuse, abondante, avec séchereuse de la gorge.—

Lourdeur, roideur et insensibilité de la langue.

Gorge. — Mal de gorge, comme par gonflement de l'orifice de l'ossophage. — Fourmillement dans le palais. — Constriction du gosier.—Inflammation, déchirement et élancement au palais et à la gorge. — Accumulation de mucosités verdâtres dans la gorge et la bouche.

Appétit. — Appétit se dissipant promptement, seulement par l'aspect ou l'odeur des aliments, avec dégoût. — Insipidité des ali-

ments. - Forte soif, surtout pour le café.


Estomac. — Renvois d'air fréquents. — Hoquet continuel. — Nausée qui va jusqu'à faire perdre connaissance par l'odeur des œufs frais ou de la viande grasse. — Nausées pendant le repas. — Nausées après avoir avalé la salive. — Vomissement d'aliments ou de bile, parfois avec douleurs violentes à l'estomac et diarrhée bilieuse, jaunatre. — Estomac très-sensible au toucher. — Sensation d'excoriation et fourmillement à l'estomac. — Sensation de froid ou de brûlure à l'estomac. — Élancements dans le creux de l'estomac.

Ventre. Ballonnement et plénitude du ventre. Pression rers le debors dans la partie supérieure du ventre. — Colique, avec douleurs déchirantes. — Douleur d'excoriation dans le côté gauche du ventre, au toucher. - *Gonflement hydropique du ventre. — Douleur de brûlure et pression dans le basventre, dans la région de la vessie et dans les parties génitales internes.

Selles. Constipation. — Selles lentes, difficiles, insuffisantes, avec besoin pressant. — Évacuation des selles sans qu'on s'en aperçoive. — *Diarrhée dyssentérique de mucosités blanches, transparentes, gélatineuses. — Écoulement de mucosités abondantes par le rectum. — Selles sanguinolentes, et comme mélées de fausses membranes. Chute du rectum. Fourmillement, prurit, brûlement et déchirement à l'anue. — Crampes dans le sphincter de l'anus.

Urines. — Besoin pressant d'uriner, avec émission abondante d'urines claires. — *Émission peu abondante d'une urine de couleur foncée, avec ténesme et sensation brûlante. — Urine branâtre ou noirâtre. — Dépôt blanchâtre dans les urines. — Sensation brûlante et pression dans les voies urinaires et la vessie. — Tiraillements, déchirements et douleurs incisives dans l'urèthre.

Laryax. — Fourmillement dans la trachée-artère. — Chatouillement dans le pharyax, qui provoque une petite toux sèche. —



COLOCYNTHIS. - CONTUM MACULATUM.

parties génitales, des deux côtés du ventre, de manière à provoquer l'éjaculation. — Excitation de l'appétit vénérien, comme une sorte de priapisme. — Impuissance complète. — Rétraction du prépuce derrière le gland. — Nodosités douloureuses dans les mamelles.

Laryax et Poitrine. — Petite toux sèche provoquée par une irritation dans le laryax, ou par la fumée de tabac. — Accès d'asthme, la nuit. — Oppression de la poitrine comme si elle était comprimée. — Battements de cœur.

Trens. — Douleurs tractives dans le dos, comme si les muscles étaient tendus. - Tension dans le cou et les omoplates. - Engor-

gement et suppuration des glandes arillaires.

Bras. — Douleur de meurtrissure dans l'articulation de l'épaule, surtout après s'être mis en colère. — Douleur ostéocope, pressive et lancinante, dans les bras. — Douleur crampoide dans les mains, qui ne permet d'ouvrir les doigts qu'avec difficulté. — Tiraille-

ment dans les tendons des pouces.

Jambes. — Douleur dans l'articulation coro-fémorale, comme si elle était serrée par des bandes de fer, au bassin elle la région du sacrum, avec douleurs dans la région lombaire jusque dans les jambes. — Lancinations tensives dans la région des lombes et des hanches, surtout en étant couché sur le dos. — Douleur pendant la marche, comme si le psoas était trop court. — Luxation spontanée de l'articulation coro-fémorale. — Manque de flexibilité du genou qui ne permet pas de s'accroupir. — Crampes dans les jambes. — Élancements dans les jambes, surtout pendant le repos. — Grande pesanteur et tremblement des jambes. — Déchirement dans la plante des pieds pendant le repos.

CONIUM MACULATUM.

CON. — Grande eignő. — HANNEMANN. — Hist. not. et prép. Pharmac. homosop., p. 201. — Dose unitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 40 jours, dans quelques cas de maiadies chroniques.

Arribores: Coff. nitr-spir. — On l'emplose comme antidate de : Nitr-se. Companer avec : Arn. asa. bell. coff. dig. dule. graph. tod. lyc. magn. magn. merc. mosch. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac plumb. puls. res. ret. sabad. sep staph. sulf ac. tar. teuer valer.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hypocondriaques, surtout chez les célibataires à principes sérères et d'une abstinence absolue, ou bien chez les personnes qui ont fait abus du colt; Spasmes, accès de

265



CONIUM MACULATUM.


faiblesse et autres affections des personnes hystériques; Affections scrofuleuses, avec induration et engargement des glandes; Affections des ricillards, des femmes, et surtout des femmes enceintes; Anciennes affections par suite de contusion, principalement dans les glandes, ainsi que dans des parties tendinenses et membraneuses; Ecchymose senile; Affections hydropiques; Chlorose; Taches hepatiques; Durires. Indurations squirrenses et ulcères carcinomateux, surtout par suite de confusion. Carie?; Ulceres gangreneux?, Petechies?, Fievres lentes?, Fievres inflammatoires?: Melancolie nypocondriaque ou hysterique: Manie?: Apoplexie avec paralysie, principalement chez les personnes igées; Migraines, Hydrocephale'r; Congestion cerebrale avec vertiges, Ophthalmie, principalement des personnes scrofuleuses, Cataracte par suite d'un coup (d'une commotion). Obscurcissement de la cornée?; Photophobie scrof deuse; Myopie; Presbyopie; Amblyopie amaurotique, Otalgie, Durete de l'ouie, Engorgement des parotides; Ozene, aussi - lle par al us du mercure; Prosopalgie, Cancer aux lecres. Spasmes dans la gorge. Duspepsie, aigreurs, nausées et autres affecti us gustriques; Cancer de l'estomac i; Constipation Lienterie?, Diabete?, Hematurie?; Catarrhe de la vessie?; Rétention d'urine, Strangurier, Orchite par suite de contusion; Impuissance, surtent par suite de pollutions: Pollutions chez les jeunes gans d'une constitution urritable; trampes de matrice; Dysménorrhee, An.en rrhée; Flueurs blanches, Sternité avec amenorrhee?, Squirre (et cancer) du sein, surtout par suite d'une contusion; Chlorose; Catarrhe avec fievre, angine et souffrances gastriques; Toux seche des sujets serciuleux; Toux convulsive et sufloquante; Coqueluche; Hemoptysie ?; Asthme, surtout ches les cieillards; Asthine hystérique; Affections chroniques du cour; etc., etc.

Vair la note, page 15.

266

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Crampes et douleurs crampoides, dans diverses parties. *Courbature des membres et des articulations dans le repos. *Douleurs nocturnes et souffrances qui troublent le sommeil — Les symptômes apparaissent pendant le repos, et s'aggravent au commencement de la marche ou du meuvement — L'aculté à se donner des tours de reins. *Acces de souffrances hysterques et hypocondraques — Soubresauts des toudons, tremblement et seconsses convulsaces dans les membres. — Bouillem, ment du song — trentlements hydropiques. — *Conflement et induration des alandes; avec douleurs feurmillantes et laucmantes. *Acces d'evanouissement — terand abattement général avec vires involontaires. — Sensation de fatique, sartout de bon matin, au lit. — *Inquiétudes dans le oorps, surtout dans les jambes. Manque d'énergie





CONIUM MACULATUM.

et faiblesse nerveuse. — Consomption. — *Affaissement subit pendant la marche. — Grande disposition à se refroidir. — *Grande fatigue et autres souffrances par la promenade en plein air. — *Manque opiniâtre de chaleur vitale naturelle. — Mouvements convulsifs des parties supérisures du corps, avec

paralysie des parties inférieures.

Pean. — Elancements et prurit picotant à la peau. — Couleur blenâtre de la peau de tout le corps. — Inflammation douloureuse de la peau. — Eleuption urticaire à la suite d'un fort exercice corporel. — Boutons, comme ceux de la gale, qui deviennent croûteux. — Taches brunâtres ou rouges et pruriteuses sur le corps, qui disparaiment et reviennent. — Dartres humides, ou croûteuses et brûlantes. — Ulcères noirâtres, avec écoulement sanieux, sanguinolent et fétide, extension fourmillante. — Ulcères gangréneux. — Ulcération des os. — Panaris. — Pétéchies. — *Taches rougeátres et verdâtres comme par ecchymose.

Sommeil. — *Envis de dormir le jour, même de fort bon matin. — Somnolence. — *Envis de dormir le soir avec affaissement des paupières. — *Sommeil tardif. — Sommeil agité et non réparateur, avec pleurs et rêves fréquents, anxieux et effrayants. — Rêves de maladies, de mutilations, de morts, de dangers et de querelles. — La nuit, maux de tête, nausées, gastralgie, saignement de nes, douleurs dans les membres, etc. — Réveil incomplet, après minuit, avec grande angoisse. — Cauchemar. — Tres-

saillement des membres pendant le sommeil.

Pièvre. — Frissons, froid et horripilation fréquente. — Chaleur sèche, intérieure. — Fièvre lente, avec manque total d'appétit. — Fièvre inflammatoire, avec forte chaleur, sueur aboudante, auorexie, diarrhée et vomissements. — Fièvre, avec inflammation de la gorge et toux. — Pouls irrégulier, — Sueurs nocturnes, même au commencement du sommeil. — Sueurs locales, fétides et mordicantes.

Koral. — *Angoisse hystérique, avec tristesse et forte envie de pleurer. — Anthropophobie, et cependant peur de la solitude. — Caractère peureux (peur de voleurs). — Idées superstitieuses. — *Disposition à s'effrayer. — *Mauvaise humeur et morosités. — *Indifférence hypocondriaque. — *Manque d'énergie morale. — Inaptitude au travail. — *Irritabilité et disposition à se fâcher. — Idées désordonnées et manie. — ('onfusion des idées, comme quand on s'assoupit. — Conception lente. — Faiblesse des facultés intellectuelles et de la mémoire. — *Oubli facile. — Délire. Têts. — Ivresse, après avoir pris la plus petite quantité d'une boisson spiritueuse. — *Vertige tournoyant en se levant, et °parfois à faire tomber de côté lorsqu'on regarde en arrière, ou lorsqu'on est couché, surtout le matin, au lit. — Coup de sang, avec face gonfiée et ecchymosée, comme chez un homme étranglé, respiration difficile, pouls lent, extrémités froides. — Accès de maux de

tête acce nousées et y intescrient de mucosités. — Douleurs suspensants dan la tene suatout pendant la marche en plein air.

Sensibilit excessive directive us même a la parele et au bruit. Maux de tete quotidiens, par soure de selles sop peu abondantes. Douleurs som laterales acus la tete, comme use etait meurtre. Sensation comme sul y avait dans la tete au corps etianger volumineux. Pesantear et pleintude dans la tete, suitout le matin en se revillant. Tiraill ment dans la tete, avec engourd, sement du coveau. *Acces don ouv de te dechirants, qui forcent a se con li r... *Douleurs hancourtes opmatres dans le sine put ou qui sen blent sorter par le fre at ... Pesantem et sere ment comme par une grufte, dans le fich

comme provenant de l'estoteac. Chute des chereux.

Your. — Pression dans les yeux, en lisant. *Inmangenesia ou-dessous des yeux, avec douleur brûlante et cuisante, lorsqu'en les frotte. — Elancements pruriants ou cuisson dans l'angle interne des yeux. — "Sensation de froid dans les yeux, pendant la marche en plein air. — Douleur de brûlure dans les yeux, avec pression dans les orbites, le soir. — Inflammation et rongeur de la sclérotique.— *Orgelet aux paupières. -- • (Taches de la cornée). - Couleur janne de la sclérotique. - Yeux ternes. - Yeux proéminents. - Regard tremblotant. - Obscurcissement de la vue. - Cécité momentanée le jour à l'ardeur du soleil. --*Myopie. — *Presbyopie. — Diplopie. — Mobilité des lignes pendant la lecture. — *Taches noires et bandes colorées devant la vue, dans l'appartement. -- Aspect rouge des objets. --*Eblouissement par la lumière du jour. -- *Photophobie avec couleur rouge pâle du globe des yeux.

Oreilles. — Déchirements et élancements dans les oreilles et autour des oreilles, surtont en se promenant au grand air. — *Accumulation de cérumen, qui ressemble à du papier moisi, et qui est mêlé de mucosités purulentes. — Cérumen couleur rouge de sang. — *Bourdonnement, tintement et grondement dans les oreilles. — Sonsibilité douloureuse de l'oule. — *Diminution de l'oule, cessant lorsqu'on a écarté le cérumen, et jusqu'à ce qu'il soit renouvelé. — *Gonflement et induration des paro-


tidea.

Nes. — *Gonflement des narines. — • Écoulement purulent par le nez. — Hémorrhagie nasale. — Exaltation de l'odorat. — *Éternument par trop fréquent. — • Sensation de sécheresse pénible dans le nez. — • Obturation opiniaire des deux narmes. — • Ob-

turation du nez, le matin,

Visage. *Chaleur du risage. — Teint pale, bleuâtre, parfois aussi avec gonfiement de la face. Crevasses à la peau du avec douleur d'excoriation après s'être lavé et essuyé — leurs nocturnes dans la face, déchirantes et lancinantes *Prurit, éruptions pruriantes, dantres et ulcères rongeant





CONTUM MACULATUM.

visage. — Éruption boutonneuse au front. — Sécheresse et enfohation des lèvres. — Ampoules et ulcères aux lèvres. — °*Ulcère* carcinomateux à la lèvre. — Serrement spasmodique des mâchoires. — Grincement de dents.

Dunts. — *Odontalgie, généralement tractive, *provoquée par la marche au grand air, "ou excitée dans les dents creuses par des aliments froids. — Élancements, "secousses, rongement et térébration dans les dents. — Gencives gonflées, ecchymosées et saignantes.

Benche. — Sécheresse de la bouche et de la gorge, ou salivation. — Parole embarrassée. — Langue roide, douloureuse, gonflée. — Mal de gorge, comme par une boule qui monterait de l'épigastre. — Déglutition empêchée. — *Déglutition involontaire. — Besoin d'avaler constamment en marchant contre le vent.


Crampes dans le gosier. — *Grattement dans la gorge.

Appétit. — *Amertume dans la bouche et la gorge. — *Goût putride on acide dans la bouche. - *Absence totale d'appétit, ct grande faiblesse de la digestion. — Le pain ne peut pas descendre, et ne plaît pas au goût. — Boulimie. — Désir de café ou d'aliments acides ou salés. — Pendant le repas, et surtout après avoir pris du laitage, sensation de ballonnement de l'estomac et du ventre, et satiété prompte. — *Après le repas, aigreurs, pyrosis, pression et plénitude de l'estomac, rapports, coliques, flatomités, manaées, doigts morts, faiblesse, fatique et sueurs.

flatuosités, nausées, doigts morts, faiblesse, fatigue et sueurs.

Esternac. — *Renvois à vide, fréquents et bruyants, parfois durant toute la journée. — *Renvois avortés avec sensation de plénitude dans la fossette du cou. *Renrois arec goût des aliments. — *Pyrosis qui remonte dans la gorge, quelquefois après le repas. — *Régurgitations acides, surtout après le repas. — *Nausées arec envie de vomir et perte complète de l'appétit, ou bien avec rapports et lassitude. — Nausées après chaque repas. ou le soir. — Vomissements de mucosités. — Pression à l'estomac, même pendant le repas. — Ballonnement de l'estomac. Douleur crampolde, contractive, élaucements et douleur d'excoriation à l'estomac et à l'épigastre. — Douleur avec sensation de froid dans l'estomac.

Ventre. — Douleur tensive dans les hypocondres, comme par un lien fortement serré. — Pression, traction, déchirements et élancements dans la région hépatique. — *Lancinations dans l'hypocondre gauche, parfois le matin au lit, avec oppression. — *Plénitude du ventre, même le matin en se réveillant. — Gonflement des glandes du mésentère. — *Contraction du ventre avec oppression. — Coliques spasmodiques. — Douleurs abdominales incisives et lancinantes. — *Mouvement et fouillement dans la région ombilicale. — *Sensation d'excoriation dans le ventre, *surtout en marchant sur le pavé. — *Bruits et borborygmes dans le ventre. — Emission de vents froids avec tranchées. — *In-



CONTUM MACULATUM.

carcération de flatuosités. -- Tranchées en émettant des flatuosités.

Belles. — *Constipation arec ténesme. — *Selles dures, soulement tous les deux jours. - *Selles diarrhéiques non digérées, avec tranchées et renvois fréquents. — Diarrhées débilitantes. — Lancination à l'anus. — Ardeur et sensation brûlante au rectum, pendant et hors le temps des selles. — Selles avec stries de sang. — Après les selles, faiblesse, battement de cœur, émission fré-

quente de vents, et tremblement.

Urines. — Pression sur la vessie, comme si les urines allaient sortir violemment. — La nuit, émission d'urine frequente et quelquefois involontaire. — Flux d'urine avec douleurs violentes. —

**OUrine épaisse, blanche, trouble. — Urines rouges. — Rétention d'urine. — Émission difficile d'une urine qui ne coule que goutte à goutte. — Pissement nocturne. — Pissement au lit. — *Envie fréquente d'émettre une urine claire et aqueuse. — Mucus visqueux mêlé aux urines qu'on ne peut émettre qu'avec de grandes douleurs. — Écoulement de pus par l'urèthre. — Pissement de sang, quelquefois avec gêne de la respiration. — *Les urines l'arrêtent tout à coup, et ne recommencent à couler qu'après quelques instants. — *Douleurs incisives dans l'urèthre pendant l'émission des urines. — Sensation brûlante et élancement dans l'urèthre, surtout après l'émission des urines.

Parties viriles. — *Gonflement des testicules. — Lascivité. —
°Impussance et défaut d'érection. — °Défaut d'énergie dans le
colt. — °Érections insuffisantes et de trop courte durée. — Émission facile de sperme, même sans fortes érections. — °Après le
colt, accablement. — *Pollutions immodérées. — Écoulement de
liqueur prostatique pendant les selles, et après toute émotion


morale.

270

Règles. — of rampes de matrice avec pincements, ou douleur de crispation, ou avec fouillement au-dessus de la vulve, accompagnées de tension dans le ventre et d'élancements jusque dans le côté gauche de la poitrine. — *Démangeaisons dans les parties génitules externes et internes. — Élancements dans le vagin et sensation comme si tout se portait vers le bas. — Elancements dans les lèvres. — *Règles trop hâtices et otrop faibles. — *Suppression des règles. — Avant les règles, douleurs dans les seins ; rêves anxieux, chaleur sèche, courbature des membres, humeur pleureuse, inquiétude et douleurs hépatiques. — *Pendant les règles, sensation comme si tout affluait vers le bas, tiraillement dans la cuisse, ou crampes douloureuses dans le ventre. — *Leucorrhée brûlante, ûcre, corrosive et mordicante, accompagnée ou précédée de coliques. — Mamelles flasques. — *Induration squirreu-e dos glandes mammaires, avec prurit et douleurs lancinantes.

Larynx. - Catarrhe avec flèvre, mal de gorge et manque d'appé-





CONIUM MACULATUM.

tit. — Enrouement. — Sécheresse à une petite place circonscrite dans le larynx et chatouillement qui donne envie de tousser. — Toux provoquée par une démangeaison et un grattement dans la gorge. — Toux sèche provoquée par un chatouillement, avec oppression de poitrine et fièvre le soir. — Toux suffoquante, avec chaleur fugace au visage. — *Toux sèche, convulsive. — *Toux comme la coqueluche, avec expectoration sanguinolente, ou par quintes, la nuit. — La toux se manifeste généralement la nuit ou le soir. — Toux provoquée en respirant profondément ou en prenant des choses acides ou salées. — Toux grasse, mais sans expectoration. — Expectoration jaune, purulente et d'odeur putride. — Toux augmentée en étant couché. — Pendant la toux, douleurs dans la tête ou dans le ventre, avec élancements dans le côté gauche aggravés par le mouvement.

Poitrine. — *Respiration courte en marchant, et au moindre monvement, souvent avec toux convulsive. — *Gêne de la respiration, même le matin en se répeillant. — Respiration difficile et lente, nurtout le soir au lit. — Gêne de la respiration avec douleurs de poitrine, le soir, au lit. — Accès de suffocation comme si quelque chose obstruait la gorge. — *Élancements dans le sternum, ou dans le côté de la poitrine. — Douleurs violentes à la poitrine avec forte toux. — Pression à la poitrine, au sternum et dans la région du cœur. — Douleurs tractives dans la poitrine. — *Secousses dans la poitrine. — Battements de cœur, surtout après avoir bu. — Coups fréquents dans la région du cœur. —

Carie du sternum.

Tronc. — Douleurs dans les reins quand on se penche en arrière. — *Pression et compression au-dessus des hanches. — Douleur pressive, crampoide et tractive dans le dos. — *Tension dans la nuque. — Douleur d'excoriation dans les vertèbres du cou. — Grosseur du cou.

Bras. — *Epaules douloureuses, comme si elles étaient meurtries et excoriées. — Dartres humides, croûteuses et brûlantes à l'avant-bras. — Engourdissement des mains, et surtout de la paume des mains. — *Sueur de la paume des mains. — Torpeur des doigts.—Prurit au dos des doigts. Taches jaunes sur les

doigts et ongles jaunatres. - Panaris.

Jambes. — Douleurs tractives dans les hanches. — Douleurs arthritiques dans le genou, déchirantes et tensives, aggravées au commencement de la marche, après avoir été assis, avec sensation comme si les tendons étaient trop courts (pendant la suppression des règles). — *Inquiétude et accablement dans les jambes. — *Lassitude dans les genoux. — Gonflement douloureux des jambes et des pieds. — *Taches rouges aux mollets, quelquefois douloureuses, devenant ensuite vertes ou james, comme après un coup ou une meurtrissure, et empéchant de mouvoir le pied qui est rétracté, comme si les tendons étaient raccourcis. — Crampes

72 COPAIVÆ BALSAMUM, -- CORALLIUM ROLL

aux mollets. *Froid et forte disposition à se refroidir les purds : Torpeur et insensibilité des pieds. Vésicules purulentes inv piels

COPAIVÆ BALSAMUM.

Fig. 1. Banne de copahu — HABM MASS — Hest n'u et prép. Vos Phormac hornes p., p. 203 — Poses usitées 3, 30. Durée d'action 10 à 12 peurs. Réméée énérge peu consu, et peur n'a énérge employ que contre les guisseraces.


SYMPTOMES. Eruptions urtilities | Levis quitalisme avant midi, frissons et frod , poss, apres mish, chabur general et soif avec désir d'eau froide. Pendant le treid febrile, le conde-pied est doulourensement sensible au mouvement. — Orachement de sang. - Envie de vomir. - Déchirements dans le ventre, précédés de tiraillemente dans les os des cuisses. -Bensation de brûlure dans le ventre. — Borborygmes et mouvements dans les intestins. - Selles blanches, diarrhéiques, généralement le matin, avec froid et déchirements tractifs dans le ventre, qui forcent à se replier sur soi-même. - Selles involon-Enrie continuelle et inutile d'uriner. - Émission d'urine goutte à goutte. - Prurit, cuisson et sensation de brûlure dans l'urèthre, avant et après l'emission des urines. - Douleur d'exceriation à l'orifice de l'urêthre. - Inflammation et gonflement de l'orifice de l'urèthre, qui reste béant, avec douleur pulsative dans tout le membre. —Écoulement jaune et puriforme par l'urethre. - Métrorrhagies. - Battements de cœur.

CORALIZEM RUBRUM.

COR. — Cornil rouge. — Archives de Start. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac hommop., p. 327. — Dose usitée : 30. — Remède encore peu connu.

TPTONES GÉNÉRAUX. — Courbature des membres après le mdre exercice en plein air. — l'aches rouges et lisses sur la su. — Sensation de froid dans les parties chaudes en les découant. — Les symptômes de chaleur et de froid sont améliorés la chaleur artificielle. Frissons fébriles, avec soif ardente et pleurs dans le front. — Chaleur sèche intérieure et extérieure





CORALLIUM RUBRUM.

avec pouls plein et dur. — Bâillements violents, fréquents, et se succedant rapidement, avec douleur dans l'articulation de la mâchoire. — Forte envie de dormir qui est insurmontable. — Réveu anxieux et sureauts en s'endormant. - En dormant, agitation et isctation.—Humeur grondeuse et jurements à cause des douleurs. Irascibilité et mauvaise humeur.

Tête. — Tête entreprise, comme à la suite de l'ivresse. — Confusion dans la tête, qui est comme vide et creuse. — Ivresse après avoir bu très-peu de vin. -- Céphalalgie pressive, comme si tout allast sortir par le front, laquelle force à remuer la tête, et n'est soulagée qu'en se découvrant le corps, qui est d'une chaleur brûlante. — Céphalalgie violente, avec nausées fortement aggravées dès qu'on s'assied. - Douleur dans le sinciput, comme s'il était aplati. — Aggravation de maux de tête et congestion à la tête et an visage, en se baissant. — Sensation comme si du vent traversait la tête, en la remuant rapidement. -- Sensation comme si la tête avait augmenté de volume.

Youx. — Sensation de compression dans l'orbite. — Douleur d'excoriation dans les yeux, en remuant le globe ou les paupières. -Sensation de chaleur dans les yeux, en fermant les paupières, avec sensation comme s'ils nageaient dans les larmes. - Sensa-

tion de brûlure dans les yeux à la lumière des bougies.

Nez. — Gonfiement semi-latéral du nez avec chaleur, pulsation et insomnie. -- Ulcère douloureux dans la narine. - Épistaria, quelquefois la nuit. -- Grande sécheresse du nex. -- Coryza fluent avec sécrétion excessivement abondante, d'une mucosité inodore et ressemblant à du suif.

Visage. — Chaleur de la face, augmentée en se baissant. — Douleur de meurtrissure à la pommette aggravée au toucher. Douleur de luxation dans l'articulation maxillaire, en màchant et en ouvrant grandement la bonche. - Gonflement douloureux des glandes sons-maxillaires. — Levres gercées, douloureuses.

Appétit. — Grande sécheresse du palais et de la gorge, avec sensation d'excoriation en avalant. — Insipidité des aliments. — Goût douceâtre de la bière. — Désir des choses acides ou salées. —

Après le repas, la téte tourne comme si l'on était ivre.

ales. -- Urines brûlantes et couleur d'argile, avec Parties geniu sédiment couleur d'argile. - Forte sueur des parties génitales. - Gonflement du prépuce, avec douleur d'excoriation au toucher. -- Gonorrhée bâtarde, avec sécrétion fétide et de couleur vert jaumatre. - Ulcères rouges et lisses, au gland et aux paroiinternes du prépuce, avec sécrétion sanieuse et jaunâtre. - Pollations.

Poitrine. — Tour douloureuse, comme s'il y avait une pierre qui déprimat la plèvre. -- Expectoration jaune, puriforme, à la suite de la toux. - En respirant profondement, sensation de froid



274 CORALLIUM RUBRUM. - CROCUS SATIVUS.

dans les voies aériennes, avec renaclement difficile du mueus

bronchique.

Membres. - Douleur pressive dans les omoplates, aggravée en tonssant. -- Roideur dans la nuque. -- Douleurs dans les articulations scapulaires, comme si la tête de l'humérus était pressée violemment vers le dohors. -- Taches lisses et de couleur rouge foncé, dans la paume des mains et aux doigts.

CROCUS SATIVUS.

CROC. — Safran cultivé. — Archives de Stade. — Hist. nat et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 204. — Doses axitées : 6, 30. — Durce d'action : jusqu'à 7 jours.
Antidote Op

COMPARER AVEC : Acon. bell. ign. mos. op. plat.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où j'on pourra consuiter ce medicament contre : - Danse de Saint-Guy, Attections hystériques, Impecillite; Melancocolie; Mélancolie rengieuse, Hémorrhagies actives; Coma, Blepharospaine; Metrorrhagie, meme apres l'accouchement ou par suite d'une frayeur; Hémoptysie?; Avortement; Lochies trop abondantes, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Mourements, comme par quelque chose de rivant dans différentes parties du corps. — *Accès de Convulsi la comme la comet, avec 11 c', danses et sants, alternant ave, des quintes de esqueluene. Sensat, in de relachement et de flechissement dans les articulations. Engourdissement de quelques membres, la nuit, pendant le sommed. Amelioration de symptomes au grand air; prusieurs a utre eux apparaissent la nuit, et s' gyranent en genéral le maim. — Ébullition le sang quelques us aans teut le corps. — *Leoulement par divers organes d'un sang noir et resqueux. — l'esanteur et courbature des membres après un lezer exercice. — Alternation frappante des symptomes physiques et moraux les plus opposes. — Faiblesse generale excessive, avec accès d'evanomissement pendant le nouvere ut. — (tran l'accablemen, le maim — Tremblement de tous les mem l'es

Peau. - Rougeur cearlate de tout le corps. Engelures. - Suppuration d'anciennes blessures.





CROCUS SATIVUS.

Forte enoie de dormir, le jour, surtout après le repus, quelquefois le soir. — Somnolenes, avec yeux ternes et vitreux.
 Chante, cris et summits pendant le sommeil. — Rêves enrayante ou gais et plaisante.

Maral. — Grande disposition à la tristese, alternant quelquesois avec grande gaieté et humeur joyeuse. — Forte envie de rire, de plaisanter et de chanter, quelquesois avec faibleme excessive. — Manie pais et plaisante, avec pâleur du visage, mal de tête et obscurcissement des yeux. — Abandon de son libre arbitre. — Emportement colérique et violence, fréquemment suivis d'un prompt repentir. — Alternation de dureté et de douceur dans le caractère. — Oubli et distraction. — Vivacité de la mémoire.

Tête. — Céphalalgie stupésiante comme si l'on était ivre, avec yeux abattus. — Vertije avec évanouissement. — Vertige confus en se levant après avoir été couché. — Céphalalgie au-dessus des yeux, avec douleur brûlante, sensation de brûlure et pression dans les yeux, surtout le soir à la lumière. — Tête lourde le matin, avec pression au vertex. — Douleur tractive dans le front, avec nausées. — Pulsation semi-latérale dans la tête et à la face. — Coupe dans le front et les tempes. — Sensation de vacillement du cerveau pendant le mouvement.

Your. — Prurit aux paupières. — Fourmillement dans les sourcils. — Premion, douleur d'excoriation et sensation de brûlure dans les youx et les paupières, surtout en les fermant ou en lisant, ou le soir à la lumière. — Sensation de gonflement des yeux, comme si on avait beaucoup pleuré. — Sécheresse des yeux. — Larmoiement en lisant. — Agglutination nocturne des paupières. — Frémissement visible des paupières. — Lourdeur et contraction crampolde des paupières. — Commes nocturnes dans les paupières. — Clignotement continuel des yeux. — Pupilles délatées. — Besoin continuel de se frotter les yeux. — Vue trouble, comme à travers un voile, surtout le soir en lisant à la lumière des bougies. — Le papier semble avoir un reflet rose pâle en lisant. — Scintillement devant les yeux.

Oreilles. — Otalgie semblable à une crampe. — Tintement dans les oreilles le soir après s'être couché. — Bruissement dans les oreilles, avec dureté de l'ouie, surtout en se baissant.

Mez. — Épistaxis d'un sang noir et risqueux, souvent seulement par une narine, et jusqu'à faire perdre connaissance. — Éternament violent et fréquent.

Visage. — Couleur terreuse de la face. — Alternation de rougeur et de pâleur du visage. — Chaleur ardente du visage, surtout le matin. — Lèvres gercées et ulcérées. — Puisations dans un seul côté du visage. — Taches rouges à la face.

Bouche. — Grattement et apreté dans la bouche. — Accumulation d'eau dans la bouche. — Langue humide et chargée d'un enduit blanc, avec érection des papilles.



CROCUS SATIVES.

270

Gorge. — Mal de gorge comme par allongement de la luette, ou comme s'il y avait un tampon dans la gorge, pendant et hors le temps de la deglutition. — Grattement et apreté dans la gorge.

Appétit. - Gout répugnant, acide, douceâtre. - Gout dour ou amer au fond du gosier. - Soif continuelle, le soir, avec malaise dans le ventre apres avoir bu. - Absence d'appétit avec sensation de plenstude pour peu qu'on ait mangé.

Estomac. — Renvois à vide, le matin a jeun. Pyrosis après avoir mangé de bon appétit. Fadeur, malaise et sensation d'accablement à l'epigastre. — Douleur bràlante à l'estomac. —

Borborygmes et sermentation a l'épigastre.

Ventre. Ventre ballonné avec sensation de plémitude. Maux de ventre crampoïdes. — Pincements dans le ventre après avoir bu (de l'eau). — Maux de ventre par refroidissement. — Monrements dans le ventre, comme par quelque chose de vivant. Coups au-dessous de l'hypocondre gauche. Sensation de pesanteur dans la région inguinale.

Selles. Prurit et fourmillement à l'anus. Elancements obtus

à cote et au-dessus de l'anus.

Urines. - Econlement de sang par l'urethre. - Urines jaunes.

Règles. — Affluence de sang vers les parties génitales, comme pour les regles. — Règles trop fréquentes et abondantes. — Règles douloureuses. — * Metrorrhagies d'un sang noir et visqueux. — Ecoulement de sang pendant la nouvelle et la pleine lune.

Larynx. Tour ciolente, sèche, ébranlante, tres-soulagée en pas-


sant la main sur l'epigastre.

Poitrine. Gêne de la respiration. — Besoin de respirer profondément, par suite d'une sensation de pesanteur au cœur. — En inspirant, sensation comme si l'on avait de la vapeur de soufre dans la gorge. — Haleine fétide. — Élancements dans la poitrine et surtout dans les côtés. — Mouvements comme par quelque chose de rivant dans la poitrine. — Coups dans la poitrine qui suspendent la respiration. — Sensation de chaleur qui remonte au cœur, avec anxieté et gêne de la respiration, soulagée par des baillements. — Sensation de pesanteur au cœur.

Trono. Tiraillement dans les reins, avec douleur dans les aines.
- Sensation de roideur au cou, pendant le mouvement. - Gon-

flement exterieur du cou.

Bras. - Douleur dans l'articulation scapulaire, en remnant le bras comme s'il était demis ou qu'il allât se deboiter. - Engourdissement des bras et des mains, avec immobilité, surfoit la nuit, pendant le sommeil. - Tiraillement fouillant dans les avant-bras. - Pesanteur et douleur de meurtrissure dans les avant-bras, après les avoir remues legerement. Picotement brûlant et tension dans le bout des doigts, comme par stagnation du sang, après une promenade en plein air. Engelures à la main et aux dougts.



CBOCUS SATIVUS. --, CROTALUS HORRIDUS.

Jambos. -- Sensation de faibleme dans les cuisses, en étant assis. --Déchirement nocturne dans la jambe avec inquiétudes dans cette partie. — Douleur de meurtrissure dans les mollets. — Fatigue dans la plante des piods, avec douleur brûlante et fourmillement. Engelures aux orteils.

CROTALUS HORRIDUS.

CROTAL. — Veninselentaire du serpent à sonnettes. — liening. — Bist. nat. et prép. Yoy. Pharm. bomosop., p. 480. — Durée d'action : plusieurs semaines.

Antidotes: 1° phosph., 2° arr. bell. caps.

Comparen avec: 1° Bell. hep. merc., 3° ars. caus., 3° carb-veg. phos-ac.,

4° alum caps. con. dulc. natr-m. n-vom. samb. veratr.

Voyez aussi Lachesis, tome [].

SYMPTOMES GENERAUX. — La plupart des symptômes se manifestent du côté droit, et les douleurs paraissent occuper de préférence les ce des membres. — Les sujets gras paraissent en être plus affectés que les personnes maigres. - - • Affections du printemps. — *Endolorissement de tous les membres, permettant à peine de rester couché. — • Rhumatismes invétérés. — • Paralysies. — Lassitudes, accès de défaillance, mort apparente. — Tremblement par tout le corps. — Spasmes et convulsions. — Hémorrhagies par toutes les ouvertures du corps. — Saignement facile des blessures. • Chlorose?.

Pean et Lésiens de continuité. — Ecchymoses. — Taches noires, rouges ou marbrées. — Taches jannes par toute la peau. •Jannisse. — •Fièvre janne. — Enflure cedémateuse du corps. Ulcères autour d'anciennes blessures. — D'anciennes cicatrices s'ouvrent de nouveau. -- Gangrènes avec rougeur noirâtre.

Sommeil - Grande somnolence, même au grand jour, ou le soir. Le matin, au réveil, membres comme brisés. — *Délires noc-

turnes, avec year ouverts.

Fièvre. - Fièvre ardente. - Pouls presque insensible, tremblant, intermittent. -- •Fièvre typhoïde. -- Fièvre tierce. -- Soif pen• dant la flèvre.

Moral. — Abattement avec indifférence pour tout. — Angoisse et inquiétude. - • Mélancolie. - • Humeur querelleuse. - • Dé-

mence. — Faiblesse frappante de la mémoire.

Teto. - Vertiges. - Affections cérébrales. - Céphalalgie par congestion de sang et constipation. - Secousses et vacillement dans le vertex, surtout en montant les escaliers. -- Elancements dans les tempes. - Prurit violent au cuir chevelu, avec formation de pellicules. — Gonflement de la tété.

277



CROTALUS HORREDUS.

278

Your. - *Brûlement dans les yeur. - Rougeur des yeur, avec larmolement. - Ecoulement de sang par les yeux. - Yeur jaunes, ou ternes, troubles et ensouces. - Pupilles dilatées. Scotomie, en lisant.

Oreilles. - Unaleur dans les oreilles. - Tiraillements avec sensation d'obturation. Ecoulement de sang par les oreilles.

Nex. - Saignement du nez, avec vertiges.

Face. Face blanche comme de l'albatre, cercle bleu autour des yeux - Teint plombe. - Face jaune, ou rouge et bouffie -Eryspele de la face - Boutons à la face, chez des jeunes filles, au printemps. - Levres tremblantes. Crampe des machoires.

Dents. — Seconsses dans une molaire, comme des coups. - Exfo-

hation des dents. Vac.llem int les deuts.

Bouche et Gorge. Langue noire et gonfiée. Perte de la parole, comme par construction de la langue et du gosier. Parole confuse, indistincte. Déglutition diffi de de la salive. Besoin frequent d'avaler la salive, avec sonsation comme si la gorge se comprunait. - Hydrophobie ralneojuc

Gastrioisme. Regurgitation d'un liquide aigre et acre, après avor mangé du pam blanc. Pyrosis. - Nausées, par acces. surtout pen lant la marche et la station. Après avoir mangé quoi que ce soit, vomissement des aliments, violent, rerdatre, bilieux et très-amer. - Ventre tellement irritable que tout est

rejete.

Estomac et Ventre. - Donleurs d'estomac. - Endolorissement du creux épigastrique. - Elancements dans le creux de l'estomac. Pression dans l'estomac, avec gout rance dans la gorge. Gene des vetements autour des hypocondres.
 Pression sous la region splenique, ou élancements comme apres une course foreee. *Iranchees, "Is matin et apres le repas. Brulement. dans le ventre. - Inflammation des intestins. - Ventre ballonne, comme trop plein, av a douleur au toucher et brulement.


Anus et Selies. - "Constipation avec mal a la tete - Selles diarrhoiques fréquentes, avec collques au-dessous du nombril.

Evacuations involontaires. - Saignement par l'anus.

Urines. Retention douloureuse des urines, avec de hauts cris. - Somation comme si une boule roulait dans la vessie et aliait sortir par l'urethro. - Urines augmentées. - Urines salurees et Parties viriles. Appetet venerien exalté.

Larynx. - Enrouem at et voix basse, rauque. Chatouillement dans la fossette du cou, provoquant la toux. - Toux seche. -Toux avec point de coté. - Expectoration sanguinolente. -Hemoptyps.c. - Douleur dans le larynx en y touchant.

Poitrine. Respiration rapide, a bouche ouverte Cirande oppe ssion de poetrine ne permettant point, la nuit, de rester couche. Dyspuce avec soil inextinguible. - Dyspuce avec



CROTALUS HORRIDUS.

CROTON TIGLIUM.

279

anguisse, nausées, soif et diarrhée. — *Oppression jusqu'à fuire tomber en défaillance. — Douleurs de poitrine, avec vomissements de matières verdâtres. — Pasumonie. — Péricardite.

Trens. — Manz de reins. — Gonflement sons la machoire et autour du cou.

Membres supériours. — A l'articulation humérale, nodocités molles sons la peau, avec élancements. — Douleur d'excoriation au bras, par suite d'une contusion. — Tremblement des mains dans le repos. — Douleure ostéocopes, paralysantes, dans les doigts. — Suintement de sang sous les ongles. — *Ponorés.

Membres inférieurs. — Jambes facilement engourdies en les croisest. — Timillement depuis la hanche droite jusqu'an pied, le soir, en marchant. — Douleur crampoide et lassitude dans les cuisses, comme après des efforts fatigants. — Ulcères à la cuisse. — Douleurs arthritiques au genou. — Gonfiement de la cuisse avec brûlement. — Douleurs de brisure aux malléoles, très-fortes en marchant. — Douleurs de brisure aux malléoles, très-fortes en marchant. — Douleurs de choses aigués. — Gonfiement des pieds, avec senantion de froid et brûlement en dedans. — Orteils comme fatigués par une longue marche.

CROTON TIGLIUM

CROT. — Graine de Tigli, Graine des Moluques. Pignon d'Inde. — Hist. nat. et prép. Voy. Phormac. homœop., p. 206. — Médicament encore très-peu connu du côté pratique.

douleurs dans les membres. — Malaise générale et abattement; douleurs dans les membres. — Malaise général, avec lassitude, suivie d'envie de dormir, aggravé en se couchant, avec perte de la vue et de l'oule; gouttes de sueur sur le front et sensation comme s'il lui était impossible d'atteindre la prochaine maison, avec vertige, pâleur du visage, lassitude et abattement, poussant à aller au grand air, où cependant on se trouve plus mal. Brisement du corps, quelquefois avec malaise fréquent. — Sensation d'engourdissement de tout le corps. — Forte excitation de tout le corps; tremblement général. — Faiblesse, quelquefois avec malaise, ou bien avec abattement. — Accès d'évanouissements. — Amélioration des symptômes pendant le sommeil.

Peau. — Chaleur ardente, surtout aux mains, avec veines gonfiées; prurit suivi de douleur brûlante; inflammation vésiculeuse de la peau; rougeur avec pustules qui, le jour suivant, forment des croêtes; pustules avec inflammation presque générale des tégu-

ments du ventre et mivie de desquamation.



CROTON TIGHTM.

Sommeil. — Baillements fréquents, toute la matinee, avec sensation de flaccidite et d'endolorissement dans l'estomac. — Entre de dormer, invincible l'après-midi, vers midi, forçant a se coucher sans que cependant on puisse s'endormir, avec palpitations de cœur. — Sommeil agité la nuit, a cause d'une affluence de réves, qui quelquefois sont pénibles et anxieux. — La nuit, au lit, jactation anxieuse sans pouvoir dormir, puis sommeil subit avec rêves pénibles. — Réveil a minuit d'un sommeil lourd, avec jambes pesantes comme du plomb; au reveil, lassitude, brisement des membres et tête lourde et entreprise; mal de tête qui réveille. — Réveil subit. — On s'endort, couche sur le dos, et se réveille par une pollution. — Rèces abondants, pénibles, affligeants, de soi-même.


Froid : Facilement ; surtout aux extrémites, avec chair Fièvre. de poule et se dissipant au lit; après midi, ne cessant pas même dans le lit; principalement au dos; surtout au ventre; des pieds jusqu'aux mollets, peau fraiche au corps, devenant chaude lorsque le pouls s'élève, avec transpiration : froid subit et pâleur des mains (comme mortes), avec rides aux doigts Frilosité, avec horripilation, le soir, frisson parceurant tout le corps. - Etat fébrile, quelquefois douloureux : d'abord augmentation de la clialeur du corps, puis sensation de froid dans le dos, dans la region des vertèbres lombaires. — Augmentation de chaleur dans tout le corps, dans le ventre. - Chaleur , partant des vertebres lomlaires; générale avec transpiration et céphalalgie; brulante, cuisante, puis froid partant des vertèbres lombaires. Pouls fréquent et plein, acceléré et irrité; faible et quelquesois frequent en même temps, ou bien petit, plein, petit et accéleré. Sueur, quelquefois seulement au front,

Moral. Tristesse, quelquifois avec repugnance pour le travail ou bien avec anxiete et déplaisir de toutes choses; mélancolie fréquente. -- Agitation. Humeur grognoune, quelquefois avec mécontentement. Répugnance pour le travail, on ne veut que flaner et rien entreprendre de serieux. Aspect désordonné avec yeux hagards, étincelants. Faiblesse de la

mémoire.

280

Tôte. Tête entreprise: en se levant, comme obscurcie, avec hébétude et pression dans le front; dans le front, avec pression et pesanteur: avec pression dans les tempes; dans l'occiput, quelquefois comme a'il était pris dans un étau (à gauche), avec pesanteur de la tête et fouillement dans les yeux, avec plénitude, obscurcissement et pesanteur dans le front, surtout a droite, avec pression descendant de l'occiput et se propageant jusque sous l'oreille avec des élancements; etourdissement dans la tête comme apres des boissons spiritueuses. L'ertiges, avec manx de tête; avec pesanteur de la tête; a faire tomber en se tenant debout; ne permettant presque pas d'être assis, surtout en levant les yeux;



CROTON TIGLIUM.

281


avec embarras de la tete jusqu'au soupér; en se promenant en plein air; surtout à droite, avec pression dans l'œil; dans le sinciput, avec tiraillements à travers le nez jusque dans le front. -Piénétude dans la tête : avec étourdissement et pesanteur dans le front ; tout le jour avec forte pesanteur et ne permettant pas de lire: avec sensation de vertige dans le front, avec pression. Pression dans la tête : dans la tempe droite et le côté du front ; dans le sincipus, et quelquefois surtout à gauche, ou bien avec douleurs violentes, battements et tension, partant du front, avec ombarras de toute la tête, aggravée après le repas ; étourdissante ; dans les erbites, aggravés dans l'appartement et vers le soir, surtout à l'air ; pression à l'occiput. — Tension dans le sinciput, avec pression at élancements; serrement dans les tempes. — Décitirements : Remontant vers le vertex; dans le front, jusque dans la tempe droite où ils se changent en élancements.—Elancements : Dans le front, au-dessus de l'œil droit; dans la tempe gauche; entre l'occiput et la nuque. -- Congestion à la tête, partant du ventre, avec penn ardente et transpiration. — A l'extérieur : Picotement aux téguments de la tête, fourmillement à l'occiput; tressaillement à la tête; brûlement à la tempe; comme par des charbons ardents ; sensibilité des téguments de la tête, le chapeau fait mal.

Your. — Eloncements, surtout dans l'œil gauche; tressaillements et élancements dans l'angle gauche, avec contractions fréquentes et tressaillement de tout l'œil; douleurs contractives dans les paupières ganches, surtout vers l'angle interne. -- Prurit aux paupières. — Irritation de la conjonctive ; rougeur inflammatoire de la conjonctive gauche ; inflammation de l'œil dans lequel une goutte d'huile s'est introduite, occupant tout le côté du visage : gonflement cedémateux des paupières; petites vésicules autour de l'uil; gonfiement d'une glande sous la peau, au-dessous de la paupière inférieure droite, avec rougeur de la peau. - Fort tremblement des paupières. - Larmoiement. - Vue trouble, comme à travers un brouillard ou de la fumée; nuage devant l'æil faible, devant les deux; la rue se perd, quelquefois comme par un vertige (dans l'appartement), ou bien par pesanteur et faiblesse des yeux.

Oreilles. - Epreinte dans l'oreille gauche; quelquefois spasmodique et prefondément dans l'intérieur; pression sourde vere les deux conduits auditifs; pression et tournoiement vers le trou de l'oreille avec embarras de la tête; élancements au-dessous de l'oreille gauche. - Dureté de l'ouse, par l'oreille droite : perte de

l'oule de courte durée : bruit dans les oreilles.

Mes. — Inflammation du nez et de toute la face. — Éruption à la cloison, avec rougeur de cette partie, douleur au toucher, et petites vésicules jaunes qui, plus tard, forment une croûte et s'écaillent enfin, - Irritation de l'interieur du nes : sécheresse ;



282 CROTON TIGLIUM.

manque de respiration par le nez. — Augmentation de la sécrétion nasale ; léger coryza.

Pace. — Pâleur et froid du visage; chaleur augmentée; brûlement quelquefois, surtout aux joues, on bien à toute la face et durant plusieurs jours. — Inflammation de la face et du nez; gonflement du visage, éruptions de boutons. — Lèvres brûlantes, quelquefois surtout aux commissures des levres et avec gonflement des bords externes; tension dans les commissures des lèvres; secheresse des lècres, quelquefois avec gerçures, on bien surtout le soir, et avec tension. — Dans l'articulation sous-maxilleure gauche, tiraillement; gonflement d'une glande, avec douleur au toucher.

Dents. — Dans une molaire creuse, douleur d'excoriation en mi-

rieur, quelquefois douloureux.


Bonche. — Bonche comme brûlée à l'intérieur; ardeur dedans; sécheresse avec grattement dans la gorge. Accumulation d'eau, quelquefois avec écoulement par les coins de la bouche; sécrétion de salive augmentée, avec sensation de chaleur dans la bouche; salivation fréquente; irritation des glundes seclivaires, forçant à cracher souvent, provoquant une sensation de brûlement et une acreté avec goût rance dans la gorge, ne cessant qu'après avoir éprouvé dans le rectum des symptômes analogues qui sont suivis d'une selle. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Gonflement du palais; chatouillement, grattement et brûlement à la jonc-

tion des parties molles et solides.

Gorge. — Sensation, dans la gorge, d'une cherille qu'on ne peut avaler. — Tressaillement dans la gorge. — Grattement dans la gorge : forçant à renâcler ; brûlant dans le gosier et le larynx : précédé de sensation de rudesse ; suivi de brûlement; éloigné en prenant du bouillon. — Brûlement dans la gorge : comme par du poivre ; continuel, avec contraction, fort amélioré après un court sommeil; amélioré en inspirant, aggravé en expirant; ardeur dans la gorge et l'œsophage, jusque dans l'estomac. — Luette rouge et allongée ; amygdales gonflées et douloureuses à la pression. — Sécheresse du gosier : avec irritation, comme par inflammation ; avec difficulté d'avaler ; avec expectoration de mucosités acides comme du vinaigre. — Expectoration abondante de mucosités visqueuses, avec goût acide.

Appétit et Goût. — Goût : d'amandes; fade, avec fourmillement douloureux au bout de la langue; pâteux, avec langue chargée d'un enduit blanc; doux amer, et comme par l'électricité au bout de la langue; amer; acide, âcre, remontant à l'estomac. — Appétit diminué de même que la soif; appétit nul; dégoût répugnance pour la bière; impossibilité de manger, même de l soupe au lait, à cause de dégoût et de maux de cœur; après ave pris du lait, fort dégoût et nausées, avec envie de vomir. — Apr

le repas, mal an ventre.



CROTON TIGLIUM.

288

hunythmas gastriques. — Renvois : arec nausées, quelquefois artout après avoir bu, ou bien avec abattement ; avec dégoût. --Régurgitations : d'eau ; de bile, le soir. — Hoquet. — Nausées et anvie de vomir : fréquemment ; avec dégoût persistant et malaise ; urec dégoût; continuels, avec froid, régurgitation d'eau et salication; avec vertige et absence d'appétit, ne permettant presque pas d'écrire ; dans le ventre, avec vomiturition ; haut-le-cœur fréquents avec accumulation d'eau dans la bouche. — Vomissements : Avec nausées; du café ingéré ; de mucosités, avec amertume de la bouche; d'une cau jaunâtre, avec odeur d'huile et goût douceàtre, comme l'huile ; après le repas, d'eau, de mucosités et de pain, avec nausées continuelles ; amers le soir, des aliments ingérés au souper, précédés de nausées, plénitude et pression à l'estomac, suivis de sucur à la face; la nuit, d'un liquide acide, d'odeur àcre, précédés de nausées; violents des aliments ingérés, en se promenant en plein air (après de fortes nausées), ou bien d'eau et à la suite de nausées, aggravées après des tartines de beurre : forts, subits, d'une eau écumeuse, blanc jaunâtre, avec efforts spasmodiques ; vomissements de bile.

Estomac. — Plénitade: avec sensibilité douloureuse de l'estomac; pressive, quelquefois avec nausées et absence d'appétit. — Sensibilité douloureuse de l'estomac: au toucher; avec sensation de vacuité et nausées avec envie de vomir jusqu'après midi. — Pression à Pestomac: avec mouvement dans le ventre; avec chatouillement; avec angoisse; avec malaise dans le ventre; avec serrement, angoisse, et malaise excessif, ou bien accompagné de tension; pression dans le creux de l'estomac. — Contractions dans l'estomac, avec pression dans le creux et écoulement d'eau par les yeux et le nex; mouvements spasmodiques, comme pour vomir, avec nausées; rétrécissement de la partie supérieure de l'estomac. — Grattement dans l'estomac; brûlement, quelquefois comme par des charbons ardents; brûlement et chaleur dans le creux de

l'estomac; borborygmes, avec pesanteur sur la poitrine.

Ventre. — Dans la rate : élancements; pression. — Douleurs violentes dans le ventre et l'estomac; bas-ventre affecté et dou-loureux; maux de ventre améliorés après avoir pris une soupe au lait; douleur permanente dans le ventre en touchant le nombril, avec bruit dans le ventre et maux de ventre; douleur dans la région ombilicale et le bas-ventre; les douleurs dans la région ombilicale sont aggravées par le toucher, ou en appuyant dessus, sur quoi elles s'étendent quelquefois jusqu'à l'anus qui sort alors. — Coliques dans la région ombilicale, quelquefois surtout le soir, et avec ballonnement du ventre qui est suivi d'une selle; douleur comme si les intestins se tordaient dans la région ombilicale, suivie de déchirements dans le côté gauche; violentes douleurs spasmodiques dans le ventre, plus fortes en étant assis courbé, qu'en marchant et en se tenant debout. — Tension dans le ven-




CROTON TIGLIUM.

284

tre : entre l'ombilie et le creux de l'estomac; pénible et spasmodique dans la partie superieure du ventre, surtout en étant assis : forte avec ballonnement de tout le ventre, selle, emission de vents fétides, et forte aggravation de tous les symptomes en étant assis: dans la région ombilicale, en étant assis, avec pression sur l'anus. - Pression dans le rentre . en sortant, remontant vers l'estomac, avec nausées subites, et avec pincements et tennion dans l'ombilie : au-dessus du nombril avec serrement. - Procement dans le rentre avec borborygmes; dans la région ombiheale, quelquefois surtout en marchant : avec tranchees, quelquefois surtout dans la region ombilicale et le cote ganche du ventre; avec pression our l'anus ; fort, en se reveillant, avec grondement dans le ventre, peu apres, émission de vents fetides avec fort besoin d'aller a la selle, et évacuation avec tranchées et spasmes abdominaux. Tranchées: avec pancements; dans le colon transpersum, repouveloes apres chaque selle : partant de l'onbilic, coupant presque la respiration, et forçant à se courber de côté; nu-dessus de l'ombilie, comme avec des couteaux, se dissipant apres une selle, dans la région ombilicale et les intestins en même temps, ou bien suivies d'une selle; au-doss us de l'estoniae, dans le ventre. Déchirements dans le ventre : Pendant le repast dans le côté droit du ventre, avec douleurs incisives au-d sous de l'estomac, dans le colon dans la région ombilicale, après le repas. Elancements dans le ventre : au-dessus de l'on bille; à gauche de l'embilie; dans le carrim; dans la region de l'S romain. Houleurs d'excernation dans le bas-ventre, en toussant; sensation comme et de l'eau tiède se mouvait dans les Intestina, surtout du côte gauche; sensation de froid dans le ventre. Pesanteur dans la partie superieure du ventre avec nausees; dans le bas-ventre, avec retraction du ventre. Plénitude dans le centre : avec borborygmes et coliques; avec pincements: avec fension et coliques dans la region ombilicale, Ballonnement du rentre tout le jour avec tension et borboryemes aggraves en marchant. Mourements dans le ventre, fluctuation comme par de l'eau; borbervgmes, qualquefois à gauche; grondement surtout dans les intestins greles Extérieurement, chaleur fourmillante dans les teguments du ventre. Dans les aines, tension et douleur -- Emission de vents : avant la selle : avec borborygmes dans le ventre, fréquente, quelquefois avec élancements, ou bien comme avant une selle niolle ; vents fétid s. Selles Anus. - Besom d'aller a la selle : avec groudement et pincements dans le ventre ; comme par chaleur et agitation dans le ventre; avec pression sur l'anus comme par une diarrhee; le matin au lit, et apres s'être leve, selle suivie de d'uleur d'exco-

riation à l'auus, subit, immediatement apres s'être levé ou donné de l'exercice: si pressé qu'il ne peut aller assez vite pour atteindre le vase, - Selles: molles, comme de la bouillie, queiquefois avec





CROTON TIGLIUM.

brâlement à l'anus ; visqueuses ; muqueuses ; aqueuses , quelquefois très-abondantes et fréquentes, même la suit, ou bien avec clancements à l'anus; liquides avec grattement à l'anus; jaunes, diarrhéiques, quelquefois après les vomissements, ou bien avec oueur; muqueuses, avec ténesme; vert foncé liquides, suivies de lassitude de longue durée; d'abord fermes, puis bilieuses-muqueuses, et enfin aqueuses; brunes, en bouillie, avec mucosités, ou bien suivies de borborygmes dans le côté gauche; vert grisatre, brun sale, promptes et partant d'un seul jet.— Après avoir pris du café, les selles (fréquentes) cessent. — Après la selle : tiraillements et pression dans le haut du ventre et la région ome! bilicale. — Emission d'ascarides et de ver solitaire. - Dans lerectum, premion et ténesme, avec tranchées à se tordre en étant amis. — Dans l'anus : brûlement, quelquefois ne permettant pas de rester assis, et avec gonflement des alentours, ou avec pulsations et élancements; grattement après la selle; douleur d'excoriation et brûlement après s'être donné de l'exercice, douleurs contractives et élancements en marchant; douleur comme si une cheville cherchait à sortir; douleur d'excoriation après la selle, avec sortie de l'anus et besoin d'aller à la selle, et en comprimant le ventre, pression sur l'anus jusqu'aux parties génitales et au gland, avec cela forte angoisse, oppression, sueur au front et nausée avec perte de la vue et de l'ouïe; le repos adoucit les douleurs.

Urines. — Dans la région rénale droite, forts élancements qui coupent la respiration; excitation des reins, avec urine abondante. — Besoin d'uriner, quelquefois immédiatement après avoir uriné; émission augmentée, quelquefois arec urine fréquente, même toutes les demi-heures. — Urine jaune abondante; nuage dans les urines, qui quelquefois sont troubles; après que le nuage s'est dissipé, des cristaux bruns nagent à sa place; urine pâle, écumense, le matin; pâle, avec sédiment blanc, le jour; jaune orange, pâle, la nuit, un pen trouble et floconneuse au fond; foncée, enflammée et très-floconneuse, la nuit et le matin; rouge de sang, déposant beaucoup de mucosités au fond, qui, en les remuant, s'allongent en fils; sédiment trouble dans les urines, puis urine avec pellicule irisée. — En urinant, ardeur dans l'urèthre, ou dans le gland.

Parties génitales. — Verge douloureuse avec rougeur du gland et élancements dans l'urèthre; tiraillements dans le cordon spermatique gauche, empêchant de marcher; testicule gauche rétracté, le droit pendant et flasque; éruption dartreuse au scrotum; érections. — Règles trop peu abondantes ou tout à fait supprimées et avec dyspnée et palpitations de cœur, surtent en montant un escalier.

Larynx. — Enrouement; coix raugue, quelquefois comme par un rhume ou avec besoin de renticler; chatouillement dans le larynx;



CROTON TIGHTEM.

sécrétion et accumulation de aucosités, augmentées quelquefois avec chatonillement ou principal ment le sor, catarrhe bronchique; pression sur le laryux, surtout à gauche loux, avec renaclement frequent; continuel, quelquefois avec mucosités dans les bronches, qui ne veulent pas se detacher; arec expectoration de mucosités, surtout le matin, ou bien le soir, et avec pression sur la poitrine; mucosités continuelles dans les poumons, qui ne se peuvent detacher, avec dyspuée et sifiement en res-

pirant profendement.

286


Poltrine, Respiration. Respiration . empeche par des maux de ventre: difficile; avec oppression, quelquefois avec angoisse; respiration génée, quelque fois avec plenitude et angoisse dans la poitrine, respiration courte apres la selle; dyspuec; aggravec en montant l'escalier. Postrone douloureuse en appuyant dessus; plémetuda et sensibilité douloureuse des deux curites, avec clancements brûlants a gauche et vers los deux omoplates, ou bien avec pression et brûlement à droite et a gauche; malaise particulier dans la portrine et le ventre; sensation de vacuité dans la poitring. Pression sur la postrine : en respirant prefondement ; forte, le soir : profondement dans le milieu de la poitrine. Elancemente dans la postrine : en bas, a droite, en inspirant ; du côté gauche quelquefois, surtout le soir. Pulsation, derrière. du côté droit. - Brûlement dans la portrine, quelquefois violent, jusque dans les intestins - Palpitulians de cœur : riolentes quelqu fols, que l'on peut sentir exterieurement : pendant le colt; apres le repas, surtout en étant couche; battement subit dans la région de l'norte. - Elancementa frequenta dans la région du cœur, quelquefois surteut en inspirant; tressaillement frequent vers le cœur; le ventricule gauche du cœur est surtout affecté. - Extérieurement, pulsation, glouglou, et battements our la postrine; déchirements

Don, Reine, etc. - Dans les lombes, fourmillement, comme par des insectes, - Dans les vertébres cervicales, pressions et tiral-

lement.

Extremités supérieures. Sur l'epaule drute, pression; elancements dans la gauche. — Dans les brus, pesanteur et lassitude; brusement tensif; sensation de pesanteur et accablement; dechirement dans le droit. Dans le conde gauche, terébration dans l'articulation. Dans l'arant-brus droit, tiraillement; tension, pression et brusement; dechirement dans le gauche. Dans la main droite, tiraillements — Dans les dougts gauches, tressaillements; tiraillements et dechirements dans le doigt du milieu gauche; douleurs touillantes dans les dermères phalanges des doigts.

Extrémites inférieures. Dans l'anticulation coxo-fémorale gauche, douleur tensive, sensible surtout en se levant de son siège; tiraillements et gouffement dans les fesses, à l'anus, après



CROTON TIGLIUM. — CUPRUM METALLICUM.

s'être donné du mouvement. -- Dans les jambes, lassitudé et accablement. — Dans les ouisses, tension et brûlement; brûlement pruriant à la gauche; sensation de paralysie à la même. ---Dans les genoux, fenillement et déchirement; tension et picotement : foullement arthritique. - Dans la jombe gauche, picotement: déchirement; tressaillement pendant la sieste; ardeur preriente nu tibia droit. -- Au pied droit, pecantour et precsion dans l'articulation; élancements dans les deux, quelquefois comme alls statent luxes (gauche); tremaillement et déchirement dans la plante du pied gauche. -- Dans les orteils, élancements et déchirements, surtout dans les gros.

CUPRUM METALLICUM.

CCPR. - Culves metallique.-- Hannenann. - Mist. not. et prép. Platmac. homozop., p. 39. — Dose ustate : 30. — Durde d'action : 30 à 30 jours dans quelques cas de maladies enroniques.
Antidores : Bell. chin cocc. dulc. hep. îpec. merc. n-vom. — On l'emploie

comme anii Ioie **de** : Aut. COMPARER AVEC : Bell. calc. chin. coco. drus. dulo. hep. ted. tpes. merc n-rese puls, rhue, sulf. verate. - C'est surtout après serete, que le cuivre se montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. - Après le culvre conviennent quelquefois : Cale. veratr.

CLINIQUE. — Se laiseant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: - Affections rhumatismales; Douleurs ostéocopes; Affections spasmodiques et convulsions, surtout chez des personnes irritables et sensibles; Epilepsis; Danse de Saint-Guy, aussi par suite d'une frayeur; Faiblesse, avec surexcitation du système nerveux; Consomption?; Paralysies?; Ictère?: Eruptions chroniques?; Gale?: Ulcères incétérés; Dartres?; Carie?; Fievres hectiques?; Fièvres lentes?; Melancolio?; Manie; Rage?; Encephalite?; Ophthalmies?; Gastralgie?; Gastrite?, et autres affections gastriques; Choléra asiatique; Coliques spasmodiques; Diarrhées; Coqueluche; Hémoptysie?; Croup?; Asthme spasmodique, principalement chez les enfants par suite d'un refroidissement, ou chez les femmes pendant les règles, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Dechirements pressifs on tressaillements dans les membres. - Douleur de meurtrissure à plusieurs endroits, surtout aux articulations et aux membres. -Douleurs ostéocopes. - Douleurs rhumatismales. - Beaucoup de



388

CUPRUM METALLICUM.

donleurs, surtout celles qui sont pressures, s'aggravent au toucher. - Douleurs ebranlantes qui parcourent tout le corps. -Secousses ou coups douloureur à diverses parties. En pleurant, convulsions avec manque d'haleine, et rétraction des cuisses. - *Spasmes toniques, avec perte de connaissance, renversement de la tête en arrière, rougeur des yeux, salivation et émission fréquente d'urines. - *Convulsions épileptiques. -Mouvements involontaires des membres, comme dans la danse de Saint-Guy, avec rougeur du visage, distorsion des yeux, du visage et du corps, pieurs et anxiete, bauffonneries et envie de se cacher. olas convulsions commencent le plus souvent aux dougts et aux orteils Rire spasmodique. *Tressaillements convulsifs, la nuit, en dormant *Convulsions riolentes, avec grand déploiement de forces - Affections paralytiques. Symptômes qui apparaissent périodiquement et par groupes. -Grande lassitude et affaissement de tout le corps. - *Faibleses opiniatre. Consomption. *Surimpression mabilité de tous les organes. - Accès d'évanouissement.

Peau. Eruptions qui ressemblent a la gale. - Dartres avec écaliles jaunes. Carie. Eruptions militaires, surfout a la pol-

trine et aux mains. - OUlceres opiniatres.

Sommeil. Sommeil profond, avec secousses dans le corps, et tressaillement des membres.


Fièvre. - Frissons apres les attaques d'epilepsie. Fièvres lentes.

- Sueur froide - Fortes spenrs la nuit.

Moral — Melancolie, avec acces d'ang sisses mortelles *Manque de force morale. — Anxiete et pleurs, alternant avec bouffonneries. — Douceur alternant avec obstination. — Inaptitude au travail, avec crainte de l'oisivete. — Accès d'ahenation, avec idées fixes d'occupations imaginaires auxquelles on croît se livrer, ou avec chants gais, ou bien avec malice et morosité, et souvent avec pouls accèléré, yeux rouges, suflammés, regards egarés et auves de sueur. — Fureur. — Demence. — Perte des sens et de

l'esprit. — Délire. — Caractère très-peureux.

Tête Vertige en lisant et en regardant en l'air. Vertige tournoyant, comme si la tête allant pencher en arant. Sensation,
comme si la tête était vide. Douleur a faire erier, a l'os parietal,
en y portant la main. Douleurs de meurtrissure dans le cerveau
et les orbites, en remnant les yeux. Dépression stupifiants
dans la tête, avec fourmillement au vertex. — Pression aux
tempes, aggravée par le toucher. Tiraillement dans la tête,
avec vertiges, amélioré en étant couché. Mal à la tête à la
suite d'une attaque d'epilepsie. Élancements extérieurs, brûlants, dans le coté du front, aux tempes et au vertex. — Douleurs a l'occiput et à la nuque, en remnant la tête. Gonfiement
de la tête, avec visage rouge. — Distorsion de la tête, de côte et
en arrière.



CUPBUM METALLICUM.

289

Year. — Démangeaison dans les yeux, vers le soir. — *Pression dans les yeux et les paupières, aggravée au toucher. — Yeux rouges, enfiammés, égarée, fixes. — Convulsions et moncements inquiets des yeux. — Yeux proéminents, brillants. — Yeux fermés. — Pupilles insensibles. — Obscurcissement de la vue. — Doulous de mourtrissure dans les orbites, en tournant les yeux.

Oreilles. — Déchirements dans les oreilles. — Pression dans les oreilles, comme par un corps dur.

Hes. — Forte congestion an nes. — *Obturation du nes. — Violent coryza fluent.

Vinge. — Visage pôle, avec yeux abattus et cernés. — Visage bleuatre. — Distorsion spasmodique du visage. — Air triste, anxieux. — Rougeur de la face. — Lèvres bleudtres. — Exceriation de la lèvre supérieure. — Pression à la mâchoire inférieure,

🕶 augmentée par le toucher. — Crampe à la mâchoire.

Deuts et Benche. — Odontalgie, avec tiraillements aigns, jusque dans les tempes. — Bouche pâteuse, le matin. — Accumulation d'eau dans la bouche. — Écume à la bouche. — Sensation brûlante dans la bouche. — Langue muqueuse, chargée d'un enduit blanc. — Cris, comme le coassement des grenouilles. — Perte de la parole. — Bout de la langue froid.

Gerge. — Séchereuse de la gorge, avec soif. — Inflammation du pharyax, avec déglutition empéchée. — *On entend le bruit que font les boissons en descendant. — Gonfiement des glandes du

.P00

Appétit. — Godt douceátre, ou métallique, ou acide, salé. — Goût aqueux des aliments. — Appétence pour les choses froides, plutôt

que pour les chaudes.

Intomac. — Renvois continuels. — Hoquet. — Écoulement d'eau, comme des pituites, après avoir pris du lait. — Nausées avec envis de vomér, depuis le bas-ventre jusque dans le gosier, mais principalement à l'épigastre, avec ivresse, dégoût, et goût putride dans la bouche. — Vomissements périodiques, violents, soulagés en buvant. — Vomissements de bile, d'eau, de glaires ou même de sang. — Vomissements violents, avec pression dans l'estomac, crampes dans le ventre, diarrhée et convulsions. — Crampes d'estomac. — *Pression excessivement pénible à l'estomac et à l'épigastre aggravée par le toucher et le mouvement. — Anxiété à l'épigastre.

Ventre. — Douleurs de meurtrissure dans les hypocondres, au toucher. — Douleurs tractives, depuis l'hypocondre gauche jusque dans la hanche. — Douleurs violentes dans le ventre, avec grande auxiété. — Ventre dur, avec douleurs violentes au toucher. — Pression dans le centre, comme par un corps dur, aggravée au toucher. — Rétraction du ventre. — Coliques spasmodiques arec conculsions et cris aigus. — Ulcères lancinants et rongeants dans

les intestins.



CUPRUM METALLICUM.

Selled. - Constipation, avec grande chalcur du corps. - Dearrhées evolentes, quelquefois sanguinolentes. - Saignement des boutons hemorrhoidaux de l'anns.

Urines. Besoin pressant d'uriner, avec émission pen abondante. - Emission fréquente d'urines fétides, visqueuses. - Elancements brûlants dans l'urêthre, pendant et hors le temps de l'émission des urines. · Presement nocturne.

Parties génitales. Conflement de la verge, avec inflammation du gland. - Avant les règles, ebullition de sang, battement de cour et mal a la tête.

Larynx. - Enrouement opiniatre, avec besoin de se coucher, -Bruit dans les bronches, comme par des mucosités Chatouillement dans le larynx - *Toux seche, avec ctouffement, comme la coqueluche. — Toux avec expectoration de mucosites blanchatres, pendant les accès d'asthme spasnesdique. — Toux matutinale, avec expectoration de matieres putrides.

Politrine - Respiration accelérée, ralante, gemissante, avec efforts convulsifedes muscles abdominanx — l'espiration difficile, courte. avec toux spasmodique et crépitation dans la postrine. - Toux. avec respiration siffante, aussitôt qu'on tache de respirer. -


Gêne de la respiration, augmentée en toussant, en riant, en renversant le corps en arrière, etc., ainsi que la nuit. Astlune en montant ou eu marchant vite, avec besoin de respirer profondement. Asthme spasm slique - Acces de suffocution. - Pression a la poitrine. - Contraction do doureuse de la poitreme, surtont apres avoir bu. -- Crampes de postrine, qui coupent la respiration et la voix. - Battements d'accur.

Trone et Bras - Sensation de pesanteur dans les glandes axillaires. - Gonflement des glandes du cou. - Partre dans le plidu conde. - Gonflement de la main, avec inflammation d'un vaissean lymphatique jusque dans l'epaule l'ression et tirail lements aigus dans les os du metacarpe -- Faiblesse et paralysie de la main. - Tressaillements des mains, le matin, après le lever. - Torpeur et racornissement des dorgts "Convulsions nux doigts.

Jambes. Douleurs aux jambes, surfout aux mollets, pendant le repas - Douleurs tensives et crampes aux m dlet - Douleurs pressives et tractives dans le métatarse — Sensation brûlante a la plant des pieds — Sueur aux piels. — Suppression de la sucur aux pieds. — Courbature et roideur des jambes.

valsions aux orteils.

290



CUPRUM ACETICUM.

291

CUPBUM ACMICUM.

GUPR-AG. — Andtate de quivre, verdet, vert-de-gris. — Mist. mat. et prép. Voy. Phormac. hommop., p. 98. — Peu connu.


SYMPTOMES GENERAUX. --- Lassitude, avec tremblement et manque d'appétit ; grande faiblesse, quelquefois avec convulsions: impossibilité de se tenir debout. — Insensibilité et faiblesse; roideur des membres et da corps; paralysie des membres. -- Couché sur le côté, l'animal montre de l'angoisse, avec évacuations intestinales verdâtres et écumenses; il était étendu, presque sans respiration, avec besoin de vomir et mort prompte; position sur le dos, avec tête renversée en arrière; grande agitation et cris fréquents. — Trismus, avec spasme dans le palais et mutime; tressuillements convulsifs, avec mouvements comme pour macher et avaler, vomissements douloureux et dyspaée. - Jausine: Inflammation et gonflement (par des applications extérieures). — Fièrres, avec ballonnement du ventre et constipation; chaleur, avec pouls dur, céphalalgie, difficulté d'avaler et ballonnement du ventre ; pouls petit et contracté. — Angoisse extrême, avec comissements, coliques, soif, froideur des membres et pouls accéléré et spasmodique; tristesse et abattement, avec yeux enfoncés, langue humide, goût fade dans la bouche, manque d'appétit, renaclement continuel, renvois avec goût de cuivre, soif violente et pouls petit. - Délire.

Tôte. — Ben. — Pesanteur de la tête et légère surdité; céphalalgie violente avec soif et fortes coliques. — Sur la face, expression

de forte angoime; écoulement de sang par le nez.

Symptomes gastriques. — Goût cuivreux et langue chargée d'un enduit grisâtre. — Répugnance pour le boire et le manger (chez des animaux), quelquefois avec vomiturition. — Rencois avec goût cuivreux et renaclement continuel. — Enrie continuelle de romir, quelquefois avec toux et respiration convulsive; ou bien avec émission fréquente d'urine. — Vomissements, quelquefois très-fréquents, avec coliques et convulsions; vomissement verdatre, blanc, écumenx; vomissement fréquent de matières bleuâtres, suivi de vomiturition; gémissements, dyspnée et pouls irrégulier et fréquent; romissements et évacuations diarrhéiques; vomissement sanguinolent, à la suite de vomituritions fréquentes.

Estomas — Ventre. — Dans la région précordiale, déchirements; contractions périodiques de l'estomac. — Ventre rétracté, peu sensible à la pression; violentes coliques accompagnées de vomés-



292 CUPRUM ACETICUM. — CUPRUM CARBONICUM.

sements et de diarrhée; coliques nocturnes avec vomissements, fort gonflement du ventre, avec évacuation abondante de matières fécales; ventre dur, ballonné, douloureux au toucher.

Selles et Urines. — Selles avec beaucoup de vers, noirâtres ou avec mucosités sanguinolentes; selles vertes, quelquefois avec vomissement douloureux; selles accompagnées de ténesmes et de faiblesse générale. — Urine trouble, rouge foncé, avec sédiment jaune, accompagnée de forte soif et de malaise général.


Parties sexuelles. — Règles très-abondantes et violentes.

CUPRUM CARBONICUM.

CUPR-GARB. — Sous-carbonate de cuivre. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 99. — Peu connu.

SYMPTOMES. — Lassitude, quelquefois avec pouls petit, contracté, et céphalalgie violente, ou bien avec insomnie et pouls faible, faiblesse et évanouissements fréquents ; douleurs dans les membres; paralysie des membres (bras et jambes); tressaillements convulsi/s, quelquefois violents; symptômes apoplectiques. - Fièrre et stupeur léthargique; pouls petit, inégal, un peu convulsé. — Angoisse avec tremblement des membres et douleurs d'estomac; rage, avec coliques, vomissements et évanouissement. — Céphalalgie violente, quelquefois avec vomissement. Teint pâle; face hippocratique, avec ventre douloureusement ballonné. — Godt enivreux dans la bouche. — Nausées, avec vomissement vert, coliques, convulsions, et perte de la connaissance; dégoût, quelquefois avec vomissements et constipation; haut-le-cœur, avec vomissement et colique, accompagnés de forte angoisse. -- Vomusements, quelquefois violents, ou bien continuels, le plus souvent avec coliques riolentes, ou avec mouvements convulsifs et spasmes; vomissements avec diarrhée sanguinolente. -- Maux d'estomac, quelquefois très-violents, avec vomissements et colique (ou ténesmes); ardeur dans l'estomac. - Maux de ventre, quelquefois avec vomissements violents et fréquents; tranchées violentes et fièvre; déchirements et tranchées dans le ventre ; coliques violentes, quelquefois avec flatuosités, ou avec romissements (quelquefois de matières bilieuses avec vomiturition et manque d'appétit); le matin, vers deux heures, coliques avec vomissements; coliques périodiques, suivies de tremblement des membres et de transpirations abondantes. -Constipation de longue durée; diarrhée de longue durée. -Asthme. — Faiblesse et douleurs dans les extrémités inférieures ; crampes dans les mollets.





CYCLAMEN EUROPÆUM.

CTCLAMEN EUROPAUM.

CYCL. — Gyelame d'Europe. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homesop., p. 207. — Médicament encore peu connu, et qui n'a été employé que contre des Maux de dents et quelques Affections gastriques.

Exertones GENERAUX. — Traction pressive ou déchirements, principalement aux endroits où les os sont reconverts immédiatement par la peau. — Pendant le mouvement, toutes les souffrances disparaissent, excepté l'abattement; mais de nombreux symptômes se manifestent lorsqu'on est assis. — Grande lassitude, surtout le soir, avec courbature et roideur dans les jambes et pression tractive dans les cuisses et les genoux.

Pean. — Démangeaison rongeante à plusieurs parties de la peau, surtout en étant assis. — Démangeaison lancinante et insup-

portable le soir au lit.

Sommeil. — Grande envie de se coucher et de sommeiller. — Le soir, sommeil tardif, avec pulsations sensibles au cerveau. — Cau-

chemar après s'être endormi.

Fièvre. — Frissons fébriles et froids, suivis de chaleur, surtout au visage, avec rougeur, augmentant après le repas, ensuite anxiété avec chaleur à quelques parties, au dos de la main et à la nuque, mais non au visage. — Sueurs froides.

Maral. — Chagrin secrèt et trouble de conscience. — Mauvaise humeur et maussaderie avec éloignement pour la conversation, par accès. — Amour du travail, alternant avec paresse. Mémoire alternativement vive et faible. — Lourdeur et confusion

de l'esprit, avec inaptitude à toute espèce de travail.

Tête. — Vertiges, étant debout, comme si le cerveau remuait. — Mai de tête étourdissant, avec obscurcissement des yeux. — Elancements dans le cerveau en se baissant. Élancements dans les tempes. — Démangeaison picotante au cuir chevelu, ne faisant

que changer de place par le grattement.

Yeux — New. — Yeux ternes et creux. — Élancements dans les yeux et les paupières. — Gonflement des paupières. — Pupilles dilatées. — Vue trouble comme à travers un nuage. — Traction dans les oreilles. — Diminution de l'ouïe, comme si les oreilles étaient bouchées. — Diminution de l'odorat. — Coryza fluent avec éternument.

Dents. - Mal aux dents arec tractions sourdes, la nuit. - * Élan-

cements et térébration dans les dents.

Bouche. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Sensation continuelle d'apreté et de mucosités dans la bouche. — Sensation de



CYCLAMEN EUROPÆUM.

torpeur dans la lèvre superieure, comme si ellectait endurcie -Le soir, grande secheresse dans le palais, avec faim et soif,

Appétit. - Gout putrade de la bouche - Gout fade de tous les aliments. - Faim et appétit peu prononcés, surtout le matin et le soir. Prompte sotieté suivie de dequat, des que l'on commence à manger. - Repugnance pour le heurre et les aliments

froids. Après le repas, grande envie de dermir.

Estomac. Renvois fréquents, à vide ou acries Renvois avec hoquet, surtout apres le repas. - Nausces avec envie de vomir. et malaise dans la region de l'epigastre, comme après avoir pris des aliments gras, surtout apres le diner et le sonner. - Ecoulement d'eau comme des piluites, arce nausers, surtout le soir. -Vomissement sanguinolent avec diarrhee semblable, sucur froide, tintement des oreilles, convulsions et vertiges.

Ventre. — Plémiude et pression au creux de l'estomac, comme par surcharge. - Malaise dans le bas-ventre, avec nausees. -Sensibilité douloureuse du bis-ventre au moindre attouchement. - Acces subits de tranchees avec pincements. Borborygmes

dans le bas-ventre, immediatement après le repas

Selles. Selles dures, frequentes. Evacuate us de la consistance de la bouillie. - · Pression tractive à l'anus et au permée, comme par une ulcération sous-cutanée. - Distribée sanguinolente

Urines. - Envie fréquente duriner, avec emission abondante d'urines blanchatres. Elancements dans l'urethre, en urmant.

Poitrine. Le soir, haleine courte comiac par faillesse. - Acces de suflocation. — Oppression de la postrine arre gene de la respiration Lancinations et tiraillements nigus dans la poitrine, avec respiration courte et genée. Pression au cour, comme par congestion de sang, avec battements de cœur trèssensibles.

Tronc. - Douleurs lancinantes dans les reins. - Douleurs d'excoriation a la nuque. — Pression, avec faiblesse paralytique, ou

traction a la nuque et au cou.


Bras. - Pression comme par un corps dur dons les bras et jusque dans les dougts, qui empiebe d'cerire. Douleurs tractives dans les bras et jusque dans les doigts. - Dauleur comme apress'etre heurte, cu douleur de mourtrissure dans le bras, -Traction doulourense dans le bras et le prignet. Contraction des doigts. - Vesícules rouges aux articulations des doigts, précédées de prurit violent.

Jambas. - Douleurs crampoides dans les cuisses - Taches rouges aux enisses, comme par une brulure. - Demangeaison fréquente et vi lente aux mollets, a la cheville des pieds et aux orteils. - Douleur de luxation dans les articulations du pied. Douleurs d'excoriation dans les orteils, en marchant. -Orteils morts, après avoir marché — Sucur fetide entres les

orteils.

294





DAPHNE INDICA.

DAPRIN INDICA.

DAPH. — Daphné des Indes. — Héring. — Hist, mat. et prép. Pharmac. homosop. — Dores unitées: 1, 30. — Durés d'action : Plusieurs semaines dans les affections chroniques.


Antidetts : Bry. dig. rhus. silje. sep. nine.

*CLINQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques, même après des gonorrhées supprimées; Arthrite vague; Douleurs ostéocopes et exostoses; Amblyopie amaurotique; Gastralgie et autres affections gastriques, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — *Douleurs lancinantes, comme des coups, dans différentes parties du corps, passant souvent rapidement d'une partie à l'autre, étant aggravées par l'air froid oet en prenant de l'eau-de-vie. — Douleurs rhumatismales et arthritiques tant dans les muscles que dans les os. — Exostoses avec douleurs lancinantes on pressives et sourdes. — Douleur d'excoriation dans les exosteses. —*La plupart des souffrances se manifestent au côté gauche du corps, et s'aggravent principalement à l'air frais, cainsi que pendant la lune décroissante, le matin, on overs le soir, et surtout au lit. — Grande lassitude et courbature dans tous les membres. — Besoin de rester couché. - "Insomnie complète, equelquefois à cause de douleurs ostéocopes. — Envie de dormir sans pouvoir y réussir. — Rêves de feu ou de chats noirs, avec cauchemar. — Sommeil agité, non réparateur. — Sursauts avec effroi, en s'endormant, accompagnés de frissonnement avec sugar visquense. — Fièvre semblable au typhus, avec frissons excessifs, survis de chaleur continue, de sueur visqueuse par tout le corps, et perte complète de l'appétit. --- Fièvres avec souffrances gastriques et nerveuses. — Sueur viequeuse, d'odeur putride. — *Abattement moral. — Caractère peureux. -Irritabilité, surexcitation et tremblement pendant les douleurs. Irascibilité, absence d'esprit et indécision.

Tête. — Malà la tête, provoqué par un travail intellectuel quelconque. — Douleur derrière les yeux, d'une tempe à l'autre. — *Sensation de plénitude dans la tête, comme si le crâne allait éclater, surtout en se redressant dans le lit. — Sensation comme si la tête était trop rolumineuse, avec élancements dans les tens-



DAPHNE INDICA.

pes. — Sensation comme si les parties extérieures du cerveau étaient enflammées et se heurtaient douloureusement contre le crâne. — *Forte chaleur dans la tête, surtout au vertex, et parfois avec sensation comme si la tête était comprimée. — Pulsation douloureuse dans les tempes (et les gencives), quelquefois avec douleur d'excoriation au toucher. — *Exostoses au crâne. — *Tubérosités au vertex, molles, comme s'il y avait de l'eau dedans, avec douleurs pénibles, surtout la nuit; les douleurs empêchent le sommeil, et s'aggravent au toucher. — *Gonflement dur de tout le côté gauche de la tête (du crâne?), avec sensation de torpeur et douleurs lancinantes, aigués, passagères.


Your et Oreilles. — Grattement dans les yeux. — Sensation pénible autour des yeux et des paupières, avec sécheresse et pesanteur des paupières. — Sensation douloureuse comme si l'on poussait les yeux en dehors de la tête. — Douleurs violentes aux prunelles, le soir, avec forte surexcitation nerveuse. — Yeux enfiammés, faibles, ternes et comme noyés de larmes. — Sensation comme si une pellicule s'était placée devant les yeux. — Vue faible avec confusion des caractères en lisant. — Diplopie. — Pupilles fortement contractées. — Bourdonnement des oreilles.

Face — Dents. — Chalcur et sensation brûlante aux joues, autour des oreilles et au vertex, parfois avec besoin continuel de bâiller.—Sensation de gonflement, de roideur et de tension dans l'articulation temporo-maxillaire, avec cuisson brûlante à la peau. — Pulsation dans les dents et les gencives. — Douleurs tractives aigués dans toutes les dents. — Mal aux dents avec et sans salivation. — Mal aux dents avec érections, ou après le colt. — Mal aux dents avec accès de frissons ou avec dispositions à transpirer.

Bouche — Ventre. — Langue chargée d'un seul côté. — Sécheresse de la langue, comme si elle était brûlée, sprès le sommeil. — Fétidité de la langue. — Salivation. — Salive chaude. — Grand désir de fumer du tabac. — Pyrosis et vomissement aigre. — Vomissement avec nausées, après le déjeuner. — Sensation de plénitude et bouillonnement dans la région précordiale. — Pression dans l'estomac après avoir bu. — Crampes fréquentes de l'estomac. — Après chaque repas, douleur brûlante et sensation d'excoriation dans l'estomac, avec renvois d'air fréquents; les douleurs s'étendent jusqu'à l'hypocondre gauche et au dos. — Élancements et douleurs dans la région splénique. — Douleurs arthritiques qui passent rapidement des membres au ventre. — Mal au ventre avec frissons.

Selles — Parties génitales. — *Resserrement du ventre et constipation. — oSelles peu copieuses et sanguinolentes sur la fin. — *Emission d'urine fréquente et abondante. — oPiesement nocturne fréquent. — Urines troubles, épaisses, jaunâtres comme des œuss pourris. — Urines de couleur jaune rougestre. —

296



DAPHNE INDICA. — DIGITALIS PURPUREA.

297

Urines fétides. — Dépôt rougeaire qui adhère aux parois du vase. — Diffeur d'excoriation dans l'urèthre en urinant. — Sueur du scrotum. — Écoulement de liqueur prostatique après avoir uriné. — Érections pendant les maux de dents. — Après le

cost, mal aux dents.

Pettrine.—Voix faible. — Haleine fétide. — Expectoration séreuse, abondante. — Expectoration sanguinolente. — * Toux avec romissement, et *expectoration jaunatre, écumeuse, mêlée parfois de stries de sang; la toux fatigue et empêche le sommeil. — *Battement et tressaillement du cœur, avec impossibilité de rester couché sur le côté gauche. — Douleurs aigués dans la région du cœur, avec découragement et tremblement. — Étouffement la nuit, avec sensation comme si les glandes du cou étaient gonfiées, et les artères roides de sang.

Membres. — Douleur à la nuque avec mal à la tête. — Prurit brûlant au dos. — Tiraillement douloureur le long de la moelle épinière, aggravé en se baissant. — Phlyctènes très-pruriteuses aux
bras et aux mains. — Douleurs ostéocopes, térébrantes, et douleurs lancinantes aiguês aux doigts. — Miliaire pruriante aux
jambes. — Douleurs rhumatismales aux orimes et aux genoux. —
Freid aux genoux et aux pieds. — Douleur de contusion aux orteils. — "Gonflement douloureux de la partie charnue du gros
orteil, avec douleurs qui souvent passent rapidement dans d'au-

tres parties du corps.

DIGITALIS PURPUREA.

DIG. — Digitale pourprée. — HABNEMANN — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 210, — Dose unitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 50 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: N-vom, op.
COMPARER AVEC: Are. bell. chin. coff. coloc. con, bell. merc. n-vom. op.
petr. puls. spig. sulf-ac.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections arthritiques (avec nodosités?); Engorgement et induration des glandes; Ictère; Cyanose; Affections hydropiques; Fièvres, avec affections gastriques, bilieuses ou muqueuses, Fièvres lentes, avec affection du système nerveux?; Fièvres vermineuses?; Mélancolie par affection organique du cœur?; Apoplexie séreuse?; Hydrocéphale?; Ophthalmies catarrhales (arthritiques et scrofuleuses?); Cataractes; Amblyople amaurotique?; Affections gastrico-muqueuses ou bilieuses; Gastrite?; Ascite; Uré-



DIGITALIS PURPUREA.

thrite chronique?; Retrévissement de l'urèthre?; Ténesme de la vessie à la suite d'une genorrhee; Hydrocele; Amenorchée avec doigts bleuûtres et taches bleues à la face, Hémoptysie; Affections organiques du cœur; Hydrothorax, etc., etc.

Voy, la note, page 15.

298

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élancements brûlants et déchirements, surtout dans les nembres. — Douleurs pénétrantes et sensation de combature dans les articulations, e nume après une grande fatigue. Engorgement des glandes. Genflements tendus et douleureux, surtout des membres. (envulsions. Attaques d'épilepsie. *Genflements hydropiques. Amaigrissement.—Grand accablement et paddesse nervense. Avecs de faiblesse excessive, surtout après le deponer et le diner. Prostration subite des forces, comme su l'on all ut s'écanoner, avec suour générale.

Peau. — Demangeaison rongeante, se changeant, si l'en ne gratte pas, en un picotement l'rûlant et insupportable. — Desquan ation de la peau de tout le corps — "Peau bleuatre, particulierement

aux paupières, aux levres, a la langue et aux ongles.

Sommeil — Envie de dormir le jour et somnolence interrompue par des accès de vomissements convulsifs — La nuit, demi-sommeil avec agitation. *Sommeil nocturne, interrompu par des

rèves anxieux, avec sursauts

Fièvre. Frond du corps, souvent avec sueur froide, surtout au front ou d'un seul côte du corps. — Frond aux mains et aux pieds. Acces frequents et subits de chaleur fugace, suivis de faiblesse. — Sueurs nocturnes et abondantes, préceders parfe se de frissons ou d'horriphation, avec chaleur interrure dans la journée. — Pouls petit, faible et d'une lenteur excessive, mais accélere par le plus léger monvement.

Moral. *Anymase extrême, surtent le soir, avec desposition à pleurer et grande cramte de l'avenir Remerds. Morosité pleurense, avec sensation de malaise intériour. Indifférence. Beaucoup de goût pour le travail Faiblesse de la aemoire.

Delires nocturnes et ag tation

Tôte. Ét predissement - *Vertiges arec tremblement. Pression succades a la tête, surtout pendant les travaux d'esprit.

Tension dans le front et a uruant les veux. Del irement dans les tempes et les ates de la tête. Flaven ents aux timpes et au front, quelquefeis s'étendant jusqu'au l'ut du nez, surtout apres avoir bu fruil — Pror t dans le cerceau, d'un seul côté de la tête. — Sensaton en se laissant, comme si le cerceau tombait en arant. — Ondulations dans le cerveau, comme si l'enacte de la la tête. — Gonflement de la



tête. La têle fléchet constamment en arrière. - Congestions violentes à la tête, avec grand bruit dans les oreilles.

Your. *Pression dans les yeux, fortement augmentée par le toucher. *Douleur brûlante et pression au-dessus des yeux, *avec vue trouble. - *Flancena nts dans les yeux. Rougeur inflammatione de la conjonctive et des paupieres, avec gonfiement et sensation, comme si du sable « tait introduit dans les yeux. - Inflammation des glandes de Meibonius - *Larmoiement cuisant, augmente par une clarte vive et à l'air froid. *Agglutenation des pumpières, avec 6 rée secretion de mucositée. - Disposition des yeux a se tourner de côte - Popilles insensibles et dilatées.

Vue trouble a una a travers an brouillard. — Obscurcissement de la vue et cecite complete, comme par une amaurose. — Obscurcissement du cristallin. — Illusions de la vue. — Fantômis v. siens et couleur d'arc-en-ciel devant les yeux. — *Les objets paraissent verts ou janues. — Étincelles devant les

year. - Diph pie. - Le feu parait bleu.

Oreilles. Otalgie avec douleurs tensives et contractives dans les

creilles - trouffement les parotides.


Visage Pulsur du risage. - « l'ouleur bleue des lècres et des paupieres. Convulsions d'un côte du visage. Douleurs crain-poides et tractives aux poinmettes — Gonfiement de la joue avec douleur un toucher. — Eruptions, avec prurit rongeant aux joues et au menton. — Pores noirs et suppurante au visage. Gonfiement des levres. — Eruptions aux levres. — Lèvres desséchées.

Boucho. Apreté, excoration et grattement dans la houche et la gorge, ave gont pateux. Salve doncentre et fétide. — Salve atom avec experiation de la langue et des geneives. — Langue hierater (conflorent le la langue — Fleère à la langue. —

Langue chargee de mucosites blanches.

Appétit. Goût d'uccâtre surfaut après avoir fumé du tabac, quelqu tois ave, accamulation continuelle de salive dans la bouche — Goût muqueux, — Goût amer du pain — *Absence d'appetit, quelquefois même avec langue nette. Se l'estrout de boissons acides. — Grande appetence pour les choses imeres. — Après le repas, pression et ballonnement du ventre et de l'estomae.

Estomac. Renvocat regargitations aigres, quelquefois après le 1-pas Pyrosis *Nansees avec envic de romir, accablement moral et inquietnde *Vomiturition convulsive. - Vomissements et nansees avec plenitude et pression à l'epigastre. - Vomissement matritual ou nocturne. - *Vomissements de mucosites, d's aliments en de ble, avec nausées excessives. - Nansees le matrit et a . - Clant - Nausees et vomissements pondant le 1-pas. - Vomissement des aliments des qu'on crache. - Vomissement tiplent, avec vertige. - Sensation de rétraction



DIGITALIS PURPUREA.

de l'estomac. — *Pression, douleur brûlante et pesanteur à l'estomac et à l'épigastre. — Sensation de faiblesse à l'estomac, comme si la vie allait s'éteindre, surtout immédiatement après le repas. — Douleurs crampoldes à l'estomac, parfois avec nausées et vomissements, soulagés par des renvois. — Élancements au creux de l'estomac, jusque dans les côtés et le dos. — Plénitude au creux de l'estomac.

Ventre. — Douleur de tension contractive dans les hypocondres. — oSensibilité et douleurs pressives dans la région du foie. — Torsion et pincements crampoldes dans les intestins. — Coliques lancinantes et déchirantes, avec envie de vomir, surtout pendant le mouvement et l'expiration. — oBallonnement du ventre. — oGonflement hydropique du ventre. — Tranchées comme par un refroidissement ou une diarrhée. — Tension crampolde dans les

aines, - Souffrances par des flatuosités.

Selles. — *Selles blanches comme de la craie ou couleur de cendre.
 — Diarrhée d'excréments mêlés de mucosités, précédées de frissons et de tranchées. — Selles dyssentériques. — Selles involon-

taires. — Diarrhées aqueuses.

300


Urines. — Rétention d'urine. —*Besoin pénible et presque inutile d'uriner, avec émission d'urines chaudes, brûlantes et excessivement rares. — *Emission d'urine difficile, comme par rétrécissement de l'urèthre. —Pissement nocturne. — Flux d'urine. — Diminution de la sécrétion des urines, alternant quelquefois avec émission abondante. — Douleurs incisives dans l'urèthre, avant et après l'émission des urines. — Émission involontaire des urines. — *Urines de couleur foncée, brunâtres ou rougeâtres. — Nausées avant et après l'émission des urines. — En urinant, sensation brûlante et constriction dans l'urèthre. — Inflammation du col de la vessie.

Parties génitales. — Douleur de meurtrissure dans les testicules. — Gonflement des testicules. — Appétit vénérien fortement exalté, avec érections et pollutions fréquentes. — Gonflement

hydropique du scrotum.

Larynx. — Enrouement et coryza le matin. — Mucosités abondantes dans le larynx, se détachant en toussant légèrement. — Toux après le repas, avec vomissement des aliments. — *Toux sèche, avec douleurs dans les épaules et les bras. — Toux avec expectoration de matières ressemblant à de l'amidon. — Cuisson dans la poitrine en toussant. — Toux crampoide, sèche, provoquée par une conversation soutenue. — *Expectoration sanguinolente en toussant.

Peitrine. — Respiration péniblement génée, surtout la nuit, en étant couché, et le jour en marchant ou en étant assis. — Le matin, constriction gussoquante de la poltrine, forçant à se redresser dans le lit. — «Soustrances authmatiques comme par hydrothorax. — Pression à la poitrine en se tenant courbé. —



DIGITALIS. -- DROSERA ROTUNDIFOLIA.

801

Tension dans la poitrine, avec besoin de respirer profondément. Douleur contractive dans la poitrine en se courbant. — Cuisson dans la poitrine. — Sensation de faiblesse dans la poitrine, provenant de l'estomac. — Congestion à la poitrine. — Accélération des fonctions du cœur, avec battements sensibles à l'oule, angoisse et contraction au sternum. — Horripilation au sein. — Palpitations violentes, avec bouillonnement de sang, la nuit, forçant à se lever et à ouvrir la fenêtre.

Trenc. — Douleurs tractives dans le dos et aux reins, comme après un refroidissement. — Douleurs de meurtrissure aux reins, en se mouchant. — Roideur et tension des muscles du cou et de la nuque.

Bras. — Tiraillements paralytiques et déchirements dans les bras. — Gonflement nocturne de la main droite et des doigts. — Froid aux mains. — Déchirements dans les articulations des doigts. — Roideur subite et paralytique dans les doigts. — Torpeur et engourdissement facile des doigts.

Jambes. — Grande roideur des jambes après avoir été assis, se dissipant par la marche. — Manque d'énergie et faiblesse paralytique dans les jambes. — Gonflement aux genoux comme un stéatome. — Douleurs incisives dans la cuisse, et sensation brûlante dans le mollet, en croisant les jambes. — Tension dans le jarret. — Pieds froids. — Gonflement des pieds, le jour seulement.

DROSERA ROTUNDIFOLIA.

DROS. — Drosère à femilles rondes. — Rosée du solul. — HAMMEMANN. — Hist. mat. et prép. Voy. Pharmac. homorop., p. 201. — Doses maitées : 9, 12, 30. — Durée d'action : 6 à 7 jours.

ARTHOTE : Camph.

COMPARER AVEC : Acon. bry. cin. cupr. bep. hyos. ipec. n-vom. apong.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Épilepsie; Fièvres intermettentes; Presbyopie et autres défauts de la vue (même à la suite d'ophthalmie syphilitique?): Affections gastriques; Catarrhe et enrouement, même à la suite des morbilles; Coqueluche; Affections des voies aériennes à la suite du croup; Laryngite chronique, même avec ulcération; Pneumonie chronique?; Phthisio florissante avec aphonio et vomissement des aliments.

Foy. In note, page 15.



DROSERA ROTUNDIFOLIA.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Éluncements rongeants dans la cavité des os des bras et des jamues, excessivement forts, avec lanomations violentes dans les articulations, pendant le repos plutôt que pendant le mouvement. — Pression lancmante et douloureuse dans les muscles (des membres, ne s'ameliorant dans aueun position. — Douleur de meartressure, sensibilité excessivement douloureuse, faiblesse paralytique dans tons les membres. — Fail I see lans teut le corps, avec y ues et veux creux — Convulsions epileptiques, avec son mul et crachement de sang après les accès. — La plupart des souffrances apparaissent la muit et le matin, ainsi que dans la chaleur et pendant le ropos.

Sommeil Randoment par lant le sommeil, et et unt couché sur le dos. Sursauts frequents, avec effroi pendant le sommeil.

Reveil nocturne cause par une sueur qui s'établit. — Sommeil

à midi et le soir au coucher du soled.

302

Pièvre Harripilation par tout le corps, avec chaleur du visage, froid glacial any mains et absence de soif, ou *frissons avec froid et paleur des mains, des pieds et du visage. Chaleur avec mal à la tête et toux convulsive. — *Fierre avec nausces et encie de dormir, et autres souffrances gastriques, ou avec mal à la

de dormer, et autres soufrances gastriques, ou avec mal à la

Moral. - Abattement moral, cause par des idées d'inimitiés imagnaires. - Anxiete, surtout dans la solitule, avec peur des revenants - Inquietule pui ne permet pas de s'occuper l'ingtemps du mime bjet - Inquietude sar l'avenir. - Exasperation a la main les occasion. - Envie de se n'eyer. - Obstinution à executer ce qu'en a resolu. - La moindre chose met le malade hors de lui-meme.

Tôte. Embareas douloureux de la tête, comme après avoir parlé fort. Vertiges en se preno nant au grand air, au point de faire tember (a ganche).— Deuleurs presso es a la tête, surt ut au front et aux pennacties, qu'il qu'fois ave mais reset et, urdiss ment. — Battement et mart l'u cut au front lu de lans au deliors. —

Douleur d'exercat on au curr cherela

Oreilles. Elancements et sere ment dans les cre, lles, surtout en avalant. Durete de l'ouie avec bourdennement et bruissement.

dans les ore.lles.

Nex — * Sugmement de nez, surtout le soir. — Mouchement de sang — Pores noirs au nez. — Secheresse continuelle du nez. — Grande sensibilité aux odeurs acides. — Coryza fluent avec étarnument.

Visage. Paleur lu visage avec jures creuses et yeux abattus. Sentation brulante et picotante a la pead des joues au-dessous des



DROSERA ROTUNDIFOLLA.

308

yeux. - Lèvres gercées et constamment sèches. Pression dans les pommettes vers l'hence aggraves par la pression et le contact. - Pores neurs au menton, à la fact et au nez.

Bouche et Gorge Douleurs linemantes dans les dents, après avoir pris des bessions chaud s. Ulteres a la langue. — *Saign ment de la bouche — Ulteration du voil du palais. Élancements a la gerze, après aven mange du saie. — Difficulté d'avaler de amanents solides, e minimpar retrecissement de la gorge. — Sensation dats la gerze, comme si des mins de pain s vertaient arrêtees — Pensation de la gerze, comme si des mins de pain s vertaires.

Appetit Son surtent le nert n Hasquarte d's aliments.

te ut amer des abments et surtent du pain Renvois amers. —

Hoquet frequent. Econdement d'enux comme des patuales. —

'R pagnane paur la vance a pare. Vomissements la nuit et après le tiner. — *Vomissements de lale, le matin Vomissement de sang — Nauseus après averr mange des aliments gras. —

*Vomissements le glaires et des aliments, pendant la toux. —

Élancements et battements au criux de l'estonne.


Ventre. Douleurs I ins les hyperon l'es, en toussant et au toucher Chques apres aver mange des acides.

Selles et Urines S lles fréquentes de mu esites sanguinel ntes, avec tranchees. Hese in frequent d'uriner, avec emission peu abon lante, souve et gentte a gentte. Emission d'urine la nuit.

Un'nes brunat es d'une odeur forte.

Règles. Regl s'supprimées - Rèples tardives. Flueurs blanches, avec douleurs : mil elles de l'infantement.

Larynx. Fourantlement dans le l'organ qui provoque une petite teux et de clin ement jusque dans la gorge Sensation comme sal y avait un corps mon dans le larynx, une plume, par exemple. Somat on de secheresse d'aprete et de grattement au fond du gover, avech in det fort *Enrouenant et cort très lesse et cre ese ... En blocssement du lirons en parlant. - Ac analat on de chir alt mature ent dures et molles, jaun'itres growths of virlation "Tour it encouement. Toux per let tire du find . la petrine, avec deuleurs dans les bypocondres et la postrin de l'agres en appayant la main dessus. - True be paid it here, can be batement agrees so tre coache. - * Tous meche every de un conductor * Tour fot gante comme la cepielier de volte bletatre, respontibil sibilarte acces I will ston, su grement du net et de la houtelie, et angote - 1, to et est proceque par use rares, despitais et des et soti es le mais - "I am verment des alimants apres et . pend int la tour l'ex ave dale de feat le Le chant, la funce la talac et la borcons a fint hi terr. - Tur avec expecterate a language rate of the call its north s. * l'ax l'main i, april ration a pre et muscaboule. -Toux avec expectoration de matières purulentes, et clanoc-



304 DROSERA ROTUNDIFOLIA. — DULCAMARA.

ments dans la partie supérieure de la poitrine. - Expectoration verdatre.

Poltrine. — Gêne de la respiration en parlant, comme si la gorge se contractait, principalement en étant assis. — Oppression de poitrine, comme si, en toussant ou en parlant, quelque chose arrêtait la voix. — Serrement de la poitrine en toussant. — Douleurs à la poitrine en toussant et en éternuant. — Douleurs d'ulcération sous-cutanée au sternum, en pressant dessus.

Tronc. — Douleur de meurtrissure dans le dos. — Roideur de la nuque, avec douleurs pendant le mouvement. — Pores noirs à la

poitrine et aux épaules.


Bras. — Douleurs de meurtrissure dans les articulations des bras et des mains. — Crampe et enroidissement des doigts en saisissant un objet. — Douleurs nocturnes dans les os du bras.

Jambes. — Douleurs paralytiques dans l'articulation coxo-fémorale et dans les cuisses en marchant, et qui force à boiter. — Elancements incisifs dans les jambes. — Déchirements dans les articulations du pied, comme si elles étaient déboitées, seulement en marchant. — Roideur de l'articulation des pieds. — Sueur froide aux pieds qui sont constamment froids.

DULCAMARA.

DULC. — Douce amère. — Habremann. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homésop., p. 241. — Dose unitée: 30. — Durée d'action: 10 à 30 jours. Antidotes: Camph. ipec. merc. — On l'emploie comme antidote de: Capr. Comparen avec: Acon. ara bell hry. con, cupr. ipec. lach. merc. n-vom. phos. rhus. sulf. — C'est surtout après: Cupr. merc. et lach. que duic. se montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par l'abus du mercure; Affections par suite d'un refroidissement (dans l'eau aussi); affections des membranes muqueuses; Affections scrofuleuses, avec engorgement et induration des glandes; Tumeurs froides; Affections hydropiques; Paralysies; Affections à la suite des morbilles; Dartres de différentes espèces, même celles par l'abus du soufre; Pemphigus chez les enfants; Ramollissement des os: Éruptions urticaires; Verrues; Scarlatine et miliaire pourprée, lorsqu'il y a complication de ces deux maladies; Fièvre, avec affection des membranes muqueuses; Céphalalgie, surtout par suite d'un refroidissement; Croûte de lait; Ophthalmie scrofuleuse; Amblyople amaurotique; Glossoplégie; Angines, surtout l'angine catarrhale (après l'usage



DULCAMARA.

305

du mercure); Affection scorbutique des geneives; Cholérine; Dyssenterie par refroidimement; Diarrhée muqueuse?; Catarrhe de la passie; Rétrécissement de l'urèthre?; Bubons scrofuleux; Dartres aux parties génitales; Catarrhes invétérés avec enrouement; Coquelnche?; Phthisie muqueuse?; Asthme pituiteux; Pneumonie chronique?; Hydrothorax; Phthisie florissante?; etc., etc.

s note, page 15.

SYNTTONIA GENERAUX. — *Douleurs déchirantes, ou lancinantes, tractives dans les membres. — *Souffrances comme par refroidissement dans diverses parties. — Aggravation des souffrances, principalement le soir ou la nuit, et pendant le repos; amélioration par le mouvement. — Douleurs avec froid au corps. — «Sécrétion et excrétion immodérée des membranes muqueuses. — *Gonflement et induration des glandes. — Amsigrimement. — *Gonflement hydropique de tout le corps, des membres et du visage. — Gonflement rapide de tout le corps. — Faiblesse et courbature de tout le corps. — Convulsions semi-latérales, avec perte de la parole. — Affections paralytiques des

membres. — Grande lassitude.


Pean. — Séchereme et chaleur de la peau. — *Miliaire urticaire avec flèvre. — *Dartres de différentes espèces, savoir : a) •Dartres humides, croûteuses, "pâles, suintantes après les avoir grattées; b) Dartres rougeatres avec auréole rouge, saignant après les avoir grattéen c) Dartres à bords rouges, avec sensibilité douloureuse an contact et à l'eau froide; d) Petites dartres rondes, saignant après avoir gratté; e) Dartres sèches, furfuracées. — •Croûte dartreuse sur tout le corps. - *Eruptions dartreuses avec gonflement des glandes. - Verrues. - Dartres dans les articulations. — Eruption de pustules pruriantes, qui passent en suppuration et se recouvrent d'une croûte, surtout aux membres inférieurs et à la partie postérieure du corps.

Sammell. — Forte envie de dormir, le jour. - . Sommeil nocturne, agité, inquiet, par suite de chaleur et de tressaillement dans le corps, surtout après minuit. — Réreil de très-bonne heure. —

Rêves effrayants. — Visions le matin, en s'éveillant.

Fièvre. — Le soir, frissons fréquents et froid, ne s'apaisant pas même à la chaleur du feu. — Froid pendant les douleurs. — D'abord frissons fébriles, puis chaleur brulante avec douleur étourdissante à la tête, visage rouge, chaleur brûlante dans le palais, et soif inextinguible de boissons froides. - *Chaleur sèche et sensation brulante à la peau, avec délires et soif. --•Fièvre avec exacerbation le soir. — Pouls dur, tendu. — Suenr générale, surtout la nuit. - Sueur fétide, avec émission abondante d'urines.

Meral. — Agitation morale. -- Grande impatience. -- Désir impa-



DULCAMARA.

306

tient de diverses choses, qu'on repousse dès qu'on les a obtenues.

— Disposition à se quereller, sans colère. — Délires nocturnes, avec exacerbation des douleurs.

Tête. — Grand étourdissement, comme s'il y avait un étau sur le front. — Douleurs pressives, étourdissantes à diverses parties de la tête. — *Térébration et douleur brûlante dans le front, avec fouillement de dedans en dehors. - *Les maux de tête s'aggravent par le plus léger mouvement, oet même en parient. — Sensation de pesanteur à la tête. — Congestion à la tête, avec bourdonnement d'oreilles et dureté de l'oule. — Sensation comme si l'occiput était plus développé.

Youx. — Pression aux yeux, surtout en lisant. — Sensation comme s'il jaillissait du feu par les yeux. — *Inflammation des yeux. — Tressaillement des paupières à l'air froid. — Étincelles devant les yeux. — Vue trouble, comme par une amagrose commençante.

Oreilles. — Otalgie, la nuit, avec nausées. — Tiraillements aigus, avec élancements dans les oreilles.

Noz. — Épistaxis d'un sang très-chaud et rouge vif, avec douleur pressive au-dessus du nez. — Coryza avec obturation du nez, aggravé à l'air froid.

Visage. Pâleur du visage avec couleur circonscrite des joues. — «Éruptions et verrues au visage. — «Croûtes épaisses, brunâtres ou jaunâtres, au visage, au front, aux tempes et au menton. — Dartre suintante aux joues. — Tressaillement des lèvres à l'air froid. — Paralysie de la mâchoire inférieure. — «Gonflement des glandes sous-maxillaires. — Rougeur du visage. — Distorsion de la bouche.


Bouche. — Salivation. — Sécheresse de la langue. — Langue chargée de mucosités épaisses. — Gonflement de la langue. — Boutons et ulcères dans la bouche. — Gencives décollées et fongueuses. *Paralysie de la langue et parole embarrassée, surtout en se refroidissant. — Mal de gorge, comme par allongement de la luette, avec douleur pressive. — Chalcur brûlante dans le palais. *Maux de gorge, comme après un refroidissement.

Appétit. — Goût fade, et comme de savon, dans la bouche. —

«Amertume de la bouche. — *Soif ardente de boissons froides, géneralement avec sécheresse de la langue, jointe à une sécrétion plus abendante de salive. — Faim, avec répugnance pour tout aliment. — Après avoir mangé modérément, ballonnement du ventre et de l'épigastre. — *Nausées, avec vomissement de mucosités risqueuses.

Estomac. — *Pression à l'estomac et jusque dans la poitrine. — Contraction crampoïde à l'estomac, au point de suspendre la respiration. — Rétraction de l'épigastre, avec douleur brûlante.

Ventre. - Douleurs dans la région ombilicale. -- Pincements lancinants et tranchées dans la région ombilicale, surtout la nuit.
 - Pincements, rongements et sensation comme si un ver rampait dans le ventre. - *Maux de rentre, comme par un refroidisse-



DULCAMARA. - EUPHORBIUM.

807

ment. — *Engorgement inflammatoire et induration des glandes Enguinales, avec douleurs tractives et tensivés.

Sallis. — Constipation. — *Diarrhée, comme après un refroidissement, avec tranchées, ou avec vomissements, renvois et soil. — *Diarrhées de mucosités verdâtres on brunâtres. — Diarrhée angulnoleute, avec démangenison à l'anus, et chute du rectum. — *Diarrhées nocturnes, séreuses, avec coliques.

Urines. — Rétention d'urine. — Urines rares et fétides. — Urine claire et visqueuse, ou trouble, avec sédiment muqueux. — Urines rouges, brûlantes. — "Émission involontaire des urines, comme par paralysie du cal de la vessie. — Émission difficile des urines, et goutte à goutte de la vessie. — "Écoulement de mucocité par l'urèthre. — Rétrécissement de l'urèthre. — Urines troubles et blanchâtres.

Edgles. — Règles retardées et plus abondantes. — Éruption dartreuse aux grandes lèvres. — Avant les règles, éruption miliaire. — Dartres au sein.

Laryan. — Catarrhe et enrouement, comme par un refroidimement. — Toux avec enrouement. — Toux grasse. — Toux avec espectovation de sang rouge vif. — *Toux semblable à la coqueluche, *provoquée en respirant profondément.

Poitrine. — Porte oppression de la poitrine, surtout en respirant. — Elancement obtus, comme des coups, dans et sur les deux côtés de la poitrine. — Douleur pénible d'ondulation dans le côté gauche de la poitrine. — Fort battement de œur, sensible à l'ex-

térieur, la nuit.


Tronc. — Douleurs violentes dans les lombes, au-dessus des hanches, fouillantes, lancinantes ou tractives, principalement la nuit dans le repos. — Roideur de la nuque. — Engorgement et induration des glandes de la nuque et du con. — Tiraillements lancinants aux reins, aux épaules et aux bras.

Bras. — Paralysic des bras. avec froid glacial, comme par une apoplexie. — Donleur paralytique dans les bras, comme par une meurtrissure, principalement dans le repos. — *Éruption dartreuse et rerrues aux mains. — Sueur dans la paume des mains.

Jambes. — Tractions et déchirements dans les jambes, surtout dans les cuisees. — Dartres aux genoux. — Bouffissure et gonfiement de la jambe jusqu'au genou. — Sensation brûlante dans les pieds et les orteils. — Desquamation érysipélateuse et prurit aux pieds. — Fourmillement dans les pieds.

EUPHORBIUM.

EUPHORB. - Eaphorbe officinal. Archives de STAPP. — Hist. nat. et prép Voy. Pharmac. homosop, p. 211. — Dose usitée : 21, 30. - Durée d'action : jusqu's 30 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.



EUPHORBIUM.

ARTIDOTES: Camph. citr.
COMPARER AVEC: Bell. merc. mez. nitr-ac. — C'est surtout après beil. merc.
et nitr-ac. que ce médicament convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laiseant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par l'abus du mercure?; Affections des os et des membranes muqueuses?; Ulcères invétérés et torpides?; Scarlatine?; Verrues; Ophthalmies catarrhales? Erysipèle vésiculeux de la face?; Chophagite?; Gastralgie?; Ebréchement des dents; Ptyalisme; Affections des voies urinaires; Suites fâcheuses d'une pleurésie ou d'une pneumonie, avec adhérence de la plèvre?, etc., etc.

Voy. la note, p. 15.

308

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs dans les membres, déchirantes, ou pressives et lancinantes, surtout dans le repos, soulagées par le mouvement. — Douleurs lancinantes et tensives dans
les muscles. — Douleurs brûlantes à diverses parties du corps,
surtout dans les organes internes. — Faiblesse paralytique dans
les articulations, avec difficulté de se lever de son siège. —Grande
mollesse et lassitude. — La plupart des symptômes sont aggravés pendant le repos, en étant assis et au toucher.

Peau.—Prurit rongeant et brûlant qui oblige à se gratter presque constamment. — Stries d'un rouge pourpre sur la peau. — Fusoncles. — Ulcères indolents. — (Sphacèle?) — «Verrue».

soncles. — Ulcères indolents. — (Sphacèle?) — °Verrues.

Sommeil. — Envie de dormir le jour, accompagnée de hâillements fréquents. — Somnolence comateuse, le jour. — Difficulté de s'endormir le soir, avec tremblements et sursauts. — Réveil fréquent.

Pièvre. — Horripilation et manque de chaleur vitale, surtout dans les affections des organes internes. — Frissons au commencement du repas. — Horripilation et frisson avec froid des mains et chaleur des joues, sans soif. — Sueur matutinale, avec chaleur, sans soif.

Moral. — Apprehensions anxieuses. — Taciturnité. — Goût pour le travail.

Tôte. — Vertige tournoyant à faire tomber de côté. — Maux de tête pressifs, lancinants. — Douleur de meurtrissure à l'occiput. — Inflammation érysipélateuse de l'extérieur de la tête.

Your. — Inflammation des yeux, avec prurit et sécheresse des paupières et des angles des yeux. — Inflammation chronique des yeux. — Larmoiement cuisant et agglutination nocturne des paupières. — Sécrétion abondante de mucosités dans les angles des yeux. — Trouble de la cornée. — Trouble de la vue. — Myopie. — Diplopie.



EUPHORBIUM.

309

Oreilles et Hes. — Otalgie en plein air. — Démangeaissa suffoquante dans le nez et jusque dans le cerveau, avec écoulement abondant de mucosités. - Eternument fréquent.

Pace. — Gonflement érysipélateux de la joue, avec éruption de vésicules jaunâtres et douleur térébrante et fouillante. - Gon-

flement påle de la joue. — Douleur brûlante à la face.

Dunts. — Maux de dents pressifs, lancinants, ou avec douleur térébrante, aggravés par le contact de la mastication, on bien au commencement du repas, avec frissons et douleur dans la tête

et les pommettes. — *Ebréchement des dents.

Bouche et Gorge. - Sécheresse de la bouche, sans soif. - Saliration arec horripilation, envie de vomir et pincements dans l'estomac. — Salive salée. — Douleur brûlante depuis la gorge jusqu'à l'estomac, accompagnée de chaleur, anxiété, tremblement

et écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites.

Estomac. — Goût fade, rance, amer. — Forte soif de boissons froides. — Benvois à vide. — Hoquet. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, avec chaleur, anxiété et tremblement. — Douleur de meurtrissure à l'estomac. — Relâchement et flaccidité de l'estomac, avec rétraction du ventre. destomac contractives. - Pincements et sensation de griffement à l'estomac. - Douleur brûlante dans l'estomac et a l'épigastre. — Inflammation de l'estomac.

Ventre. — Maux de ventre avec douleurs constrictives.-- Colique spasmalique, venteuse, avec douleur d'écartement ou qui semble presser vers le haut, soulagée généralement en appuyant la tête sur le genou et le coude. - Sensation de vacuité dans le ventre. - Douleur brûlante dans le rentre. - Déchirement comme par

suite de luxation dans les aines.

Selles et Urines. Envie pressante d'aller à la selle, avec prurit au rectum. - Diarrhées liquides arec ténesme, sensation de brûlure à l'anus, et douleur d'excoriation dans le ventre. - Envie pressante d'uriner avec ecoulement difficile, peu abondant et goutte à goutte. - Ecoulement de sang par l'urethre.

Parties génitales. - Lancinations déchirantes au gland. Prurit - Déchirement dans les testicules. -voluptueux au prépuce. Douleur brulante au scrotum. — Erections continuelles sans

lascirité. - - Écoulement de liqueur prostatique.

Larynx. - Toux sèche, creuse, provoquée par un chatouillement brûlant dans la trachée-artère et la poitrine. - Toux sèche, jour et nuit, comme par une oppression, le matin avec expectora-

tion frequente.

Poitrine. - Respiration gênée et haleine courte, avec douleur tensive dans les muscles de la poitrine. - Sensation d'extension spasmodique dans la poitrine. -- Sensation comme si l'un des lobes du poumon était adhérent. - Pression dans les muscles de la poitrine. - Lancination pressive sur le sternum. - Lancination



310 EUPHORBRUM. EUPHRASIA OFFICINALIS,

dans le côté gauche de la portrine, pendant le repis, soulagée par

le mouvement Douleur brulante d'une la patrine

Trone et Membres — De pleur crampoide dans l'épine dorsale, le matin au lit, en étant ce de l'épaul de l'épaul pendant le répos, soulager par la marche. — Stries écartates sur l'avant-bras, pruriantes au teucher. — Tracti ins crampoides à la main apres avoir écrit. — Douleurs de la retion dans les henches — Douleur brâlante, la nuit, dans les os des cuisses — Grande faiblesse des jambes. — Centractien crampoide des orteils.

EUPHRASIA OFFICINALIS.

EUPHR. - Euphranie officinale - Hauvenany - Hist, nat at prép Voy, Pharmac, homosop, p 214. - Done unite 30. - Durce duction : jusqu'a 20 jours d'us quelques cas Antilores Puis?

COMPARER AVEC . Arn. merc, n-v an puls, seneg, spig.


CHASIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, en verra les cas ou l'on pourra consulter ce i ne heament equire. Suites facheuses à une contasion. l'un comp. d'une chute, etc. Ophthalmes rhumatismales, serofoleuses, extarmales, tommatiques, etc.; Blennorrhec des quax : Obse meissen unt, inflammation et taches le la comp. Amb.y que amaurotique. Toux humi le a la suite de la grippe, Condylônies, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Donleurs crampold a par tout le corps — Picotenent aux extremites comme par une mouche, avec sensation de torp ur. — Exacerbation des syngtomes le soir. — Frate carre de dormer le jour, comme par tutique des yeux — Bellements rudents en se prem nant au grand aux — Lancinations yiel, nte la liverses parties et qui empe hent dedormir. — Reves effray auts as a reveil frequent et el, surs iot, ave lettroi. — Predoi, i une du fre, la Fortes a ur noctuene — Theiturniste et repagnant pour la convention, en est uncentre en soimème — In lifférence hypocondrinque. — Paresse. — Melancolie

Tête. - Embor, es et l'ade e d'incustre surc'é ins la tête le soir, augmentés en étant sen le Meur de tête prossits, avec plus tophobie et chaleur, principal angut au front -- El incements





EUPHRAGIA OFFICINALIS.

aux tempes et au front. -- Battement dans la tête, sensible au dehors.

Your. — Pression dans les yeux. — Sensation mordicante dans les yeur. - Rougeur inflammatoire des yeur. - *Inflammation de la cornée. - *Inflammation et ulcération du bord des paupières, avec mass de tête. — Cicatrices d'ulcères et taches à la cornés. — *Rooulement abondant de larmes corrosires, au point d'avengler, surtout quand on est exposé au vent. - *Gonfiement et aggiutination des paupières. — Cuisson dans les yeux, comme par da mble. — Lancinations dans les yeur, excitées par une lumière trop vive. — Eruptions de petits boutons miliaires autour des yeux. — *Sécrétion abondante de mucosités, quelquefois sanguinolentes, par les yeux et les paupières. — Compression dans les paupières. — Contraction dans les yeux et-les paupières, qui force à clignoter. - La lumière semble être obecure et vaciller. - Photophobie, surtout à la lumière du jour et au soleil.

Oreilles. — Otalgie, avec douleurs térébrantes dans la région du

tympan.

Hos. — Boutone paralents aux ailes du nez. — Excoriation et sensibilité douloureuse des narines. - Epistaxis. - Coryza fluent, le jour : la muit, obturation du nes. — "Violent coryza fluent, avec sécrétion abondante de mucosités, embarras excessif de la **tête et larmes corros**ives dans les yeux.

Wisago. — Roideur des joues, en parlant et pendant la mastication, avec sensation de chaleur et douleurs laucinantes. — Miliaire au visage, avec sensation de brûlure et rougeur, en se mouillant la face. — Lèvre roide comme si elle était de bois. — Elancements

dans la máchoire inférieure et au menton.

Boncho. — Bégayement et interruptions fréquentes de la parole. — Parole difficile, à cause d'une roideur paralytique de la langue et des joues. - Sensation d'un gloussement qui remonte dans la gorge.

Dents. — Douleurs lancinantes dans les dents inférieures. — Sai-

gnement abondant des geneives.

stomes - Urines. - Gout insipide. - Nausées et amertume dans la bouche après avoir fumé. - Renvois avec goût des alimenta. - Pincemente dana le ventre pur courte accès. - Serrement pressif et brûlant au travers du ventre. -- Coliques alternant avec affections des yeux. -- Selles dures et insuffisantes. --**Emission fréquent**e d'une urine abondante et claire.

Parties viriles. — Rétractions spasmodiques des parties génitales, le soir, au lit. — Prurit lancinant et voluptueux au gland et au prépuce. — • Condylômes. — Rétraction et fourmillement des

testicules.

Poitrine. - Toux, surtout le jour, avec expectoration difficile. -Toux, avec suspension de la respiration. - Toux matutinale,



312 EUPHR, OFFICINALIS. — FERRUM METALLICUM.

arec expulsion abondante de mucosités, et coryza fluent. -

Gêne de la respiration, même en étant assis.


Membres. — Douleurs crampoïdes, pressives, dans le dos. — Douleur d'engourdissement dans les bras et les mains. Douleurs crampoides, pressives, dans les mains et les doigts. - Accès de gonflement des articulations de la main ou des doigts en remuant ces parties. Torpeur des doigts. - Elancements dans les jambes pendant le repos. Tension, comme par raccourcissement des tendons dans le jarret et le tendon d'Ach.lle, en marchant. - Sensation de pesanteur et douleur crampoide dans les mollets, en restant longtemps debout. - Secousses qui remontent le long de la cuisse, suivies de torpeur paralytique de cette partie.

FERRUM METALLICUM.

FER. - Fer métallique. HARNEMANN, Hist, nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 103. - Doses usitées . 12, 30. - Durée d'action : 6 à 7 semaines dans quelques cas ile maladies chroniques.

ANTIDOTES Arn ars. bell. chin. kep. ipec mere, puls, verstr. On tem-ploie comme antidote de Ars chin the de Chine. COMPARER AVEC . Amin ars cale carb-veg cham, chin, cin, graph, hep. ipec, n-vom, puls, sep, thus verstr.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections arthritiques; Suites facheuses de l'abus du quinquina ou dn the de Chine; Paralysies, celles aussi qui proviennent de pertes débilitantes; Affections hydropiques; Chlorose; Congestion de sang et hemorrhagies, avec surexcitation de tout le système sanguin; Atrophie?; Faiblesse par suite de pertes débilitantes?, Fièvres internuttentes, empirées par l'abus de quinquina; Migraine; Cephalalgie congestive; Ophthalmies scrofuleuses?; Hemorrhagies nasales et buccales, Dyspepsie arec romissement des aliments (surtout chez les sujets phthisiques); Gastralgie; Coliques spasmodiques, flatulentes et cermineures; Lientérie?, Durrhée, surtout chez les personnes phthisiques et chez les enfants; Ascarides; Métrorrhagie, apres l'accouchement aussi : Stérilité . Avortement , Vomissement des femmes enceintes, Grippe; Coqueluche?; Asthme spasmodique (et flatulent)?, Toux convulsive; Phthisic (première période): Hémoptysie: Congestion à la poitrine, avec palpitations de cœur: Œdeme des pieds par suite de pertes débilitantes, etc., etc. Voy. la note, page 15.



FERRUM METALLICUM.

318

STRPTOMMS GÉMÉRAUX. — Douleurs violentes, déchirements et élancements surtout la nuit, avec besoin de remuer les parties affectées. — Varices. — Crampes et contractions spannodiques des membres. — Gonfiements hydropiques, avec douleurs lancimentes. — *Bouillonnement de sang et hémorrhagies. — La plupart des symptômes se manifestent la suit, s'aggravent en étant assis, et s'améliorent par un mouvement doux. — *Grande hasitude et fuiblesse générale, excitées même par la parole, alternant souvent avec un tremblement anxieux de tout le corps. *Amaigrissement. — Après s'être promené au grand air, fatique nerveuse au point de perdre connaissance, avec obscurcissement des yeux et bourdonnement dans la tête. — Grand besom d'être couché et faiblesse paralytique.

Pean. — Semmtion brûlante à diverses parties de la peau, avec douleur d'excoriation au toucher. — Pâleur de la peau de tout le

corps, on teint terreux.

Bournail. — *Grande fatigue sommolente, arec sommeil agité, la muit, jactation auxieuse, affluence de rêves et difficulté de se rendormir lorsqu'on s'est éveillé. — Sommeil tardif, le soir. — Yeur à demi ouverts pendant le sommeil. — Impossibilité de dormir en

étant couché sur le côté.

Fibre. — Frissons fréquents et de courte durée. — Manque de chaleur vitale. — Frissons avec forte soif, précédés ou accompagnée de mal à la tête. — Chaleur sèche avec besoin de se découvrir. — Bouillemement de sang, le jour, avec chaleur le soir, surtout dans les mains. — Fièrre avec congestion à la tête, bouillesure autour des yeux, gonflement des veines, vomissement des aliments, respiration courte et faiblesse paralytique. — Sueur abondante, facilement procoquée par le moindre siouvement et pendant le sommeil. — Sueur nocturne d'odeur forte. — Sueur froide avec anxiété pendant les crampes. — Sueur colliquative et visqueuse. — «Sueur le matin, à la suite des maux de tête,

Meral. — Anxiété avec battements dans l'épigastre. — Humeur querelleuse, acariatre, emportements et ergoterie. — Gaieté al-

ternant avec tristesse d'un jour à l'autre.

Tôte. — Embarras et pesanteur de la tête. — Vertige à faire tomber en avant comme par le mouvement de la voiture, *surtout en se baissant, en se remmant, etc. — Étourdissement et vertige tournoyant en regardant l'eau courante. — *Douleur pressive dans la tête, surtout à l'air frais. — Embarras douloureux dans la tête, au-dessus de la racine du nez, surtout le soir. — Tiraillement depuis la nuque jusque dans la tête, où l'on ressent des élancements et un bourdonnement. — *Moux de tête périodiques, martelants et pulsatifs, qui obligent à se coucher, otoutes les deux ou telle semaines. — Congestion à la tête. — Douleur



TERRUM METALLICUM

au ouir chevelu, comme s'il était écorché. -- Chute abondante des cheveux, avec douleur lorsqu'on les touche.

Yeux. - Yeux troubles, ternes et larmoyants, surtout après une légère fatigue (en ecrivant). - Yeur rouges, avec douleur brûlante. - Conflement et rougent des panpières avec un orgelet.

Oreilles et Nez. - Bourdonnement dans les oreilles, soulagé en appuvant la tête sur une table. Epistaxis, principalement par une seule narine et le soir. -- Accumulation continuelle de

caillote de sang dans le nez.

Face et Gorge. — *Visage terreux ou *pale, hâce, avec venz enfoncés. — *Visage rouge comme du fen. — Taches jaunes on bleuntres à la face. — Petites taches rouges sur la joue qui est pâle — Boufhssure de la face autour des yeux. — *Lèvres pâles. — Douleurs pressives dans la gorge, en avalant. — *Crache-

ment de sanq.

314

Appétit. — Gout douceafre comme de sang. — *Goût amer des aliments. — Absence d'appetit, surtout dans la matinee, alternant avec boulimie. Degout pour la viande et les acides. — La viande pèse sur l'est mac. — Soit inextinguible, ou absence de soif. — Les aliments solides paraissent trop sees. — Après chaque repas, renvois et regargitati et des almients, meme de ceux qu'on a mangés de bon appetit. — Après avoir pris des acides, romissement. — Après tous les repus et toutes les leussons, pression à l'estomac et au ventre, — La biere porte à la tête ou fait vomir.

Estomac. — Nausées avec envie de vonir pendant le repas. —

*Vomessement des alements, surtout la nuit, ou innochatement
après le repas, même après n'avoir mange que des œufs frais. —

Vomessement aigre et renvois acides. — Renvois amera après
avoir mange des choses grasses. — *Pression a l'estomac, surtout après avoir mangé de la viande. — Itouleur crampoide à
l'estomac. Crampes pressices à l'estomac, toutes les fois qu'on
a bu ou mangé

Ventre. - Ballonnement et dureté du ventre - Douleurs crampoïdes dans le ventre et le dis. - Crampes dis muscles abdominaux comme si le ventre était contracte, surtout en faisant des efforts et en se baissant. - Coleques flatulentes, la nuit. - Pe-

santeur d'aleureuse dans le bas-ventre, en marchant.

Selles. *Diarrhées ouqueuses et corrosives, quelquefois accompagnées de douleurs crampoides dans le ventre, le dos et l'anns.

— Selles non digérées. — Selles muquenses. *Ascarides du

rectum. Hemorrhoides avengles et fluentes.

Parties génitales. Exaltation de l'appetit vénérien, avec érections et pollutions fréquentes. — Ecoalement de mucosités par l'urethre. — *Metrorrhagies, vavec surexcitation du système sanguin, et douleurs d'entantement. Visage rouge comme du feu et écoulement abondant d'un sang tantot liquide, tantot noir et coagule, accompagne de douleurs semblables à celles de l'en-





FERRUM METALLICUM.

fantement, aux reins, et dans le ventre. — Règles faibles et d'un sang pâle. — Suppression des règles. — Pendant le coît, cuisson et douleur d'excoristion au vagin, avec manque de jouissance. — Avant les règles, douleurs lancinantes dans la tête, avec tintement dans les oreilles. — *Arortement. — L'encorrhée laiteuse et corrosive. — Stérilité.

Larynn. — Enrouement et âpreté dans la gorge. — Chatouillement dans la trachée-artère, qui excite fortement à tousser. — Toux, seulement en se remuant et en marchant. — *Expectoration purulente par la toux.— Toux spasmodique, surtout le matin, avec expectoration de mucosités tenaces et transparentes, cessant fuemédiatement après le repas; ou *toux spasmodique, sèche, commençant après le repas, avec romissement des aliments. — Expectoration fétide verdâtre, avec stries de sang. — *Toux avec expectoration de sang, surtout la nuit ou le matin. — Toux après le repas, avec vomissement des aliments. — En toussant, douleurs à l'occiput, ou élancements et douleur de meurtrissure dans la poitrine.

Politime. — Géne de la respiration, avec soulèvement presque imperceptible de la poitrine, et forte dilatation des navines, en expirant. — Géne de la respiration, surtout la nuit ou le soir, comme partant de l'épigastre, aggravée pendant le repos, et soulagée par les occupations intellectuelles ou physiques. — Accès de suffocation, le soir au lit, avec douleur brûiante dans la gorge et la partie supérieure du corps, et froid dans les membres. — Oppression constrictive de la poitrine. — Crampes constrictives de la poitrine, aggravées par la marche ou le mouvement. — Lancination tensive dans la poitrine et jusque dans les omoplates.

- Congestion à la poitrine. - Battement de cœur.

Trunc. — Déchirement entre les omoplates, la nuit. — Elancements dans les omoplates en remuant les bras. — Roldeur des muscles du cou avec douleur pendant le mouvement. — Gonflement des glandes du cou.

Bras. — *Eluncements et déchirements dans l'articulation de l'épaule et dans le bras, ou tiraillements, faiblesse paralytique et pesanteur. — Inquiétudes dans les bras. — Gonflement et desquamation de la peau des mains. — Crampes et torpeur dans les

doigts.

Jambes. — Déchirements arec lancinations riolentes, depuis l'articulation coxo-fémorale jusque dans le tibia, aggravés le soir, au lit, et dans le repos. — Douleur paralytique et torpeur dans les cuisses. — *Faiblesse des genoux au point de fléchir, avec inquiétude dans cette partie. — Varice aux jambes. — *Roideur, traction et pesanteur dans les jambes. — Gonfiement des genoux et des articulations des pieds. — *Gonfiement des pieds avec douleur tractive, surtout au commencement de la marche. — Crampse dans les mollets, la plante des pieds et les orteils.



316 FERRUM MURIATICUM. — FLUORIS ACIDUM.

FERRUM MURIATICUM.

PERR-MUR. — Muriate ou hydrochlorate de fer. — Bornninguausen. -Hist, nat, et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 104,-Pen counn.

SYMPTOMES. — Dans les membres, quelquefois spasmes subits; torsion des membres; déchirements paralytiques depuis l'articulation de l'épaule jusqu'au haut du bras et à la clavicule, avec impossibilité de lever le bras, et se dissipant par un mouvement doux. — Crampes dans les mollets, dans le repos, surtout la muit. --- Chaleur sèche, avec tendance à se découvrir ; odeur forte de la sueur nocturge; sueur froide de la face pendant les crampes dans les muscles. — Douleurs dans l'occiput, en toussant. -Dans le nes, constamment du sang caillé. — Face pâle, avec taches rouges sur les joues pâles. - Les aliments solides semblent être secs et sans saveur. — Absence d'appétit, surtout le matin; horreur de la viande et des aliments acides. - Soif inextinguible, ou bien aussi absence de soif. — Renvois, avec goût acide, amer, après des aliments solides ; romissements, après avoir mangé des œufs. - Maux de ventre, crampes dans les muscles, comme si le ventre était rétracté, surtout par la fatigue en se baissant, après quoi on ne peut se relever que très-lentement. — Pendant le coït, douleur d'excoristion et cuisson dans le vagin, svec absence ou sensation voluptueuse. — Respiration forte, commo pendant le sommeil, en étant assis tranquille. — Toux spasmodique, le matin, avec expectoration de mucosités visqueuses, transparentes et cessant immédiatement après avoir mangé; en toussant, douleur de brisement dans la poitrine, ou bien élancements dans la poitrine.

PLUORIS ACIDUM.

PLUOR-AC. — Acide fluorique. — Dr Héning. — Hist. not. et prép. Vey. Pharmac. homoop., p. 104. — Doses usitées : 15 à 30. Comparer avec : Ambr. baryt. calc. coni. nitr-ac. op. phosph. rhus. silic. - Convient parfois particulièrement après : Calc. silic., surtout dans les maladies des os, ainsi que après nur ac., dans les affections syphilitiques mercurielles. — Dans ces mêmes circonstances, ces mêmes médicaments conviennent souvent aussi après le Finor-ac.

ANTIDOTE : Nitr-ac?

GENERALITES. — Sensation comme si on luxait ou séparait les



membres du corps, aux articulations de la hanche et de l'épaule. Douleurs tressaillantes à divers endroits. — Douleurs violentes, brûlantes, pulsatives ou térébrantes, en général de courte duréa. — Douleurs vagues, légères, comme si des démangeaisons allaient se déclarer, à la partie gauche du corps. - Pression et douleurs paralytiques, surtout dans la main, le bras et le pied. - Diverses douleurs dans les es des avant-bras et des cuisses. -Grande disposition à remuer constamment toute partie du corps; l'on montre sa mauvaise humeur dans les traits de la face et les mouvements. — Les mains, les doigts, les orteils, les pieds, les mâchoires, les lèvres, les sourcils, les paupières et les muscles de la face sont constamment en mouvement. — Augmentation de Pactivité musculaire, sans fatigue ; aucune marche, même double de celle qu'on pouvait à peine faire auparavant, ne fatigue plus, nonobstant la chaleur ou le froid (effet curatif?). - La marche fatigue, avec difficulté de lever les jambes, qui paraissent troplourdes. — Surtout le soir, subitement, grande fatigue. Grande lassitude, parfois avec nausées et renvois. — Lourdeur paraly tique de tout le corps. — La plupart des symptômes apparaissent à la chambre et pendant qu'on lit ou qu'on écrit. Plusicurs symptômes sont plus forts pendant le repos; plusieurs encore sont pires en restant debout, mais moins forts qu'élant assis. — Aussitôt qu'on se lève, tous les symptômes reparaissent de nouveau. — Amélioration des symptômes par le mouvement et la marche. — Le mouvement n'aggrave que la pesanteur de la tête, la douleur de la hanche, la douleur de poitrine, la diarrhée; la marche n'aggrave que les souffrances gastriques, le prurit, la chaleur, la sueur, les douleurs dans l'articulation du pied. - La plupart des symptômes paraissent se montrer à droite dans la partie supérieure du corps et à gauche dans la partie inférieure L'usage du café ne paraît point contrarier l'action des atténuations éloignees, mais il parait aggraver les symptômes nerveux, ainsi que le vin le fait pour la chaleur et les congestions *Souffrances syphilatiques et mercurielles, chroranguines. niques.

Pean. L'application extérieure de ce médicament détruit la peans il survient une douleur violente, les alentours de la partie affectée deviennent blancs et douloureux, formant une ampoule épaisse qui se remplit de pus. — Pustules après la plus légère application sur la pean. — Douleurs brâlantes carconscrites à pluseurs endroits de la pean (après l'usage interne). — Prurit a la tête, aux sourcils, aux paupières, a la face; le prurit se manifeste surtout à la partie postérieure du corps, surtout au des, et s'aggrave vers le soir, ou apparaît le soir et le matin. — Dans la plaquet des cas, le prurit est picotant et fourmillant, circonscrit sur de petites places, forçant impérieusement à se gratter, et suivi parfois de petits boutons réunis en groupes. — Petits groupes



FLUORIS ACIDUM.

de points rouges, forçant la muit à se gratter comme si une dartre allait se former. D'anciennes cicatrices redeviennent pruritouses, rouges aux bords, et se couvrent de petites vésicules. - Taches rouges, élevées, au-dessus des sourcils. Boutons, surtout aux cuisses et aux jambes, se couvrant de croutes et euivis de desquamation. - Plusieurs petites télangiectasies, en forme de petites vésicules sanguinolentes, comme de petits bourgeons, depuis la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'un grain de chanvre. Gonflements variqueux opimatres.

- Ollcères mercunels.

818

Bommeil. - Envie continuelle de dormir, surtout le matin et particulièrement les dernières heures avant midi - Le soir, de bonne heure, envie de dormir, presque constamment suivie d'un long sommeil de nuit. Insomme toute la nuit, suivie parfols, vers le matin, d'un court sommeil parfuitement réparateur. - Sommeil profond et long jusqu'au grand matin, avec étourdissement au réveil. Beaucoup de rêves, principalement de morts ou de choses effrayantes, les rêves sont quelquefols aussi distincts que si les choses se passaient en réalité, mais on les oublie bientôt. - Souvent les rèves n'ont lieu que vers le matin ou après minuit. - Ronflement et cris pendant le sommeil. - Le mutin, au révoil, on se trouve mieux, même après avoir peu dormi


Fierre. — Point de frissons. — Calorification du corps augmentée, on trouve le froid agréable, on se réchauffe plus vite après avoir pris froid, et ne se refroidit point, quoique couchant la nuit la fenêtre ouverte. - Les lotions froides sont tres-agréables et produisent la sensation d'un grand bien-etre. - Chaleur générale avec nausées. Plus grande facilité de supporter la chaleur de l'eté. — Sueur et sensation de chaleur plus proponcée du côté gauche que du côté droit. - Sueur abondante, acide, et d'une odeur désagréable Le soir, sueur visqueuse, désagréable et d'une grande abondance (en marchant) ou bien avec prurit. -

Sueur, à la suite de pensées anxieuses.

well. - *Disposition à des pensées anxieuses. - Le soit trèsmé ontent, voyant tout en noir, le mutin suivant très éveillé et dispose a la plaisanterie. — Mauraise humeur, grande disposition a la colère; en pensant seulement à ce qui pourrait arriver, on se fache en soi-même, jusqu'a perdre tout son sang-froid -Grande disposition, etant seul, à se faire toute sorte de pensées imaginaires, qui portent toutes le caractère de la répugnance contre les personnes de la plus proche connaissance. "Humeur insupportable chez une vieille dame paralytique, qui se querellait avec ses nièces, renvoyait son indispensable gardemalade et tourmentait toute sa maison. - Irritation contre certaines personnes jusqu'à la plus grande haine, cessant aussitôt



K)



PLUORIS ACIDUM.

que ces personnes se présentent. — Indifférent et sans amour pour ses affaires. — Contentement, gaieté; tout plaît, tout paraît agréable, les premiers jours. — Les jours suivants, caractère plus solide, et moins de disposition que les premiers jours à causer et à flaner. — Pendant plusieurs souffrances, sensation comme s'll y avait du danger, ou qu'il allat arriver quelque chose d'effroyable. — Le matin, sensation comme si l'on avait rapidement vieilli, avec besoin de se regarder dans la glace. — Difficulté de retrouver l'ordre des idées, lorsqu'on a été interrompu dans ses pensées. — Intelligence difficile pour les choses philosophiques, mais parfaitement bonne pour les choses pratiques. — Grande disposition à oublier les choses. — Mémoire plus lucide le matin.

Toto.—Souvent, sensation d'un chancellement dans la tête, d'abord étant amis, ensuite aussi à chaque mouvement court et rapide. Vertiges avec nausées. — Congestion douloureuse à la tête, au commencement du mouvement après être resté debout, ou bien avec perte de connaissance et sensation comme si un coup de sang allait arriver. — Tête entreprise, principalement le matin jusqu'au déjeuner, et surtout du côté droit de la tête ou de l'occiput. — Peranteur de la tête, avec douleur sourde profondément dans le milieu du front. — Mal de tête pressif du dedans au dehors, comme si la tête était trop lourde, précédé de salivation qui diminue au moment où le mal de tête commence. — Pesanteur au-dessus des yeux, avec nausées, et plus forte pendant le mouvement. — Douleurs pressives dans la tête, parfois remontant de la nuque, ou comme dans les os du front, mais surtout dans les deux tempes on des deux côtés de l'occiput. Pression dans les tempes du dedans au dehors. - Pression du cerveau vers le haut. Le matin, sensation comme s'il y avait quelque corps étranger. dans l'os pariétal gauche. — Le soir, après avoir beaucoup parlé, chaleur à la face et serrement pressif profondément à l'intérieur du côté ganche de la tête, suivi d'odontalgie dans la machoire supérieure gauche, avec semation comme si l'on devait serrer surtout les dents qui ont été arrachées et dont les racines. également arrachées, semblent faire du mal. - Douleurs de tête qui passent rapidement d'un point à l'autre avec sensation d'un danger imminent. — Mal de tête avec nausées et vertiges. — Espèce de faiblesse indescriptible, surtout dans la tête et les mains, avec malaise dans l'estomac. - Prurit à la tête, forçant à se grathen - Les cheveux se collent facilement. - Chute des cheveux -- Carie de l'apophyse pierreuse de l'os des tempes.

Your. — Taches rouges élevées au-dessus des sourcils. — Desquamation et picotement dans les sourcils. — Prurit aux yeux, aux angles et aux paupières, forçant à so frotter. — Écoulement des yeux; larmolement. — Douleurs et pression surtout dans l'œil droit. — Sensation comme el l'on ouvrait les paupières par



FLUORIS ACIDUM.

320

force, et qu'un vent frais soufflat dessus. — Vue plus claire et plus forte, les petits caractères se lisent avec plus de facilité qu'autref, is. — Grand cercle lumineux devant les yeux, en les fermant — Le soir au lit, colairs croisés tevant les yeux. — Les lunettes deviennent insupportables, suite ut pendant les acces de caryza, quoi que la vue ne seit point meilleure. — Fistule lacrymale à l'en gauche, comme si l'en renchait profondement à l'interie ir un corps pointu, avec des croutes longues et blanches sur la fistule, suintement et prurit periodique.

Oreilles. Douleurs i ni at derrière l'oreille droite, dans la tête, avec douleur dans le talon. Douleur et pression dans l'oreille droite. Le matin, la suscept balte de l'oute est plus forte.

Nes. Bout on parulat, plat, a bard rauge, a l'arle gauche du nez, avec disparition d'une exconation d'autoureuse chronique de la narine diante. Petit bouton entre la racine du nez et l'orl. — Bouton avec une sure de la ge et enflammee, au dos du nez. — Eternament frequent de natin, avec accamulation de salive dans la bouche, et quelqu'es i incosites ser uses dans le nez. — Le matin, en ringant la bouche, accumulat en subite de mucosités dan le nez. — Souvent des acces de corgan, cenant subitement et d'eparaissant de meme. — Après avoir pres, le soir, de la lièr (ou du en congre), congra subit le londemain matin, acce écoulement riolent.

Pres. Asperite an front, en forme d'une ligne convexe. — Chaleur à la face, surte at le soir après avoir be ucoup parle, ou bien après avoir pris du vin. — Grand besan de se lacer la figure à l'enn fraide — Chaleur au front ou au-dessous des yeux. — Prurit picotant au cote droit de la face. — Muscles de la face toujours en monvement — Doule ers dans les os facianes, tantôt spasmodiques, tantêt brulantes, ou encore conne si l'on y rennant un emps ponte. — D'uleur de pais l'ael droit jusque fort en avant de la macheure apperieure. — L'aptions dartreuses et croûtes à la face, ch's les entonés de deux ans, pet is houtens saintants, sur un foi l'rouge, avec fort prurit forçant à se gratter. — Croate de lant, avec e upt ens à la tête. — Sensation d'un embarras grampaule d'un s'es quo leur s, dans la droite avec chaleur. — Rongement dors l'es d'ha macheur enferieure

Dente. — Sensation de et deux aux dents, surtout aux dents canines et in issues. In pussement des dents. Mal de dents dans la madeire gauel. Dents tellement deul ureus s'que la masticat, n'devient impossible. L'air find, en entrent dans la boache, frappe douloureus ment les dents arises. Le mal de dents lu c'éte droit passe rapidement à la cui-se gauche. — Estude dentaire à la canue superieure droite. Les dents incisives paraissent aiguis, comme cassees, au peut de faire mal à la langue l'isque celle-ce les touche. Gout acre, putride, de la vieille racine d'une dent incisive superieure. — Les dents cariées





PLUORIS ACIDUM.

paraissent moins sécréter et les gencives saignent moins qu'auparavant.

Bouche et Garge. — Goût semblable à de l'encre, paraissant provenir d'une dent. — Brûlement et comme d'excoriation, dans la bonche et aux lèvres. - Accumulation de salire dans la bouche, la nuit, avec la diarrhée, ou bien pendant les éternuments; salivation suivie de mal à la tête. — Picotement à la langue, avec salivation et cuisson au palais. — • Petit ulcère douloureux dans la bouche, au coin entre les mâchoires supérieure et inférieure, trèssensible en mangeant. - Sécheresse du palais, à gauche. - Senention comme si la région des fosses nasales était largement ouverte, pendant la promenade au grand air. — Sensation comme si, à l'entrée du pharynx, vers le côté gauche, il y avait un point " excorié, ou qu'il allat s'y former un ulcère. - Sensation de chaleur dans la gorge. — Constriction de la gorge, avec borborygmes, pression et brûlement dans l'estomac, rapports et vomiturition. — Sensation de grattement au larynx forçant à faire le monvement de la déglutition et à renacler. — Mal de gorge avec douleur d'excoriation et déglutition difficile au point de ne pas même permettre d'avaler du pain sans de grandes douleurs : les mucceités détachées par le renâclement contiennent un peu

Gent et Appétit. — Goût dans la bouche comme de l'encre, paraissant provenir d'une dent. — Goût acre, putride, provenant d'une vieille racine de dent. — Goût salé dans la bouche, le matin au réveil. — Goût acide, et sensation de graisse dans la bouche. Arrière-goût des aliments ingérés, dans la gorge. — Satiété prompte en mangeant; on mange moins qu'autrefois, les aliments plaisent au goût; plus tard, appétit plus prononcé le soir qu'a midi. — Appétit augmenté, faim très-prononcée et grande voracité. — Désir de choses piquantes. — Moins de goût pour le vin qu'autrefois. — Pendant l'augmentation de l'appétit, besoin de rétracter les muscles abdominaux. — Répugnance pour le café, plus tard, après avoir éprouvé le contraire les premiers jours.

Betomac. — Rapports acides fréquents, parsois avec pyrosis et besoin de rendre beaucoup de vents. — Rencois fréquents d'air, parsois avec mal au cœur. — Rapports d'un goût fade et nauséabond, avec envie de vomir. — Pression, constriction, plénitude, chaleur et brûlement dans l'estomac. — Entre les repas, pression, comme par une indigestion. — Gargouillement dans l'estomac.

Ventre. — *Douleurs dans le côté gauche du ventre comme dans la rate, pressives ou pinçantes. — Tressaillements dans le côté gauche du ventre. — Maux de ventre immédiatement après avoir mangé (des poissons au yinaigre, du melon, des harengs). — Maux de ventre avec borborygmes et douleurs errantes. — Battement comme du pouls, en touchant la poitrine et le ventre. — Sensa-



FLUORIS ACIDUM.

tion de défaillance, comme un vide dans la région ombilicale, avec besoin de respirer profon lement, et amelierce en serrant le ventre. - Beaucoup, de borborggmes et préquente sorte de vents. —

Vents tres-fetales.

322

Selles. - Selle diarrhé que, chaque matin après le café et le soir tard, avec tenesme et sort e du rectum, chez un homme affecté de souffrant es homorrhoidales. - Diarrhee d'etc. - Diarrhee nocturne, avec accamulation de sulve a la bouche, donlours à l'estomac, et sensation comme si des fiata ettes s'accumulaient dans le sentre. - Silles aboud intes en forme de houdier, parfois avec pine ment, les selles deurle iques arrivent tous les d'un jours, un per plus tard, retre gramant de 2 neures du matin jusque vers midi - Sensation comme si les vents ne pouvaient pas sertir de l'anus. - Accent les selles, beaucoup de cents tres fétules. - Congesti n'a l'anus, après avoir pris du vin. - Prurit hémorrhoidal à l'anus.

Drines. Douleurs dans la region de la vessie et des aines. — Avant et après l'emission des urines, douleur dans la vessie ou su col de la vissie; la pression est aussi louloureuse — Sécrétion urinaire dammune les premiers paus; augumntes les jours suivants. Lamission fuede d'urines chaires, non augmentées, avec seus than d'un bien-être après. — Odeur penétrante piquante des urines. — Odeur agreable des urines, avec sédiment d'un

rouge pourpre

Parties génitales. Sensation d'affluence vers les cordons spermatiques. El meements et traillements du testieule droit vers l'anneau ingrinal. Appetit vinerieu dominué, sans impuissance, les premiers jours, ou bien. Désir violent du coît, arec érections surtout la nait pend int le sommed. - Ejuculation meins prempte qu'autref is, et tres-abondante, sans nulle incommodite après.

Règles - R glos trep hâtives, plus abondantes qu'autrefois, avec é dulement d'un sang épais, coagi le. Leucorches jaunâtes, correive, avec extoriation et brulement aux parties. - Métror-


rhagre chronique avec souffrances asthmatiques

Larynx, Sensibilité du larynx, avec douleur d'execciation en toussotant et en renà dant. Excorat, in dans la gorge jusque dans le larynx. Douleur dans le larynx, comme s'il y avant là un cartil grevertant la diglutation. - Renaclement de mucasités

sanguin lentes

Poitrine — Deuleurs an esté gauche en respirant. — Reson de respirer profondement, parles avec sensation de plenitude dans la poitrine. — Oppr saion d'alla poitrine, cen me si elle était trop étroite sur le levant. — Conced la respiration con ne s'il y avait un obstacle au haut le la poitrine et dans la fossette du cou. — Sifflement en request, avec he de respirer profendement. — ell galvallance, les oullranes bien allegées — Inquietude, dou-





FLUORIS ACIDUM.

leur discoriation et tressaillements au cour. -- Pression à la politrine; élancements dans le côté gauche; douleur dans le côté gauche, douleur dans le côté gauche, jusqu'aux aines, augmentée en respirant profondément. -- Prurit à la poitrine, forçant à se gratter jusqu'au sang. -- Bougeur et gouflement d'un mamelon, précédé de prurit,

Trens. — Prurit au cou et à la poitrine, forçant violemment à se gratter, le soir en sortant. — Douleur tractive au côté droit de la maque et du cou. — Roideur de la nuque. — Crampe dans les muscles du cou. — Chaleur, comme un souffie chaud, dans la maque et remontant vers l'occiput, ou se dirigeant vers l'épaule. — Chaleur au milieu du dos se répandant vers les lombes. — La puit, douleur profondément à l'intérieur de la région lombaire gauche. — Douleur dorsale, profondément à l'intérieur, au-dessous de la pointe des omoplates, le plus prononcée étant assis et surtout en allant en voiture. — Douleur dorsale, comme dans la région des reins. — Prurit et petits boutons au dos et aux deux

épaules. — Secousses et tressaillements au sacrum.

Extrémités supérieures. — Prurit et boutons aux épaules. — Douleurs ostéocopes dans les bras, passant du bras droit au bras gauche. - Pression dans les bras. - Douleurs dans les articulations du coude. - Secousses douloureuses, électriques, dans les doigts. - Douleur rhumatismale dans l'os du bras droit, avec paralysie. - Engourdissement paralytique du bras droit, le soir en s'apprepant dessus, avec picotement. — Le matin, au réreil. *bras droit lourd, et comme engourdi*, ou bien *comme me*urtri et gelé. - Engourdissement de la main et du bras gauches, vers le matin, arec tressuillement et faiblesse paralytique, tous les jours jusqu'à midi. — Manque de force, faiblesse, torpeur et sensation paralytique dans les mains. - Douleur dans les articulations de la main droite et les doigts. - Les deux mains sont très-rouges à l'intérieur, comme marbrées avec sensation de chaleur et de plénitude. - Sueur continuelle à la paume des mains. — Prurit et potites vésicules galeuses a l'index droit. Douleurs outéocopes, sensation de luxation, picotements et battemente, comme après une contusion, dans les doigus. - Picotement dans les bouts des deigts. — Douleur qui parait sortir au-dessous de l'ougle du pouce, - Brûlement réstéré dans le bout du petit - Sensation comme si un cheven était placé le long du dos du petit doigt. - Douleur d'excornation aux verrues de la main gauche. - Les ongles paraissent croître plus rapidement. Peau des mains cassante, sèche, gercee, surtout après s'être lavé. bouts des doigts comme creux, ongles cassants et repliés en dedans, and coins.

Extrémités inférieures. — Pientement à l'os de la hanche droite, se répandent au-densis des fesses. — Douleur à la tête du fémur gauche. — Douleur dans le nerf sciatique droit. — Douleur et sensation de meurtriesure dans la hanche ganche, surtout en



524 FLUORIS. - GELSEMINUM SEMPERVIRENS.

montant au ht, ou en se levant. — Douleur brûlante, passant comme un cclair dans le nerf, le long de la cuisse, depuis la hanche, ou depuis la region vesicale. — Cuisses comme meurtries. — Douleurs dans les genoua, surtent le soir. — Douleurs tractives dans les jumbes, surtent à gauche. — Engourdissement facile des jambes, surtent du côte gauche — Douleur tractive dans le cou-de-pied droit, le soir à la promenade, suivie de faiblesse paralytique dans l'articulation du pied et celle du genou. — Douleur paralytique, comme une luxation dans l'articulation des pieds. — Chaleur et brûlement dans la plante du pied droit. — Brûlement dans les orteils, empêchant presque de marcher. — Endolorissement des cors aux pieds. — Ulcères aux jambes, autour des malléoles.

GELSEMINUM SEMPERVIRENS.

GELS. - Gelsomine. - Voy. HALE, Remedes américains.

Employé jusqu'ici avec succès contre :

Eclampsies et convulsions epileptiformes des femmes et des enfants, avec spasme violent de la glotte. Epilepsie, avec embarras dans le vertex et sensation de plemtude dans la region de la moelle allongée. Paralysie, sans perte de la sensibilite : paralysie des organes de la déglutition et aphonie à la suite de diphthérites. - Fierres intermittentes, avec douleurs pressives et lancinantes, traversant les tempes et les narmes, avec yeux etincelants et loquacité. - Congestions cerébrales, pendant la dentition. -Meningite cerébro-spinale, avec perte complete de la vue, de la parele et du mouvement; pouls et respiration faibles, nausces et vomissement. - Coryea à chaque changement du temps, avec mal de gorge dans la partie supérieure du pharyux; douleur en avalant, jusque dans l'oreille; dysecee. - Prosopulgie, avec palpitations et contractions musculaires autour des parties affectees; grande nervosite et perte de la domination des muscles du mouvement volontaire. Diphtheritis, avec gémissement, paralysies ou anesthesies par tielles, et vue anomale qui fait paraître les objets ou plus eloignes, ou doubles ou renversés. Spasme de la glotte, avec voix croupale, inspirations lentes et exspirations subites et violentes. - Gastralgre avec la sensation d'un poids lourd ou d'une tension; epigastre comme vide, et fausse faim. - Jaunisse avec grande prostration et selles comme de l'argile ou de la creme. Diarrhée après chaque émotion morale - Spermatorrhee avec face pale, yeux creux, moral abattu, marche lourde et trainante, et appetit sexuel facile a



GINSENG. - GRANATUM.

325

enciter. — Leucorrhée, avec écoulement blanc, sensation de plénitude à l'épigastre et d'endolorissement au sacrum. — Ménorrhagie, avec écoulement continuel du sang, sans nulle douleur.

GINSENG.

GINS. — Ginseng. — Bibliothèque de Genève, t. VIII, p. 450. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. hommop., p. 219.

N. B. La plante n'étant point encore bien déterminée, nous attendrons que l'on publie d'autres symptômes avec la substance mieux définie.

GRANATUM.

GRAN. — Écorce de la racine du grenadier. — Bibliothèque de Genève. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 221. — Doses usitées : 0: 1:80?

COMPARER AVEC : Ars. chin. iod., etc.

CLIBITOR. — Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Toxication par l'arsenic; Défaillance, syncope et lipothymie; Suppuration des organes internes, surtout du foie; Gonflements inflammatoires; Blessures; Ulcères; Engelures; Fièvres tierces, gastriques, bilieuses et typholdes; Ophthalmie; Taches de la cernée?; Lippitude; Ulcération de l'oreille; Épistaxis; Ramollissement et saignement des gencives; Stomacace; Odontalgie; Branlement des dents; Ulcères de la bouche; Angine séreuse et catarrhale; Amygdalite, avec ulcération; Dégoût et vomissement; Gastralgie; Diarrhée et dyssenterie; Diarrhées séreuses; Choléra; Chute du rectum; Chute du vagin et de l'utérus; Lencorrhée; Toux catarrhale; Enrouement; Pleurésie; Hémoptysie; Palpitations de cœur, etc., etc. (Toutes affections contre lesquelles l'ancienne école a recommandé ce médicament.)

Voy. la note, page 15.

· ----

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. —Grande lassitude et fatigue, surtout dans les jambes, parfois avec impossibilité de rester debout et besoin de se coucher. — Lassitude somnolente, avec mal à la tôte, comme après une débauche nocture — d'abuttement



GRANATUM.

326

Tremblement des membres. — Relachement et flaccidité des muscles, surtout dans les membres intérieurs. — Amaignesement. — Bàillements, parfois convulsifs, et pandiculations frequentes. — Sommeil agite avec reres fréquents, cris et jactation. Horripilations partielles et semi-laterales, parfois avec maux de tête semi-latéraux. — Chalcur seche, ardente, par tout le corps, avec besoin de se déconvrir. Les horripilations et les frissons ont ordinairement lieu le matin : la chalcur se manifeste le soir. — Sueur au moindre mouvement. — Grande sensibilité et disposition a s'affecter. — Irritabilité et arrogance. — Humeur taquine et querelleuse. — Serupules hypocondriaques. — Mélaneolie, humeur sombre, abattement et decouragement. — Stupéfaction — et embarras intellectuel.

Tôte. Vertiges, surtout pendant un travail intellectuel, on le matin en se levant, et parfois avec obscurcissement des yeux, on avec nausées et maux d'estomac. Sensation de cide dans la tête. Douleur stupefiante et lourdeur douloureuse dans la tête, surtout au front. — Pression su front et à l'occiput. Douleurs tractives aigués, principalement dans le coté de at de la tete. Elancements au front. — Pustules sur le front et à la tempe, avec douleur d'excoriation, laissant de petits tubercules en séchant.

Yeux, Oreilles, Nez. — Yeux cernes et creux. — Prurit et cuisson brulante dans les angles des yeux. — Sécheresse et cuisson dans les yeux. — Teint jaunâtre de la selerotique. — Inflammation des yeux, comme dans le coryza. — Pupilles dilatees. — Mouvements convulsits de la paupiere. — Obscurcissement des yeux. — Vue faible. — Serrement crampoide, douleurs tractures aigues et élancements dans les oreilles. — Tintement et bourdonnement des oreilles. — Chalcur ardente et secheresse dans les narines, ou accumulation d'un mucus tenace. — Prurit formicant dans le nez. — Coryza alternativement sec et fluent.

Face et Dents. — Teint maladif, jaunâtre et terreux. — Chaleur ardente de la jace, parfois passagere. — Prunt rongeant a la face, et surtout aux joues. — tionflement de la joue, avec lividite, chaleur ardente, prunt, tension et formication, comme des engelures. — Douleurs serrantes et tractives aigués à la face, aux poinmettes et à la racine du nez, souvent d'un seul cote. — Sécheresse et sensation brulante aux levres. — Douleur tractive nigué, tension et serrement dans les articulations maxillaires, et craquement pendant la mastication. — Douleurs lucinintes aux dents, meme la nuit, au lit. — Les dents semblent s'etre allongées. — Clèncives decollees et saignant facilement.

Bouche et Gorge. Forte accumulation de sature, parfois d'un goût douceatre, dans la bouche. — Langue humide et blanche. — Port crachotement de mucosités. — Sensation d'astriction aux



GRANATUM.

327

diverses parties de la bouche et du gosier. — Rétrécimement du gosier.

Appétit. — Grande variabilité de goût; goût alternativement fin et émoussé. — Appétit alternativement diminué et augmenté. — Foun extraordinaire et coracité, même après le repas. — Grande variabilité de l'appétit; désir de diverses choses, et surtout de café, de fruits, d'aliments succulents et acides. — Soif, avec envie de boire de l'eau. — Les aliments liquides et les pommes de terre

causent des nausées et des rapports.

Estomac. — Renvois d'air, fréquents et brugants. — Nausées fréquentes, parfois avec lassitude, affinx d'eau à la bruche, mal de ventre et d'estomac, fréquente envie d'aller à la selle, sans résultat, frissonnements, mauraise mine et mauraise humeur. — Vomissements, même la unit, et parfois avec lassitude, tremblement, sueur ou vertiges. — Pression pénible, plenitude, sensation brûlante et anxiéte dans la région précordiale. — Crampes

d'estomac, le matin à jeun.

Ventre. — Maux de ventre fréquents et souvent continus, parfois avec nausées, affluence d'eau à la bouche, frissonnement et décubitus, ou avec vertiges. — Maux de ventre après chaque repas, ou le matin à jeun. — Maux de ventre soulagés par la chaleur externe et le coucher, ainsi qu'en buvant de l'eau froide. — Pincements, élancements et rotation autour du nombril et dans l'estomac. — Anxiété dans le ventre. — Ballonnement douloureux de l'abdomen, parfois avec faim canine. — Production et évacuation fréquente de flatuosités. — Gonflement du nombril comme par une hernie ombilicale. — Fermentation dans le ventre. — Traction dans le ventre comme peur aller à la selle. — Pression douloureuse et gonflement aux aines comme si une hernie allait paraître.

Selles. — Piusieurs selles par jour. — Evacuations copieuses et de conleur très-foncée. — Diarrhées, avec selles fréquentes, et évacuation de matières fécales et muqueuses. — Avant les selles diarrhéiques, nausées et fermentation dans le ventre; pendant les selles, chaleur ardente à la face et pression sur le rectum; après, chaleur ardente du rectum. — Ténesme, avec mouvement et fermentation dans le ventre. — Chute du rectum pendant les selles. — Prurit et tetellation ensupportable dans le rectum. — Prurit brâlant à l'anus, aux fesses, au périnée, au scrotum et à la partie chevelue des organes génetaux, et surtout aun cuisses. — Elance-

mente à l'anus et dans le rectum.

Urinea et Parties génitales. — Douleurs incisives, lancinantes et rongeantes dans l'urèthre. — Inflammation et gonflement de l'urèthre. — Suintement muqueux par l'urèthre, comme dans une generatée, avec traction brûlante dans les corps caverneux, jusqu'an gland. — Excitation de l'appétit vénérien. — Règles trop hatives et trop abondantes, et accompagnées de coliques et de



GRANATUM. - GRAPHITES.

pression depuis les reins jusque dans les aines. -- Leucorrhée jaunätre.

Poitrine. Sensation d'anxiété dans la poitrine et gémissement. Forte oppression de poitrine, avec lassitude dans les jambes. - Pression sur la poitrine et a travers le sternum. Douleurs rhumatismales, lancinantes et tractives au diaphragme. - Elancements dans la postrine, surtout en marchant. Tension et serrement douloureux dans les côtés. Palpitations de caur. Douleurs et contractions parfois au moindre mouvement.

crampoides dans les muscles de la poitrine.

328


Tronc et Membres. - Fréquentes douleurs de brisement et de surcharge entre et sur les épaules et aux reins. - Traction. douleurs rhumatismales, formication et sensation de paralume dans les bras, avec difficulté de les lever. Douleurs rhumatismales dans les articulations des mains et des doigts, ainsi qu'aux avant-bras. - Roideur douloureuse et paralytique dans les doigts. — Gonflement de la pulpe des pouces, avec lividité, chalcur ardente et enflure marbree des veines. - Prurit rongeant et insupportable à la paume et au dos des mains. Sensation de reideur dans la hanche, comme par une sciatique. -Douleurs tractives aiguës, tiraillement paralytique, lourdeur et élancements au genou. - Douleur de foulure au cou-de-med. --Cors douloureux aux pieds.

GRAPHITES.

GRAPH. Graphite, plombagine, mine de plomb. - HARNEMANN. - Hist. nat et prép Voy. Pharmac homoop, p. 105. - Dose usitée : 30. - Durée d'action : jusqu'à 50 jours, dans quelques cas de maladies chropiques.

Antibotes: Ars, n vom. vinum. — On l'emploie comme antidote de . Ars. Companer Avec . Acon. agar ambr. amm. ora bell. bry. calc. carb-r. cham chim. con quai hep. hyose kal lyc. magn. magn m. n-nom. phos. puls. rhus. sah.n. sep. sil. sulf — Cest surtout après lyc., qua graph. convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections arthritiques, même avec nodosités, Engorgement et induration des glandes; Excoriation de la peau; Affections scrofuleuses; Erysipeles filegmoneux et vésiculeux; Zona; Eczéma suintant; Dartres de plusieurs espèces, surtout an visage et chez les femmes qui ont les règles faibles; Ulcères invétéres; Tumeurs enkystées (loupes); Squirre et cancer, développés sur d'anciennes cicatrices à la suite de plusieurs abcès; Mélancolie noire; Teigne; Migraine;



G. PHITES.

Ophthalmies de différentes espèces; Dureté de l'ouie et bourdonnement des oreilles par congestion de sang; Érysipèle à la face; Paralysie de la face; Dyspepsie; sans ou avec vomissement des aliments; Gastralgie; Coliques flatulentes; Bubons scrofaleux?; Ténia; Constipation ou diarrhée chroniques; Souffrances hémorrhoïdales; Hydrocèle; Induration des testicules; Impuissance?; Satyriasis; Dysménorrhée, surtout celle provenant de stagnation dans le système de la veine porte; Cancer de la matrice; Aménorrhée; Excoriation des mamelons; Excoriations des enfants; Asthme spasmo-

dique?; Catarrhe suffoquant; Difformité des ongles, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — *Douleurs crampoides, *crampes et contractions de diverses parties. — Tension dans quelques parties, comme par raccourcissement des tendons. — Tressaillement et distorsion des membres. — *Tiraillements arthritiques et déchirement dans les membres et les articulations, surtout dans les parties ulcérées. — Nodosités arthritiques. — Disposition à se donner un tour de reins. — *Engourdissement facile des membres. — Roideur et inflexibilité complète des articulations. — Gonflements durs, avec douleurs lancinantes. — Douleurs nocturnes que l'on ressent même pendant le sommeil. — Les symptômes se dissipent après une promenade en plein air. - Varices avec élancements, tension et prarit. — *Gonflement et dureté des glandes. — Douleurs pendant le changement de temps. — Malaise général qui force à gémir, sans aucune sensation de douleur distincte. — Forte pulsation dans tout le corps, et surtout au cœur, augmentée par le moindre mouvement. - Tiraillement dans tout le corps, avec besoin d'étendre les membres. - Sensation d'un tremblement dans tout le corps, avec tressaillement des membres. — *Grand amaigrissement. — *Forte disposition à se refroidir, et crainte du grand air et des courants d'air. - Lassitude générale. -Chute rapide des forces. — Augmentation des souffrances en prenant froid.

Peau. — Sécheresse opiniâtre de la peau, et absence de transpiration. — Éphélides. — Taches rouges sur la peau, comme des piqures de puces. — *Infiammations érysipélateuses. — •Érysipèle vésiculeux et semblable au zona, au ventre et au dos. — *Dartres et autres éruptions humides ou croûteuses, parfois avec sécrétion de sérosités corrosives, ou avec démangeaison le soir et la nuit. — •Tumeurs enkystées. — *Vésicules rongeantes. — *Excoriation de la peau, surtout ches les enfants. — *Peau maladive; toute lésion tend à s'ulcèrer. — Chair luxuriante et pus fétide dans les ulcères, avec douleurs déchirantes, brûlantes

et lancinantes. — *Difformité et épaisseur des ongles.

Semmell. — Forte envie de dormir, le jour et le soir de bonne

329



GRAPHITES.

330

heure. *Difficulté de s'endormir. Sommeil agité la nuit, avec réveil fréquent. — Sommeil nocturne, incomplet, comme si l'on ne fassait que sommeiller — Sommeil non reparateur, et suivi, le matin, d'un sommeil comateux. — La nuit, affluence d'idees quelquefois pénibles. — *Grande agitation, la nuit, avec rèves anxieux et effrayants, oppression et étouffement. — *Pendant le sommeil, sursauts avec effrei — Réves de morts, de feu; rèves avec réflexions. — La nuit, idées pénibles, angoisse, chaleur, inquietude, tressaillements, souffrances gastriques, et beaucoup d'autres incommodités.

Fièvre : Frissons, le matin et le soir, avec ou sans chaleur, et suivis de saeur : Sueur, souvent tres-fetide, au moindre moncement ou a la moindre fatigue, même en parlant. - Sueur noc-

turne, quelque fois fétide

Moral. — *Abatt ment, tristesse et chagrin profond, avec découragement et pleurs abandants. — Agitation, serrement de cour et angoesse, comme si on allait mourir ou qu'on fût menacé d'un grand malheur, souvent avec mal a la tête, vertige, nausées et sueur. — *Agitation aucreusse, quelquefois en travaillant assis, ou la nud avec besoin de quitter le lit. *Agitation et inquiétude le matin. Caractère peureux - Détermination lente et hesitation. — Trop grande impressionnabilité. Disposition à s'effrayer. — Irascibilité *Horreur du travail. Distraction.

On se trempe en parlant ou en cerivant.


Tête - Fatigue à la suite d'un travail intellectuel. - Sensation de torpeur dans la tête - *Irresse et vertiges, surtout le maten en se levant, on en se reveillant ainsi que le soir avec envie de se concher. *Finbarras à la tête - Acces de maux de tête, quelquefois semi latera avec nausons et vernissements acides

Maar de tête riolents le matin, jusqu'a faire venir la sueur freide et a faire tomber de faillesse. Mal de tête par le mouvement de la voiture, ainsi qu'en remuat t la tête; ou pendant et après le repas. Maux de tête du côte sur lequel on est couché Tension et construction pressor a l'occiput, avec roideur de la nuque Embarras et contraction dans le front. Douleur compressive dans le vertex, après midi, avec roulement dans la tête. Bouillonnement de sang avec battement et bourdannement dans la tête "Péchirement et tiraillement au cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu, dans les dents et les glandes du con. "Prurit ou cuir chevelu dans la marche au grand air Desquamation abondante du cuir chevelu "Chute des chereux, même sur les côtes de la tête Grisonnement des cheveux.

Youx. Paupieres l'urdes, et s'affaissant comme paralysées.

*Pression dans les yeur et les paupières, comme si des grains de sable s'y étaient introduits. * Flancements dans les yeux.

— Chalcur et sensation brûlante dans les yeux, surtout aux.



GRAPHITES.

lumières. — *Inflammation des yeux, avec rougeur de la sclérotique, injection des veines, gonflement et sécrétion muqueuse abondante des paupières. — Orgelet avec douleur tractive. — *Chassie sèche aux paupières et dans les cils. — *Agglutination des paupières, et larmoiement. — *Obscurcissement de la vue, en se baissant. — *Myopie. — Confusion des caractères en lisant. — *Scintillement devant les yeux. — *Photophobie, le jour surtout.

Oreilles. — Élancements et battements dans les oreilles. — °Sé
cheresse de l'oreille inférieure. — °Odeur fétide et écoulement

de sang *et de pus par les oreilles. — *Croûtes, dartres, suintement et excoriation dérrière les oreilles. — *Dureté de l'ouie,


améliorée par le mouvement de la voiture. — *Chant, tintement, bourdonnement et roulement comme celui du tonnerre
dans les oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles, la nuit. —
Sensation comme si l'air s'engouffrait dans la trompe d'Eus-

tache. - Sifflement dans les oreilles.

Nos. — Gonflement du nez. — Sensation de tension dans l'intérieur du nez. — Pores noirs au nez. — *Croûtes sèches dans le nes. — *Narines excoriées, gercées et ulcérées. — *Odeur fétide par le nez. — Mouchement de sang et épistaris surtout le soir et la nuit, avec congestion à la tête et chaleur du visage. — Écoulement d'un pus fétide par le nez. — Exaltation de l'odorat. — *Obturation et séchereme pénible du nez. — *Coryza quotidien, en se refroidissant. — *Coryza sec, avec maux de tête, et "avec nausées qui forcent à se coucher. — *Écoulement par le nez de mucosités liquides ou jaunâtres et épaisses "avec odeur putride. — Coryza fluent avec catarrhe.

Visage. — Teint jaune pâle, avec yeux cernés. — Chaleur fugace au visage. — *Inflammation érysipélateuse et gonflement du visage, avec éruptions de vésicules. — Tumeur enkystée à la joue. — Sensation continuelle, comme si la face était recouverte d'une toile d'araignée. — *Paralysie semi-latérale et distorsion des muscles de la face, avec parole difficile. — Douleurs tractives et déchirantes dans les os du visage. — *Éruption à la face, d'un aspect comme si la peau était à vif. — *Croûtes et *boutons suintants à la face. — °Éphélides. — °Chute des poils de la barbe. — *Ulcères à la face interne des lèvres. — *Commissures des lèvres ulcérées. — Lèvres gercées. — *Éruptions croûteuses au menton et autour de la bouche. — °Nodosités douloureuses à la mâchoire inférieure. — Gonflement et dureté des glandes sousmaxillaires.

Denta. — Maux de dents la nust, ou le soir au lit, aggravés par la chaleur, et parfois avec chaleur de la face et gonflement de la joue. — Douleurs dans les dents molaires, en serrant les mâchoires. — *Maux de dents lancinants et tractifs, surtout après avoir du froid, — Douleur d'excoriation dans les dents et les



GRAPHITES.

392

gencives pendant et surtout après le repas. — *Saignement facile et gonflement des gencires. - Sortie d'un sang noir et aigre par les dents.

Bouche. - Sécheresse de la bouche, le matiu. — Odeur putride et urineuse de la bouche, des gencives et du nes. — Douleur d'excoriation, vésicules et ulcères sur la langue. — Salivation abondante et accumulation de mucosités dans le palais et la gorge. — Parole gênée par la paralysie des muscles.


Gorge. — Mal de gorge presque continuel, en avalant, généralement lancinant, avec étranglement. — *Mal à la gorge, même la nuit, comme s'il y avait une cheville en dedans, ou comme si les aliments s'y étaient arrêtés. — Crampes dans la gorge, avec étranglement. — Apreté et grattement dans la gorge.

Appétit. — Goût amer ou acide, avec aigreur dans la bouche et la gorge. — Forte soif le matin et après le repas. — *Faim immodérée. — *Répugnance pour les aliments cuits et la viande, ainsi que pour les choses salées ou sucrées. — *Faiblesse de la digestion, avec envie de dormir, maux de tête, douleurs d'esto-mac, plénitude et ballonnement du rentre après le repas.

Batomac. - Renrois fréquents et quelquefois avortés. - Renvois aigres, avec amertume dans la bouche. - Régurgitation aigre des aliments. - Régurgitations amères et vertes. - Hoquet fréquent, surtout après le repas. - *Nausées surtout le matin, ou après chaque repas, avec envie de vomir. - Écoulement d'eau, comme des pituites, la nuit. - *Vomissement opiniâtre des aliments. - Vomissement après le moindre dégoût, avec fortes nausées et pincements dans le ventre. - Vomiturition de mucosites. - Vomissements acides. - *Pression à l'estomac, parfois avec vomissement, soulagée par la position couchée et par la chaleur du lit. - *Douleurs crampoides, ou servement comme par des griffes à l'estomac. - La nuit, pincement dans l'estomac, avec fouillement dans la portrine. - Douleur brûlante à l'estomac, qui force à manger.

Ventre. — Dans les hypocondres, tension, élancements et battements. — Douleurs hépatiques après le déjeuner, qui forcent à se coucher. — *Plénitude et *pesanteur dans le ventre. — *Ventre gros, tendu, ballonné. — *Dureté dans le bas-ventre. — Douleur nocturne, crampoide, dans tous les intestins, avec manque de sécrétion d'urines. *Incarcération et *accumulation de flatuosités dans le ventre. — *Expulsion immodérée de flatuosités fétides, précédée de pincements. — *Sensibilité douloureuse des aines. — Gonflement douloureux des glandes inguinales. — *Incarcération étysipélateuse avec grosses vésicules, près du nombril.

Selles. — *Constipation opiniâtre, avec selles dures et duroté dans la région hépatique. — Selles dures, noueuses, d'un moule trop volumineux et *insuffisantes. — *Selles trop molles. — Sortie de beaucoup de glaires avec les selles. — Selles d'une odeur



GRAPHITES.

888

putride, acide, ou de mucosités sanguinolentes. — Diarrhée avec ventre tendu. — Selle d'un moule extrêmement mince, comme un ver. — Lombrics et ascarides. — "Ténia. — Prurit, sensation d'excoriation et gonfiement de l'anus. — "Boutons hémorrhoidanz volumèment à l'anus, avec douleur d'excoriation, surtout après les selles. — "Crevames douloureuses et brûlantes entre les boutons hémorrhoidanx.

Urinea. — Envie presente, anxieuse et douloureuse d'uriner, avec émission goutte à goutte. — Sécrétion rare d'une urine foncée, se troublant promptement, avec sédiment blanc ou rougeatre. — Urine d'odeur acre, acide. — Jet d'urine mince, comme par rétrécissement de l'urèthre. — Émission involontaire des urines. —

*Emission d'urine la nuit. — Pissement au lit. — En urinant, douleur dans le coccyx.

Parties viriles. — Tension et douleurs crampoides dans les parties génitales, avec idées voluptueuses importunes. — Éruption de boutons au prépuce et à la verge. — Gonflement hydropique du prépuce. — *Gonflement hydropique des testicules. — Irritations voluptueuses dans les parties génitales. — *Assoupissement ou exultation effrénée de l'appétit vénérien. — Absence d'érections le matin. — *Écoulement de sperme presque involontaire, sans érection. — Absence de l'émission de sperme pendant le coît. — Jouissance trop faible pendant le coît. — Pendant l'excitation des parties génitales, pour le coît, coliques flatulentes.

Règles. — Vésicules et boutons à la vulve. — *Excoriation à la vulve et entre les cuisses. — Gonflement douloureux des ovaires. — Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales. —

*Règles trop tardires, trop peu abondantes et trop pâles.

*Suppression des règles. — A l'apparition des règles, tranchées. — Pendant les règles, écoulement de sang par l'anus, douleurs dans les membres, ulcères empirés, gonfiement des joues et des pieds, catarrhe avec enrouement et coryza, mal aux dents, ou crampes et tranchées violentes dans le ventre, maux de tête, nausées, douleurs à la poitrine et faiblesse. — *Loucorrhée blanche, liquide, comme de Peau, avec tension du ventre. — *Leucorrhée avant et après les règles. — *Cancer de la matrice, avec tubercules et excroissances comme des choux-fleurs au col de la matrice. — Bensibilité douloureuse et excoriation des mamelons, —avec éruption de phlyctènes suintantes. — Engorgement et induration des glandes mammaires.

Larynx. — Sensibilité du larynx. — Raucité catarrhale et enrouement, avec sensation d'excoriation, douleur brûlante et *grattement dans la gorge, coryza et embarras de la poitrine. — *Voix fausse (pour le chant). — Accumulation de glaires dans la poitrine. — Toux produite par la raucité de la gorge. — *Toux la nuit, —ou le soir, au lit, provoquée en respirant profondément,

avec oppression de poitrine.



GRAPHITES.

384

Poitrine — *Géne de la respiration et oppression de poitrine. —

*Accès de suffocation la nust, en dormant, ou en se promenant
au grand air. — Respiration sibilante — Douleur de poitrine en
montant, en allant a cheval, en baillant, ou en portant la main
sur la poitrine. — Douleur pressive crampoide dans la poitrine.

OSpasmes de poitrine. — Elancements dans la poitrine au
moindre mouvement. Battements de cœur au moindre mouvement.


Trone. — Douleur de meurtrissure aux reins, ou maux de reins violents comme un serrement par des griffes, ou comme un tournoiement. — Douleur contractive dans le dos. — Sensation de fourmillement dans le dos. — Roideur de la nuque. — *Douleur molente dans la nuque et les epaules, en baissant la tête et en levant les bras, comme une incision dechirante. — Ampoules au cou. — *Gonflement des glandes du cou. — Déchirement dans les glandes du cou.

Bras. — Déchirement ou lancination dans les épaules. — Sensation de raccourcissement dans l'articulation du coude, en étendant le bras. — *Crompe et dechirement dans les mains. — Amaigrissement des mains. — Erysipele, durillons, peau seche et crevasses aux mains. — Douleur de luxation dans l'articulation du pouce.

Gonflement et inflexibilité, roident et distorsion des dongts. Étuption granulée et vesicules rongeantes aux dougts. — *Nodosites arthritiques aux dougts. — *Executation durireuse entre

les dougts. - Epaisseur des ongles des dougts. Jambes. Pesanteur, lassitude et engourdissement des jambes au grand air. - *Excornation entre les jumbes. - Dechirement arthritique dans l'articulation coro-femorale, les pieds et les orteils - * Torpeur et roudeur des cuinses et des orteils. * Inquiétudes dans les jambes. * Dartres aux cuisses, aux jarrets et sur le tibia. - Sensation de raccourcissement dans les tendons du jurret et dans le tendon d'Achille. - l'ensien dans les varices en étendant les jambes. Roudeur et manque de flexibilite aux genour, qui ne permettent pas de s'accroupir. -- Crampes et tressatilement des muscles dans les moliets. - Congestion aux jambes et aux pieds, en etant debout, *[Teres aux jambes, -Gonflement des jambes et des pieds, avec durête et douleur lancinante. — Rondeur du cou-de-pied. — Douleur lancmante, comme d'un ulcere dans le tuton et la plante des pieds, en se levant de son siege - *Preds froids meme le soir au lit. - *Preds brulants Sueur fetide des pieds *Gonflement et distorsion des orteils. - *Peau calleuse, resieules rungeantes et ulcères aux orteds. - Executation durtreuse entre les orteds. - *Epaisseur et difformite des orgles des orteils,





GRATIOLA OFFICINALIS.

GRATIOLA OFFICINALIS.

GRAT. — Gratiole, herbe à pauvre homme. — HARTLAUS et TRINKS. — Hist. nat. et prip. Yoy. Pharmac. hommop., p. 221.—Dones suritées : 6, 9, 82, 50. — Médicament encore peu counu, et qui, jusqu'ici, n'a été employé que coutre des Affections hypocondrusques, quelques cas de Gastraigia et quelques espèces de Constipution.

SYMPTONIES GENERAUX. — Déchirement dans les membres. — Tétanos, avec pleine connaissance. — La plupart des symptômes apparaissent la nuit, ainsi qu'en étant assis, en se levant de son siège et en plein air; le contact les améliore. — Prurit, avec sensation brûlante après s'être gratté. — Éruptions sumtantes et corrosioss, qui ressemblique la gale. — Forte envie de dormir, avec hâillements fréquents et besoin de se coucher, surtout l'aprèsmidi. — Forte disposition aux frissons. — Morosité hypocondrisque, et mauvaise humeur. — Caprices hystériques. — Anxiété. — Humeur grave, et concentration en soi-même. — Grands loquacité et gaieté.

Tôte. — Vertige tourneyant en fermant les yeux. — Vertige en lisant et en étant assis, comme si la tête se balançait. — Maux de tête, avec envie de vomir et sommeil. — Sensation de plénitude dans la tête. — Maux de tête pressifs, surtout dans le front et l'occiput. — Maux de tête lancinants et pulsatifs. — Sensation comme si la tête se rapetissait par une contraction du cerveau. — Résonnement dans la tête qui prive de la vue et de l'ouïe. — Les maux de tête sont aggravés en se levant de son siége, pendant le

mouvement et la marche en plein air.

Yeux et Dents. — Prurit, frémissement et sensation de faiblesse dans les paupières. — Douleur brûlante et pression dans les yeux. — Yeux larmoyants et abattus en lisant. — Myopie en lisant. — Déchirement et élancements dans les oreilles. — Aternuments fréquents avec élancements dans le côté gauche de la poitrine et des hypocondres. — Obturation du nez. — Tension, fourmillement et sensation de gonflement au yigage. — Déchirement d'un seul côté du visage. — Chaleur brûtiete et rougeur du visage. — Déchirement ou térébration nocturne dans les dents molaires. — Sensation de froid dans les dents.

Bouche et Gorge. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Pression dans la gorge, comme par des mucosités épaisses. — Accumulation de mucosités dans la gorge. — Raucité fourmillante et grattement dans la gorge. — Bouche amère, ou

pâteuse. — Haleine fétide le matin, après le réveil.

Estomac. — Renrois amers on douceatres. — Efforts inutiles



886 GRATIOLA OFFICINALIS. - GUAIACUM OFFICINALE.

d'éructation, avec pression depuis l'estomac jusqu'a la gorge, qui suspend la respiration. — Régurgitation d'une cau amère. — Faim, parfois avec degout et horreur pour tous les aliments. — Soif augmentée. — Nausees continuelles, avec comituration. — Nausees avec froid dans le ventre. — Vomissement avec obturation du nez. — Vomissement bilieux ou de matières aigres ou amères. — Malaise et sensation de plénitude dans l'estomac. *Pression à l'estomac, apres le repus, avec nausees. — Fouillement et creusement dans l'estomac, avec envie de vomir. — Pression a l'epigastre apres le repas, comme par une pierre. — Les souffrances à l'estomac et de l'épigastre sont souvent accompagnées de nausées ou d'efforts inutiles d'éructation.

Ventre. Douleurs lancmantes dans l'abdomen. Battements dans l'hypocondre gauche. Mal de ventre pressif, avec entre de vomer Maux de ventre avec pincements, qui forcent a se replier sur soi-meme — Ballonnement dur du ventre par des flatuosités. Coleque flatulente et pressire, avec nausces et renrois

desagreables.

Selles. — Besoin pressant et inutile d'aller à la selle. - *Constipation. — Selles dures, rures et tenuces, expuléées avec de
grands efforts. — Diarrhée muqueuse la nuit, avec tenesmes.

Douleur d'excoriation au rectum. — Douleur brûlante au rectum
pendant et après les selles. — Élancements, prurit, cuisson, et

battement a l'anus - Hemorrhoides avengles.

Urines et Parties génitales. Diminution de la secrétion d'urine.

— Urine rougeatre qui se trouble en reposant, avec un sédiment nuageux. Elancements depuis le cordon spermatique jusqu'a la portrine. Après les pollutions, roideur douloureuse de la verge. Règles trop hâtives et de trop longue duree Elancements aux seins. Nymphomanie avec demangeaison aux parties.

Poitrine et Membres. — Toux seche, provoquee par une sensation de raucite dans la poitrine, surtout le matin ou la nuit. — Toux nocturne, avec douleur d'excoriation dans la trachee-artere, oppression de poitrine et frissons. — Etouffement en montant. — Oppression de poitrine, avec battements de cœur — Pression à la poitrine. — Elancements dans les cotes de la poitrine en inspirant. — Houtous sur la poitrine, qui brulent après avoir gratte. — Battements de cœur. — Elancements dans les jambes et les pieds.

GUAIACUM OFFICINALE.

GUAL — Résine de Gaiac — Harnemann — Hist, wat et prep Voy, Pharmac harmon, p. 222 — Dave marce 0, 30, — Durce d'action : jusqu'a 20 pars dans les iffects us chroniques.

Companies avec Graph, more, nevous,





GUAJACUM OFFICINALE.

CLIMIQUE. — Se laimant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques ; Contracture arthritique des membres ; Anévrismes ? ; Suites ficheuses de l'abus du mercure ; Migraine ; Pneumonie chronique (Phthisie pulmonaire?), etc., etc., Voy. le sote, page 15.

SYMPTOMES GÉMÉRAUX. — Douleurs rhumatismales dans les articulations.—*Douleurs arthritiques dans les membres, avec élancements et déchirements, et °contractions des parties affectées. — °Douleurs ostéocopes fourmillantes. — *Les douleurs sont provoquées par le moindre mouvement, et accompagnées de chaleur dans les parties affectées. — Engourdissement des membres. — Courbature et faiblesse dans les bras et les cuisses, avec horreur du mouvement. — Besoin fréquent de bâiller et d'allonger les membres, provenant d'une sensation de malaise général. — La plupart des symptômes se manifestent en étant assis, ainsi que le matin après le lever, ou le soir avant de se coucher. — Gonfiement des os. — Consomption. — °Grande sensibilité des parties malades au toucher.

Sammall. — Forte envie de dormir après midi. — Sommeil tardif et réveil de bonne heure. — Réveil fréquent, avec effroi, quelquefois en s'endormant. — Jactation inquiète, la nuit. — Cauchemar en étant couché sur le dos. — Le matin, il semble que

Fon n'a pas asses dormi.

Pièvre. — Frissonnement, frisson et horripilation, même auprès du feu. — Frissons sans soif, le matin et le soir. — Sueur matutinale. — Sueur abondante, surtout à la tête, pendant la pro-

menade au grand air. - Pouls accéléré.

Meral. — Opiniatreté. — Forte envie de critiques, et de mépriser tout. — Paresse et horreur du mouvement. — Faiblesse de la mémoire et oubli excessif, surtout pour les noms. Regard fixe et absence d'idées, surtout le matin.

Tôte. — Pression étendue et douloureuse, ou traction et déchirement dans le sinciput et les tempes. — Lancinations violentes et étendues, dans le cerveau. — *Déchirement dans un seul côté de la tête, jusque dans la joue. — Pulsations, battements (et élancements) dans les tempes, avec sensation, comme si la tête était enflée, et que les vaisseaux sanguins fussent engorgée.

Yeux, Pace. — Sensation de gonfiement, ou *gonfiement réel des paupières, avec sensation, comme si les yeux allaient sortir de la tête et que les paupières fussent trop courtes. — Pupilles dilatées. — Amaurose. — Boutons dans les sourcils. — Déchirement et *étreintes dans les oreilles. — Élancements dans les pommettes et les muscles des jones.

Dents, Appétit. - Douleur pressive dans les dents, en les ser-



888 GUALACUM. -- HAMAMELIS VIRGINICA.

rant.—Tiraillement et déchirement dans les dents, se terminant par des élancements. — Douleur brûlante dans la gerge. — Goût fade, avec absence d'appetit et dégoût pour toutes choses, accompagné d'expurtion de mucosites — Renvois a vide. — Faim immodèree, — "Nausées provoquées par une sensation comme si la gerge était pleme de glaires. — "Répugnance pour le lait.

Estomac, Urines. — Sensation de constriction anxieuse dans la region de l'estomac, qui géne la respiration — Pincement dans le ventre, comme par incarceration de flatuosités — Sensation de vacuite, avec borborvgmes et grondement dans le ventre. — Douleur comme par une hernie dans les aines. — Tressaillement des muscles du ventre. — *Constipution. — Selle dure, brisée. — Envie continuelle d'uriner, avec émission abondante. — Douleurs incisives dans l'urethre, en urinant. — Envie inutile d'uriner, avec élancements dans le col de la vessie.

Poitrine et Membres — Toux suche, avec sensation dans l'épigastre comme d'un manque d'air. Toux avec expectoration d'un pus fétide. — *Llancements dans la postrene, aggravés en inspirant. — Pression dans les vertebres du con. — Roideur de la nuque. Roideur tout le long du dos, d'un seul côté. — Déchirement et clangements dans un seul coté du dos. — Douleur contractive entre les emoplates. — Frissons dans le dos. — Faiblesse dans les bras — Déchirement et clancements dans les omoplates et les avant-bras. — *Douleurs osteocopes, pressues et fourmillantes, dans les cuisses, etant assis. — l'ension paralytique dans les cuisses, en marchant. — Faiblesse dans les cuisses.


HAMAMELIS VIRGINICA.

HAMAM. - Bamamélie de Virginie. - Voy BALE, Remedes americains.

Employe jusqu'ici avec succes contre :

Rhamatismes tant musculaires qu'articulaires, avec enfolorissement excessif des parties affectees. L'pistaxis avec hemoptysie. Hemophysie, veneuse, avec sang qui, sans effort, arrive
dans la bouche comme un courant chaud, et avec gout de soufre
dans la bouche. Hematemese avec selles sanguin deutes, précedées de douieurs et plemtude dans le ventre, a ces febriles, sueur
froide, abendante, pouls faible et accelere. Dissenterie avec
sang coulant, comme un homorrhagie, par petits caillots de couleur for, et, inc is aux mucosites. Hemorrho des, avec ecoulment de song abondant, avec brulement, cadolorissement, pleni-





HAMAMELIS. - HELLEBORUS NIGER.

tude, pesanteur, anus écorché et sensation comme si le dos allait se briser — Ovarite, à la suite d'un coup aussi, avec endolorissement pénible, répandu par tout le ventre, menstrues irrégulières, très-douloureuses, rétention d'urine, et aggravation de toutes les souf-frances au moment de l'epoque. Métrorrhagies passices avec anémie. — Amémorrhée avec épistaxis ou hématémèse, constipation opinière et variees aux jaffibes. — Dysménorrhée avec douleurs violentes, traversant les hanches et le ventre jusqu'aux enisses; sensation de plénitude dans les intestins et le cerveau, avec douleurs violentes dans toute la tête, suivie de stupeur et sommeil profond. — Mamelous saignants, avec endolorissement excessif.

HELLEBORUS NIGER.

HELL. — Ellébore noir — HARNEMANN. — Hist. not. et prép. Voy. Pharmac homosop., p 225. — Doses asuces : 9, 42, 30. — Dores d'action : 4 à 5 semanes, dans quelques affections chroniques.

Antidotes. Camph. chin
Comparin avec: Ars. bell. bry cham. chin. dig. ign. op. phos. stann.
stram. revute. — C'est surfout après Bell bry. chin. que l'elleb. se
montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLIBIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hydropiques, surtout quelques espèces d'anasarque, et principalement celles provenant de la répercussion des exanthèmes, telles que la miliaire pourprée, la scarlatine, etc.; Coma?; Fièvres nerveuses lentes; Mélancolie douce; Imbécillité; Teigne avec engorgement des glandea du cou; Hypocondrie?; Encéphalite?; Hydrocéphale aigué?; Ascite; Hydrothorax, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs lancmantes et térébrantes à diverses parties et surtout dans le périoste, aggravées par l'air frais, la fatigue corporelle, le boire et le manger. — Teraillements et déchirements dans les membres. — Douleurs lancinantes dans les articulations. — Relàchement subit de tous les muscles. — Les muscles se refusent à faire leur service, à moins qu'onn'y prête une attention soutenue; on chancelle en marchant, on laisse tomber les objets que l'on tient en main, etc. — On se trouve mieux en plein air et l'on y eprouve la même sensation que si l'an sortait d'une longue maladie; tout paraît rajeuni. —



HELLEBORUS NIGER.

Convulsions. — Crampes. — Syncope. — *Gonflements hydropiques. — Chute des cheveux et des ongles.

Peau. - Paleur de la peau. Éruptions miliaires. •Gonfiement leucofiegmatique de la peau de tout le corps. - Desquamation de la peau de tout le corps.

Sommeil. — *Sommolence, avec yeux a demi onverts et pupilles tournees en l'air. Rêves confes, anxieux, et dont on ne conserve

pas le souvenir. - Insomnie. - Jactation dans le lit.

Pièvre. — Frissons alternant avec douleurs lancinantes dans les membres. — Froid de tout le corps et surtout des membres avec chaleur dans la tête. — Frisson général avec chair de poule et sensibilité douloureuse du cuir chevelu au toucher ou en remunit la tête, tiraillements et dechirements dans les membres, lancinations dans les articulations et absence de soif. — Le soir, après s'être couché, chaleur brulante par tout le corps, et principalement a la tête, avec horripilation interieure et frissons sans soif; les boissons répugnent. — Sueur nocturne vers le matin.

Moral. — *Mélancolie taciturne avec soupirs continuels. — Angoisse excessive et presque mortelle — Nostalgie. — Humeur hypocondriaque. — Paresse — Pleurs sanglotants. — Silence opiniatre. — Déflance. — Émoussement du sens interne. — Stupidité et irréflexion, avec fixité du regard sur un seul point — Faiblesse de la mémoire. — Faiblesse de l'activite involontaire du cerveau; les muscles refusent leur service des que l'attention se porte

ailleurs.

340

Tôte. Douleur stupéfiante et sensation de meurtrissure dans la tête. — Mal de tête pressif et étourdissant. Pesanteur douloureuse de la tête, avec chaleur brûlante dans cette partie, froid aux doigts, sensation de frisson genéral et pâleur du visage.

Chaleur brûlante de la tête, avec face pale. Les maux de tête sont plus supportables lorsqu'on preud sur soi de reposer tranquillement et de sommeiller. Sensibilité douloureuse à l'extérieur de la tête et surtout a l'occiput, comme s'il était meuriri, en y touchant ou en remuant la tête. Tressaillement dans les téguments de la tête, pendant le mouvement, en se baissant ou en montant un escalier. Besoin d'enfoncer la tête dans l'oredler en dormant Tumeurs dans la peau du front, avec douleur de meurtrissure. Croûtes suintantes au cuir chevelu.

Youx et Oreilles Douleur dans les yeux, comme si un clou était enfoncé sur les bords de l'orbite. Pesanteur pressure dans les yeux, de haut en bas. Fixité involontaire du regard sur un seul point. Photophobie le jour, - Élancements dans les

oreilles, le jour et la nuit, avec terebration fouillante.

Visage et Dents. - Face pâle, quelquefois jaunâtre. - *Gonflement pâle et codémateux du visage. - Front ridé. - Vesicules blanches sur les lèvres qui sont gonflées. - Douleur ostéocope, sourde, à la pommette. - Maux de dents, la nuit, avec dou-



HELLEBORUS NIGER. - HEPAR SULFURIS. 342

hanches - Manque de solidité dans les jambes, avec fléchissement des genoux - Roideur et tension dans les cuisses et les Lancinations obtuses et térébrantes dans les articulations des genoux et des pieds.

HEPAR SULFURIS.

HEP. - Fore de soufre, Calcaire. — HARNEMANN — Hist. nat. et prep. Voy Pharmac homes p., p. 105. Doses indees: 3, 30 — Durée d'action: jusqu'à 60 jours, dans les dernitres dilutions et dans les affections chro-

ANTIDOTES: Acetum bell — On l'emplore comme antidote de : Ars. ant. bell, cupr fer. 10d. merc mir-an. sil vinc.

Comparer avec Amm art, urn aix bell, bry cham chin ein empr. dros ferr. lach. merc. mir-an plumb spung, zil, zinc. C'est suriout après Bell lach. mi. spong. zinc., que l'hep-ault se montre eilleuce, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué, - Après hep., conviennent quelquefois : Bell, merc. mir-ac, spong, sil.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections arthritiques, avec gonflement inflammatoire. Suites facheuses de l'abus du mercure; Engorgement, inflammation et suppuration des glandes. Inflammations flegmoneuses; Affections rhumatismales; Atrophie des cufants?; Affections scrofulcuses; letère : Erusipèles simples, flegmoneux et vésiculeux : Eruptions urticaires; Dartres, surtout a la face; Rhagades, surtout celles provenant de l'abus du mereure; Ulcères inveterés, putrides, carcinomateux. Surexe tation nerveuse, surtout celles par l'abus du mercure; Migraine; Calvitie, surtout celle provenant de l'abus du mercure, ou a la suite de fortes maladies aiguês, ou de maux de tête lystériques, etc., etc.: Teigne. Dartres aux oreilles: Eruptions et dartres à la face; Ophthalmies serofuneuses, arthritiques, traumatiques, catarrhales, etc., Ulceres de la cornée: Otife, avec otorrhée purulente; Gonflement scrofuleux du nez?, Salivation avec ulcération dans la bouche, par suite de l'abus de mercure : Amygdalite et autres angines flegmoneuses. Bubous scrofuleux: Diarrhées et dyssenteries, (hancres mous et phagedeniques, Lochies maladives, Cancer au sein t: Croup (periode exsudatorre passee), Laryngites aigues et chroniques (phthisie laryngee); Phthisie pulmonaire; Rhagades aux mains; Panaris, etc., etc.

Voir la note, page 15



HEPAR SULFURIS.

paralytiques dans les membres, surtout le matin, en s'éveillant.

— *Douleurs d'exceriation ou de meurtrissure au toucher, à diverses parties. — Élancements dans les articulations. — *Gonflements arthritiques, avec chaleur, rougeur et douleurs de lumition. — *Gonflement, inflammation et ulcération des glandes. — *Apparation ou aggravation des douleurs, la nuit, surtout pendant les friesons. — Surexcitation nerveuse excessive, avec sensibilité douleureuse au moindre contact, ainsi qu'au grand air, qui cauen beaucoup de souffrances. — *Amaigrissement, *parfois avec angoisse, irritabilité, frisson au dos, rougeur des joues, insunnie, etc. — *Accablement physique, et tremblement après avoir fumé du tabae, "ou en marchant au grand air, avec chaleur et anxiété. — Accablements au grand air, avec chaleur et anxiété. — Accablements.

Pean. — *Inflammations érysipélateuses, même avec gonflement et vésicules. — Couleur jaunâtre de la peau, surtout au visage, avec couleur jaunâtre de la selérotique, et urines couleur rouge de sang. — Démangeaison brûlante au corps, avec vésicules blanches après s'être gratté. — *Éruptions urticaires. — °Éruptions de boutons et de tubérosités, douloureux au toucher. — *Peau maladire, toute lésion tend à s'ulcérer. — *Gerçures de la peau. — *Ulcères putrides, répandant une odeur de fromage fort, et salgnant facilement, avec élancements, sensation de rongement (surtout la nuit), ou avec douleurs brûlantes et pulsatives. — Ulcères carcinomateux. — *Tuméfactions chaudes et rouges, avec

douleur de foulure. - Suppurations. - *Panaris.

Semmeil. — Forte envie de dormir, le matin et le soir, avec bâillements conoulsifs. — *Sommeil inquiet, avec tête renversée en arrière. — Sommeil prolongé, avec étourdissement, comme dans le coma vigil. — Insomnie à cause d'une grande affluence d'idées. — Rêves d'incendies, de maladies, de dangers, de coups de fusil, etc. — *La nuit, souffrances gastriques, mal à la tête, agitation, tressaillement des membres et chaleur sèche. — *Sursauts la nuit pendant le sommeil, comme si l'on manquait d'air,

avec pleurs et grandes angoisses.

Pièrre. — *Horripilation et frissons, surtout au grand air, ou la nuit, avec douleurs opposées. — Frissons, avec claquement des dents et froid aux pieds et aux mains, suivis de chaleur et de sueur, surtout à la poitrine et au front, avec peu de soif. — D'abord amertume de la bouche, puis frissons avec soif; une heure après, chaleur avec sommeil, après quoi vomissement et céphalalgie. — *Chaleur sèche la nuit, avec mal à la tête, soif et divagations. — *Chaleur fugace, avec sueur. — *Chaleur febrile ardente, avec rougeur du visage et forte soif. — *Grande disposition à transpirer, le jour, au moindre effort et au moindre mouvement. — Sueur nocturne. — Sueur matutinale. — Sueur visquence, acide.



HEPAR SULFURIS.

Moral. — Tristesse et envie de pleurer. — *Angoisses et appréhensions extrêmes, surtout le soir, et parfois au point de se suicider. — Mauvaise humeur; on n'aime pas même a voir les siens. — Irritabilité excessive. — Dépit et emportement, avec parole précipitée et faiblesse excessive de la mémoire. — Visions le matin,

au lit. - Emportement jusqu'à pouvoir tuer les gens.

344

Tête. — Vertige en remuant la tête, ainsi que par le mouvement de la voiture, ou le soir, avec nausées. - Vertige, avec perte de connaissance et obscurcissement de la vue. - Mou.c de tête, le matin, provoqués par une secousse quelconque. - Maux de tête la nuit, en remuant les yeux; il semble que le front va être arraché. Mal à la tête, comme si un clou y était enfoncé Pression dans les tempes et au vertex, avec battements de cœur le soir Tension au-dessus de la racine du nez. - *Douleur d'ulcération dans la tête, immédiatement au-dessus des yeur, tous les soire, ou bien la nuit, au lit. - Elancements d'uns la tête. surtout après avoir été au grand air, et en se baissant, ou la nuit comme si la tête allait éclater. - * Térébrution dans la tête, surtont dans la racine du nez, tous les matins. - *Chute des cheveux et pluques chauves. - Sueur froide à la tête. - *Tubérosités à la tête avec douleur d'excortation au toucher. — Croûtes humides à la tête.

Youx. — Douleur, comme si on enfonçait les yeux dans la tête. —
Mouvement des yeux douloureux et difficile. — Ardeur, pression
et élancements dans les yeux. — Douleur d'ulcération, immédiatement au-dessus de l'œil, chaque soir. — *Inflammation des
yeux et des paupières, quelquefois même érysipélateuse, avec
douleur de meurtrissure et d'excoriation au toucher — Boutons
au-dessus des yeux et sur les paupières. — *Taches et ulceres de
lu cornée. — *Larmoiement et agglutination nocturne des paupières. — *Occlusion spasmodique des paupières, la nuit. —
Yeux proéminents. Obscurcissement de la vue, en lisant. —
*Photophobie, le jour et aux lumières. — Trouble de la vue, le
soir, à la lumière des bougies, alternant avec lucidité de la vue.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, en se mouchant. — Chaleur, rougeur et prurit dans les oreilles. — *Écoulement par les oreilles d'un pus qui parfois est fétide. — "Croûtes derrière et sur les oreilles. — Durete de l'ouïe, avec pulsation et bourdon-

nement dans l'oreille, surtout le soir, au lit.

Nes. — Inflammation, rougeur et gonflement du nez. — Douleur de meurtressure et d'excorration du nez au toucher. — Douleur d'ulcération brulante et croûtes dans les narines Épistaxes, le matin et après avoir chante. — Manque ou exaltation de l'odorat. — Coryza, principalement d'un seul côté, avec raucité dans la gorge, gonflement inflammatoire du nez, fievre et courbature dans tous les membres.

Visage. — Face jaune avec cercles bleus autour des yeux. —



HEPAR SULFURIS.

ments dans le ventre, surtout du côté gauche. - Gonflement et suppuration des glandes inquinales. Incarcération et émission difficile de flatuosites, surtout le matin

Selles. — Selles dures et seches. *Emission difficile d'exeréments rares et mous, avec besoin pressant et ténesme. — Diarrhees de matières stercorales, avec tranchées. - Durrhee blanchetre, d'odeur acidulée, surtout chez les enfants. - * Selles dyssenteriques, verdatres ou couleur d'argile, avec évacuation de mucosités sanguinolentes. - Apres la seile, douleur d'excorration et écoulement sanioux par l'unus - Sorties de houtons hemorrhof-

daux du rectum. Sueur au perinée.


346

Urines. - Urines tardives, tronoles, avec sédiment blanchâtre. -·Faiblesse de la vessie, avec ecoulement lent des urmes. — Secrétion abondante d'une urine pale, avec pression sur la vessie. -Urme acre, corrosive, ou pale et aqueuse, ou *rouge fonce et chaude. * Emession d'urine la nuit. - Pissement au lit. -Presentent de sang, après avoir uriné. - Rougeur et inflammation de l'orince de l'urethre. Ecoulement muqueux par l'urethre. Pellicule irisce sur les urmes.

Parties viriles. Farblesse des parties genitales. Caisson, eccoriation et suintement entre les cuisses et le scrotum. - *Clevre chancreux au prepuec. Erections doulourcuses, crampoides et tensives. - "Absence de désirs venerieus et d'erections. -Erections sans energie, pendant le co.t. - Excitation des parties génitales, comme par l'éjaculation. - * Ecoulement de liqueur prostatique, surtout après avoir urine, et pendant une selle dufficule.

Règles. - Excoration à la rulve et entre les cuisses. - Congestion à l'uterus. - Ecoulement de sang, hors le temps des règles, avec ballonnement du ventre. - *Regles trop tardives. -Leucorrhée, avec cuisson a la vulve. - Ollicere carcinomateur au sein.

Larynx. - Enrouement. - Douleur et grande sensibilité du larynx. avec voix faible et ranque, amaignissement, fievre hectique et insomnie. - Douleur permanente an larynx, aggravec par la pression, par la parole, en toussant et en respirant. - l'aiblesse des organes de la parole et de la portrine, qui empeche de parler à haute voix. -- lour provoquee par une irritation ou une douleur dans le larynx. - Toux prefonde, sourde, provoquee par une gene de la respiration. - * l'oux suffoquante, violente, avec vomiturition. - Toux semblable a la coqueluche. - Toux après avoir bu. - * Tour seche, le soir, après avoir en froid a une partie du corps, ou en étant couché dans le lit - *Acces de toux, sèche, rauque et creuse, avec ungoesse et suff scation, se terminant sourcet par des pleurs. - Toux abevante. Toux avec crachement de sang. - *loux avec expectoration aboudante de mucosites, rale muqueux. - Pendant la toux, résonnement et



HEPAR SULFURIS. -- HIPPOMANES.

douleur dans la tête, comme ni elle allait éclater. — Après la toux, éternument.

Poitrine. — Respiration anxieuse, anrouée, siffante avec péril de suffocation lorsqu'on est couché. — Acces de suffocation qui farcent à renverser la tête. — Haleine courte. — Besoin fréquent de respirer profondément, comme après avoir cours. — Elançaments dans la poitrine en respirant et en marchant. — Boutons et furoncles sur la poitrine, avec lancinations et douleur d'excoriation au toucher.

Trues. — Douleur brûlante, lancinante dans la région des reins.

— Douleur de meuririssure aux reins et jusque dans les cuisses.

— Elemements et *tiraillement dans le dos, rentre les omopletes et dans les muscles du cou. — Tension nocturne dans le les, en se retournant dans le lit. — «Sueur fétide sous les aisselles. — Elemement des glandes axillaires. — Bosses au cou, douleureuses au toucher.

Bras. — Douleur de meurtrissure dans les es du bras. — Gonflement arthritique de la main, des doigts et des articulations des
doigts, avec chaleur, rougeur et douleur de luxation pendant le
mouvement. — *Penus des mains gercés, râpeuse et sèche. —
Éruption granulée aux mains et aux poignets. — *Éruption urticaire aux mains et aux deigts. — Luxation et déboîtement facile
des doigts. — *Doigts morts. — Panaris.

Jambes. — Douleur aux fesses en s'asseyant. — Furoncles aux fesses. — Douleur de meurtriesure dans les cuisses. — Tension douloureuse dans les cuisses, et qui empêche de dormir. — Fréquemment, lassitude subite dans les jambes, en marchant. — Gonflement des genoux. — Crampes dans les mollets, la plante des pieds et des orteils. — Pieds brûlants. — Gonflement des pieds et des malléoles, avec gène de la respiration. — otionflement rouge, rhumatismal aux malléoles, avec douleur qui augmente la nuit. — Crevasses aux pieds. — Elancements dans les core.

HIPPOMANES.

HIPP. -- Hippomanes. — Hening. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. hodicaop., p. 230. — Études pathogénésiques de l'Amerique du Nord. Courants : Caus. oxal-ac.

CLIRIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas dans lesquels on pourra l'administrer avec succès contre l'une ou l'autre des affections suivantes :

— Convulsions et épilopsie des onfants : Affections moraice et



HIPPOMANES

345

affections mentales avec le caractère de la depression, surtout dans l'age de la puberte, ou avec contintion de l'appetit vénérien. Souffrances des femmes à l'age critique: Eruptions de diverses notures. Mans de tête qui affectent surtout le moral et l'intellect. Affections du cour, Paralysie des mains; Douleur de luxation dans l'articulation des mains; (Rétrécissement de l'urèthre?; Gonfiement de la prostate?).

SYMPTOMES GÉMÉRAUX. — Grande lassitude avec besein de se coucher, sans que cela soulage; lourdeur dans les membres; grand abattement et faibleme, avec face pâle; faiblesse physique et intellectuelle. — La plupart des souffrances se montrent dans la position assise. Le côté gauche paraît être affecté de préférence. — Douleurs déchirantes dans les extrémitée supérieures et inférieures, en les étendant.


Poss. — Prurit, avec sensation agréable après s'être frotté, principalement à la poitrine et entre les épaules. — Taches urticaires très-pruriteuses, à plusieurs endroits; boutons et petites pustules; éruptions sèches, comme des dartres; exervissances sèches, tuberculeuses; efuroncles. — «Carcinome.

Bommeil. — Baillement fréquent, prosque spasmodique; entie continuelle de dormer, sans que le sommeil délasse. — Insommie nocturne. — Réves fréquents; pénibles, effrayants; rêves lascifs.

Fièvre. — Frimonnement et grande frilosité, même dans la chaleur de l'été; frimon qui commence dans le dos. — Chaleur fébrile vers le soir, avec renouvellement de toutes les souffrances.

Meral et Intellect. — Humeur mausmde, mécontente, hyeocondriaque; humeur colère, portant à vouloir battre tout le monde; le soir, aggravation de la mauvaise humeur avec chaleur; dégoût de la vie jusqu'au suicide; ogémissement, la nuit, en s'agitant dans le lit. — Nostalgie. — Inquiétude qui fait courir cà et là; peur de l'avenir; radoteries. — Imagination lascive. — Horreur du travail et incapacité de méditer; fuiblesse intellectuelle et physique. — Sensation de légèreté et fourmillement dans la tête, au point d'en devenir fou. — Frayeur facile au moindre bruit, gui produit mal à la tête.

Total — Mal de tête avec vertige et stupeur, précédé de chaleur à la tête; puis, frisconnement, flatuosités, dégoût du tabac, suif, mauvaise humeur, envie de dormir cé-baillement. — Mouse de tête violents, comme une pasanteur; douleurs pressives, principalement au front et dans les tempes; fourmillement, fouillement et battement dans le front. — Maux de tête continuels, tant dans la chambre qu'au grand air. — Aggravation des maux de tête en marchant la face tournée au soleil; amélieration à l'ombre. — La suit, disposition à enfoncer la tête dans l'oreiller. — La tête



HIPPOMANES.

349

se trouve mieux étant couchée du côté douloureux. — Sensation de légèraté et de fourmillement dans la tête. — Coups électriques qui traversent le cerveau. —Les cheveux se dessèchent, blanchissent et tombent.

Youx. — Endolorissement des yeux en les remuant, avec mal à la tête; brûlement dons les yeux et larmoisment. — Regard fixe. — La fiamme de la bougie paraît bleue; en marchant dans la sûe, taches rouges, bleues, vertes, devant les yeux; en rentrant à la chambre, obscurcissement de la vue.

Oreilles. — Sensation comme s'il y allait se former un écoulement à l'oreille (droite) forçant à y enfoncer le doigt. — Élancements, térébration et déchirement dans l'oreille (gauche). — Le bruit

effraye facilement.

Men. — Sensation de froid dans les narines, en respirant. — Épistaxis, le matin ; sortie de petits morceaux de sang par le nez et la bouche. — Vibrations, frémissements légers dans la pointe du nez.

Face. — Pâleur, pendant la lazsitude. — Chaleur de la face, avec

aggravation des symptômes du moral.

Bouche et Gerge. — Douleur d'excoriation dans la bouche. — Salive aboudante, pendant le mal de tête et le mal de gorge. — Langue chargée de blanc, avec point rouge. — Sensation dou-loureuse comme par une pelote dans la gorge, en parlant et en avalant; endolorissement des amygdales. — Le matin, mucosités tenaces dans la gorge.

Gastricismo. — Golt amer dans la bouche. — Manque d'appétit, dégoût des aliments; répugnance pour le tabac. — Désir de choses acides, piquantes, avec dégoût des choses sucrées et langue

blanche. - Nausées, lorsqu'il survient un courant d'air.

Betemac et Ventre. — Sensation de froid glacial dans la région de l'estomac et le côté gauche, aux côtés et au ventre. — Sensation de vide dans le ventre et la tête; Ventre dur, sans soulagement par les garde-robes; Douleurs violentes autour du nombril, avec ou sans émission abondante de vents fétides. — Beaucoup de vents.

Selles et Anns. — Selles molles, avec écoulement de liqueur (prostatique?) de l'urèthre après avoir uriné. — Selles dures, volumineuses, noueuses. — Spasme du sphincter de l'anns.

Urines. -- Émission fréquente d'urines aqueuses. - Tiraillement de l'anus le long de l'unithre; jet d'urine génée, comme s'il était retenu par une enflure.

Parties viriles. — Tiraillement, tension et fourmillement dans les testicules. - Appétit rénérien fortement augmenté, avec érec-

tions et pollutions.

Règles. — Les règles paraissent favorisées dans l'époque du retour. Règles de quinze jours en avant, et sans nulle souffrance. Larynx et Toux. — Larynx comme à vif, comme si l'air qu'on



350 HIPPOMANES. - HYDRASTIS CANADENSIS

respire était trop froid; chatonillement dans la gorge, en respirant, forçant à tousser. Toux, pendant le sommeil, sans réveil; toux aboyante. Expectoration muqueuse des poumons, surtout le matin.

Poitrine et Respiration. - Élancements, surtout dans le côté gauche de la portrine; douleurs tressaillantes, de bas en haut, au cote gauche de la portrine; pression et tiradlement de bas en haut, de l'hypocendre droit jusque dans l'épaule gauche. Fréquen, ment, en marchant, douleur au cœur, comme su cet organe lut arrache; souvent des pulsations dures et riolentes du cœur, surtout a chaque tour du corps et en se levant de son siège.

Tronc. Douleur dans le dos : comme dans la moelle épinière ; sous l'emoplate gauche : le long de la colonne vertébrale, entre les omo dates : dans la region des vertebres lombaires, entre l'omoplate gauche et la colonne, en avalant, en respirant profondement et se courbant du coté gauche. Paiblesse de la nuque qui per-

met a penoe de tenar la tete droite.

Membres thoraciques. Pesanteur à l'epaule gauche, comme s'il y avant un per la dessus; le bras est quelquefois comme paralyse dans l'epaule. Pans la main droite, fourmillement et capitation; faiblesse paralytopae, roideur et lourdeur des articulations carpaennes, surtout le matin au lit, grande faiblesse dans les mains, qui ne permet de men tenir; sensation de luration et de foulure dans l'articulation carpienne gauche.


Membres pelviens. Fatigue et lass tude douloureuse, surtout dans les cuieses. Sensation de luxation ou de foulure dans le genou, avec grande lassitude, surtout en se tenant debout. Crampes et douleurs crampondes dans la plante des pieds; faiblesse et secheresse dans les articulations et la plante des pieds, au point de craindre d'appuyer le pied. Paralysie, tension et tiraillement dans l'articulation du pied (droit). Pieds froids.

HYDRASTIS CANADENSIS.

HYDRAS. - Bydrastis. - Voy. HALE, Remedes americains.

Employé jusqu'ici avec succes contre:

Variole et Varioloides avec gonfiement pronencé, rougeur et fort prurit, avec mal d'gorge violent. (Tumeurs squire uses, Lupus, Rhugades, Intertrigo et autres Dermitoses.) Scorbut avec grande prostrution des forces, et alceres aux jambes. Jaunnesse, avec catarrhe gastro-duodenal, sensation de faiblesse dans l'epigastre et palpitations de cœur, violents et opiniatres. Uteres



HYDRASTIS. - HYDROCYANI ACIDUM.

851

à la gorge. — Catarrhe gastrique aigu, avec aigreurs, cenetipation, douleur wourde dans l'estonne et sensation de défaillance dans l'épigastre. — Constipution, avec mal de tête, hémorrhoides, coliques accompagnées de défaillance et de chaleur dans les intestins, et, après chaque selle, douleur persistante dans l'anus et le rectum. — Generrhée, avec sensation de défaillance, après chaque selle. — Leucorrhée, avec écoulement visqueux, érosions ulcérées su col de l'utérus et dans le vagin, sensation d'une grande prostration et battements de cœur violents. — Bronchite des vieillards, avec grande faiblesse, état cachectique, manque d'appétit, et expectoration abondante, épaisse, jaunâtre, visqueuse et filante. — Equirre ou sein, tumeur dure, lourde, adhérent à la peau, avec clancements comme par des couteaux.

MYDROCYANI ACIDUM.

BYDROG. — Acide prinssique. — HARTLAUB et TRINKS. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmec. homozop., p. 406.

COMPARES: LANGO.

des membres, surtout des cuisses; faiblesse et lassitude extrêmes; faiblesse nerveuse. — Spasmes; spasmes au dos; spasmes de la face et des machoires : convulsions. — Paralysie des extrémités inférieures, puis supérieures; perte de la sensation, puis roideur de ces parties; tremblement et chancellement, immobilité, insensibilité, roideur du corps. — Accès cataleptiques; grande flexibilité des membres; pulsations du cœur toujours plus lentes, plus petites, plus insensibles, jusqu'à la léthargie; diminution de la chaleur vitale. — Excitation de l'activité des sens; sensation intérieure de bien-être; donce langueur avec sensation de lassitude bienfaisante. — Émoussement des sens et insensibilité aux influences extérieures; disparition de-toute douleur; insensibilité; perte de connaissance. — Erreur des sens; frisson et lassitude.

Peau. — Prurit à différentes parties, surtout entre le menton et les lèvres. — Petites pustules rouges à la hanche; résicules brûlantes, pruriantes, aux extrémités supérieures et au cou. — Sécheresse de la peau. — Pâleur générale, avec teinte bleuâtre.

Sommell. — Bâillement fréquent, quelquefois avec horripilation et spasmes à la peau. — Envie de dormir, quelquefois insurmontable, ou bien après le repas ; sommeil lourd le matin ; envie continuelle de dormir ; coma vigil ; sommolence. — Insomnie ; sommeil difficile, presque impossible; réveil fréquent. — «Rêces vifs, sans suite ; anxieux, pénibles, de mort.



HYDROCYANI ACIDUM.

Pièvre. Frilosité, horripilations fréquentes, après minuit ou le matin; horripilation avec baillements ou avec soil. — Froid des membres; sensation de froid intérieur et exterieur. Fièvre, horripilation, puis chalcur brulante; alternation de violent frisson et de chalcur brulante, chalcur à la tête, avec extremités froides, chalcur et sueur par tout le corps, l'apres-midi, agitation fébrile générale, avec excitation violente, acces de chalcur et mouvements du cœur très-prompts, desordonnes. — Pendant le frisson, étourdissement à la tête et vertige; pendant l'horripilation, brouillard devant la vue.

Moral. - Accablement; découragement. - Angoisse et oppression; angoisse dans le creux de l'estomac; crainte de maux imaginaires. - Irritabilité tres-grande, humeur fâcheuse; humeur

chagrine ; incapacité de travailler.

352

Tête. Paresse de lu pensee, avec hébétude dans la tête; impossibilité de réfléchir, et de rassembler ses idees; mémoire trèsaffaiblie; répugnance contre toute fatigue morale - Tête entreprise et pesante, étourdissement, avec affaissement du corps; etourdissement, quelquefois avec sensation d'ivresse - Obscurcissement des sens, quelquelois avec vacillement des objets, et voile devant la vue, et avec difficulté de se tenir sur ses jambes en se redressant après s'être baisse, en se levant de son siège, aggrave au grand air - Vertige, quelquefois avec chancellement; sensation comme si quelque chose se mouvait dans l'air et l'entrainait avec soi, ou bien comme si tout tournait autour de soi. -Céphalalgie avec vertige, céphalalgie ctourdissante, douleur sourde dans le front, partant des tempes. — Tete lourde et hébétude. Céphalalgie pressire dans le front, ou bien a l'occiput, à gauche, vers la region frontale; forte dans le sinciput et l'occiput, depuis le vertex jusque dans le front et les orbites des yeax; dans le côté de la tête (droit ou gauche), surtout dans le vertez et le front; à diverses parties de la tête - Tension dans la region frontale; élancements, tantôt par-ci, tantôt par-la, dans la tête.

Youx. Your demi-ouverts; renverses; sortant de la tête; fixes; immobiles; difficulte de mouvoir le globe des yeux. Pupilles dilatées et immobiles; insensibles a la clarte. — Puupières grandes ouvertes; immobiles; comme paralysées; tressaillement spasmodique dans les paupières superieures. Obscurcissement de la vue; trouble et brouillard devant la vue; cécité amaurotique.

Oreilles Pression dans l'interieur des deux oreilles, quelquefois avec bruit et résonnement. — Dureté de l'oule.

Nes. -- Cuisson dans le haut des narines, dilatation des ailes du nez

qui ont une teinte bleuûtre. - Sécheresse dans le nez.

Face. — Bouffissure de la face; visage bave; risage caduc, pâle et bleuâtre; teint terreux et gris; expression de béatitude dans les traits. — Contorsion des coins de la bouche, trismus; contractions effroyables des muscles de la face.



HYDROCYANI ACIDUM.

858

Bonche, Gurge. — Séchereuse de la bonche. — Sécrétion de salive augmentée. — Langue chargée, quelquefois blanche, ensuite foncée et sale; contraction à la racine; sensation de froid sur la langue; brûlement au bout de la langue; paralysie et roideur de la langue, qui souvent sort de la bouche; perte de la parole. — Douleur dans le palais; inflammation du palais. — Spasmes dans l'arrière-gorge et l'assophage; grattement dans la gorge et le gosier; grattement pénible dans la gorge; ardeur dans la gorge et dans l'assophage; brûlement dans le palais, le gosier et l'assophage, inflammation du gosier et de l'assophage.

Symptimes gestriques. — Gout douceatre, fétide, acre et irritant; beaucoup de gaz dans la bouche, avec gout d'acide prussique. — Anorexie, répugnance pour les aliments. — Adipsie, avec chaleur dans tout le corps; soif ardente. — Dégout, envie de vomir;

vomiscements d'un liquide noir.

Esternac, Selles. — Maux d'estomac; sensation de froid dans l'estomac, quelquefois avec élancements; pression et serrement dans le creux de l'estomac, avec forte oppression; contractions spasmo-diques dans l'estomac; ardeur et brûlement, on bien aussi inflammation de l'estomac et des intestins; douleur pulsative dans les précords. — Froid dans tout le ventre, quelquefois alternant avec brûlement; grondement et borborygmes dans le bas-ventre; gonflement mou du ventre, sans tension. — Selle involontaire.

Urinte. — Rétention d'urine. — Émission fréquente d'urines; émission abondante d'une urine aqueuse, pâle ou jaune pâle, déposant un nuage trouble. — Urine, avec sédiment épais et rougeatre. — Émission involontaire des urines. — Brûlement dans

l'urèthre.

Laryax, Toux. — Grattement douloureux et brûlement dans le laryax; inflammation du laryax; sensation comme de gonflement du laryax; constriction de la gorge; chatouillement dans le laryax; quelquefois élancements et tiraillements; raucité et curoucment de la voix. — Forte voix; tussiculation fréquente,

par cuisson dans le larynx; hémoptysie.

Poltrine, Bespiration. — Respiration ralante, gémissante, lente, très-difficile, avec râle muqueux; gêne de la respiration, à cause d'élancements dans le larynx; besoin de respiration à cause d'élancements dans le larynx; besoin de respiration anxieuse; paralysie des poumons; oppression de postrine, asthme, quolquefois pénible; sensation d'étouffement, avec douleurs penibles dans la poitrine; forte oppression et constriction de postrine. — Douleurs vives dans la poitrine; pression dans le cote droit de la poitrine; élancements dans le côté gauche, au-dessous du cartilage inférieur du sternum ou près de cêtte partie, dans la poitrine, en respirant profondément. — Dans la région du cœur, douleurs et pression; palpitations de cœur; mouvements irréguliers du cœur; battements du cœur faibles.



HYOSCYAMUS NIGER.

854

HYOSCYAMUS NIGER.

HYOS. — Jusquiamo — HAHNEMANN. - Hist nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop, p 227. — Doses unitees 12, 30 — Durée d'action : 8 à 15 jours, dans quelques cus de maladres chroniques.

ANTIDOTES: Bell, camph. chin. - On l'emploie comme antidote de Bell.

plumb.

Comparen avec Acon. arn bell. camph. cham. chim dros graph. igu. tach n-vom. op. phos. plat. plumb. rhus. rut. stram. veratr. — C'est surtout après bell., que l'hyosc. convient lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce medicament contre : Affections par suite d'un refroidissement, d'une frayeur avec angoisse, ou d'une contrariéte; Convulsions, crampes, spasmes-hystériques, épilepsie, danse de Saint-Guy et autres affections spasmodiques, principalement chez les femmes enceintes ou en couches, ainsi que chez les enfants et par suite de vers; Inflammations avec symptomes nerveux; Surexcitation nerveuse avec insomme; Fièvre typhoïde, aussi a la suite du choléra; Fievres intermittentes, Fievre avec affections vermineuses?, Imbecilhté; Debrium tremens; Vesanie, mame, rage et autres alienations mentales; Hydrophobie; Encephalite; Hydrocephale aigue?; Migraine; Amblyopie amaurotique avec héméralopie; Presbyopie; Odontalgie par suite de refroidissement; Hoquet spasmodique; Dyspepsie avec vomissement des aliments, aussi chez les enfants; Hematemese, même par suite d'un refroidissement; Gastrite?, Enterite?; Coliques spasmodiques; Diarrhée, surtout chez les femmes en couches: Paralysie du sphincter de l'anus; Paralysie de la vessie; Spasmes, diarrhee et autres affections des femmes enceintes ou en couches, Crampes de la matrice?; Fièvre puerpérale, Convulsions, vomissement et autres affections des nouveau-nes, Toux chez les vieillards, aussi a la suite des morbilles; Toux convulsive; Crampes de postrine?. Pneumonie avec phénomènes nerveux?, Phthisie commençante; Affections organiques du cœur, etc., etc.,

Foy, la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Dechirement incisif et tiraillement sourd dans les membres et les articulations. — Membres froids, tremblotants, engourdis. — *Moucements convulsifs et secousses de quelques membres ou de tout le corps, parfois, pour peu que l'on essaye d'avaler les liquides. — Jactation des pieds et des mains. — *Attaques d'épilepsie, quelquefois avec de tête comme par ebranlement du cerveau. — Douleur pressire et étourdissante dans le front, surtout après le repas. — Embarras constrictif dans le front. — Sensation de fluctuation ou de commotion au cerveau, surtout en marchant. — Chalcur et four-in illement dans la tête. — Mal de tête alternant avec deuleur à la mique — Bedamement de la tête de cote et d'autre.

Your Your about us et ternes. **Yeur ronges, paces, conculses et proemments. — *Mouvements spasmodiques des yeur. * Rongeur de la selerotique. Genilement acs paupières — Strabisme — *Occlusion spasmodique des paupières — *Pupilles dilatees — Trouble de la vue. — Myepre ou preshyopie. — Erreurs de la vue » Diplopie. Les objets semblent etre beaucoup plus grands qu'ils ne sont en effet, ou bien celores en ronge — «Cecte moturne. » L'arblesse de la vue comme par une amaurise comi engante.

Oreilles et Nez. Bourdonnement dans les oreilles. — Durete de l'oute comme par étourdissement. — Epistaxis. Pression cram-

poide à la racine du nez. - Perte de l'odorat.

Visage. — *Visage froid, pâle, bleuâtre, ou bouffi et rouge comme du sang. — Pression crampoide à la pommette. — Séchereme

des lèvres. — *Crampe de la máchoire.

Denis. — *Douleurs pulsatives et déchirantes dans les deuts, se faisant ressentir depuis la jone jusque dans le front, surtout après un refroidissement à l'air froid, ou le matin, et souvent avec congestion à la tête, chaleur et rougeur de la face, gonflement des gencives et spasmes dans la gorge. — Déchirement dans les gencives, avec bourdonnement et sensation de vacillement des dents. — Serrement des dents. — Odents enduites de mucosités. — Gensation d'allongement des dents.

Boache et Gorge. — Sécheresse de la bouche. — Salivation d'un goût sale. — Salive sanguinolente. — *Écume à la bouche. — Exhalaison fétide par la bouche, dont on s'aperçoit soi-même. — Ardeur et torpeur de la langue, comme si elle était brûlée. — • I angue sêche, chargée d'un enduit brunâtre. — *Rougeur de

que. — Paralysie de la langue. — *Perte de la parole. — reme et chaleur brûlante de la gorge. — *Construction de rge et impossibilité d'avaler les liquides. — "Gonfiement

dessement de la gorge.

et Estomac. — Perte du goût. — Boulimie avec forte Horreur des boissons. — *Hoquet, surtout après le repas. * le repas, mal à la tête, ivresse, forte angoisse et tristesse. * avoir bu, convulsions. — Nausées en appuyant sur l'él. — *Vomiturition et vomissements avec translates ani l'élevier. Vomissement aqueux, avec nt de mucosités (sanguinolentes) est de siquefois avec convulsions, etouffement app, grand épuisement et froid aux n.



358 HYOSCYAMUS NIGER. - IATROPHA CURCAS.

qui font contracter les jambes — Taches gangréneuses et vésicules aux jambes. Roideur et abuttement dans les articulations du gen u. — Gonflement des pieds. — Contraction des orteils en marchant et en montant.

IATROPHA CURCAS.

IAT. Gros pignos d'inde, Figne infernale, Riem d'Amérique. — Henra. — Hist nat et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 236. — Medicament encore tres-peu conus.

CLINIQUE. En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas ou l'on pourra le consulter avec aucces contre les affections suivantes : Eruptions diverses ; Contractures ; Douleurs rhumatismales dans les membres et les articulations , Surdite , Vomissement des femmes enceintes ; Gastrite ; Coliques ; Enterite ; Cholera asiatique ; Lombries et Ascarides.

Voy. la note, page 15.

**MPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs en divers endroits;

**douleurs rhumatismales dans les muscles et les articulations :
douleurs musculaires alternant avec coliques; endolorissement
des muscles dans la position assise; courbature après avoir marché. — Convulsions : **spasmes toniques, avec vomissement et
duarrhée — Grand affaissement genéral des forces. — Eruptions;
gonflements. — Sauffrances nocturnes : angoisse dans la poitrine, battement de cœur; rêves abondants; secheresse de la
bouche, sueur en dormant. — Froid genéral du corps, froid au
dos, horripolations et faissonnements; frissonnement dans les vertèbres lombaires; sueur avec faiblesse; sueurs visqueuses. —
— *L'eau froide soulage. — Angoisse nocturne dans la poitrine;


*grande anxiete; colère dans les rêves; extase.

Tête - Oreilles. -- Congestion a la tête; chaleur dans la tête; avec pesanteur, embarras, oreilles brulantes, baillement et dégoût; chaleur dans l'occiput, chaleur dans le sinciput; tête chaude, avec horripilation au dos. -- Bourdonnement d'oreilles; dans les oreilles, douleurs, élancements, brûlement. -- Prurit au

wez, en mangeant.

Organes de la digestion. - Bouche sèche, sans soif, avec chalenr et brulement, sensation comme brule, jusque dans la gorge; salive aboudante, avec nausées. - *Vommement facile et trèspondant de matières aqueuses, comme albummeuses, avec diap-





IATROPHA CURCAS. – IGNATIA AMARA.

rhes. - Dans l'estomac : chaleur, ardeur, brûlement, pression contraction crampoide, douleur incisive; sensibilité à la pression; nensation d'un affaissement dans l'estomac et le creux stomacal.

*Grande anxiété à l'estomac; inflammation de l'estomac et des intestins. - Ventre ballonné et douloureux ; douleurs dans la région ambilicale, a gauche (en haut) et le long de la colonne vertébrale; borborygmes et douleurs dans le ventre; *gloussemené comme par des liquides, avant, mais aurtout après les selles diarrheiques. - *Diarrhees aqueuses, sortant comme une chute d'esse : avant la selle diarrhéique, frissonnement dans la profondens des vertèbres lombaires. Dans le rectum, brülement, clancements, fourmullement, prarat. Après la douleur ombilicale et les nausées, crampes et élancements au col de la vexise.

Poitrine, Tronc et Membres. - Douleur lancinante derriere le stermun; élancements dans la région du cœur; pulsations du cour plus fortes; douleur dans la clavicule gauche, le long du nerf plusire. - Dans les muscles lombaires : pression, élancements, roideur; douleurs venant du ventre. - Dans l'épone dorsale . douleurs; chaleur qui passe aux vertèbres; frissonnement dans la profondeur de l'épine. - Roideur de la nuque. - Dans les doigts : endolonssement, douleurs, prunt. Dans les genouz : lassitude, courbature, pression, déchirements. Dans les mollets. *crampes: pression, tiraillements, élancements, roldeur, courbature, pulsations. - Douleurs crampoides aux jambes, avec distersion des mollets jusqu'au tibia. Dans les pieds douleurs, tiraillements, élancements, fourmillement. Prurit aux orteils.

ignatia amara.

IGN. - Fève Saint-Iguace. - HAHNGMANN. - Hist. not. et prép. Voy. Pharmac, homotop., p. 229. - Pose unite: 30. - Duree d'action : jusqu'à 9 jours quelquefois.

Annaeres : Arn. cham. cocc. coff. puls. - Ou l'emploie comme l'antidote

de : Cham. coff. puls. zinc. Comparen avec : Alum, ara, calad, caps, caus, cham, ein, cocc, coff, croc-hyon, ipre, mes, mosch, netr-m, n-mosch, n-rom, par, phos-sc, para, s, rut. tahad. see. sep. staum. staph. suif. tart. valer. verutr. zinc. s spec., qu'sya, convient quelquefois, lorsqu'elle est d'ailal ancè Murs indiquée.

CLIBEQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des nymptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections principalement des personnes sensibles, d'un tempérament nerveux et portées à concentrer en elles-mêmes les chagrins qu'elles éprouvent ; Affections du sexe féminin et surtout des femmes




IGNATIA AMARA.

hysteriques; Suites facheuses d'une affliction, d'un chagrin concentré, d'un amour malheureux, etc., buites facheuses de l'abus du café ou de la camomille ; Accès de defaillance, et de faiblesse hysterique; Crampes, convulsions, épilepsie et autres affections spasmodiques, surtout par suite d'une frayeur ou d'une contrariété, et principalement chez les femmes hystériques ou chez les enfants pendant la dentition; Fierres intermittentes; Fierres catarrhales et rhumatismales; Frèvres lentes?, Mélancolie et autres affections morales par suite d'une affliction; Hystérie; Migraines et céphalalgies nerveuses et hystériques. Céphalalgie et chute des cheveux par suite de chagrins; Ophthalmie et photephobie scrofuleuses; Corven chronique, Odontalgie, surtout chez les femmes hysteriques; Dentition difficile des enfants avec convulsions; Amygdalite et autres angines, a la suite de la scarlatine aussi; Gastralgie: Gastrite, dyspepsie et autres affections gastriques, Affections bilieuses; Splénalgie, Coliques, surtout chez les femmes hystériques, Affections vermineuses. Chute du rectum, chez les enfants aussi; Dysménorrhée; Chlorose?; Crampes de matrice; Convulsions et autres affections spasmodiques des femmes en couches et des nouveau-nés; Ecorchure des enfants, surtout celle qui provient de l'abus de la camomille, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

360

SYMPTOMES GENERAUX. - Douleurs simples et violentes sculement au toucher, à diverses parties. - Pression incinre ou aigué et quelquefois dure dans les membres et autres parties. - Elancements comme par des contenux. * Sensation d'écartement ou de constriction dans les organes internes. Déchirement arthritique dans les membres, - Douleur de luxation on de foulure dans les articulations *Douleurs de contusion ou de meurtrissure, surtout dans le périoste, et principalement etant couche sur le côté. - Engourdissement fourmillant des membres. Lourdeur et engourdissement formicant des membres * Attaques de crampes et de convulsions, "quelquefois avec anxiété, accès de suffocation, renversement de la tête, visage bleuatre ou rouge, spasmes de la gorge, perte de connaissance, etc. • Convulsions épileptiques avec écume à la bouche, baillements frequents, yeux convulses, rétraction des pouces, face rouge ou alternative ment pale et rouge, etc. Mouvements involontaires des membres, comme dans la danse de Saint-Guy — Après les convulsions, soupirs prefonds ou sommeil soporeux. Forte susceptibilité au grand air. Convulsions avec cris et rires. - *Faiblesse hysterique et accès d'évanoussement. *Les symptômes se manifestent surtout immédiatement après le repas, ainsi que le soir, après s'être conche, ou le mutin lorsqu'on rient de se lever. - *Le case, le tabac, l'eau-de-vie et le bruit



IGNATIA AMARA.

361

aggravent aussi bien des douleurs. — *Les douleurs se dissipent, soit en étant couché sur le dos, soit en se couchant sur la partie affectée ou sur le côté sain, mais toujours par le changement de position. — *Douleurs nocturnes, qui troublent le sommeil.

Ponn. — Prurit qui se dissipe facilement en se grattant. — Engelures. — *Exceriation de la peau. — Prurit en s'échauffant en plein air. — Éruption urticaire sur tout le corps avec prurit

violent (pendant la fièvre).


Semmeil. — Sommeil profond et comateur, non réparateur, avec respiration ronflante. — Bâillements spasmodiques violents, surtout le matin ou après la sieste. — Sommeil très-léger. — Sommeil agité avec gémissements, plaintes, beaucoup de paroles, cauchemar, ou sursauts et rêves fréquents. — Tressaillement des membres en s'endormant. — *Rêves avec réflexions et raisonnements, ou avec idées fixes. — Sursauts avec effroi en s'endormant.

Pièvre. — Friesonnement fébrile, surtout au dos et aux bras, avec soif d'eau froide, et quelquefois avec nausées et vomissements. Frissonnement avec aggravation des douleurs. — Soulagement du froid par la chaleur extérieure. — *Chaleur universelle, surtout à la tête, avec rougeur, principalement de l'une des joucs. et adipsie, quelquefois avec horripilation intérieure, froid aux pieds, élancements dans les membres, et mal à la tête. - Acces subits de chaleur fugace par tout le corps. - Sensation pénible de chaleur, quelquefois avec sueur. — *Absence de soif pendant la chaleur et la transpiration, ou dans l'apyrexie. — Chaleur et rougeur de la peau, avec insupportabilité de la chaleur extérieure. - Fièvre avec mal à la tête et au creux de l'estomac, grand fatigue, pâleur de la face ou pâleur et rougeur alternatives. lèvres sèches et gercées, éruption urticaire, langue blanche, sommeil profond avec ronflement, etc. — Sueur avec elancements et bourdonnements dans les oreilles. Sueurs pendant le repas.

Moral. — *Tristesse et chagrin concentré, avec soupirs. — Irremlution. — Impatience. — *Forte disposition à s'effrayer. *Humeur morose et chagrine; on pense malgré soi à des choses pénibles et désagréables. — Effronterie. — Caractère tendre et conscience délicate. — Inconstance. — *Alternation de gaseté folle et de tristesse avec pleurs. — *Laconisme. — *Grande faiblesse de la mémoire. — *Amour de la solitude. — *Angoisse, *surtout le matin, au réveil, ou la nuit, quelquefois avec battement de cœur. — *Humeur pleureuse et indifférente, avec horreur pour le travail. — *Chagrin de cœur rongeant. — *On dessespère de se guérir. — La moindre contradiction irrite jusqu'a la colère et à l'emportement, avec rougeur de la face. — Crainte de voleure, la nuit. — Cris et découragement total pour la moindre chose. — Humeur excessivement variable.

Tota. — *Vertiges, eavec scintillement devant les yeux. — Grande

Jana. - 8. édit., Ire part., t. 1.



IGNATIA AMARA.

pesanteur de la tête, comme si elle était pleine de sang. - Mal de tête pressif, surtout au-dessus de la racine du nez, et souvent accompagné d'envie de vomir, aggravé ou soulagé en se baissant. - *Pression crampoide dans le front et l'occiput, cavec obscurcissement de la vue, rougeur de la face et larmoiement. — *Sensation d'expansion douloureuse à la tête, comme si le crâne allait éclater, surtout en causant, en lisant ou en entendant parler. — Douleur de meurtrissure à la tête, surtout le matin en s'éveillant. -- *Les maux de tête sont aggravés par le café. l'equ-de-vie. la fumée de tabac, le bruit et les odeurs fortes. — *Mal de tête comme si un clou était enfoncé dans le cerreau. - Déchirements térebrants et lancinants, profondément dans le cerveau et dans le front, soulages en se couchant. Mal de tête pressif. tressaillant. - Tremblement de la tête. - Renversement de la tête en arrière. — *Chute des cheveux.

Your. -- *Pression dans les your, quelquesois comme si du sable s'y était introduit. — *Inflammation des yeur. -- •Rougeur des yeur. Agglutination des paupières. — *Larmoiement, •surtout à la clarté du soleil. — Gonssement de la paupière supérieure, avec engorgement des veines. Inflammation de la partie supérieure du globe de l'œil. — Mouvements convulsifs des yeur et des paupières. Fixité du regard, avec dilatation des pupilles. — *Photophobie. — *Vue trouble, comme à travers un brouil-

lard.

362

Orailles. -- • Gonflement des parotides avec douleur lancinante. -- Rougeur et chaleur brûlante de l'une des oreilles. -- *Dureté de l'ouie, • excepte pour la voix humaine.

Nez. - Prunt dans le nez. — Narmes excortées, ulcérées, avec gonflement du nez. Épistaxis. — Coryza sec, avec mal de tête

sourd et surexcitation nerveuse. - Sécheresse du nez.

Visage. - Face pâle, rouge ou bleue, ou terreuse et hâve. — Sueur seulement au visage. — Alternatives de pâleur et de rougeur. — *Rougeur et chaleur brûlante de l'une des joues. — Tressaillements convulsifs et distorsion des muscles de la face. — Éruption à la face. — Lèvres sèches, gercées et saignantes. — Douleur d'excoriation a la face interne de la lèvre inférieure. — Croûtes aux commissures des lèvres et aux lèvres. — Douleurs dans les glandes sous-maxillaires. — Tressaillements convulsifs des coins de la bouche. *Berrement spasmodique des mâchoires.

Dents. -- Odontalgie, comme si les dents étaient brisées. — Vacillement des dents. — Les maux de dents se font ressentir vers la

fin du repas et s'aggravent encore après.

Bouche. — Inflammation et rougeur de la bouche et du palais. — *Mucosites continuelles ou accumulation d'une salice acide dans la bouche. — *On se mord facilement la langue en machant ou en parlant. — Langue humide, chargée d'un enduit blanc. —



363

Élancement dans le voile du palais jusque dans l'oreille. — • Écume à la bouche. — Voix faible, chevrotante.

Gargo. — Mal de gorge comme s'il y avant dedans une cheville, hors le temps de la déglutition. — Palais rouge et enflammé, avec sensation comme si ce qu'on avale passait sur une tumeur brâlante et exceriée. — *Elancements dans la gorge, s'étendant quelquesois jusqu'à l'oreille, principalement hors le temps de la déglutition. — Inflammation, gonflement et induration des amygdales, avec petits ulcères. — Déglutition génée (des boissons). — Constriction du gosier,

avec rapports sanglotants.

Appétit. — *Répugnance pour les aliments et les boissons, surtout pour le lait, la viande, les aliments cuits et la fumée du tabac. — *Manque d'appétit et prompte satiété. — *Goût fade comme de la craie, dans la bouche. — Faiblesse et difficulté de la digestion. — Goût amer et putride des aliments, surtout de la bière. — Dégoût ou fort désir de choses acides, dégoût du vin et de l'eau-de-vie. — Après le repas, ballonnement douloureux du ventre. — Désir de diverses choses dont on ne se soucie plus dès qu'on les a obtenues. — Insipidité des aliments. — Le lait qu'on a pris le matin laisse longtemps un arrière-goût. Après avoir fumé, hoquet, nausées, sueurs et coliques.

**Hoquet toutes les fois que l'on a bu ou mangé. — Renvois acides. — Nausées avec agitation et angoisse. — *Vomissement des aliments, même la nuit. — °Vomissement de bile et de mucosités. — *Accès périodiques de crampes d'estomac, qui troublent le sommeil de nuit, et sont aggravées en pressant sur la partie affectée. — Pression sourde ou élancements à l'épigastre. — Froid on sensation de brûlure à l'estomac, surtout apres avoir pris de l'eau-de-vie. — *Sensation de vacuité et de faiblesse à l'épigastre. — Sensibilité douloureuse du creux de l'estomac, au

toucher.

Ventre. — Sensation de plénitude et ballonnement des hypocondres, avec gêne de la respiration. — *Douleur à l'hypocondre gauche, °aggravée par la pression et la marche. — Elancement, sensation de brûlure et pression ou gonfiement et dureté dans la région de la rate. — Douleur expansive dans le ventre, comme si les intestins allaient éclater. — Ballonnement du ventre. — Tranchées dans la région ombilicale. — Pression violente dans le ventre. — Tournoiement autour du nombril. — Les maux de ventre s'aggravent après avoir pris du café, de l'eau-de-vie ou des choses sucrées. — *Élancements et pincements dans le ventre, surtout dans les côtés. — *Douleurs crampoides périodiques dans le ventre. — Pressions crampoides dans la région inguinale. — Battement dans le ventre. — Gargouillement et borborggmes dans les intestins. — *Coliques venteuses, surtout



IGNATIA AMARA.

la nuit. - Semation de faiblesse et tremblement dans le ventre

avec respiration suspiriouse.

364

Selles. *Selles dures avec encre frequente et mutile. Selles jaunes, blanchatres, d'un moule tres-volumineux et difficiles à evacuer. *Duarhée de mucosites sanquemolentes, avec gargouillement dans le ventre. — Selles muqueuses, accompagnées de coliques. — Écoulement de sang par l'anus. — C'hute du rectum pendant les selles. — Prurit et fourmillement a l'anus. — Ascarides du rectum. — Retrécissement de l'anus. — Douleur contractive d'excoriation à l'anus, après les selles. — Élancements depuis l'anus jusque bien avant dans le rectum. Cuisson dans le rectum, pendant les selles diarrhéiques.

Urines. — Émission frequente et abondante d'une urine aqueuse. Urine jaune citron. - Émission involontaire des urines. — Besoin pressant et irresistible d'uriner. Après avoir pris du café, besoin continuel d'uriner — En urinant, sensation de brû-

lure et cuisson dans l'urèthre.

Parties viriles. Fort prurit aux parties génitales et à la verge, le soir, après s'etre couche, se dissipant en grattant. — Douleur d'excoriation et d'ulceration sur les bords du prépuee. — Étranglement et pression dans les testicules, surtout le soir, après s'etre couché. — Sueur au scrotum — Lascivité et images rolluptueuses, avec faiblesse de la puissance génitale. — Absence de l'appetit vénérien. Erections avec gêne douloureuse et pres-

sion au pubis. Erections pendant toutes les selles.

Règles.—*Regles trophatives et tropfortes, tous les 10 à 15 jours.


— Sang des règles noir, mélé de caillots. — Pendant les regles, pesanteur, chaleur et douleurs à la tête, photophobie, coliques avec douleurs contractives, anxiete, battement de cœur et grande fatigue jusqu'à la defaillance. — *Douleurs crampoides et compressives dans la région de l'utérus, avec et uffement, la pression et le coucher sur le des soulagent la douleur — *Crampes de matrice pendant les règles. — Leucorrhée corrosive et puru-

lente, précedee de pression contractive à la matrice

Larynx — Voix faible, impossibilité de parler haut — Catarrhe, avec coryza et mal a la tête. — Toux provoquee par une sensation de constriction dans la fossette du cou, comme par la vapeur du soufre. — Toux nocturne, opiniâtre. — Toux sèche, parfois avec coryza fluent — Toux continuant egalement le jour et la nuit. — Toux sèche, rauque. — Toux spasmodique éhranlante. — Toux courte, comme si l'on arait du duvet dans la gorge, d'autant plus forte que l'on tousse davantage. — Toux rauque, seche, provoquée par un chatouillement au-dessus de l'estomae

Poitrine. - Géne de la respiration et oppression de la postrine, surtout la nuit. - Respiration difficile, comme s'il y avait sur la postrine un posds qui l'empêchât.--Manque d'haleine en mar-





IGNATIA AMARA. — INDIGO.

shant, et toux des qu'on reste tranquille. - *Respiration suspirieuse. Etouffement en courant. Pression à la poitrine. - Constriction de la pottrine. - Elancements dans la poitrine et dans les côtés, provoqués par des flatuosités. — Battements de cœur, la nuit, avec élancements au cœur, ou bien le matin en s'éveillant, ainsi qu'en méditant et pendant le repos. - Battement dans la poitrine.

Trons. — Douleurs violentes aux reins, comme des **élancements**, des tiraillements on le serrement d'une griffe. - Renversement du dos en arrière (par les convulsions). — Elancements comme par des couteaux, depuis les reins jusque dans les cuisses. -- Roideur de la nuque. — Douleur pressive dans les glandes du cou.

-- Glandes engorgées, comme des nodosités, au cou.

Bras. — *Douleurs insupportables dans les 0s et les articulations des bras, comme si la chair était décollée, ou avec sensation paralytique et douleur de luxation. - • Tressaillements convulsifs dans les bras et les doigts. — Déchirement dans les bras, provoqué par l'air froid. - Tension dans le poignet. - Sueur chaude des mains. — Sensation de torpeur et fouillement dans les bras,

la nuit, au lit.

Jambes -- Douleurs déchirantes, incisires, à la face postérieure des cuisses, en fatigant les muscles. — Pesanteur des jambes et des pieds, avec tension dans les jambes et les mollets en marchant. - Chalcur du genou, avec nez froid. - o Tressaillements convulsifs des jambes. - Roideur des genoux et des pieds. -Sensibilité douloureuse de la plante des pieds, en marchant. — Elancements et douleur d'ulcération à la plante des pieds. — Sensation de brûlure dans les talons, la nuit, en les rapprochaut l'un de l'autre. — Sensation de brûlure dans les cors.

INDIGO.

IND. - Indigofera tinctoria; indigo. - Annales de Taixes. - Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. hommop., p. 231. - Remède encore très-peu connu.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs qui se dissipent entièrement, ou du moins ne reparaissent que très-diminuées, après avoir appuyé sur la partie affectée ou avoir gratté. - Douleurs lancinantes et déchirantes dans les membres, après midi et le soir. - Furoncles. - Envie de dormir le soir, et sommeil agité la nuit. La nuit, réveil anxieux et en sursaut.
 Rêves anxieux. Prédominance du froid. - On est mal disposé, d'humeur chagrine, et-paresseux.



INDIGO - IODIUM.

366

Tête — Selles. — Sensation commo si la tête était plus volumineuse et qu'elle occupat plus d'espace. Douleurs lancinantes et déchirantes, profondement dans le cerveau. - Bruit et battement dans la tete. Chaleur et bouillonnement dans l'occipat, comme produit par l'eau bouillante. Sensation au vertex, comme si Fon tirait les cheveux - Tressaillements convulsifs et fremissement des paupieres, qui empechent de voir. Dechirement dans et derrière les orcilles, ainsi que dans la machoire inferieure Douleurs dechirantes, térebrantes et rongeantes dans les os du visage, et surtout dans la machoire inferieure - Congestion à la face, avec joues brulantes. - Epistaris, avec perte de la vue. Dechirement et douleurs meisives dans les os et les cartilages du nez. - Torpeur de l'interieur de la bouche, le matin apres le réveil - Sensation de brulure sur la langue et au fond du palais. Crachement de salive sanguinolente. Renvois à vide. - Renvois avec gout d'encre. - Renvois donceatres. -Sensation dans l'estomac, comme si l'on était à jeun. Selles diarrhéiques, avec pincements dans le ventre envie d'aller a la selle.

rhétques, avec pincements dans le ventre envie d'aller a la selle.

Poitrine Membres. Toux sufficemte, forçant a venur, le soir avant et après le coucher. Gargouillement et grond ment dans la poitrine a chaque inspiration -- Douleurs la semantes dans et autour des seins. Douleurs dechirantes dans l'avant-bras, depuis le coude jusque dans les doigts, et qui changent de place par le mouvement -- Tressaillements convulsifs dans les bras. -- Veines des mains rouges, enflees et tendues -- Douleurs lancinantes et déchirantes dans les membres superieurs. -- Déchirement dans les membres inforieurs, surtout dans les orteils.

Grande lassitude des membres inferieurs, le soir, et se faisant sentir même après qu'on s'est couché.

IODIUM.

10D. — Iode — HARMENANN. — Hist not, et prep Voy Pharmac homeop p 107 — Dose unice. 30. — Durce d'action : jusqu'à 7 semaines dans quelques cas Antidotes : Ars " camph chin coff hep phos, spong, sulf. Comparen Acs. coce coff. con cupr dig merc, phos. spong sulf.

CLINIQUE Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas ou ce medicament pourra être consulte contre : — Arthrite inveteree. Suites facheuses de l'abus du mercure : Affections serofuleuses et lymphatiques, Engorgement et induration des glandes, Atrophie des enfants serofuleux. Affections rachitiques : Affections rhumatismales; Dartres; Ophthalmie et Otite scrofuleu-



IODIUM.

367

ses; Blépharophthalmie; Croûte de lait?; Salivation, avec ulcères de la bouche, par l'abus du mercure; Carreau; Phthisie abdominale; Bubons scrofuleux et arthritiques; Dyspepsie; Aménorrhée?; Flueurs blanches; Galactorrhée; Laryngite chronique avec ulcération (Phthisie laryngée); Catarrhe chronique, Grippe; Coqueluche: Gonflement inflammatoire du genou; Goitre; Tumeur blanche; Hydrartre, etc.

Vog. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs erratiques dans les articulations. — *Déchirement dans les membres, et surtout dans les articulations, la nuit principalement. — Sensation de torpeur dans les membres. — Tressaullements convulsifs et soubresauts des tendons. — *Déviation des os. — Douleurs ostéocopes nocturnes. — Ce médicament agit d'une manière excitante sur le système glandulaire, l'estomac, le foie, etc., et provoque dans ces organes la sécrétion. — *Gonflement et dureté des glandes, après des contusions aussi. — Hémorrhagies par différents organes. — Forte surexcitation de tout le système nerveux. — Bouillonnement de sang, et pulsation dans tout le corps, augmentés par le plus léger effort. — Mandèment des membres. — Marche chancelante. — *Grande faiblesse; la parole même provoque la sueur. — Atrophie et amaigrissement jusqu'à l'état de squelette. — Gonflement ædémateux, même de tout le corps.

Peau. — Peau sèche, ou visqueuse, moite, et d'un jaune sale. — Dartres. — Panaris. - Anasarque.


Sommell. — Rêves agités. — *Sueur nocturne.

Pièvre. — Frissonnement même dans un appartement chaud. — Augmentation de la chaleur du corps. — Chaleur fugace. — Transpiration acide, le matin. — Pouls accéléré, petit, dur. —

Fièvre avec consomption. Sueur acide, le matin.

Meral. — Disposition pleureuse et accablement moral. — Mélancolie, hypocondrie, tristesse, cœur serré et anxieux. — Appréhension anxieuse. — Agitation inquiète, qui ne permet ni de rester
assis, ni de dormir. — Surexcitation morale, avec grande susceptibilité. — Illusions de sentiment. — Loquacité et gaieté
immodérées. — Hésitation et irrésolution. — Paresse d'esprit,
avec grande répugnance pour tout travail intellectuel. — Fixité,
immobilité de la pensée. — Délire.

Tôte. — Embarras de la tête. — *Le matin, étourdissement. — Mal de tête à l'air chaud, ainsi que par le mouvement prolongé de la voiture, ou par une marche forcée, et aggravé par le bruit et la parole. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau, avec manque de force dans le corps, comme par paralysie. — Douleurs pressives aigués dans le front. — Congestion à la tête, avec



368 .

IODIUM.

battement dans le cerveau. — Mal de tête comme par un bandeau serré.

Yenx — Douleurs dans les orbites. — Sensation d'abattement audessus des yeux, comme s'ils étaient profondément enfoncés, le soir. — Douleur d'excornation dans les yeux. Inflammation des yeux, quelquefois après un refroidissement. — Gonflement des paupières. Couleur jaune sale de la sclerotique. Larmoiement. — Mouvements convulsifs et tremblement des paupières. Vue affaiblie. — Diplopie. — Étincelles et scintillement devant les yeux

Oroilles. Bourdonnement dans les oreilles. - Dureté de l'ouie.

- Sensibilité au bruit.

Nez. — Epistaxis. — Tache rouge, brûlante, au nez, au-dessus de l'œil. Obturation du nez, ou sécrétion plus abondante de mucontés.

Visage *Teint pâle, jounâtre, ou brunissant promptement. —
Rougeur fréquente et subite du visage, avec sensation de brûlure
aux oreilles. — Visage défait avec yeux abattus. — Tressaillement
des muscles de la face. — Ulcère à la joue, avec gonflement des
glandes voisines. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Dents. Douleurs pressives dans les dents molaires. — Dents jounes et enduites de mucosites, le matin. Gonflement inflammatoire et saignement des geneives, avec gonflement de la joue. *Ramollissement des geneives.

Bouche. - Aphthes dans la bouche. - *Ulcères dans la bouche. - Douleur et gonflement des glandes de l'intérieur de la bouche.

- Exhalaison d'une odeur putride par la bouche. - * Saliration.

Langue chargée d'un enduré épais.

Gorge. - Mal de gorge, avec douleur pressive, hors le temps de la déglutition ('onstruction permanente dans le gosier, et déglutition empêchée. - Inflammation du gosier, avec sensation de brûlure et grattement.

Appétit. Goût désagréable, comme du savon, ou amer sale. -Augmentation de la sorf. — Appetit variable, tantot *boulimie, tantôt absence d'appétit. — Faim inaccoutumée, avec améliora-

tion après le repas. Grande faiblesse de la digestion.


Estomac. — Renvois généralement acides, avec sensation brûlante.

— *Pyrosis, surtout apres des aliments indigestes — *Nauséca fréquentes. — Vomissements violents, renouvelés par le manger.

— Vomissement de matières bilieuses, ou de muçosités jaunâtres.

— Douleurs d'estomac des plus violentes, avec évacuations bilieuses. — Pression à l'estomac, après chaque repas. — Douleurs d'estomac, crampoides, rongeantes et brûlantes. — Inflammation d'estomac — Pulsation dans l'épigastre.

Ventre. — Douleurs abdominales qui se renouvellent après chaque repas. — Ballonnement du ventre. — Grosseur du ventre, qui ne permet pas de se coucher, sous péril de suffocation. Gonfle-



369

ment dur de la rate. — Douleurs crampoides dans le ventre. — *Coliques violentes. — Douleurs dans le ventre, comme celles de l'enfantement. — Gonflement et inflammation des glandes du mésentère. -- Tremblotement dans le ventre, depuis le creux de l'estomac jusqu'à la périphérie, avec augmentation de chaleur. -Gonflement et induration squirreuse des glandes inquinales.

*Incarcération de flatuosités.

Selles. — Selles dures, noneuses. — *Constipation. — Selles diarrhéigues, molles, quelquefois blanchâtres, *alternant avec constipation. — Selles de la consistance de la bouillie. — Diarrhées violentes, écumenses, ou de mucosités sanguinolentes. — Selles dyssentériques de mucosités épaisses, ou purulentes, avec rétention des matières stercorales. - Le soir, sensation de brûlure à l'anus.

Urines. — Suppression de la sécrétion d'urine. — Urines abondantes et-fréquentes. — * Émission des urines, la nuit. — Urines de couleur foncée, ou vert jaunâtre, ou laiteuse, ou âcre et cor-

rosive. — Pellicule irisée sur les urines.

Parties viriles. - Appétit rénérien exalté. - Tiraillement douloureux dans la partie antérieure de la verge. — Gonflement et

dureté des testicules. — Dureté de la prostate.

Bègles. — *Règles, tantôt en retard, tantôt trop bâtives. — Métrorrhagies. — Faiblesse, battement de cœur et beaucoup de souffrances, avant, pendant et après les règles. - Induration (et cancer?) de l'utérus. - Leucorrhée rongeante. - Flaccidité et

atrophie des mamelles.

Larynx. — Enrouement et fourmillement insupportables dans la gorge, surtout le matin. - *Inflammation de la gorge et de la trachée-artère avec douleur contractive d'excoriation. - Sécrétion plus abondante de mucosités dans la trachée-artère, avec rena-*Toux sèche, avec pression, élancement et clement fréquent. *Toux matutmale. sensation de brûlure dans la poitrine. *Toux, avec expectoration de mucosités abondantes et quelquefois sanguinolentes, •douleurs dans la poitrine et fièvre. — •Toux ressemblant à la coqueluche, excitée par un chatouillement insupportable dans la poitrine, avec angoisse avant la quinte, et amaigrissement excessif.

Poitrine. — *Géne de la respiration et dyspnée. — Suffocation. — En respirant, élancements dans le côte gauche. - Perte de la respiration, surtout en montant un escalier. — Faiblesse de la poitrine. — Congestion à la poitrine. *Battements de cour violente, crampoides, portés au plus haut degré par le moindre effort. — Tension brûlante, lancinante dans les téguments de la

poitrine.

Trone. — Crampes dans le dos. — Tension dans le cou. — *Gonflement à l'extérieur du cou. — Gonflement du cou en parlant. *Gonflement des glandes du cou, de la nuque et des aisselles.



IODIUM. - IPECACUANHA.

Sensation de constriction con--Goîtres durs et volumineux. tinuelle dans le goître. - Taches jaunatres sur le cou, et rougeur

comme par ecchy mose

370

Bras. - Douleurs esteccopes dans le bras, aggravees lorsqu'en est couché dessus, et troublant le sommeil . Lassitude dans les bras, le matin au lit Mouvements convulsifs et tremblement des bras, des mains et des doigts. Engeurdissement des doigts - Douleurs déchirantes dans les doigts. - Soubresauts des tendons dans les doigts. Panans. - Freid continuel aux mains, qui se couvrent d'une sueur froide pendant le travail. Carphologue.

Jambes. Douleur crampoïde dans les jambes, seulement en etant assis Pesanteur, genflement, tremblement et paralysie des jambes. Tiraillements rhumatismaux dans les cuisses et les genoux. - Gonflement inflammatoire du genou, avec douleurs déchirantes et suppuration. Gonflement hydropique du genon.

Tumeur blanche. Crampes dans les pieds, surtout la muit. - Soubresauts des tendons, aux pieds. Sueur here et currosive aux pieds.

IPECACUANHA


1PEC. Ipécseuanha. - HARNEMANN - Hist nat. et prép Voy Phaemac. homorop., p. 232 Doses nattees. 3, 9, 30. Durce d'action. jusquà 5 jours queiquefois

Antidotes Arn, are then. On l'emploie comme antidote de Alum.
ard are chir. capr dule, fer laur op tabae lart.

Comparen avec Acon ulum arn ara cale carb-veg, chim, chin, cin, coce croc l'eupr dros dule ter, ign laur, n-iom, op. phon, pals sabin sulf tert recute d'est saito d'iprès Acon ulum ara, el teratr, que l'i, et convient quelquelois, lorsqu'il est d'ailleurs lad qué. Après l'ipec, conviennent quelquelois. Aru are thin coce, ign, n-vom.

CLINIQUE. Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections principalement des enfants et des personnes blondes (et au temperament sensuel); Sultes fâcheuses de l'abus du quinquina ou de la graisse de porc, Affections par suite d'un refroidissement. d'une indigestion, ou d'une debauche, Crampes et emvulstans, tétanos et autres affections spasmodiques, surtout chez les infants et les personnes hysteriques, Hémorrhagies; Érupte ne miliaires (surtout chez les femmes en couches), et suites facheuses de la repercussion de cette éruption. Suites fâcheuses d'une apoplexie; Fièvres gastriques et bilieuses; Fièrres intermittentes; l'ièvres lentes; Migraine, Embarras gastrique, surtout à la suite d'une





IPÉCACUANHA.

indigestion, ou par l'abus du café ou de la graisse de porc; Choléra asiatique et sporadique; Hématémèse; Mélana; Affections gastriques, avec vomissement et diarrhée; Entérite?; Gastrite?; Spasmes abdominaux hystériques; Diarrhée, surtout chez les enfants; Affections gastriques des femmes enceintes; Fièvre puerpérale; Métrorrhagies; Laryngite?; Grippe?; Toux convulsive ou suffoquante; Coqueluche; Catarrhe suffoquant; Asthme de Millar et autres affections astàmatiques; Crampes de la poitrine, surtout celles qui proviennent de la vapeur de l'arsenic ou du cuivre, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleur de meurtrissure dans tous les os. — Fourmillement, comme d'engourdissement, dans les articulations. — Accès de malaise avec dégoût de tous les aliments et faiblesse excessive et subite. — *Saignement par divers organes, avec sang rouge vif. — *Sensibilité trop grande au froid et à la chaleur. *Tétanos, *accès de spasmes et convulsions de différente nature, *quelquefois avec renversement de la tête *et distorsion des traits, ou avec perte de convaissance, face pâle et bouffie, yeux à demi fermés, mouvements convulsifs des muscles de la face, des lèvres, des paupières et des membres, ou bien encore avec cris, envie de vomir et râle muqueux dans la poitrine. — Amaigrissement excessif.

Peau. — Eruptions miliaires. Prurit violent à la peau (des cuisses et des bras). — Pendant les nausées, on est forcé de se

gratter, jusqu'à ce que l'on vomisse.

Sommeil. Sommeil, avec yeux à demi ouverts. — Sommeil agité avec gémissements. — Pendant le sommeil, tressaillement des membres. — Rêves effrayants, avec sursauts fréquents et effroi

pendant le sommeil.

Fievre. — Horripilation, avec froid des membres et du visage. —
Froid, surtout des mains et des pieds, avec sueur froide et abondante de ces parties. — Aggravation des frissons par la chaleur extérieure. — Avant les frissons, malaise, pandiculation et lassitude, avec sueur froide au front ou froid ou frisson aux oreilles. — Chaleur subite dans l'appartement, avec sueur et vertiges. —
— Soif seulement pendant les frissons ou le froid. — Fièrre se manifestant par beaucoup de frissons, avec peu de chaleur, ou par beaucoup de chaleur, avec peu de frissons que nette ou chargée, et oppression constrictive de la poitrine. — Fièvre le soir, avec grande inquiétude, chaleur sèche et pénible, paume des mains brûlante et sueur nocturne.

Moral — Cris et hurlements (des enfants). — Anxiété et crainte de la mort. — Maussaderie avec dédain pour toute chose. — Hu-



IPECACUANHA.

372

meur méprisante. — Désir d'une foule de choses sans savoir au juste lesquelles. — Irritabilité et disposition à se facher. — Impatience - Lenteur de la conception.

Tête. — Vertige en marchant, avec vacillement et chancellement.

*Douleur, comme si le crâne était meurtri, dans tous les os de la tête, jusqu'a la racine de la langue.

*Accès de maux de tête, avec nausées et romissements. — Déchirement dans le front, provoqué ou aggravé par le toucher. — Mal de tête lancinant, avec pesanteur de la tête. Pression douloureuse au front.

Yenx et Nes. - Yenx rouges et enflammés. Chassie dans les angles des yeux. - Tremblement des paupières Pupilles dilatées Trouble de la vue. - Epistaxis - Porte de l'idorat.

*Coryza, avec obturation du nez — Froid et frissons aux oreilles.

Visage et Bents. — *Couleur pâle, terreuse ou jaunatre de la face, qui est bouffie, avec yeux cernés. — *Tressaillement conculsif dans les muscles de la face — Levres couvertes de petits aphthes et d'éruptions. — Douleurs d'excoriation aux lèvres. — Tressaillements contulsif dans les lèvres. Rougeur de la peau autour de la bouche. — Odontalgie par accès, comme si on arrachait la dent.

Bonche et Gorge. — Sensibilité douloureuse de toutes les parties de la bouche. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — *Langue chargée d'un enduit blanc ou jaunatre Mal de gorge pendant la deglutition, comme par gonflement du pharynx. — Déglutition difficile, comme par paralysie de la langue et du gosier.

Appétit. - *Goût fade ou pâteux ou camer, surtout le matin.
Goût douceâtre, comme si on avait du sang dans la bouche.

'Appétence seulement pour les friandises et les choses sucrees. Adipsie. -- Gout insipide de la bière. Le tabac a fumer a un goût nauséabond et fait vomir. -*Grande répugnance et dégoût.

pour tous les aliments. Pituites de l'estomac.

Estomae. *Nausees, comme provenant de l'estomae, avec accumulation abondante de salive, prurit violent a la peau et renvois à vide. — *Vomiturition, surteut après avoir bu froid ou apres avoir fumé. — *Vomissement des boissons ou des aliments ingerés, ou bien de matières bilieuses, rerdâtres, ou acides, ou muqueuses, gélatineuses, souvent avec d'uleur a l'estomae, et parfois immédiatement après le repas. — vomissement de sang Vomissement avec sueur, chaleur, haleine fétide et soif.

Vomissement avec d'arrhée. Vomissements des qu'on se baisse. — vomissement de matières noires comme de la poix. *Sensation d'un malaise excessif à l'estomae et à l'épigastre. — *Sensation comme si l'estomae était vide et flasque. — offonflement de la région stomacale. Pincement autour de l'epigastre et dans la region des hypocondres. — Pression a l'estomae, avec

vomissements.





Ventre. — Pincements dans le ventre, aggravés au plus haut point par le mouvement et améliorés dans le repos. — Douleur d'exceriation dans le ventre. — Coliques, avec agitation, jactation et cris (chez les enfants). — Coliques avec douleurs crampoïdes. — Douleurs incisives dans la région ombilicale, avec horripilation. — Colique flatulente.

Selles. — *Belles diarrhéiques, semblables à des matières en fermentation. — Diarrhées opiniatres. — *Selles diarrhéiques, verdâtres ou jaune citron, d'odeur putride, ou sanguinolentes, bilieuses et muqueuses. — *Selles diarrhéiques séreuses. — *Diarrhée avec nausées, coliques (et vomissement). — *Selles dyssentériques, avec flocons blancs, et suivies de ténesme. — *Évacuation de matières noires comme de la poix.

Urines — Urines troubles avec sédiment couleur de brique. — Urine rouge et rare. — *Urine sanguinolente, *avec douleurs dans la région de la vessie et à l'ombilic, sensation brûlante dans l'urèthre, envie de vomir, et douleur dans les reins et au creux de l'estomac. — Écoulement de pus par l'urèthre, avec douleur mordicante.

Parties génitales. — Sensation pénible, comme si tout affluait vers les parties génitales et vers l'anus. — *Métrorrhagies, avec écoulement d'un sang rouge vif et coagulé. — Règles trop hatives et trop fortes.

Laryan. — *Toux surtout la nuit, avec coups douloureux dans la tête et l'estomac, et avec dégoût, romiturition et romissements. — *Toux sèche, provoquée par un chatouillement contractif dans le laryan et jusqu'à l'extrémité des bronches, surtout en étant couché sur le côté gauche. — *Toux qui ressemble à la coqueluche, avec saignement par le nez et la bouche, et vomissement des aliments. Toux, avec crachement de sang. provoqué par le moindre effort. — *Toux spasmodique, seche, ebranlante, arec accès de suffocation, roidissement du corps et visage bleuître.

Poitrine. — *Respiration anxieuse et courte. — *Asthme spasmodique, avec contraction dans le larynx, et respiration haletante. — Râle muqueux dans la poitrine. Respiration suspirieuse. — Oppression de poitrine et haleine courte, comme si
on avalait beaucoup de poussière. *Perte d'haleine au moindre mouvement. — Spasmes de poitrine. — Douleur d'excoriation dans la poitrine. Battement de cœur. — Taches
rouges pruriantes sur la poitrine, avec brûlement après avoir
gratté.

Trono et Membres. — *Roideur tétanique et renrersement du dos, soit en avant, soit en arrière. — Gonflement et suppuration à la fossette du cou. — *Tressaillements convulsifs des jambes et des pieds. — Douleur de luxation à l'articulation coxo-fémorale dès qu'on s'assied. — Crampes nocturnes dans les muscles de la



374 IRIS VERSICOLOR. - KALI BICHROMATICUM.

cnisse. — Prurit violent aux mollets. Ulteres, avec fond noir, aux jambes.

IRIS VERSICOLOR.

IRIS. - Iris d'Amérique. - Voy HALE, Remedes américains.

Employé jusqu'ici avec succès contre :

Prosopalgie avec douleur dans la tête, les tempes et les yeur, et vomissement excessivement penible de mucosités douceatres, mêlées parfois de traces de bile. Clustrite, avec brulement violent dans l'epigastre, brûlement dans la bouche, le pharyux et l'essephage, vomissement, diarrhée et grande prostration. Catarrhé intestinal, avec brûlement dans le rectum et l'anus après la selle. évacuations douloureuses, verdatres, et se manifestant chaque nuit, entre deux et treis heures. - Cholera, avec brulement violent dans l'estomac ou autour du nombril après chaqueévacuation, et aggravation régulière entre 2 et 3 heures du matin. Spermatorrhée, avec face pale, yeux enfonces, moral abattu, marché trainante et appétit vénérien facile a exciter. - Grippe, avec eternument continuel, douleurs violentes et constrictives dans les tempes, et diarrhée indolore, féculente, couleur claire.

KALI BICHROMATICUM

KAL-Bl. — Bichromate de potasse — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac. homes p., p. 408 — Durée d'action?
Antidotes . Camph. coff. merc. natr sp.
Companies avec Ars carb-veg. coff lyc. merc natr-m. natr ac. phos puls.

bration et douleurs de menetrissure dans les membres. Dechirement dans les os longs des membres. «Rhumatismes chroniques. Lourdeur et fatigue dans les men bres. Grande faiblesse et aspect maladif, cachectique de la figure. Grande sensibilité au grand air. «Il métars que passent repulement d'une partie a l'autre En lourissement de teut a corps, surtout le matin, en se levant «Les douleurs rhumatismales alternent arec des symptômes gastropies, et les douleurs ostéocopes arec des affections de la gorge. «The meany de





ouffrances s'appravent var un temps chaud : d'antro

souffrances s'aggravent par un temps chaud; d'autres apparaissent ou augmentent principalement le matin. — Amaigrissement

général.

Peau et Lésions extérieures. — Peau chaude, sèche et rouge. — Éruption comme la rougeole. — *Pustules varioloides, parfois avec croûte noire au centre. — *Prurit brûlant dans la peau. — Furoncles. — Éruptions pustuleuses confluentes. — Pustules par le centre desquelles passe un poil. — *Ulcères gangréneux, secs, ovoïdes, rongeant en profondeur, avec auréole rose et enflammée, bords renversés, tache noirâtre au centre et laissant des cicatrices enfoncées. — *Ulcères et éruptions syphilitiques, avec croûtes épaisses et pus jaunâtre. — *Pustules ecthymateuses. — *Ecséma impétigineux, avec ulcères variqueux.

Sommeil. — Envie de dormir, le soir, de bonne heure. — Sommeil tardif, par surexcitation nerveuse. — Sommeil non réparateur. — Rêves vifs, effroyables. — Sommeil dérangé par beaucoup de

souffrances, mais surtout par des maux de tête.

Fièvre. — Sensation fébrile, la nuit et le matin. — Horripilations qui se répandent par tout le corps, en partant des jambes. — Prissonnements aux extrémités inférieures, alternant avec chaleur fugace. — **Fièvre rhumatismale.

Moral et Intellect. — Abattement, morosité, paresse et horreur du travail. —*Grande indifférence. — Mélancolie et tristesse. — Irritabilité irascible. — Anthropophobie et morosité jusqu'au

dégoût de la vie.

Tête. - Accès fréquents de vertiges. — Vertiges à faire tomber, avec sensation comme si tout tournait en cercle. — Sensation vertigineuse qui traverse le front. - Vertiges avec nausées et vomissement. — Tête embarrassée, avec nausées, angoisse et hébétude. — Céphalalgie avec douleurs des yeux et otalgie. — Céphalalgie semi-latérale, principalement au front, au-dessus d'un ail. — Aggravation des maux de tête par l'air froid et le mouvement. Mal de tête aux tempes. Bouillonnement de sang remontant à la tête. Élancements tranchants dans la tête comme par des couteaux. — Migraine, maux de tête hystériques, céphalalgie congestive? — Douleur d'excoriation au vertex, avec hérissement des cheveux. — Tiraillement et sensibilité aux os du crâne. — Chute des cheveux.

Yeux.—Pression dans les yeux comme du sable. Prurit et brûlement des yeux arec larmoument. Inflammation, gonflement, prurit et rougeur des paspières, avec sensation de rugosité et d'epaississement à la surface interne.—Inflammation des yeux, parfois avec photophobie, perte de la vue et écoulement abondant de larmes. Vue trouble comme par un voile jaune devant les yeux. -Amblyopie amaurotique.— Taches volantes et étincelantes devant les yeux. — Couleur jaune de la selérotique.

Taches romes et ecchymoses dans le blanc des yeux. - Taches



KALI BICHROMATICUM.

376

sanguinolentes et pustules sur la cornée - Taie blanche sur la cornée. - Ophthalmies catarrhales et scrofuleuses.

Oroilles. — Élancements dans les oreilles jusque dans le côté de la tête et du cou, avec glandes engorgées (laquement et chant dans les oreilles — Oreilles bouchées.

Nez. Sensation de froid dans les narines, en inspirant l'air.

Douleur d'excornation dans les narines. Petits ulcères brulants a l'entree des narines. Brulement et croûtes dans les narines.

- Saignement de nez frequent, avec sang épais et rouge fouré Ecoulement abandant de serasités par les narines, avec grande sensibilité du nez "Sécrétum abondante d'un mueus purulent, avec obturation continuelle des narines. Polypes du nez "l'Icération et destruction de la clouson du nez. Mouchement de masses roides, verdâtres, ou de bou. hous durs, elasti ques, d'une odeur nauséabonde. Gontlement du nez, avec endolorissement de la cloison. — Endol rissement des cartalages du nez. Battements et pulsations dans la racine du nez, qui paraît chaude au toucher, avec gonflement sans rougeur. 📑 Sensation de plénitude et de grosseur dans la partie superieure du nez, avec besoin fréquent de se moucher. Pesanteur du nez. Fetidité devant le nez. Perte de l'odorat. Excernati n. br ilement et secheresse pénible du nez. *Obturation fre piente ou opiniaire du nez Eternument frequent, violent et ebranlant - Coryen sec, avec narines ulcérées, eternument frequent et accès de toux.

Face. - Couleur pâle, maladive, jaune, terreuse ou gris cendré de la face. Yeux creux et cernés. - Douleur de meurtrissure et sensibilité des os de la face - Tension dans les muscles de la face. Eruption, comme scorbutique, a la face. - Prurit et brûlement a la peau de la face et du front. Prurit dans les favoris.


Eruption de vesicules aux lèvres, avec fort prurit en dessechant. «Croûtes syphilitiques à la joue, depuis la racine du nez jusqu'a la levre.» Sueur a la lèvre supérieure. — Lèvre inferieure gonflée et gercée

Dents. Odontalgie avec salivation abondante. — Déchirement tractif dans les dents gauches, parfois jusque dans l'oreille, la tempe, le cou et la tete, avec engorgement des glandes du ceu, et suivi de gonflement des geneives. Inflammation et ulcéra-

tion des gencives. — Gencives livides.

Bonche. Grande sécheresse de la bouche et des lèvres. — Vésicules, aphthes et ulcères a la surface interne de la bonche. Langue molle, rough et gercee. — l'Icere douloureux sur la langue, de longue durée — Langue chargée de mucasites épaisses, jaunâtres — Salive jaun itre. — Accumulation abondante d'eau à la bouche. — Sensation comme d'un cheveu à la racine de la langue et au voile du palais. — l'Icère croûteux au palais, laissant une cicatrice déprimée.





KALI BICHROMATICUM.

Gerge. — Grande sécheresse de la langue, forçant à avaler continuellement de la salive. —Elancements pressifs dans la gorge, en avalant et en parlant. --- Pendant la déglutition de substances sèches, sensation fréquente comme s'il en restait quelque chose dans la gorge. - Sensation comme s'il y avait un corps étranger dans la gorge, quelquefois jusque dans l'estomac, comme si les aliments s'y étaient arrêtés, surtout en rendant des rapports. — Grattement et rugosité dans la gorge.—Brûlement dans la gorge et l'œsophage. -- Rougeur cuivrée ou érythémateuse, opiniâtre, de la gorge et du palais. — Ramollissement de la paroi postérieure du pharyny, avec rougeur foncée, brillante, vaisseaux injectés et petites gerçures qui suintent du sang. — Rougeur et gonflement douloureux des amygdales et de la luette, suivis d'ulcération comme syphilitique. — Ulcères de la gorge, au voile du palais et à la luette, avec auréole rouge et suppuration jaunatre. — *•Ulcères syphilitiques dans la gorge.*

Goat et Appétit. - Goût douceâtre, métallique, cuirré, particulièrement aussi en fumant du tabac. — Goût de la bouche aigre, amer ou salé. -- Goût désagréable de l'eau. - Appétit sul, surtout le matin. - Répugnance pour les aliments, la viande et la fumée du tabac. — Soif prononcée, continuelle et même inextinguible. — Désir de bière ou de boissons acidulées. — Même après des repas pris avec plaisir, sensation comme si la digestion était nulle et que les aliments pesassent sur l'estomac comme un poids. - Souffrances d'estomac, même après les repas les plus légers. — Souffrances par l'usage du thé de Chine.

Castricismo. — Rapports d'air fréquents. — Hoquet fréquent. — Nausées fréquentes ou continuelles, particulièrement aussi en marchant, la nuit ou le matin, avec sensation de lourdeur dans la tête et les yeux. — Le manger diminue les nausées, mais les liquides paraissent les provoquer. Pyrosis, surtout après avoir pris du thé. Nausées avec romissements, le plus souvent muqueux ou bilieux, amers et jaunâtres. — Vomissement de mucosités et de sang. — Vomissement des aliments ingérés, particulièrement aussi après le déjeuner. — Pendant les vomissements, vertiges, brûlement dans l'estomac et sueur d'angoisse.

Estomac. — Presnon, plénitude et ballonnement de l'estomac, surtout après le repas. - Grand malaise dans l'estomac, avec dégoût, inquiétude, nausées et chaleur. — Gastralgie nocturne. - Inflammation de la muqueuse de l'estomac, avec plaques rouge brunâtre. - Ulcères, suppurations et désorganisations

gangréneuses dans l'estomac.

Ventre. — Pression et élancements dans la région hépatique. — Inflammation et ramollissement du foie. — Elancements forts dans la région splénique. — Colique crampoide, constrictive, avec nausées et suivie de selles en forme de bouillie. — Tournoiement et tortillement dans le ventre, par le moindre courant d'air.



KALI BICHROMATICUM

378

- Coliques avec douleurs comme si l'on perçait les intestins.

Ventre ballonné, tendu - Flatuosites abondantes. Inflammation, ulceres, suppuration et ramollissement de la muqueuse des intestins.

Selies et Anus. Constipation continuelle, opinuitre, parfois avec coliques. — Selles rares, dures, noucuses, avec chute du rectum. Selles pales, couleur d'argile, avec d'uleurs l'epatiques. — Diarrhée aqueuse, comme un terrent, suivie de tenesme et de vomiturition violente, avec brulement dans le ventre.

Selles dyssenteriques, avec evacuations sanguin dentes, ou avec selles aqueuses, brunatres et couneuses, accompagnées de ténesme, vomiturition et coliques. Tenesme fréquent et épreintes dans l'anus, avec soulagement par l'emission de vents.

Douleur violente, comme par une cheville, dans l'anus — Dou-

leur d'excornation dans l'anus, rendant la marche tres d'uloureuse.

Voies urinaires Brulement dans l'urethre, pendant et hors le temps de la mietion Inflammation, ramellissement, obseration, suppuration et autres lessons organiques des reins. - Envie frequente d'uriner. Mietien nocturne, abondante. Urines rouges, parfois avec douleurs qui traversent le dos. Depot blanchêtre, ou épais et muqueux, dans les urines. - Emission des urines complétement supprimée, jusqu'à la mort.

Parties viriles. — Prunt dans les poils, avec cruption de petites pustules tres-serrées sur une petite plaque circonscrite. Croutes

Régles et Parties de la fomme. Douleur d'excoriation, rougeur erythemateuse et gonflement du vagin. Regles en avance, avec vertiges, degeut, sensation febrile et mal a la tête. Leucorrhée jaunatre, epaisse, avec douleur et faiblesse aux reins et malaise dans l'épigastre.

Laryax, - Enrouement et raucité, particulierement aussi le soir et le matin au réveil. Douleur d'excornation au larynx. -Beaucoup de chaleur dans la garge arec excitation a la toux. Toux par chatouillement dans le larynx, le plus souvent avec expectoration épaisse, abondante, on avec crachement de sang. - Expectoration épaisse, blanche en blanc bleuatre, par la toux. Toux excitee par le manger. Bronchite chronique, à la suite de respiration de vapeurs arsénicales. Tou e matulinale, avec expectoration visqueuse - *Tona opiniatre avec expectoration muqueuse et rale dans la potreur. Avant la toux, ballonnement dans l'estomac et nausees. — En toussant, douleur dans les côtés et les lombes Expectoration jaunaire, d'un goût de pus, douceafre. Apres avoir tousse, vertige violent avec douleur dans le sincipid. Masses polypouses dans les bronches. Fausses membranes dans le larynx et la tracheeartere. - *Toux avec douleur dans un point de la poitrine, comme par un nicère.



KALI BICHROMATICUM. - KALI CARBONICUM. 379

Poitrins. — Dyspnée, parsois avec douleur de poitrine et tour sorte. — Haleine courte, comme par une constriction de l'épigastre qui couperait la respiration. — Endelorissement de la poitrine en respirant prosondément. — Pression et pesanteur sur la poitrine, comme par un poids, particulièrement aussi en se réveillant. — Pression dans la région du cœur. — Douleur sixe dans la région de la pointe du cœur. — Battement de cœur violent, avec pression pénible. — Hypertrophie du cœur.

Treno. — Douleurs violentes dans le coccyx, ainsi que dans les lombes et le sacrum, augmentées parfois par la toux, la respiration et le mouvement. — Élancements dans la région néphritique. — Pustules et furoncles au dos. — Roideur de la nuque. — Déchirement et tiraillements dans un côté du cou, venant de la

tête.

Extrémités supérieures. — Douleur rhumatismale dans les épaules. — Pustules aux bras. — Brûlement aux avant-bras, comme par l'eau bouillante. — Déchirement et tiraillement dans les os de l'avant-bras et de la main. — Grande faiblesse, comme paralytique, dans les mains. — Douleurs rhumatismales dans les doigts. — Pustules à la naissance des ongles, se répandant de là

sur le dos des doigts et des mains.

Extrémités inférieures. — Douleurs rhumatismales dans les hanches, surtout pendant le jour et le mouvement. — Fortes douleurs dans les articulations des genoux. Déchirement dans la jambe, avec tressaillement des membres. — Douleur ostéocope dans le tibis. — Gonfiement du tendon d'Achille. — Douleur de luxation dans l'articulation du doigt. — Douleur au talon en marchant. — Ampoules faciles, en marchant. — Brûlement des pieds, surtout à la plante. — Douleur d'excoriation au gros orteil, à l'endroit où l'ongle touche la chair.

KALI CARBONICUM.

EAL. — Sous-carbonate de potasse, sel de tartre. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prip. Voy. Pharmac. homosp., p. 109. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 30 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES . Camph. coff. nitr-spir.


Companer avec Amm. amm m. ors bor. bry. calc. camph. carb-veg cham. chin: coff. graph laur. magn. natr-m. nur ac. n-vom. phos. puls. rhus. sil. sulf — G'est surtout apres: Lyc. natr-m. nur.ac., que le kali se mentre parfois efficace, a'il est d'ailleurs indiqué. — Après le kali conviennent parfois: Carb-veg. phos. et beaucoup d'autres.

on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hydropiques, Anasarque, Affections rhumatismales et arthritiques; Prialysies; Engorzina ut des glandes; Acces dévanoussement et de tublesse hysterique, Paul lesse par suit que pertes débilitantes. Privres le résisé, Mizra ne Tenne Loupes et a tetes, Ophthalm. Amblyope et auretique, Privit te; Purcte de l'ouie, Ontre et otorrhée, Prosopalei. Dispose en ou avec vousse un ut des al units, Gastralgie, Deumes en pet ques nequitienent que 2, Philose he patrique. Carques sprinchques, Ascite Ameniar hier et dysmenie des jounes filles expresse uter rene a Plearies e, philh sie tuberrendeuse. It is uno entre et dysmenie des paines filles expresse at the a spasse lique; Maux ce yous par suite l'une enuit. Prodromes et suites d'accestement. Affections du cour,

Prop. la note, psg. 15

SYMPTOMES GENERAUX. - Sensibilité doulourense des membres, quelque position qu'on leur fasse prendre. — Douleurs pressives dans les articulations. - *Contraction spasmodique de quelques parties. — *Douleurs tractives et déchirantes dans les membres, surtout pendant le repos, avec gonflement des parties affectées et avec grande faiblesse et frissons après l'accès, -Douleurs lancinantes dans les articulations, les muscles et les organes internes. - Gonflement et dureté des glandes. - *Souffrances hydropiques des organes internes, ou de toute la peau du corps. *Les douleurs se manifestent souvent vers 2 heures du matin, et sont plus fortes alors que le jour, pendant le mouvement. - Le séjour au grand air aggrave beaucoup de souffrances (surtout les symptômes fébriles), tandis que quelques autres s'y trouvent soulagées. - Accès de spasmes et treasoillements convulsifs des membres et des muscles. - Attaques d'épilepsie, par accès nocturnes. — Facilité à se donner des tours de reins. - Disposition des membres à s'engourdir, lorsqu'on est couché dessus. - Paralusies. Sensation générale de vacuité dans tout le corps, comme s'il était creux. - Pesanteur et paresse. - Faiblesse comme si on allait perdre connaissance, et tremblement surtout après une promeuade. — Accès de faiblesse, arec nausées, sensation de chaleur et de lassitude au creux de l'estomac, vertiges et étourdissement. Fort bouillonnement du sung, avec battement dans toutes les artères. Horreur excessive du grand air et des courants d'air. -- *Grande desposition à se refroidir, surtout après un exercice échauffant.

Peau. — Sensibilité douloureuse de la peau, comme si elle était ulcérée. — Peau sèche, avec impossibilité de transpirer. — Sensation de brûlure, ou prurit brûlant et lancimant à la peau. — *Taches pruriantes, brûlantes, jaunes ou rouges sur le corps quelquefois avec suintement après s'être gratté. — Miliaire urti-



KALI CARBONICUM

331

carre - Vesicules rongeantes. Engelures d'un bleu rongeatre. - *Verruex - Dartnes. Sarguement des ulceres, surtout la muit.

Sommeil. - *Forte enen de dormer le jour et le soir de bonne heure. Demi-mm-1 is nuit. On s'endort tard - Pendant le sommeil trescuillement, pleurs, paroles et surauts avec effroi - *temmeil agite, arec réces frequents, anxieux et effrayants - Reves de brigande, de merts, de dangere de serpents, de mala lies, de spectres, de diables, etc. - La nuit, acces d'anguisse, souffrances gustriques, douleur à l'esternac et à la region precordiale, collega s, flatuesites, diarrhee, erections et poliutions frequentes, souffrances asthmatiques, cauchemar et crampes dans les mollets.

Pièvre. - Frisann, le sonr avec seif, souvent accompagne de maux de dents Frison immediate in at apres les douleurs. - Horripilation frequente le jour - (haleur le matin, au lit, avec douleurs aux reins et dans la petrine. Manque de transpiration et impossibilité de transpirer, on bien forte disposition à transpirer pendant un travail intellectuel, ou pendant la marche.

Sucurs noclurnes.

Moral. Tristesse avec pleurs. Apprehension anxieuse et inquietude, surtout sur sa sante, avec crainte de ne pas guerir. Irresolution, timidite et caractere peureux. Peur le soir, au lit Humeur acariatre, mecontentement et impatience. - Humeur changeante : tantot deuceur et tranquillite, tautot emportement et colere. - * Disposition à d'effrayer * Humeur irascible et colere. - *Perte de la memoire. On se trompe de mots

et de syllabes. Perte subite de connaissance.

Têto. - * Embarras et bebetade a la tête. - Vertiges le matin, le soir et après le repas, ainsi qu'en tournant promptement la tête ou le corps. - Virtige avec chancellement. - Vertige qui semble proventr de l'estemac. *Mal de tete par le mouvement de la costure, en etermant, en toussant, ou le matin. - *Mal de tête semi-latéral, avec nausces et vomissements, aggravé jusqu'a devenir insupportable au mouvement le plus lèger. - Mal de tete violent a travers les yeur. - *Maux de tête pressifs a l'occiput, surtout pendant la promenade, avec irritabilité, ou bien dans le front avec photophobie - Douleurs dechirantes et tractives dans la tête. Maux de tête lanemants, principalement dans les tempes - *Congestion a la tetr, avec battement et bourdonnement. Tremblement dans la tête, et sensation comme si elle contenait que que chose de mobile. Les maux de tête sont soulagés en appuyant le frent. Sensation, comme d'un coup dans la tete, qui la fait pencher de côté, avec etourdissement. -*Forte disposition a se refroidir la tête. - Tumeurs douloureuses et purulentes au cuir chevelu. Eruption crouteuse au cuir chevelu. - *Chute et sécheresse des cheveux. - Le matin,



KAIT CARBONICUM.

383

sueur au front. Grande tache jaunatre et furfuracée au front.

Yeux. Douleur pressive et déchirante dans les yeux. Sensation mordicante, cuissan, sensation de brûlure et elancements dans les yeux. CSensation de froid aux paupieres Rougeur et inflammation des yeux, avec douleurs en lisant à la lumice des bougies. *Gonflement des yeux et des paupières, avec difficulté de les ouvrir. *tionflement comme un sac au-dessus des yeux, entre les sourcils et les paupières. Excometion et suppuration aux angles des yeux. *Agalutmation des paupières, le matin surtout. *Larmoiement. Leux ternes, abattus. Propension à la fixité du regard. -- *Taches voltigeantes devant la rue, en lisant et en regardant en plein air. Coul urs d'arc-enciel, taches et étincelles devant la vue. - Clarte vive et douloureuse dans les yeux, lorsqu'ils sont fermes, s'etendant profondément dans le cerveau, le moir, après s'être couche. Photophobie. *Eblouissement des yeux par la lumière.

Oreilles. Elancements dans les oredles, quel presois du dedans au dehors. Oreilles froides Gonflement inflammatoire des oreilles, avec écoulement de pus ou de cérumen liquide I le le dans les oreilles. Executation et suppuration derrière les oreilles — *Inflammation et gonflement des parotides. — Acuté excessive de l'ouie, le soir en se couchant. *Onie faible et confuse. Chant, tintement et bourdonnement dans

les oreilles.

Nez rouge, couvert de boutons. *Ulcération de l'interieur du nez. Epistaxis, le matin. — *Odorat emousse. *Coryra et obturation du nez, quelquefois avec sécrétion de mucosites vert jaunâtre, et manque continuel d'air. — Coryra fluent, avec secrétion de mucosités sanguinolentes. Sécrétion de mucosites puru-

lentes par le nez. Secheresse du nez.

Visage. *Conleur de la face, jaune ou pâle et maladive, avec yeur abattus et cernes. Forte rongeur de la face, alternant avec paleur *Douleur tractive a la face. Dechirement dans les os de la face. *Chalcur fugace a la face. *Bouffissure a la face. Eruption de boutons à la face, avec gontiement et rougeur des jones *Gontiement entre les sourcils et les paupières.

*Boutons dans les sourcils. - Vermes a la face. Le phelides.

Levres epaisses et ulcerees. Levres crevasse es et qui s'exiolient - Levres pâles. Sensation crampoide dans les levres. - Crampes de la machoire. Gontiement de la machoire inférieure

et des glandes sous-maxillaires.

Dents *Odontalgie seulement en mangeant, ou le matin, en so reveillant, ou bien provoquée par les choses froides (l'eau).

Udontalgie avec endolorissement des os de la face, et douleurs tractives, tressaillantes, ou déchirantes, surtout le soir au lit.'—



388

*Maux de dents lancinants, avec gonflement de la joue. — Fouillement, térébration, picotement et rongement dans les dents. — Gonflement inflammatoire et ulcération des gencives.

Bouche. — Exhalaison fétide par la bouche. — Sensation de sécheresse dans la bouche, avec accumulation abondante de salive. — Excoriation et vésicules dans l'intérieur de la bouche et sur la langue. — Gonflement de la langue.

Gargo. — Mal de gorge avec douleur lancinante, en avalant. —
Déglutition empêchée, comme par inertie des muscles du gosier.

- *Accumulation de mucosités abondantes au palais et dans

la gorge. — *Renáclement de mucosités.

Appétit. — *Goût amer ou acide. — *Mauvais goût dans la bouche, comme par dérangement de l'estomac. — Goût putride, donceitre, ou comme si l'on avait du sang dans la bouche. — Boulimie. — *Forte appétence pour le sucre ou les acides. — Horreur du pain noir; it pèse sur l'estomac. — Le lait ne convient pas. — Après le repas, envie de dormir, pâleur du visage, frisson, mal de tête, mauvaise humeur, nausées, renvois aigres et pyrosis, co-liques, ballonnement du ventre et fiatuosités. — Après avoir pris des aliments chauds (de la pâtisserie ou de la soupe), pincements et inquiétude dans le ventre.

Intomas. — Renvois fréquents. — *Renvois et régurgitations aigres. — Pyrosis. — Nausées, jusqu'à faire perdre connaissance, quelquefois pendant le repas. — *Nausées anxieuses avec envie de vomir, surtout après le repas, ou après une émotion morale. — Vomiturition le soir. — Vomissement des aliments et de matières acides, avec prostration des forces comme si l'on allait tomber en défaillance. Vomissement nocturne des aliments. — *Plénitude d'estomac, surtout après le repas. — Pression à l'épigastre. •Tension au-dessus de l'estomac. — Crampes d'estomac, contractives, renouvelées par tous les aliments et toutes les boissons, ou bien la nuit avec vomissement. — *Pincement, fouillement et élancement à l'estomac. — Lancinations à l'épigastre et dans les hypocondres, qui suspendent la respiration. — Pulsations à l'épigastre.

Ventre. — Douleur au foie en se baissant, comme s'il était foulé.

Douleur brûlante, pression et élancements dans le foie. —
Pression et élancements dans la région des reins. — Maux de
ventre avec renvois fréquents. — *Pression dans le bas-rentre,
**Osurtout en se baissant. — Fort ballonnement du ventre, surtout après le repas. — Inquiétudes et *pesanteur dans le ventre.

— Epasmes abdominaux, contractifs et spasmodiques. — Coliques ressemblant aux douleurs de l'enfantement, quelquefois
avec maux de reins. — Élancements dans tout le ventre. —
*Inertie et *froid dans le ventre. — Gonflement hydropique du
ventre. — Traction et élancements dans les aines. — Production abendante et *incarcération de flatuosités. — *Émission de

8



KALI CARBONICUM.

flutuosités nulles ou *commodérée, quelquefois precedes de douleur

pressive dans le rectum.

384

Selles. *Constipation, quelquefois tous les deux jours. - *Resserrement du ventre, et évacuation difficile d'excrements d'un moule trop volumineux. - *Inactivité du rectum - Envie inutile d'aller à la selle et selle insuffisante. Diarrhées, le plus souvent le soir et la nuit avec tranchées et grand accablement physique. - Écoulement de mucosites ou de sang peudant les selles. - Sortie de ténia et de lombries. - Avant la selle, annieté. - *Prurit à l'anus. - Douleurs dechirantes, lancinantes, incisives et brûlantes à l'anus (et au rectum), surtout après les selles. - *Boutons hémorrhoidaux de l'anus, douloureux, saignants et avec douleur lancinante. - Excoriation et éruption pustuleuse à l'anus.

Urines. — *Enrue fréquente d'uriner et émission peu abondante d'une urine enflammée. - *Émission frequente d'urine, jour et nuit. — Douleurs incisives dans la vessie, de droite a gauche. —

Sensation brûlante dans l'urêthre, surtout en urmant.

Parties viriles Tension, dechirement et tiraillement dans le gland et la verge. Prurit et douleur de meurtrissure au scrotum. *Gonflement chaud des testicules et du cerdon spermatique. — *Exaltation excessive on absence de l'appetit venerien. — *Répugnance pour le coit. *Défaut d'érections ou erections par trop frequentes et douloureuses. *Absence de pollutions ou pollutions immodérées *Après le coit et les pollutions,

faiblesse du corps, omais surtout des yeux.

Règles. Répugnance pour le coît chez la femme. - Peudant le coît, procement et douleur d'execriation dans le vagin. - Sensation continuelle comme si tout se portait vers les parties génitales. Douleur brûlante et élancements dans la rulee.

"Erosion, "prurit et rongement aux parties genitales et a l'intérieur des parties. - "Regles trop hâtires ou trop faibles.

"Suppression des règles. - Ecoulement de sang chez les femmes enceintes. -- "Sang menstruel, corrosif.

*Pendant les règles, éruption pruriante et excornation entre les cuisses. - Symptomes gastriques et sommeil agité et anxieux, pendant les règles. - *Leucorrhée, quelquefois avec maux de reins violents et douleurs comme celles de l'enfantement - Leucorrhée jaunatre avec prurit et sensation de

brûlure a la vulve.

Larynx. *Enrouement et raucité dans la gorge, avec éternument violent. — Aphenie. — Enrouement facile. — Sensation comme s'il y avait une cheville dans le larynx. — Toux en remuant les bras (en jouant du violon). — Toux provoquée par un chatouillement. — Toux sèche, surtout la nuit et le soir, le matin. avec expectoration. — Toux crampoide, avec vomiturition et vomissement surtout le matin. En toussant, élancements dans la gorge ou



KALI CARBONICUM.

885

la poitrine. — Expectoration difficile par la toux. — Hepectora-

tion purulente par la toux. - Coqueluche.

Poitrine. — *Respiration difficile. — Haleine courte, le matin. — *Respiration génée *en marchant vite ou le matin. — *Asthme spasmodique. — Oppression anxieuse de la poitrine. — Suspension de la respiration, la nuit. — *Sifflement dans la poitrine. — *Oppression de postrine, comme par hydrothorax. — Douleur dans la poitrine, en parlant. — *Crampe de poitrine, *quelquefois en toussant. — Sensation dans la poitrine, comme si le cœur se contractait. — Pression, douleur brûlante et élancements à la poitrine, quelquefois en respirant. — Douleurs incisives dans la poitrine. — Battement de œur (quelquefois avec angoisse), surtout le matin, en se réveillant avec ébullition de sang.

Tronc. - *Maux de reins, °aussi après une chute. — Douleur de meurtrissure dans le dos, pendant le repas. — *Douleur tractive dans le dos, qui souvent provient des reins. — *Roideur entre les omoplates. — *Roideur de la nuque. — °Faiblesse des muscles du cou. — °Goître. — Gonflement dur des glandes axillaires et de celles du cou. — Sueur sous les

⊾isselles.

Bras. — Gonfiement de l'épaule, avec douleurs. — *Pression sur l'épaule. — Tension, déchirement, tiraillement dans les muscles et les articulations des épaules, des bras, des mains et des doigts. — Froid, enroidissement et *engourdissement des bras, surtout au froid, ou après un exercice violent. — *Manque d'énergie dans les bras — et les mains, surtout le matin, au lit. — Tressaillement fréquent dans les bras. — *Roideur de l'articulation du coude. — Douleur paralytique dans le poignet. — Élancements dans le poignet et les doigts, pendant le mouvement. *Tremblement des mains en écrivant. — Mains froides. Peau des mains râpeuse et gercée. — Torpeur et engourdissement du bout des doigts. — Douleur brûlante dans le bout des doigts. — Vésicules rongeantes aux doigts. — Tressaillements dans les doigts en cousant.

Jambes. *Tiruillements aigus, surtout la nuit, dans les articulations et les os des hanches, des jambes, des pieds et des orteils.

— *Tiruillements pressifs et déchirements dans les jambes. —

Tressaillement des muscles dans les fesses et les cuisses. — *Douleur brûlante et élancements dans les jambes et les pieds. —

Inquiétudes dans les jambes, le soir. — Torpeur et engourdissement des jambes. — "Horripilation fourmillante sur le tibia. —

"Gonflement des jambes et *des pieds. — *Roideur de l'articulation du pied. — Elancements dans les articulations du pied. —

*Froid aux pieds, même le soir, au lit. — Engourdissement des pieds après le repas. — *Sueur "fétide des pieds. — Donleur brûlante et *élancements dans la partie charnue du gros orteil. —

"Com aux pieds, douloureux au toucher.

JARR. - Stdit , Im part., t. f.



KALI CHLORICUM.

386

KALI CHLORICUM.

KAL-CH. — Chlorate de potasse, muriale exygéné de potasse — Archives de STAPF. Hist, nut et prep Voy. Pharma: homeop, p 111. Doses untees 1, 5, 30 Durée d'action : plusieurs semaines, dans des affections chroaiques

ANTIDOTES Bell puls. 9

COMPARER AVEC. Amm. arn, bell. colc. cocc. kal. patr-m. mtr.


CLINIQUE. Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce medicament contre : - Affections scorbutiques, Obstructions dans les visceres abdominant et souffrances hémorrhodales?, Prosopulgie; Mélancolie?; Souffrances asthmatiques?; etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Tiraillement et douleurs dechirantes dans les membres. Tressaillements fréquents au corps, et surtout a la tete Grande faiblesse et lassitude. Prurit par tout le corps, surtout le soir au lit. - Eruptions miliaires. - Boutons pruniteux. Forte disposition frileuse, frissons continuels et horripilation, parfois avec enroidissement des mains. Froid continuel aux pieds. Pouls frequent et accelére. Sommed agité, parfois avec ronflement bruyant, forte gène de la respiration et couche sur le dos Rêces lourds, anxieux ou penibles. Rèves de prediction de la mort ou d'une mort par suite d'une fievre typhoide; rêves lascifs, avec pollutions Mauvaise humeur et anxiete, avec tension a la region precordiale, amélioree apres avoir saigne par le nez. Humeur triste, apathique, avec dégout de la vie et frissonnement, surtout le soir. Tôte Nez. Tête entreprise et embarrassec. Vertige avec congestion de sang a la tête, apres des exercices forces. La biere et le vin enivrent facilen ent un seul verre suffit pour faire perdre la raison. Maux de tete continus, surtout le soir. -Mal à la tête, avec vertiges. - Douleurs dans les lempes ou à l'occiput, se propageant parfois jusqu'aux machoires. Tension dans le front, survie parfois de coryza et d'eternument. Congestion de sang aux yeux. Pression, elancements et crampes dans les yeux. Flammes et et.ncelles devant les yeux, en toussant et en etermant - Coryea violent, avec eternument fréquent, et secretion ab adante de mucosites. Saignement de nez, même la nuit.

Pace Dents. - *Douleurs tructives, crampoides, tensives, pressures et tiruillantes dans les muscles et les os de la face. Elancements dans la face. Chaleur passagère au visage.

3



KALI CHLORICUM. - KALI HYDRIODICUM.

387

— Éruptions de boutons à la face, au front et entre la lèvre et le menton. — Gonflement des lèvres. — Agacement des dents. — Mal aux dents de la machoire supérieure. — Saignement des gen-

cives. — Gencives d'un rouge pâle.

Botohe — Metomac. — Sensation de froid à la langue et dans la gorge. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Sécrétion abondante de salive et de mucosités dans la bouche. — Salive acidulée. — Sécheresse, grattement et àpreté dans la gorge. — Déglutition difficile. — Goût de la bouche acide, amer, salé, ou empyreumatique. — Accès de boulimie, soulagés parfois en buyant de l'eau froide. — Renvois d'air fréquents.—Renvois aigres. — Pression dans l'estomac et la région précordiale, parfois avec besoin de faire des renvois ou avec humeur apathique et frissonnement. — Sensation de chaleur ou de froid dans l'estomac. — Douleurs incisives dons la région stomacale.

Ventre—Parties génitales. — Mouvements fréquents dans le ventre, avec disposition à la diarrhée. — Flatuosités abondantes. — Selles tardives, dures et sèches. — Selles liquides, diarrhéiques, parfois muqueuses. — Diarrhées douloureuses. — Envie fréquente d'uriner. — Urines troubles. — Érections fréquentes, violentes. — Pollutions fréquentes, avec rêves lascifs. — Prurit

au scrotum et dans l'urèthre.

Poitrine — Membres. — Enrouement. Tour violente, parfois avec coryza. — Toux, comme provoquée par la vapeur du soufre, avec sécheresse dans la gorge et dans la poitrine. — Oppression de poitrine, avec sensation de constriction. — Congestion de sang à la poitrine. — Battement violent de cœur, parfois avec oppression de poitrine et froid aux pieds, ou avec sensation de froid dans la région du cœur. — Douleurs tractives et déchirements dans les avant-bras et les poignets. Froid extraordinaire au bras. — Envies enflammées aux ongles. — Phlyctènes et boutons pruriteux au dos des mains. — Douleurs lancinantes, violentes, au genou.

KALI HYDRIODICUM.

RAL-H. — Hydriodate de potasse.—Hantlaus et Trints. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 112. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs déchirantes dans les membres. — La plupart des symptômes se manifestent pendant le repos et se dissipent par le mouvement. — Baillements trèsfréquents. — Insouncie. — Nuits agitées, avec réveil en sureaut et effroi. — Prédominance de froid ou frissons, avec soil. —



KALI HYDRIODICUM.

Inquietude le soir, avec envie de pleurer, comme si l'on s'attendait a quelque malheur. Disposition a s'effrayer. Irascibi-

lité, emportements et humeur querelleuse.

388

Tôte Nez. — Pesanteur de la tête, avec humeur chagrine; on ne sait ou reposer la tête. Violents maux de tete, compressifs ou expansifs, avec sensation de froid à la partie doulourense, qui est chaude rependant. ('reusement ou battement d'un seul côte du front, - Douleur d'ulcération au cuir chevelu, en grattant.

Douleur brûlante dans les yeux, avec photophobie. Vue indistincte. Otalque avec douleurs lancinantes, dechirement et grande sensibilité de l'oreille. Douleurs dechirantes dans le visage, avec gouflement de la joue — Pâleur du visage. — Dartres sèches, pruriantes sur la joue. — Grande sensibilité des narines — Déchirement et douleur brûlante dans les narines. — Lipistaxis. — Obturation du nez, avec soulement de sérosités corrosives et brûlantes.

Face — Appetit — Lèvressèches, gercées et enduites, le matin, de mucosites visqueuses — Douleur d'ulceration dans les dents, la nuit. — Odontalgie aggravée par le contact de quelque chose de froid, soulage e par les choses chaudes. — Gencives gonflées, avec douleur d'ulcération lancinante — Vésicules brûlantes et doulou-reuses sur la langue. — Salive sanguinolente, avec bouche mauvaise — Exhalaison par la bouche d'une odeur fétide, comme celle de l'oignon. — Mal de gorge lancinant pendant la deglutition, tantôt avec pression, tantôt avec douleur d'ulcération. — Amertume, ou amertume de uceâtre dans la bouche. — Goût rance, après tout aliment et toute bosson — Insipidité des aliments. — Disposition continuelle à rendre de l'eau par la bouche, comme des pituites, avec repugnance pour tous les aliments.

Estomac et Ventre. Sensation de vacuite et de fadeur dans l'estomac; qui ne s'apaise pas par les aliments Gloussement, sorte de cris et borborygmes dans l'estomac. Pression brûlante à l'estomac, qui ne se laisse pas soulager par des renvois. Don-leurs abdominales, brûlantes, incisives, dans la région ombilicale avec sensation de fadeur dans l'estomac et renvois, en rentrant de la promenade au grand air. Ballonnement douleureux du ventre. Borborygmes dans le ventre, comme par quelque chose de vivant. Pression et sensation comme si tout se pertait vers les aines, ou serrement comme par une griffe à ces parties, comme si quelque chose allait sortir par le vagin. Traction dans la région lombaire, comme s'il y avait dedans quelque chose de vivant.

Selles Régles. Selles dures, tenaces, difficiles a evacuer.

Diarrhée avec maux de reins, comme s'ils étaient brises, ou comme si les règles allaient paraître. Envie pressante d'uriner, avec emission abondante jour et nuit. Règles plus abondantes.

- Leucorrhée acre, qui excorie la peau.

Larynx et Membres. - Toux sèche, provoquée par une irritation



KALMIA LATIFOLIA.

des symptômes de la tête vers le soir. - Mal de tête avec vertiges et nausées.

Youx. -Obscurcissement fréquent des yeux, surtout en regardant en has, avec nausées et renvois. - Vue trouble. Clancements et prurit dans les yeux; les yeux souffrent plus le

Oreilles. - Elancements dans les oreilles - Tintement d'oreilles. Nez. — Nez souvent bouché, surtout le soir. — Ecoulement du nez

avec éternument fréquent et odorat tres-seusible.

Face. — Paleur de la face. — Peau rugueuse des joues, chaque été: la nuit, prurit à la face. *Declurements et elancements dans les os de la face et les máchoires, oprosopalgie de Fothergill. -Lècres : sèches et gonflées, roides, le matin; gercees, avec sécheresse de la peau du corps.

Dents. - Douleurs surtout dans les dents supérieures; douleurs qui, de la tête, passent dans les molaires supérieures et les œil-

lères.

390

Bouche et Gorge. Langue blanche, sèche. Elancements dans la langue. -- Inflammation des glandes sublinguaires; salive augmentee, immédiatement après le repas, fourmillement dans les gland salivaires, avec fermentation dans le gosier. - Dans la gorge, ascension continuelle de mucosites; sensation d'une boule qui remonte ou d'un genflement; grattement et apreté, avec endolorissement en avalant et battement dans les amygdales; pression avec nausees et élancements dans les yeux; déglutition difficule, parfois avec gorge seche et soif.

Gastricisme. - Nausées; avec vertiges et mal à la tête; avec obseurcissement des yeux; pendant la douleur à la gorge, les flatuosités incarcérées, l'oppression de poitrine et les douleurs dans les membres. - Régurgitation comme une sorte de rumination. avec beaucoup de bile Vomiturition continuelle. (Souffrances


gastriques et délire.)

Estomac. -- Estomac embarrassé, avec sensation de chaleur intérieure, preotement dans la peau, sueur modérée, puis envie de dormir, vertige et vue obscurcie; sensation de contraction dans l'estomac, et d'une boule remontant la gorge, avec renvois, brulement dans la région stomacale. - Dans le creux de l'estomac. pression, aggravée en étant assis courbé, ameliorée en étant assis droit, avec la sensation comme si, au-dessus du creux, quelque chose allait être écrasé.

Ventre. — Dans la région hépatique, douleur et pression. — Pouleurs dans le côte droit du ventre. - Incarcération des flatuosités, avec nausees. - Sensation de faiblesse dans le ventre, comme dans la matrice, remontant jusqu'a la gorge, et disparaissant

quelquefois par des renvois.

Belles et Anns. - Selles molles. Diarrhées?. - Dyssenteries?. Urines. — Emission fréquente d'urines jaunatres, plus abondantes.



KALMIA LATIFOLIA. — KREOSOTUM.

391

Règles. — Menstrues insuffisantes et tardives, avec douleurs dans le dos, les lombes et les cuisses. — Leucorrhée jaunatre.

Larynx. — Chatouillement dans la trachée; bruit, en respirant, comme par un spasme dans la glotte. — Toux jour et nuit, excitée par un grattement dans la gorge; avec expectoration muqueuse, le soir : avec expectoration facile, de matières grisatres, lisses comme de la graisse, d'un goût putride et sale, et tombant en

morceaux, en les étendant.

Poitrine. — Oppression de la poitrine et dyspnée, surtout pendant les douleurs rhumatismales, ou les nausées; oppression et courte haleine, forçant involontairement à respirer vite. — Elancements dans la partie inférieure de la poitrine. — Affections chroniques et aigués des poumons. - Battement de cœur ; hypertrophie du cœur, avec épaississement des valvules, par suite de rhumatismes aigus.

Trons. — Sensation de paralysie douloureuse dans la région sacrale, le soir, au lit. — *Douleurs violentes dans le dos, les lombes, l'épine dorsale et les vertèbres. — Pression, élancements et tiraillement, dans les côtés du cou; douleur dans les vertèbres de la

Membres thoraciques. — Douleurs, pression, déchirement dans les bras, les épaules, les mains, surtout à gauche; douleur para*lytique dans la main,* tant à gauche qu'à droite.

Eembres pelviens. - Douleurs surtout dans les genoux et autour. - Douleur de foulure dans les pieds. - Elancements dans la plante des pieds et les orteils.

KRE080TUM.

KRE. — Kréosote. — Warle. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. honthop., p. 114. - Doser usitées : 6. 30. - Durée d'action : 4 à 5 jours.

ANTIDOTES : N-vom iod.? Cham.

COMPAREA AVEC : Arn. cham. chin. hep. iod. merc. mur-ac. nitr-ac. n-vom. petr. phos-ac. puls. sil. sulf.

CLINIQUE. -- Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra conserver ce médicament contre : - Affections rhumatismales et arthritiques, même avec gonflement?; Affections scrofuleuses; Hémorrhagies; Éruptions galeuses ?; Suppurations ?; Ulcères gangréneux, carcinomateux, putrides, etc.?; Blessures?; Excoriations?; Écorchure des malades alités?; Dartres farineuses et pustuleuses; Teigne?; Plique polonaise??; Blépharophthalmie; Ophthalmies; Couperose; Dartres faciales; Odontalgies; Affections scorbutiques des gencives?; Hémorrhagies nasales et buccales?; Angines, avec ulcération??; An-



KREOSOTUM.

392

gines syphilitiques??; Mal de mer; Dyspepsie?; Gastralgie?; Dyssenteries?; Pissement au lit, par suite d'un sommeil trop profond, Nausées des femmes enceintes, bouffrances à la suite d'un cancer a la matrice; Métrorrhagies; Dysmenorrhee. Leucorrhees; Disposition à l'avortement; Catarrhes chroniques, principalement chez les personnes âgees; Grippe; bouffrances phthusiques?, Hemoptysie?, Phthisie laryngée?; Maladies de cœur?; Maux de reins; Coxalgie, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Douleur d'excoriation et d'ulceration; sensation paralytique douloureuse; douleurs tiraillantes et lancinantes. Douleurs pinçantes et *clancements, surtout dans les articulations. Lassitude, lourdeur et *courbature dans tous les membres, surtout aux jambes. Secousses dans les membres, surtout la nuit en dormant. *Douleurs nocturnes. Accès d'evanoussement, le matin au reveil. Disposition a la défafflance dans une chambre chaude, avec chaleur du visage et haleine courte. — Accès de torpeur, avec paleur et fioid dans plusieurs parties, qui semblent alors comme mortes. Douleurs de meurtrissure ou de contusion — Sureveitation de tout le corps. Oliquietude par tout le corps, surtout pendant le repos. Les douleurs paraissent plus fortes pendant le repos.

Peau. — Prunt violent par tout le corps, surtout vers le soir et avec sensation brûlante aux bras et aux jambes, après s'etre gratté. Prurit brulant, nocturne, et chaleur par tout le corps. Éruptions urticaires — Éruptions de tuberosités semblables aux piqures de punaises, avec prurit violent, surtout le soir. — "Dartres farmeuses et pustuleuses, seches ou l'umides, mais avec

prurit violent a presque toutes les parties du cerps.

Sommeil. *Forte envie de dormer, avec buillements fréquents, parfois avec goût putride dans la bouche et manque d'appetit. Accès de baillement, avec frissons, larm rement, douleurs pressives au front, ou lassitude. *Beso n'eontennel de dormer Difficulté de s'endormer, par suite d'inquiétudes dans tout le corps, ou d'une sensation de fatigue, avec deuleurs dans tous les membres. *Sommeil agité, nvec jactation. Reveil frequent la nuit. Sommeil non reparateur, avec sensation paralytique dans tous les membres, au reveil I a nuit, maux de reins, frissons interieurs, pulsations a la tête, inquictudes dans tout le corps, douleurs pressives et brulantes dans les youx, agglutination des paupières, etc. En dormant, sursaut avec effroi *Réves /requents, anaiena, réves de neige, de claite, de peursuites, d'empoisonnement, d'amagrissement, de feu, d'érections, d'entre d'unine et de linge sale et degoûtant.



KREOSOTUM

394

trouble comme à travers un voile, ou comme s'il y avait du duvet devant les yeux.

Oreilles. Chalcur et rougeur brûlante des oreilles Gonflement inflammatoire de l'oreille, avec douleurs tensives, brblantes, ou meme avec reideur douloureuse du cou au este affecté, douleurs jusque dan l'épaule et le bras, chaleur au front et pression au-dessus des yeux. - Tiraillements et elancements dans les oreilles, ou douleurs crampoides, pressives et expansives Bourdonnement des oreilles, avec durcté de l'onie, alternant avec tintement et sifflement dans la tête. - "I partres humides aux oreilles.

Nes. Mauvaise odeur et fétidité devant le nez, parfois avec manque d'appétit. Le nez est constamment humide. Saignement de nez, même le matin; le sang est d'un rouge clair on séreux, on épais et noir. *Eternument frequent, surtout le matin. Coryza fluent avec sonsibilité douloureuse des fosses nasales, en respirant l'air. Coryza, avec sensation d'erosion sous le sternum. - *Coryza sec, avec cternument frequent

Face. - Chaleur fréquente et même continuelle du visage, parfois avec pulsation dans les joues et le front, et avec reugeur foncée de toute la face, envie frequente d'uriner. Couperose. Couleur grisatre, terreuse, du visage. Dartres furturacees aux joues, aux paupières et autour de la bouche. Douleur tractive, aigue, au roté droit du visage, depuis la machoire jusqu'a la tempe - Secheresse des levres, comme par une chaleur interieure. Boutons pustuleux au menton et a la joue; ils se couvrent de croutes jaunatres.

Dents. *Douleurs tractives et tiraillements successifs dans les dents, même le matin au réveil, et parfois avec douleurs dans le côté malade du visage, jusqu'a la tempe Allongement des dents Rougeur inflammatoire des geneives.

Bouche et Gorge. - Langue pale et flasque, avec accumulation d'une salive sérense dans la bonche. - Secheresse continuelle dans la gorge, avec soif ardente et fréquente - Grattement et apreté dans la gorge Douleur d'excornation ou pression dans la gorge, en avalant. - Sensation d'etranglement douloureux au

fond du gosier jusque dans la portrine et le des.

Appetit et Estomac. Gout amer, surtout dans la gorge, et en avalant les aliments | Gout fade de la bouche | Perte entière de l'appetit, parfois avec langue pale et flasque, accumulation de salive dans la bouche et soif ardente. Renvois d'air et rapports sigres Nausées avec envie de vomr, sahvation et frissons par tout le corps, cu avec sensation brulante dans la boucle - "Vomiturition surtout le matin, à jeun, comme dans la grossesse, et parfois avec vomissement d'eau et de mucosites, secheresse du nez, chaleur et douleur pressive au front, soif et front aux mains et aux pieds. Vomissement d'eaux douceutres le matin a jeun.



KREOSOTUM.

396

Larynx. *Grattement et raucite dans la gorge, avec voix rauque et enrouee. — Toux sèche, excitée par un grattement dans la gorge, ou par un chatouillement dans les bronches. *Toux seche, sibilante. *Toux avec haleine courte. *Toux, le soir van lit. — Toux continuelle, avec sommeil et frissons, suivis de chaleur sèche. — Toux continuelle, rauque et creuse, excitée par une accumulation de mucosites dans la gorge, et avec expectoration facile de mucosites blanchatres, ou jaunatres, et epaisses — Les mucosités expectorées ont parfois un goût douceatre — *En toussant, emission involontaire d'urines, et ebranlement dans le ventre

Poitrine. - *Haleme courte, parfois avec sensation de lourdeur dans la poitrine, et besoin de respirer profondément, ou avec douleur de meurtrissure dans la poitrine, en respirant. -- *Respiration difficile, anxieuse. *Elancements violents dans la poitrine, a la région du cœur, dans les cotes et dans les intercostaux, parfois en respirant, ou avec suspension de la respiration; ces elancements se manifestent même la nuit. - Ibaileur brûlante dans la poitrine, comme après avoir bu de l'eau-de-vie; la douleur s'étend depuis le centre de la poitrine jusqu'à la gorge et la langue, et est accompagnée de chaleur, rougeur et tension au visage.

Trono et Membres. *Manc de reins comme dans les douleurs d'enfantement spasmodiques, avec forte envie d'uriner et d'aller a la selle, on avec flueurs blanches. Douleurs d'ulceration dans les vertebres lombaires. *Douleurs nocturnes au dos, plus fortes pendant le repos. - Élancements dans les musicles et les articulations des épaules. - Douleur de contasion aux bras. - Sensation paralytique douloureuse aux avant bras et aux doigts.

Douleurs crampoides dans les coudes et les avant-bras. Les mains sent roides, avec pean geneed. Boutons a la main, avec prurit violent, spriout le soir au lit. Dartres au coude, aux mains et aux doigts Douleur de luxation aux pouces Dougts morts. Engourdissement des doigts. Douleurs de fatigue dans les hamnes et les jambes — Douleurs tractives et lancinantes dans les cuisses, aggravées par le mouvement. Dou-leurs de contusion et taches bleuatres aux cuisses. Douleurs dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. -Lour laur dans les jambes. Douleurs tractives et lancinantes dans les jombes, alternant avec souffrances des yeux. - Douleurs de luxation dans les articulations des genoux et des preds. -Dans le juriet, peau rouge, râpeuse, comme une dartre. - Tension et crampes aux mollets *Douleurs d'ulceration et sensation brolante a la plante des pieds. *Gonflement redemateur des pieds depuis les orteils jusqu'aux mellets. Proid aux pieds. - - Sucur des pieds, - Dartres aux malléoles.



KREOSOTUM.


390

Larynx. *Grattement et raucite dans la gorge, avec voix rauque et enrouee. — Tour sèche, excitée par un grattement dans la gorge, ou par un chatouillement dans les bronches. *Tour seehe, sibilante. *Tour avec haleine courte. *Tour, le soir, vau lit. — Tour continuelle, avec sommeil et frissons, suivis de chaleur seche. — Tour continuelle, rauque et creuse, excitée par une accumulation de mucosites dans la gorge, et avec expectoration facile de mucosites blanchatres, vou jaunatres, et epaisses. — Les mucosites expectorées ont partois un goût douceâtre. *En toussant, emission involontaire d'urines, et ebranlement dans le ventre.

Poitrine - *Haleme courte, parfois avec sensation de lourdeur dans la poitrine, et besoin de respirer profondement, eu avec douleur de meuririssure dans la poitrine, en respirant. - *Itespiration difficile, anxieuse. *Elancements violents dans la poitrine, a la région du cœur, dans les cotes et dans les muscles intercostaux, parfois en respirant, ou avec suspension de la respiration; ces elancements se manifestent meme la nuit. - Douleur brulante dans la poitrine, comme apres avoir bu de l'eau-de-vie; la douleur s'etend depuis le centre de la poitrine jusqu'a la gorge et la langue, et est accompagnée de chaleur, rougeur et tension au visage.

Trono et Membres. *Maux de reins comme dans les douleurs d'enfantement spasmodiques, avec forte envie d'uriner et d'aller a la selle, ou avec flueurs blanches. Douleurs d'ulcération dans les vertebres lombaires. — *Douleurs nocturnes au dos, plus fortes pendant le repos — Élancements dans les muscles et les articulations des épaules. Douleur de contusion aux bras. — Sensation paralytique douloureuse aux avant-bras et aux doigts.

Douleurs crainpoides dans les coudes et les avant-bras. Les mains sont roides, avec peau geree. Boutons à la main, avec prurit violent, surtout le seir au lit - Dartres au coude, aux mains et aux doigts. — Douleur de luxation aux pouces — Doigts neuts - Engourdissement des dougts. Douleurs de fatigue dans les hanches et les jambes. — Douleurs tractives et lancinantes dans les enisses, aggravées par le monvement Douleurs de contusion et taches bleuatres aux cuisses Douleurs dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. Lourd ur dans les jambes Douleurs tractives et lancinantes dans les jambes, alternant avec souffrances des yeur. - Douleurs de luxation dans les articulations des geneux et des pieds. -Dans le jarret, peau rouge, rapeuse, comme une dartre -- Tension et crampes aux mollets. *Douleurs d'ulecrati met sensation brulante a la plante des pieds. *Gonflement cedemateux des pie la depuis les ortells jusqu'aux mollets. - Froid aux pieds. Sucur des pieds. - Dartres aux malleoles.



NOUVEAU MANUEL

DR

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

PREMIÈRE PARTIE

MANUEL DE MATIÈRE MÉDICALE

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX REVETU DES MÉDICAMENTS HOMESOPATHIQUES

AVEC INDICATIONS DES OBSERVATIONS CLINIQUES

PAR

LE DOCTEUR G. H. G. JAHR

MULTIÈME ÉDITION REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT ADGMÉNTÉE


TOME SECOND

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Rue Haussfordie, 19.

Leabre, Mikidita, Trainit and Cas. | Beloid, Mikid-Makidital, Mikid-Makidi





MATIÈRE MÉDICALE HOMEOPATHIQUE

LACHESIS.

LACH. — Le venin dentaire du Trigonocéphale à losanges. — Héring. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 331. — Dose maitée . 30. – Durée d'action : plusieurs semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Alum. ars. bell. caps cham. chin. cocc. hep. merc. natr-m. nitr. n-mos. a-vom. phos-ac rhus. samb veratr. — Contre la suite de la morsure: Ars. bell caps. natr-m samb. Companer Avec: Alum. ars bell. bry. caps. carb-v. caus. cham. cocc.

con, dulc, hep. byos lyc. merc. natr-m, nitr-ac, n-mus. n-rom, phos-ac, puls. rhus. samb selen, sulf versir. — Cest surtout après Ars, con. hep. lyc. merc. mir-ac. n-vom. que le lachesis fait du bien lorsqu'il est indiqué. — Après le lachesis conviennent quelquefois: Alum, ars, bell, carb-v caus, con. dulc merc. n-vom. phos-ac

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des personnes maigres, épuisées, d'un tempérament mélancolique, ou colérique, avec teint maladif; Souffrances par un temps chaud et humide, ainsi que par les changements du temps et le vent; Suites facheuses d'un chagrin, d'une affliction (mortification) et d'une frayeur?; Souffrances des ivrognes; Souffrances par l'ubus du mercure; Rhumatismes aigus et chroniques; Affections arthritiques; Douleurs ostéocopes; Paralysies; Faiblesses par perte d'humeurs (pollutions, hémorrhagies)?; Accès d'évanouissement; Syncope et asphyxie?; Atrophie, Anévrisme; Convulsions et accès de tétanos, principalement chez les enfants et les jeunes gens; Epilepsies chroniques; Hémorrhagies; Anérrisme; Gale; Lepre; Erysipèles simples, flegmoneux et vésiculeux; Scarlatine maligne ?; Panaris; Ulcères carcinomateux; Gangrène?; Ulcères mercuriels; Fièvre des enfants; Fièvres quotidiennes et tierces; Mélancolie; Folie religieuse; Aliénation mentale à la suite d'études forcées; Imbécillité?; Hydrophobie?; Accès d'apoplexie (dans l'âge viril): Congestion cérébrale avec perte de connaissance; Affections cerébrales des enfants : Encéphalite ? ; Hydrocephale ? ; Suites d'un coup de soleil?; Fatigue nerveuse par des travaux de tête; Céphalalgies



398

nerveuses hysteriques, congestives; Ophthalinies aigues et chroniques?, Obscurcissement et ulceres de la cornec. Amblyopie amaqrotique? Ozene?, Coruza chronique acre obtaration du nes; Corvea suppresse par desem tons nortales. Er supele a la face; Pros palgues et odontalgies - agestives et nerveuses principalement chez les jeunes filles). Angines aigués principal ment chez les enfants. An ines merenraelles, mee ul cration, Bodamie, Dyspepsic avec vomessement des aliments. Affections gastrico-lelle uses?; Hematemese 2. V. m. soment des femmes ence.ntes, 1 s ivre gues ?; Chol rar, Affect, as hepatiques, auss, chez les ivr gues, Abees hepatiques, Ramolliss in ut du fire Ictere Fierre jaune, Cliques spasmodo, les Coliques des femmes encentes :: l'impanite?; Disposition chronique a la const pation. Diarrhees de plusieurs especes, Dyssenteries : Luenterie Affections vermined a des enfants; Coliques hemorrhoidales; Hémorrh ides fluentes, in avec flux maqueux. Indurations dans le ventre aver selles puralentes, sangum dentes, Hem erhagne int stande . Impuissance : , Dusmenorrhee et autres sauffrances dans l'age critique; Souffrances hysteriques, Avertement, Indurate n et uberati n dis evanes; Affect, no catarrhales - t inflammat (res) des veies aeriennes, Coqueluch . Croup. Duspinee : Suaffrances asthmatiques: 4-thme de Millar ! . Asthme thymique & Kopp ! . Pleuresie; Phonin nie !; Grippe, Phthisi 2: H moptysie: Hydrotherax, Oothopn e paralyte, as ?; Buttements chroniques du carier, prin ipalement chez des jeunes fales, Anevrismes, polypes, inflamination et autres maladies du cour?, Cyanase?, Coxalgie, Ulceres aux jambes, Panaris, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. | Douleurs voluntueuses, on epodvantables, on fortement pressives, a physicurs parties du c rps. Sensation de luxation et de paralysie dans 1 sarticulations. - *Roideur A tension dans les museles comme s'ils etn ent trop courts - *Impleurs estendines - *Douteurs chamatesmales tives et tractires aux membres ou douleurs i agesutes avec semation do in urtrissure on se recount. Doublars is characs qui paraissent insupportulies et ne permettent pas de rester au Lt - Les d'elle irs affectent alternativen ent l'un ou l'autre ecte du corps, ou tente t les men l'es tantot le corps, et se moutreet seatent en cross . * Souffe inces intermittentes et périodiques, * soufferners a compagnies de per l'de sufficiation et souffrances aree boson de seemel r * Aggrar ition et renoutelliment dissumfrances ipri le summed on la nut t principalement avant minuit, su quel jues heures après le repaix su par un temps hunnde et chaul, ainsi que par les chang ments de temps et le vent , soulagement de beaucoup de uffrances par



399

le grand air. Les emotions morales, telles que les contrarietes, la peur, la fraveur, etc., renouvellent souvent toutes les souffran-1981 - *Paralysie avec lour leur et 1 leur des nambres, *paralysie sur l'iterale *Grande jublesse de corps et d'espeu, epuisem nt comme apres une perte de sang, chute rapule des forces relach ment des forces naisculaires. * Acces de defaitlance are dyspiner, mausers, sacur frinde recetige pillear du rescope Volatesche Lts, clourdescments, obscure esen ent des yeux, de ale ars et porat cans la region du colur, e nyulsions et epistaxis. *Acces d'asphyate et de syncope, avec perte des sens et du mony in nt, insensibilité comme dans la nort, serrement des dents, rodeur et genflement du corps, peuls tremblant et sans nul betten ent ... Tremblement des membres, palpitations musculair et tressaillement dans plusieurs parties du corps -"A res de convalsoms et d'epdepsie, avec cris, noncements des membres clate saus connaissance, your convulses, coume devant la bruche, prings frances, acunt l'acces, piede froids, rapports, paleur du cisage, certiges, tête laurde et d'uloureuse. battements de cœur, bal, amendent du ventre; apres l'acces, son med. A conditional service district to be members *Hemoren of cet extrarasula is du sang dans differents organes.

Peau Echyneses, saignement fue le et abandant des places et des alerres sertie de masses de sang par les pores de la peau. Tume ars var queus se tronflement by l'epique de tout le corps. Timefactions dures et pales. - *Pena paune, verte, plom-

ber. rouse blessates, on nonatre, prin ipalement autour des plans et des alores. *Taches saunes rouges, carerres.

Taches pales, livides, aver acces de defaillance. Gale seche, miliaire, aver reuption degrosses resentes sounes, ou d'un noir blessate, avez sufficient les parties affectées, et douleurs qui poussent au de espeir. Eruption miliaire pui par la suite, de vont seu bla de aux urtreaires, à la searlatine, aux morbilles.

Leus pale et eruptions residuleuses, avec aureob rouge.
Plaques exe il es, avec l'illeurs brulantes en les touchant.
Ulter s'ent ares de beutons, de ves cules et l'autres petits ulcere et l'erres s'iperparels a fand sele avec aureole rouge.
Ulteration cure momenteuse elles places, en putrefaction de la chair passible, avec herre a flammature pouls faible, accelere et pitern étent d'fa hance in usees, venassements spasmédiques et bilieux, convulsions et sucurs froides. Papules, vertues:
*taneurs dures. *Panares. Bisses et tuberosités rouges et passible, accelere.

Sommell Grande envie de dormer le jour, et sonne lence proncepalement ques le repus Insomn e, principal ment avant minuit, avec sure cedation nerveuse. Som polence et insomnie alternatives, tous les deux jours. — *Sommel léger, avec réveil



400

frequent et jucile, aydation et juctution, grimssements et soupars, sursauts et effroi. *Réces continuels et frequents, tant
poétiques et méditatifs, que voluptueux, rèves de querelles, de
choses horribles, de spectres et de mort. *La unit, chideur,
agitation, brûlement à la paume des mains et a la plante des
pieds, douleurs esteocopes, ou chumatismales, diarrhée, emission
d'urine, exaltation mentale et beaucoup d'autres suffrau es, Après le sommeil, sensation de ro deur et de courbature dans
les membres, érections avec desir venerien, douleurs au des et
aux reins, congestion de sang, lourdeur et douleur de tête, pression à l'estemae, mal à la gorge, bâillement nerveux et aggraça-


tion de toutes les souffrances. Fièvre. - Frond glacial de la peau ou des membres, en seulement des pieds, avec grand desir du feu, et quelquifois avec perte de sentiment, sueur visqueuse, faiblesse et grande frequence du pouls. Fressons, quelquefois seulement partiels, souvent avec douleurs dans les membres, maux de reins, agitation et jactation, coliques, trismus et mouvements convulsits des membres, douleur à la poitrine, soif claquement de dents. *Horrimlation pendant la chalcuret principalement en soulevant la couverture Frissons, principalement apres les repasou dans l'apresmidi. - Chaleur seche, principalement la nuit ou le soir, et surtout aux pieds et aux mains, accompagnee souvent d'agitation et de juctation, de mal it la tête, delires, soit mestinguible, rapports, vomissements bilieux, cris, gemissements, secheresse de la bouche et de la gorge, et eselles frequentes - *Chaleur alternant acce froid, frissons ou horripilation. -- *Fierres nocturnes on vesper times, paracees *quotidiens, tierces, con quartes, et accompagnées souvent de mal a la tete, chute rapide des forces et faiblesse qui force à se coucher, manque d'appetit, boquet, vomissement, sensabilité du cou au toucher, palpitations du cœur. angoisse, urines jaunes, diarrhee, douleurs aux membres, an dos, aux reins, baillements nerveux et spasmodiques, pandiculaisous. gonflement du corps, taches et ulceres. *Fierres chroniques: fierres lentes; pecres typhoides Renouvellement des perres par des aliments acides = *Sueur febrile, principalement apres la chaleur, vers le matin, sueurs abondantes, sueurs fetides; sucurs froides; sucurs sanguinolentes. *Pouls intermittent,

tremblant.

Moral. Grande ingoisse, anxiéte insupportable et inquietude qui porte a chercher le grand air. Grainte et pressentiment de la mort. - *Accublement moral et melancola, avec appréhensions, inquietude sur sa maladie, trop grande disposition à s'abandonne au chaqum, a voir tout en noir, et à se creire persente, hai et incprise des siens — *Tristesse et degoût de la vie *Mehance, soupe ins et grande disposition à prendre tout en mal,

on faible et frequent, ou irregulier, ou a peme sensible, ou





à contredire et à critiquer. Jalousie frénétique - Paresse avec *deplaisur et inaptitude à un travail quelconque de corps ou d'esprit. *Caractère peureux, avec incertitude et indécision. *Grande apathie et faiblesse de memoire extraordinaire; tout ce que l'on intend est comme efface, on ne se rappelle plus même l'orthographe, et on oublie jusqu'à ce que l'in allait dire.

On se trempe en parlant et en ecrivant, ainsi que sur les heures du jour et les jours de la semaine. *Imbecellite et perte de toutes les facultes de l'esprit - *Surexcitation et trop grande arritobilite nerveuse, avec disposition à s'effraver, état d'extase et d'exaltation que ra jusqu'aux pleurs, besoin de mediter et de composer des travaux intellectuels, savec une serte d'orgueil *Loquainte frenetique, avec discours sublimes, mots choisis, et idees que passent rapidement et constamment d'un sujet à un autre - *Delires nocturnes avec beau aip de paroles ou avec

murmures Dens nee et parte de comassance,

Tete. Tatigue de la tete par des travaux intellectuels tiges principalement le matin au receil, aussi que le sair, apres s'être couche on allant au grand air, en levant les bras, et souvent arec défadlance, paleur du risage, nausces, vomissements, congestem à la têle saignement de nez et lassitude des membres - Ivresse, stup-prot perte de connaissance - *Accès d'apoplexie, avec faie bleuatre, mouvements convulsifs des m inbres et extravasation de sang dans le cerveau. Ramollissement du cerveau et de ses membranes - Douleur violente a la tete avec face jaune et rougeur des joues *Mal de tête, avec congestion de suna, scintillement devant les yeux, somm dence. frissons et besoin de se coucher, ou avec nausces et vomissements, co-phalalgie par la chalcur da seleit "douleurs profondes dans le cerv au, ou dans les orbites, * u un-dessus des yeur, on a le cerput, avec roideur de la naque. Doaleur de meurtrissur cans be virtex, at *sensation do tor bration, avec comps et buttements en remuant la tete - *Pesantem et pression a la tete comme si elle allait e later, ou *tension comme par des fils tires de l'occiput vers les yeux, ou élancements comme per des contenue dans différentes parties de la tête et jusqu'aux yeux Deuleurs qui de l'interieur de la tête se propagent jusqu'aux ereilles, au nez et au ceu = *Maur de tête tous les motens ou reced on toutes les apres-dinées, ou bien a tent changement de temps - Gouffement d' la tete, palpitations musculaires aux tempes, tensien a l'occiput jusqu'a la nuque; sensibilite buloup use du cuir chevelu, avec prurit penible, forte desquarration et chute des cheveux

Yeux. Ye ir jaunes on troubles, termes et abattus, on brillants et conculses, avec regard fixe. Pupilles très-dilutées. Ecchymasse et hemorrhagie des veux. Secheresse des yeux, comme s'ibectaient plans de paussière on *econloment de laimes qui.



quelquefois, paraissent froides. Photophobie. Prurit et elancements comme par des contenux dans les yeux, ou *pression violente comme se le globe allait sortir de l'orbète, aggraves en remnant les youx : Yeur rouges, enflammés, avec rougent de la conjonctive et de la selectaque, chalcur l'rôlante et larn, or in ut.

Sensation common si les voux ctaient trop gracen les orbites trop petits. Confidement et inflammation des paupières, la le leurs bords. Convulsions, pesanteur et paralysis d'apparers.

Fublesse de la rue et presbyopie. Confus en des caractères en hant. Trouble de la vue comme par un voile. Observeissement et porte de la vue. Flammes et étine lles, on ve le bleu devant les yeux, ou cercles bleus autour de la chandelle. Yeux


petits et sans expr ssion

Oreilles. Oreilles frontes, sensibles au vent, Gonflement douleureux de l'interieur de l'oreille *Secheresse des creilles
*Cérumen trop peu ab indant, trop dur et trop pâle, ou summe de
la bouillie, *et blane avec dimenution de l'ouir Battements
tres-desagreables, resonnement, *l'ruissement, tint rout craquement, beurdonnement et roulement, su bruit comme si on
battait le tambeur, dans les creilles. Oreilles en u-beu lines,
Sensibilité excessive ou dureté de l'ouie. Hemorinagie par
les reilles Genflement des parotides. - Excornition et croûte
derrière les oreilles.

Nez. Douleurs necturnes au dos du nez Obturation da nez comme par un gonflement interiour, principalement le main, ou avec le coryza. Gonflement, *rongeur et e real atroi des bords du nez avec croûtes dans les narines. Monel ne et de sang. Sugnement abondant par le nez, d'un sang renz clair ou épa s'et noir. Ecoulement de pois par le nez *(exyza sec, chronique avec obturation du nez, on fluent, avec écoulement abondant de naicosites sereases, larinoi ment cternument fréquent et inflammation et ros ou des narines d'angre incomplet, avec beau oup de souffrai ces de la tote et de l'esprit, qui desparaissent toutes des que le flue catarchal s'est étable.

- *Boutens chromques ronges sur le nez

Visage *Face pale, malader, defaite, cadavereus*, teint plombe, en terreus, decolo e, januaitre *Rangen, en conserte des jones, avec couleur jaune de la face. Cerele bleu, auteur des veux : Pet tes ve nes i mges sur les jets : Bouffissure, quel jucfois efficiable, tension et gonflement range du visage : Chaleur et rengeur du visage penasut le delire) = *Erysipèle a la face, quelquéleis avec pourit, bouters on vésicules, gerçures et suintement corrosif, do ileurs l'illantes et gonflement : Miliaire et boutons au visage. Dantee avec croutes épaisses dans la region des favoris : Douleurs tensives et formicantes au visage, d'uleurs dans les es de la face; pros palgie avec vomissements des aluments : Levres seches et gonfleus:



LACHESIS.

402

bontons aux lèvres; tremblement des lèvres. — Faiblesse et paralysie de la machoire inférieure, avec distorsion des traits. — Trismus, avec serrement et grincement des dents; claquement des dents.

Dents. — Douleurs térébrantes dans les dents cariées, principalement après le diner, et quelquesois avec gonflement des joues et sensation comme si les dents étaient trop longues. — Maux de dents, tous les matins après le réveil ou toutes les après-dinées, avec douleurs déchirantes, tractives et lancinantes dans la racine des dents (de la mâchoire inférieure). — *Mal aux dents, avec douleurs à la tête, frissons, chaleur et jambes lourdes. — Les douleurs de dents se propagent jusqu'aux oreilles. — Agacement et vacillement des dents; les dents cariées se ramollissent et s'ébrèchent. — Gonflement et sensibilité douloureuse des gencives. — Les boissons chaudes et froides renouvellent les douleurs.

Bouche. — Gonflement inflammatoire de la cavité buccale. — Bouche et palais excoriés et très-douloureux. — *Sécheresse de la bouche et de la langue, ou accumulation d'eau dans la bouche, et *salivation. — Langue luisante, rouge et fendillée; ou enflammée, gonflée, brunâtre ou noirâtre. — Roideur, immobilité et paralysie de la langue. — Aphonie ou parole confuse, indistincte; voix nasillarde; difficulté de prononcer telle ou telle lettre et tel ou tel mot; parole plus haute et plus pascipitée qu'on ne le vou-

drait. — Bégayement.

Gorge. - *Chatouillement continuel dans la gorge, comme par une miette de pain, ou quelque chose de semblable qui s'y serait arrêté. - *Sécheresse partielle ou générale de la gorge, s'étendant souvent jusqu'aux oreilles, au nez et à la poitrine. — Brûlement et douleur d'excoriation à la gorge, principalement en avalant. — *Excortation douloureuse et gonflement inflammatoire de la gorge, avec rougeur des parties affectees, comme par du cinabre. — •Gonflement des amygdales. Grandes et *petites tumeurs dans la gorge, qui empêchent la deglutition. continuel d'araler, et sensation en avalant, comme s'il y arait une tumeur, un morceau, ou un tampon dans la gorge. sation de rétrécissement, de strangulation et de constriction à la gorge. — Gorge comme roide et paralysée. — Convulsions et pasmes dans la gorge. — *Déglutition empéchée, avec horreur des boissons, qui souvent sortent par les narines. — Hydrophobie. - Aggravation des maux de gorge par le plus léger contact et la moindre pression du cou, ainsi qu'après avoir dormi, et en avalant la salive; soulagement en mangeant. - .* Maux de gorge qui n'affectent qu'une petile partie, ou qui, au contraire, se propagent jusqu'aux oreilles, au larynx, à la langue, aux gencives. souvent avec dyspnée et péril de suffocation, salication et renn-*Accumulation abondante de mucosités clement de mucosités.



464

tenuces dans la gorge Maux de gorge alternant avec obturation du nez, ou avec souffrances en parlant "Ulceres au palais, dans l'arrière-bouche et a la gorge, avec odeur tetide, suppuration abondante, et vives douleurs en avalant les aliments


Appetit. — Goût desagréable ou sucre, acide, apre, astringent ou métallique. *Manque d'appétit et de faim : inappetence complète pour les aliments ou les boissons — Répugnance pour le pain, qu'on ne peut pas avaler. *Appétit irrégulier, tantôt anorexie, tantot boulimie *Faim maludire, avec nausées, bâillements convulsifs et acces de défaillance si l'on ne mange pas de suite, ou avec pressien rongeante dans l'estomac, se renouvelant peu apres av ûr mangé. Soif inert nquible. — Desir de vin ou de lait, qui l'un et l'autre cependant incommodent. *Apres avoir mange, pression à l'estomac, rapports, reriges, flatuosites, envie de romir, ou romissement des aliments faiblesse dans les genoux, paresse et lourdeur du corps, fatique de l'esprit, malaise, régurgitation, diarrhée, gene de la respiration, mal a la tête et aux dents, et exacerbation de toutes les souffrances.

Estomae Hoquet après avoir bu, ou fumé du tabae. Rapports a vide, violents, avec peril de suffocation. *Rapports qui soulagent les souffrances. Renvois acides, avec goût des aliments. Pyrosis depuis la gorge, comme si tout l'a sophage était plein de choses rances. Nansces et envie de vomir, principalement le matin, ou après le repas, ainsi qu'a la suite de beaucoup d'autres souffrances. L'omissements molents et convulsifs de tout ce que l'on prend, on de matières bilieuses, amères, verdâtres. Vomissement de sang pur, ou de mucosités sanguinolentes. Vomissements avec diarrhée, obscureissement des yeux, donleurs d'estomae et diucese. *Sensibilité e reessire de la région précordiale au moindre contact; les vetements se três sont insupportables, et la moindre pression est tres-douloureuse.

*Grande faiblesse de l'estomac, il ne peut supporter ni les aliments ni les boissons. Sensation comme si quelque chose embarrassait le cardia, et empéchait la déglutition. Pression dans l'estomac et jusque dans la poitrine, et sensation comme si un ver s'y remuait et le rongeait. — (Tous les soirs) crampes et douleurs riolentes à l'estomac, avec rapports, vomiturition et vomissement de glaires.

Ventre Douleurs hépatiques, brûlantes, tractives, ou incisives,
Inflammation et ramollissement du foie. Abres hepatiques.
— Douleurs et points douloureux dans la région splénique,
quelquefois en allant en voiture, ou en marchant.

- Grosseur du ventre chez les jeunes filles. Sensation de ride dans le rentre. Douleurs abdominales à la suite d'un tour de reins *Douleurs généralement pressives, dans la réquin ambalique, quelquefois avec gêne de la respiration, aggra-




405

vation une heure après le repas, et soulagement par les rapports. — Tranchées violentes à rendre fou, ou *tiraillements aigus, avec contraction du ventre. — Brûlement dans le ventre, avec pression sur la vessie. — Inflammation des intestins. — Extravasation de sang au péritoine. — *Ventre ballonné, dur, avec coliques flatulentes, —mal au dos, vomissement, diarrhée et diurèse. — Émission fréquente de vents; les vents pénètrent quelquefois dans l'anneau inguinal. — Douleur comme si une hernie allait sortir.

Selles. -- Selles tardives. -*Constipation opiniatre, avec selles dures, difficiles. Selles petites, insuffisantes et tenaces. — *Constipation alternant avec diarrhée. — Diarrhées arec coliques violentes, nausées, vomissements, angoisse, douleurs au rectum pendant le passage des selles, ténesme et excoriation de l'anus. - *Selles diarrhéiques, principalement la nuit, ou après le repas, con par un temps chaud (et humide), ou pour avoir pris des fruita et des acides. — Selles involontaires et sans qu'on s'en aperçoive. — Ecacuation de matières fétides, ou de selles molles, de la consistance de la bouillie, on liquides on gluantes, comme de la poix, ou sanguinolentes et purulentes, ou de matières non digérées, ou de sang pur, ou de mucosités sanguinolentes. — Pendant les selles, douleur, ténesme et brûlement à l'anus; après la selle, congestion de sang à la tête, vertiges, faiblesse, douleurs et battements à l'anus. - Constriction douloureuse de l'anus et du rectum. — Chute du rectum pendant la selle. — Sortie de mucosités et de sang par le rectum, quelquefois avec coliques violentes. — *Hémorrhoïdes avec coliques, ou avec brûlement et tranchées dans le rectum, ou avec congestion sanguine à l'anus et diarrhée. - *Hémorrhoïdes saignantes.

Urines. - *Pression sur la vessie, avec envie d'uriner, ou avec tranchées et brûlement dans le ventre. — *Enrie fréquente d'uriner, arec émission abondante, même la nuit. Douleur violente, comme si une balle roulait dans la vessie, et de là dans l'urèthre. Ténesme violent, avec urines peu abondantes. — Paralysie de la vessie. — Élancements incisifs, continuels, dans l'urèthre. Petite tumeur de l'urêthre, avec rétention d'urine. *Urines troubles et brunes, ou rouges, ou jaune foncé, et quelquefois avec émission fréquente, mais peu abondante, ou avec sédiment brun et sablonneux, ou rouge, ou couleur de brique. — Urines écumenses. — Émission involontaire et inaperçue des urines. — Pendant le besoin d'uriner, douleurs au dos et aux reins. - *En urinant, sensation de brûlure dans l'urèthre, et beaucoup d'autres souffrances qui viennent toutes par le mouvement de la voiture et après avoir bu du vin. - Douleur d'excoriation à l'urethre et au gland. - Pissement après la selle et après avoir uriné.

Parties viriles. - Pression sur les testicules, comme si une her-



nie allait sortir, en faisant des efforts pour uriner Boutons aux parties velues. — Beaucoup de desirs rénerieux, sans besoin phusique et avec placeid, te de la verge. — Erection sans le sus venerieus — Polluti us nocturnes et diurnes, qu'imperieux avec faiblesse et sucar — Ecoulement de liqueur prestatique en uri-

nant ou apres avoir arm. So rme d'une odeur penetrante.

- Dans le coit, l'éjaculation tarde à avoir lieu, en manque entierement Secretion abon lante derrière l'glant l'iches et boutons rouges sur le gland et sur la couronne Amin assement du scrotum et durête des testicules. Epaississement du

prepuce.


406

Regles. Sensation d'une boule qui monte du ventre à la peltrine, comme dans l'hysterie Douleurs dep ns l'avail jusqu'à l'uterus, avec evacuation de pus pendant les selles Enflure des parties, avec prunt et desirs venerieus. - * hoghes fandes, turdices et de trop courte darée, souvent avec hemorrho des et beaucoapd'autres souffrances. *Spasmes abdominana pendant les règles — Avant les regles, Laleurs et hattements dans la tête, vertiges, epistaxis, pression a l'estomac, rentois, trai chies dans l'hypogastre, écoulement maqueux par l'un thre et crampes de poitrine. * Avant et après les règles, de trit e avec tertes collegues = *A l'apparition des rogles mant de reins, avec nouleur de brisement dans les hanches et la portrin : l'encant les regles, maux de reins, comme pour l'enfantement, l'aitements a la tête et tranchées. Avortement. Le lait des personnes mordues par ce serpent devient venimeux et se ca.lle

Larynx. Catarrhe, avec toux, coryza, doul urs landmantes a la tete, roideur de la nuque et affection de poitrine. Enrouement continuel, avec s'insation, comme s'il y avait quelque chose dans la gorge qui empechat de parlir et qui ne pri se

détacher. Etrangler unt et construction du larvix, ave sonsation de goullement et de tension. Sensibil te douloureuse du larynx et du vou, au toucher et a la plus legere pression, avec néral de suffacetion en tatant le gener et en removement la tote

Sent ion de pulsation et d'et usement entre le larynx et la pottrine scheresse, bralement et de deur d'exemple, on au larynx sonsat, in d'une be de caus le arynx. L'ore facble, creuse, nasillarde *Toux souvent fatignate, dont tous les efforts ne peurent rien detacher, exeitec le plus servent par un chatouillement dans le larynx, aans la poitrine et a i creux de l'estomac, su par la pression du gosier, ainsi que par la ceux estion, la marche et tout ce qui peut augmente, la scheresse de la gorge - *Toux toujours après acoir dorme, ou la i.u.t. en dormant, ou le soir, après s'être esuché ainsi qu'en se levant de la position couchée. *Toux seche et courte, susse juante et er assante, quelques is avec vous sement. - Crachats maqueux, tenaces ou acides, et d'un gout desagreable, ou sanguin deuts.



407

Hémoptysie. — En toussant, accumulation d'eau dans la bouche, douleurs vives au creux de l'estomac, secousses dans la tête et

tension aux veux.

Poitrine. — Respiration courte, fréquente, ou convulsive, ou râlante, roufiante et croassante, ou suspirieuse, gémissante et profonde. — Besoin fréquent de respirer profondément. - * Dyspnée et oppression de poitrine, avec de grands efforts pour respirer. - *Haleine courte, principalement après le repas, en marchant, après un effort des bras, et quelquefois avec tristesse, on avec toux asthmatique. - *Accès d'asthme, et gêne de la respiration, principalement après avoir mangé, ou le soir en se couchant, ou la nuit, pendant le sommeil, et quelquefois avec angoisse. soif, nausées, vomissement, défaillance et sueur froide. — *Accès de suffocation, surtout en étant couché, le soir ou la nuit au lit, et principalement lorsque quelque chose vient se placer devant le nez ou la bouche. – Orthopnée paralytique. — Haleine d'une odeur très-désagréable. -- Pression à la postrine, comme par un poids, ou comme si elle était remplie de vents, et principalement la nuit. - Douleurs violentes, avec grande angoisse et monvements continuels dans la poitrine. — Brûlement et douleur d'excoriation dans la poitrine, comme si tout était a vif, principalement après le repas. — Points dans le côté et dans la poitrine, aggravés en respirant, et quelquefois avec toux et crachats sanguinolents. — Extravasation de sang dans les poumons. — Gangrène des poumons. - *Battements de cœur, arec anxiété, oexcités quelquefois par des douleurs crampoïdes avec toux et accès d'étou ment. -- Spasmes au cœur (avec anévrisme de la carotide droite) et pulsation désagréable aux orcilles. dans la région du cœur, avec haleine courte, acces d'évanouissement, et sueur froide.

Prono. Enflure et bouffissure des téguments de la poitrine. —
Prurit, plaques rouges et éruptions miliaires a la poitrine. —
Nuque et cou excessivement sensibles à la moindre pression.

Roideur rhumatismate de la nuque et du cou. Points au dos et entre les épaules. — Petite tumeur pres de l'épine dorsale. —
Brûlement au dos. — Spannes des muscles du dos. *Roideur douloureuse depuis les reins, jusqu'à la hanche, comme si les muscles étaient trop courts. Douleurs nocturnes, insupportables, au dos, aux reins, a la hanche et au genou. — Manque de force dans le dos et les genoux, qui force a marcher courbé. —
Douleur de luration dans les reins, comme après des efforts. —
Papules, vésicules, dartres, boutons et taches écarlates sur le dos

et les omoplates.

Bras. — Douleurs rhumatismales, arthritiques et ostéocopes, aux bras, aux mains, aux doigts et aux poignets. — •Ulcère malin au haut du bras. — Tension comme par raccourcissement des tendons, depuis le coude jusqu'aux doigts.—Inflammation éryspéla-



408 LACHESIS. LACHNANTHES TINCTORIA.

teuse au coude. Élevures aux bras, après avoir gratté. Seu sation de fatigue ou de paralysie, et douleur de luxation dans les bras — Paralysie des mains, "Iremblement des mains bras — Paralysie des mains, "Iremblement des mains — Mains seches et brûlantes. Bouts des doigts engourdis, douloureux. — Prapires au bout des doigts, — Prurit, *eruptions galeuses, plaques rouges avec vésicules, furoncles, excroissances et verrues aux mains et aux doigts — Gonflement noir, bleuatre, dur et froid, au dos de la main et des doigts. — Gonflement dur de la main jusqu'au coude, avec douleurs excessives. — *Panaris.

Jambos. — *Sensation de raccourcissement, et raccourcissement des tendons du jarret. Douleurs nocturnes dans la hanche et la cuisse — Douleurs vives et tractives aux jambes pendant les changements de temps et un temps venteux — Furoncles aux cuisses — Sensation de pesanteur, de paralysie, d'engourdissement, et tremblement aux cuisses et aux genoux. — Genoux comme disloqués, toides et faibles. — Crampes et douleurs dans les mollets — Elevures rouges aux cuisses et aux jambes apres s'être gratté — Plaques exceriées et ulceres superficiels a fend sale aux jambes. — *Gonflement douloureux, rouge ou blendtre, des pieds et des jambes. — Pesanteur, engourdissement, froid glacial, sueur des pieds. — Prurit, *éraptions galeuses, papules et taches de brulure aux pieds et aux jambes. — Gerçures et rhagades entre les orteils. —Abès aux talons.

LACHNANTHES TINCTORIA.

LACHN. -- Luchnanthes. - Voy. HALE, Remedes américains.

gravent dans la position couchée, et s'ameliarent en marchant, Aggravation de la plupart des symptòmes dans l'apresenudi, et de la ficere, la nuit, de 1 à 2 heures — Sensation d'une grande faiblesse, comme à la suite d'une perte d'humeurs. — Somnolence avec baillements et paupières lourdes. — Froid dans le dos, entre les omplates, comme s'il y avait la un morceau de glace, puis sensation d'une secousse avec froid par tout le corps et chair de poule, le tout se renouvelant par le mouvement, hevre avec delure violent, rougeur circonserte des joues, yeux étincelants et aggravation, de 6 heures du soir a minuit; hevre avec somnolence; sueur froide, au front surtout. I'rurit et brûlement par tonte la peau du corps, plus fort après s'être gratté. Grande loquacite, suivie de stupidité et d'irritabilité.



410 LACHNANTHES TINCTORIA. - LACTUCA VIROSA.

de couteau, dans le côté droit de la poitrine. — Bouillonnement dans la region du cœur, avec ascension vers la tete, vertige et sueur, sensation de chaleur dans la region du cœur, elancements au cœur, avec in paretude palpitations frequentes et violentes, chaqui coup est deuble. l'un dur et plein, l'autre mou et petit, tremblement du cœur, avec grande faiblesse.

Trone et Membres. Dans la nuque, roi leur et douleur, se repandant par toute la tête jusqu'au nez, avec sensation comme si les parines fussent contractios sensation de luxation le la nuque, en tournant ou en renversant la tote; roidour du cou qui tire la tête de cote (comme a la suite de la scarlation ou de la dyphtherite).

Sensation de froid entre les epaides, comme s'il y avait la un morceau de glace u qu'u, y tut mondle par de la sueur froide; brulement dans la region du rein droit, se repandant vers le côté gauche, brulement dans l'os sacram Dechirement dans l'articulation des coudes; dans les condyles des deigts, ou depuis les épaules jusque dans les articulations des doigts, Déchirement dans le genou droit, brulement et elancements, au dessus, au dessous et en dedans de la retule, petites vesicules sur les fesses, laissant sainter une bruneur aqueuse apres s'être gratté; fourmiliement dans les deux extremités inférieures, pire dans la chaleur, brulement dans la plante des pieds et la paume des mains, crampe dans les pieds, la nuit.

LACTUCA VIROSA.

LACTUCA. — Laitue vireuse. — Journal for arevet mittel lehre, t. 11, 1.

Hist nat et prep. Voy. Pharmac homocop., p. 237. Durce d'actum
jusqu'a 24 heures

Antiubres Les ac des végétaux et le cafe

N. B. Les symptômes suivis d'un 8 appartiennent ou factuenrium, préparé avec du loctueu outieu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Semble agur de preference sur les organes de la respiration. Firaultements dans les nombres et le dos, ou bien peri diques à diverses parties si, decharments qui royagent d'aurit dans le poignet, tantot dans les gen ux, la cuisse, l'articulation du pied, à la inique, d'uns les tempes, etc.; bouillonnement douloureux dans les mentires, l'apres-midi, on étant assis tranquillement, tressaillement aigue, ramponte, pres des articulations (à la inique, les hyperondres, les eures, les hanches), le plus souvent le soir, et d'uis le repos, quelque fois aussi pire le matin, et surtout du coté des extenseurs; douleurs crampoides, qui reparaissent bientot à d'autres parties et génent





Insage de ces parties (surtout aux coudes, aux mains, aux doigts aux jambes), brisement de tous les membres, forçant à passer tent le jour au let « Demarche mal assurce, ou branche en marchant » convulsions dangereuses chez les femmes (»). Abattement general, quelquefeis avec lassitude et immobilité; forte paeque, grande lassitude (aussi »), quelquefeis avec besoin de domir ou bien le matin, après s'être leve, avec inaptitude au trivial, après la mondre occupation, irritation et lassitude, comin après de grandes fatigues « Sensation indicible de legic etc dans le corps «) sensation de force vivifiante chez une pers une hysterique »); besoin de se tenir droit, en étant assis. « An grand aux, bien-etre plus grand et surreut la poitrine plus libre, legerète maccoutumee dans le corps (»), allegement des

Peau. Uncement lancipant et cuiss, n sous-cutance ça et la, ou bien aussi clanciments. Inflammation et cruption char des applications sur des parties de licates de la peau. Conflement ordem items de fout le corps, avec affections asthmatiques, tête entreprise, position sur le dis penible, norripilation, absence.

symptomes, surtout par le mouvement au grand aur, desir du

d'appetit t'ux exarte et pouls petit et plem.

Sommeil — Builtements frequents; baillements et pandiculations (s), Grande ence de dormer pendant le jour (saussi), avec fatigue et lassitude avec baillements frequents (saussi), le soir de benn heure oblige int a se couener tot, sommed invincible (a), on s'endort en travaillant, coma, que lquefo savec degout (s), envie de dormir sans peuv ir s'endormir, sommed projond de plusieurs heures, quel prefois meme avec pouls un peu frequent.

Sommed nucturne parable, reparateur (s aussi), solide, rempli de raves, ou bien aussi sans revas, solide avecarionlement de sperme in spercu ,s,, sommed nocturne etourdessant, avec difficulte de se reveiller le matin agite, non reparateur saussi : son in all ling, agite is a resent frequence presque tous les quarts Impossibilité presque compiète d'etre coache sur le dos a cause des symptomes asthmatiques) et en meme temps tension dans le creux de l'estomac, in aime a etre couche la tete bante et un cote droit - La mit mi lit firte appression de portrant, qui reveille pendant le soumeil et ablige à se mettre promptement sur son seant, avec anviete, sensation de grande fatigue le mitiu (s., gene le la respiration, avec depleurs pressives et sa sesantes lans la poitrine, qui ne permettent que pen de sommeil: egen de la respiration qui empeche de dormir, ave battement pulsatif dans la tete, et en meme temps, battement de cour, suivi de buleurs dechirantes dans la tôte, avec pesantour et hébetude, douleurs de tete, toux spasmodique et chalcur fébrile, avec reves dont on n'a pas conscience et som-Réces : fantastiques, pendant un sommeil agite; meil agite



LACTUCA VIROSA.

vifs et quelquefois anxieux (de suicide par arme a feu), pendant an sommed profond; vers le matin, quelquefois singulier et comme s'il decrivait un cercle en tournant sur un pied; sommeil toute la nuit avec une foule de rêves. - Le mutin au reveil : sensation comme si la tête était vide, difficulté a chasser le sommeil; grande lassitude, après un sommeil agité, avec oppres-

sion (s)

412

Fièvre. - Froid parcourant souvent le dos et la tête (s aussi), quelquefois avec chaleur de la face (s), ou bien avec frisson dans la chambre chaude, et froid aux pieds et aux mains ; frisson facile pendant la journée, même dans la chambre chaude, horripilation. qui quelquefois semble glisser seus les cheveux. - Fierre, avec fortes douleurs de tete sensibilité douloureuse du cuir cheveln au toucher, dechirements dans les articulations des membres (de même que dans la nuque et la face), gran le pesanteur de la tête, le soir qui force a la pencher en avant, choleur pénille et trèsseche a la tête et à la partie supérieure du corps, avec froid glacial des pieds, et en même ten ps ardeur et larmon ment des yeux, quintes d'une toux seche, suffequante et spasmodique, avecébranlement violent dans la poitrine et la tête et contractions spasmodiques et douloureuses des vertebres lombaires et de la region des hypocondres. - Sensation de chaleur, d'une secheresse insupportable, surtout aux jambes, qui sont douloureuses, comme après une très-grande course, le matin de 3 à 6 heures. - Pouls lent (s aussi), lent et tendu; rare, même jusqu'a 10, 12 pulsations (s) Transpirations abondantes, fortessueurs (s): sueur nocturne générale et douce (s),

Moral. Humeur mélancolique, chagrine, semble favoriser la tristesse, avec idées exaltres et exagerées, de telle sorte que de la chose la plus simple, il red, ute les consequences les plus terribles et les plus inquiétantes, après un chagrin, le soir, d'uleur étourdissante dans le front et contractions violentes dans la gorge, avec

envie continuelle de pleurer. — Angoisse et agitation intérieure. Munvuise humeur excessive, à la moindre contrariéte, mauraise humrar, humeur chagrine, arec inaptitude au travail et impossibilité de rester au lit; humeur acuruitre, la moindre

chose suffit pour le monter.

Tôte. - Difficulte de réflechir (s), inaptitude aux travaux de l'intelligence, parce que les idees s'embrouillent et qu'il lui est impossible d'embrasser l'ide-génerale, il ch-rche de cote et d'autre avant de trouver quelque chose. Embarras de la tete de matin, quelquefois avec pesanteur, comme par plenitude, dans le front, quelquefois avec sensation de chaleur de cette partie, quelquefois dans la bosse frontale droite, quelquefois dans la gauche (extériourement), avec élancement qui traverse celle de gauche, en se baissant, sensation d'étourdissement et de vertige; téte embrouillée, quelquefois le matin, en se levant. Sensation



LACTUCA VIROSA.

yeux, surtout aux paupières (quelquefois seulement le jour en écrivant, ou bien surteut à l'æil dreit, avec trouble de la vue et pupilles dilatées). Rougeur de la conjonctive, avec augmentation de la sécretion muqueuse, chez des hommes d'un age avancé, avec plethore abdominale. Paupières rec uvertes de chassie.

Papilles delatees (s). Frouble de la rue, cue faible, quelquelois avec arl ur dans les youx; vue faible, trouble (s), vue empechée, comme par un nuage en un vole qui quelqu lois se dissip, en fixant attent vement un objet, mouches y dant devant les youx, en se baissant, après le repas.

Oreilles. Tiraillement dans les creilles, clancements suivis de tension dans i creille gauche Bourdonnement dans les oreilles,

résonnement devant les oreilles, le seir, au lit.

Nes. - Sensation d'ecartement dans le bout du nez. Odeur spécifique devant le nez et gout anal gue dans la Louche. Eternument frequent, avec aggravation des symptomes de la politrine, ou bien avec poutrine douloureuse (quelquefois comme par une executation qui plus tard se transforme en pression) (oryen qui laisse de l'exe-riation et de la socnoresse dans le nez

Face. Mauvaise mine (s), visage pabl, refait, chabit de la face, avec tremblement et sonsation de goußerieut des levres (s). - Fourmillement tensif dans la face, traillement picotant depuis la glande sous-maxiliaire droite jusque dans l'reille et la langue; élancements au menton, à la sortie du nerf sous-maxillaire.

Dans les lècres : fremissement, gonflement des glandes

lymphatiques

414

Dents. Douleur rapide dans les molarres gauches de la machoire inferieure, e mme si on tournait la dent affecte. - Geneure

douleureuse, en machant a la place ou etait une dent

Bouche. Sensation de tension dans le fond de la binche et au palais, qui force a cracher constamment accumulation de salve plus abondante, quelquefeis l'un gout a riule; secheresse de la bouche, sans soit. Langue charque d'un enduit blanc (saussi), enduite de mucosites epaisses (s), doule areuse comme si elle était brûlée à la pointe, contraction au-dessous de la langue.

Gorge. Brûlement leger dans la gorge, quelquefois le soir, sensation dans la gorge comme si cette partie etait exposée à la chal ur d'un feu ardent. Deglatetem gênée, avec sensation comme si la lie tte était à v.f., avec prûlement, in bien e mine si les muscles du pharynx refusaient leur service. Accamulation de mucosites dans la gorge; mucosites visquenses dans la gorge.

le matin (s aussi),

Appétit Goût. Goût: fade dans la bouche (s): amer, quelquefois après avoir mange des tartines de heurre, samer, comme du fiel, dans la gorge Absence d'appetit (~ aussi). l'appetit est nul à mult, le manger repugne, appetit nui pour le pain et la



LACTUCA VIROSA.

416


dant et après le repas, jusqu'a forcer a se tordre. masnes dans le rentre (tranchées): à diverses parties, avec pincements, dans tout le ventre, avec borborvgmes douloureux et suivis d'une selle diarrhéique muqueuse - Sensation de chaleur désagréable dans le ventre, bouillonnement fréquent, remontant du ventre dans la poitrine. Sensation de pesanteur dans le ventre qui presse vers le bas, apres le dejeuner, sensation e mme si on avait un fardeau sur le ventre, principalement sur l'ombilic et le creux de l'estomac, pire etant debout - *. Affections du système de la reme-porte? Hydropone abdominale in la suite d'une fictre intermittente avec constipation), avec gonflement tres-volumineux du ventre, des pieds et de la face; con bien avec induration du foie et astlime — Sensation de plenitude dans le centre, quelquefois avec borborygmes et émission de vents, sensation de plenitude dans le coté droit, avec gene de la respiration et sculagement par des renvois et l'emission de vents (s); tension du ventre, surtout dans la regien hépatique, le soir. Mouvement de flutuesites dans le ventre, berhorygmes abondants dans le ventre, quelquefois pendant le repas, ou bien après (avec elancements au-dessous du precord, ou bien avec pincement dans le ventre), ou encore principalement dans la region ombilicale; émission de vents abondants, quelquefois fetides (à la suite de birborygmes), ou bien le soir, precédée de pincements

Selles et Anus. (onstipution; point de selle le premier jour, ou bien elle ne vient que plus tard et est dure; ela constipation habituelle diminue. Selle senlement a la suite de besoins et de pincement, besoin d'aller à la selle, avec sensation de lassitude extreme, et avec évacuation difficale et rare, selle precédée de tonesme dure, et ne s'evacuant qu'avec effort, avec douleur persistante de meurtrissure a l'anus; selle insuffisante. - Selles dures; dures et tardives, sèches, dures, difficiles, et seulement avec efforts; dures, noueuses, avec brûlement a l'anus, a la suite d'une constipation de deux jours, selles au total plus rares et plus fermes - Provoque des selles faciles (s.?), facilité les évacuations intestinales (8 %); selles molles, ou bien aussi en bouillie les prenners jours; évacuations fréquentes, en bouillie (s); Diarthee (s); quelquefois diarrhée, une fois constitution (s). ffunt la selle : lassitude generale, fatigue au point de s'endormir, buillement et accumulation d'eau dans la bouche; après la selle (molle), pression a l'anus - A l'anus : tiraillement, picotement, vers le soir : boutons hémorrhoidaux autour de l'anus, avec tenesme dans le rectum et nouvelle evacuation d'une selle liquide, apres chaque selle ferme.

Voies urinaires. Bessin d'uriner, avec tiraillements fréquents dans le gland qui parcourent tout le corps — Sécrétum d'urine augmentée (s'aussi); emission d'urine plus fréquente et plus abondante; il faut se lever la muit pour uriner; pression sur la



417



vessie, vers le matin, par l'accumulation de l'urine, qui est plus abondante. — Urine claire comme de l'eau et en même temps plus abondante et plus frequente; jaune clair, avec odeur de violette, brune, chaude et brulante dans l'urethre. — Dans l'urethre, sensation continuelle, en etant assis, comme si une goutte y coulait, ardeur a l'orince — Dans la region de la cessie,

pression comme par besoin d'uriner.

Parties genitales. Dans la verge, gonflement d'un vaisseau lymphatique à la suite d'erections matutinales, tiraillements a la naissance de la verge, ou bien aussi au cordon spermatique droit et le long de la face interne de la cuisse — Appetit venerien diminue, chasse la lascivite et les reves voluptueux (s), érections douloureuses, dans le sommet du matin pollutions, quelquefois pendant les reves lascifs dans le sommeil du matin, ou bien deux, dans une nuit, sans en avoir conscience, pendant un sommeil profond — Regles trop hâtires, d — 6 jours, ou bien de 4 (avec douleurs crampoides dans le ventre). — Favorise les regles (s).

Augmente le lait dans les seins (s)

Laryux et Toux. Voic beaucoup plus etendae. Rudesse dans la gorge · apres la lecture a baute voix; dans le pharynx dans le larynx, forçant a respirer prefendement; avec grattement dans la gorge (s), secherossi et grattement dans le pharynx et dans le hant de la poitrine, enfouement, le seir, ou bien aussi le matin, avec rudesse dans la gorge: sensation de plenitude dans le larvax, diminuee en renversant le trone en arrière, besom frequent de toussoter; "Sensation continuelle de plendude dans le larynx, avec irritation de toux suffoquante, parole genee et toux frequente avec expectoration. - Tous par chalonellement dans la gorge quelquefois avec sensation d'oppression de la poitrine; avec sensation de secheresse brulante dans la gorge, fréquente, sèche de temps en temps on bien par montements courts, avec ébrantement de la podrine, de meme que du ventre et de l'occiput, seche, aboquate, doub arease, provenant d'une toux deja existante, avec expects ration facile a detacher, spasmodique, creuse et seche, ou men excessive et menagant de briser la poitrine, provoquee par un chatauillement dans le gosier, cla toux seche provenant d'une toux deja existante et paraissant surfeut, selen les variations de l'atmosphere, disparant completement Exerction de mucosates par la toux (qui etait seche auparavant') et les mouvements sont plus vigoureux et plus longs, expectoration abendante de mucosites par une toux courte. - Pendant la touce ou la tussiculation. aggravation des deuleurs de pettrine, cour suffoquante sèche chez une personne hysterique, avec insomme persistante et sensation rengeante de fruid, dans l'estomac et le creux de l'estomac.

Poitrine et Respiration. - Dyspnee: respiration courte, génée (*), géne de la respiration, avec clancements dans l'aile du poumon gauche, ou bien avec pression dans le creux de l'estomac:



LACTUCA VIROSA.

418

respiration rapide, par affluence et à uillennement dans la portrine besoin frequent de respirer profondement, surteut en étant assis replie sur soi-meme; respiration comme insuffisante, en marchant et en se tenant del 12, a cause d'une institut a spasmodique dans les régions embalicale et pre-redule, avec besoin fréquent de respirer profendement; en respirant pref nde pont, sensation comme si la respiration ne remplissait pas la postrine.

Asthme, gene de la respiration ou de la postrine (* aresi : comme si le las de la partine ctait trop etroit, avec crainte de respirer profondement, purce qu'alors on épronce chaque fois une secourse, forte, la muit tiennt du sommeil et forçunt a se mettre promptement sur son seant, acec angoisse (s), frequente, avec per inteur sur la postrine, besoin de respirer prefendiment et soulagement momentane en baillant et en s'etirant, conne par des exhalaisons corrosives le soir au lit, avec toux suff rative, creuse, tavec besoin e ntinuel de se replier sur seem me en étant assis, parce que sans cela tout gene e mine si c'était trop etroit comme sele thorax clud frop étrait, comprime ou resserre, surtout en etant assis replie sur sci-mêne, sa bien avec frequente gêne constrictive dans la partie inferieure de la potran. sensation de constriction spasmo lique dans la region des hyporondres, surtout a droit Oppression de podeine, ou groe de la respiration (s aussi, obligeant a respirer profondement is aussi, qu'Iquefois avec besein de bailler et alante, in lacu soulagee en se levant apres av ir eté assis plu ou en cifa ant le haut du corps, avec leuleur sourde au-dessous lu struum, forte, avec gêne frequento a des parties circ ascrites de la postrine, legere des deux : tes et au dessous lu sternum, survie de sensation de chaleur à la parci epposée de la pertrire - Sensation de pléndude dans la podrine auxieuse, aggravee vers le soir ; au-diss us lu st rhum et vers la clavi il gaache, av bes in le respirer prefondement, dans foutella poitrare avec tressa ll ment leger et l'aleur de briscipent dans la poltrine. Sensut on de pesanteur sur la poitrine avec gene de la respiration comme si on acrit un quintal sar la poitrine, avec bes in d'écarter les rétements; les ur avec sensation de plinitude dans l'ybarenx; en se pronomint au grand air comme si on avait in far leau étrang r sur la poitrine, perio li pae augmentant et dimenuant, avec serrement, oppression of augmentation le chalent Lois la poitrin. Les symptomes de la patrine sont soulages larsque ou se met sur son seant, on ne peut supporter r'en de serr s'ir le thorar (parce que cela gerel crespiration). Asthme convulsef, qualquefois dans une affecti la organique du cour l'occes de sufficiation dans one la hopisio de postrine d'adropis e de postrine, avec gonflement general, anxiete, man pie de respectivit en chant conche, forçant a se mettre sar sen seaut, toux e arte. seche, grande farblesse, envie de dormit irrésistible après midi et



10 LACTUCA VIROSA. LAUROCERASUS.

l'articulation de l'epaule et du coude droit, et plus tard tantet dans le poignet, tantot à d'autres parties; élancements déliés au-dessous du droit. Grande fatigue du bras droit. Dans le haut du bras, tiraillement et sensation de faiblesse, douleur crampoîde à l'extremité inférieure, douleur de luxation au muscle triangulaire gauche, seulement le rsque le bras est plié. Dans le coude, tiraillement sourd à la pointe. A l'acant-bras droit, dechirement, suivi de sensation paralytique du petit doigt. Dans les mains, tressaillement douloureux; tiraillement dans la gauche, quelquefois spasmodique dans l'articulation, tremblement des mains (s). -- Dans les doigts, sensation de chaleur, suivie de faiblesse persistante de ces parties, dechirements dans le metacarpe des deux mains, prurit fourmillant aux doigts de la

main gauche. Extrémités inférieures. - Dans les jambes : grande fatigue: tremblement et lassitude; lourdeur, quelquefois surtout en marchant, avec tension dans les jarrets; elles s'endorment frequemment, quelquefois en etant assis. Dans les cuisses, brisement avec tension dans les jarrets, en se levant de son siège; tressaillement dans la cuisse gauche. Dans les jambes scusation de stagnation de sang, quelquefois en etant assis, avec lourdeur on bien seulement dans la droite pendant le repos et avec tiraillements, douleur tiraillante dans la droite avec sensation de roidissement, quelquefois remontant jusqu'a la hanche, tremblement dans la jambe gauche, l'apres-midi; crampe dans le mollet gauche, en marchant. - Dans les pieds : douleur a la plante du pied gauche, pendant le repos, comme s'il avait saute sur une pierre, se dissipant en appuyant le pied, froid aux pieds. Aux orteils : prurit formicant (au pied gauche) ; douleur dans le gros orteil gauche, comme s'il était difforme et renverse en arrière, en appuyant le pied; douleur comme d'ulcoration sous-cutance, audessous de l'ongle (le 4me).

LAUROCERASUS.

LAUR Laurier-cerise. — HARTLALB et TRINKS. — Hist. nat. et prep. Voy Pharmae. homosop., p 238. — Doses usitées : 3, 30. — Durce d'action 6 a 8 jours quelquefois.

ANTIDOTES Camph. coff. ipec. op.

Companen avec Amm cauth, thin coff, spec, kal, merc, n-voin, op. rhos sec apig, versir.

CLINIQUE. — On n'a jusqu'ici encore employé ce remède que contre : Cyanose (?); Philusse florissante et Choléra.

Voy. la note, page 15.



LAUROCERASUS.

421

SYMPTOMES GENÉRAUX. Iresaullements conculués et spasmes par acces. — Indammation des arganes internes. — Tremblement, surtout des mains et des pieds, pendant l'exercice en plein air. — Faiblesse subite, aceq accablement nerreux, excesser — a sprinderie arec paralysis des membres) — Évanous-sements — Douleurs tractives et dechirement dans les membres. — Manque d'energie de la force vitale. — Convulsions apileptiques avec soume à la bouche — Tetanos. — Aggravation des souffrances, le set amelioration la nuit, et au grand air

Sommeil. Buillement's tempuents, souvent accompagnes d'horripilation avec chair de poule. Envie de dormir insurmontable, le jour et le soir de bonne heure. Sommelence, parfois comme un coma vigil. Insomnie par surexcitation et acces de chaleur.

Reres pembles et aastes.

Pièvre - Frasonnement et frassons tebrules, ne se dissipant ni a la chalcur du fou ni a celle du lit. Horripilation avec chair de poule, survie de chalcur brulante - Froid de tout le corps, mais surtout des pieds principalement au grand air. - Manque de chalcur naturelle - Pouls faible lent et irregulier.

Moral. Abattement meral Forte anxiete, apprehension et agitation, qui ne permettent le rester nulle part, ni de s'endormir le suir mais qui se dissipent au grand air. Repugnance pour le travail de l'esprit - Promptitude et precipitation morale Finhlesse de la memoire. Incapacite intellectuelle.

Esprit obtus et perte de connaissance.

Tôte. - Etourdissement avec chute et perte de connaissance.

Irresse et certige, avec envir de dormir - Vertiges en se relevant après s'etre baisse, ou en se levant de son siège avec un code devant la vue, ou arec sensation comme si tous les objets tournaient en rond. Mul detéte stupepant et gravatif avec sensation, comme si, en se baissant, le cerceau tombait en acant et se heurtait contre le crane. - Mal de tête pressif, très-violent dans l'appartement. - Froid sontinuel dans la tête. - Congestion a la tête arec chaleur et battement. - Les maux de tête se dissipent par une sensation de froid au vertex, dans le front, la nuque et jusque dans les reins

Youx. Douleur brulante dans les yeux. Secheresse des yeux.

Youx largement ouverts on a demi fermes, convulsés, proéminents et fixes. Papilles dilutées, namabiles. Obscureissement de la vue. Tons les objets paraissent plus gros qu'ils

ne le sont en effet.

Visage. Teint pâle, blufusel et quis - Visage have, on boufii et gonfie. Distorsion des traits. Crampes de la machoire. Tressaillements des muscles de la face. Eruption autour de la bouche.

Bouche. Bouche sèche et pateuse. Ecume à la boache. -Sensation de froid sur la langue. - Perte de la parole.



LAUROCERASUS.

Gorge Mal de gorge, avec sensation douloureuse comme si elle etait tirée en bas, pendant et hors le temps de la déglutition Crampes dans le gosier et l'excephage. On entend le bruit que font les boissons pendant qu'elles descendent. Déglutition empichée ou ginée — Sensation de froid ou chaleur et doulour brûlante dans la gorge et dans le fond du palais.

Appetit. Gout d'ue âtre, u acre et excitant . Soif ardente, avec sécheresse de la bouche. . Absence d'appetit avec répa-

gnance pour tous les aliments - Faim excessive.

Estomac. Renyms à vide violents, ou avec gout des aliments —
Fort dégoût, nausces et romissement, même des aliments
Vomissement de matieres noires — Pression à l'estomac
Maux d'estomac jusqu'u faire eranouir. Grande angoisse
dans la region precerdale — Sensation de froid ou brûtement
dans l'estomac et l'epigastre — (Inflammation de l'estomas).

Ventre. Coliques an-dessous de l'embrie comme si on coupait les intestins. Sensation d'un genflement de la grosseur d'une noix, dans le cote gauche du bas-ventre Tranchees, crampes et contractions dans le ventre Sensation de froid, ou chaleur et brâlement dans le rentre Inflammation des intestins i - Col. qu'es flatulentes - Borborygmes, grandement et gargouillement dans le ventre et l'est mac. Pincement dans la region ombilicale.

Selles Construction. Selles dures, tenaces, avec efforts.

Diarrhers avec ténesme, douleurs incisives et brûlement à l'anus.

Diarrhees de mucosités verdatres, avec e ntraction dans les aines.

Selles involontaires. Paralysis du sphineter de l'anus.

Urines. Retention d'armes. Urine aqueuse, jaune pale. Urine ecumeuse, âcre — Sediment epais, rongeatre, dans les armes — Emission involontaire des urines. — Paralysie de la vessie — Pendant l'émission des urines, deuleur dans la region de l'estomac

Parties génitales. Exaltation de l'appetit venérien. - Gangrene des parties genitales -- Règles trop hâtires et trop abondantes - Per lant les regles, dechirement dans la tête, odoutal-

gie et tranchers

422

Larynx. - Enrouement, aprete et grattement dans la gorge et le pharynx — Sensation de gonflement du pharynx — Voix grave de l'asse-taille — Constrution spasmodique de la tracherartere. — Petite toux courte, provoques par un chatomlisment et un gratt ment dans la gorge — Expectoration gélatineuse, alendante, avec petits pemis de sang.

Poitrine. — Respiration leute, faible, an eieuse — Respiration rálante, ronflante — La respiration est arrêtee dans la region de l'estomac. — Respiration asthmatique econne si les poumens ne provaient pas assez se dilater, ou comme par paralysie des poumons. — Pression a la poitrine. — Construction de poutrine,



LAUROCERASUS. - LEDUM PALUSTRE.

423

avec oppression. Brûlement et élancements dans la poutrine. Douleurs dans la région du cour. Battement du cour.

arregulier et lent.

Membres. Tiraillements aigus et elancements dans les épaules et les bras. Sensation brulante dans les mains, avec gouflement des veines a ces parties. Tremplement des mains Peau seché et râpeuse, entre les doigts. Tiraillements aigus et élancements dans les genoux. Engourdissement des pieds.

LEDUM PALUSTRE.

LED Romarin sagrage. HABNEMANN — Hist. nut et prep Voy. Pharmac. homotop., p. 239 — Dores unitees: 15, 30. — Datee d'action; 6 à 7 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTE CAMPA.

COMPARER AVEC. Alum are bry canth cham by mere, puls thus, septiming the medicament convicut quelquelots apres by: — Après ledum

convenuent quelquefois Chin sep.

CLINIQUE. Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas a l'en pourra consulter ce no di ament contre : Affections arthritiques et rhumatismales . Nodosites arthritiques . Affections by le piques : Dartres et autres emptions chroniques ; Anasarque Fur noles . Coma somnolent? Cophalalgie congestive ou rhumatismale? . Ophthalmies rhumatismales et arthritiques?; Dureto de l'eule (par refroidissement de la tête pour s'être fait couper inopportunément les chovour). Dartres et autres eruptions a la face . Hemorrhagie nasale et buccale ?; Ascite? Diabete? ; Gonorrhée chronique? , Laryngite chronique (Phthise laryngee)? ; Toux convulsive Coqueluche? . Phthisie pulmonaire? , Pneunoune chronique? ; Podagra? . etc., etc.

Van. la note page 15

symptomes généraux. *Douleurs arthritiques pressives, et tiraillantes aigues, ou sin plement pressives, dans les membres, aggraires le soir à la chaleira du lit. Lagourdissement et sensation le toipeur dans que lqu « n'embres. Douleurs dans les articulations, déchirantes ou lancinantes pulsatives et paralytiques, aggraires par le mouvément. Les douleurs lans les articulations sont les scules qui s'aggravent par le mouvement, il n' n'est pas de meme des autres. N'idosites gentteuses dans les articulations. Gonflements durs, chauds, tendus, avec douleurs dechirantes. *Gonflements hydropiques de quelques



LEDUM PALUSTRE.

424

parties, ou de toute la peau du corps. - Froid et manque de chaleur vitale. La chaleur du lit est insupportable, et provoque

de la chaleur et un brulement dans les membres

Peau. - Prurit et rongement a la peau, avec brulement après s'être gratte. Demangeaison rongeante, comme par des peux. - Éruptions miliaires - Éruptions comme la clavelce, avec desquamation - Taches bleuâtres sur le corps, comme des petéchies. - *Dartres sèches, furfuracées, excessivement pruriantes, - *Furoncles.

Sommeil. Forte envie de dormer le jour, comme se on était erre; sorte de somnolence, avec grant desir de se coucher. Insomme nocturne, avec jactation inquiete, tressaillements, visions et images fantastiques en fermant les yeux. Rêves agi-

tes, anxieux. Reves lascifs, avec émission de sperme.

Fièvre. Frisson riolent et horripilation avec froid des membres. — Chaleur aux pieds et aux mains, le soir. Fievre le soir, avec douleur dans la tête et les yeux. Sensation de forte chaleur, alternant avec sueurs. Sueur facilement excitée par la marche, surtout au front, et parfois d'une odeur acide.

Moral. Anxiete. Dispositions à s'effrayer. Dispositions à se facher et à s'emporter. Sérieux imperturbable. Humenr

morose et chagrine. - Misanthropie - Demence.

Tête. Irresse. Vertige etourdissant, capable de faire tomber en avant ou en arrière, aggravé en se baissant ou en se promenant au grand air. Tête entreprise, avec ebranlement douloureux du cerveau en faisant un faux pas. *Maux de tête stupépants Mal de tête pressif, comme s'il y avait un peids qui deprimât tout le cerveau. Déchirement dans la tête et les veux, qui sont enflammes, avec fievre le soir *Vi dentes douleurs pulsatives dans la tête. Impossibilite de supporter une conflure quelconque. Demangeaison comme si des poux rampaient sur le cuir chevela et le front. Refroidissement facile des teguments de la tête.

Youx. Prurit dans les angles internes des yeux. Pression dans les yeux, surtout le soir, parfois avec brûlement. Inflammation des yeux, avec agglutination et douleurs dechirantes.

Larmonement brûlant des yeux — Papilles delatees — Trou-

ble de la vue, avec scintillement devant les yeux.

Oreilles. Bruit dans les oreilles Tintement dans les oreilles *Durete de l'oute, comme par obturation des oreilles.

Nes. Nez deuloureux au toucher, -- Brûlement vielent dans le

nez Saignement de nez.

Visage. - Pâleur du visage - Face bouffie, tantot rouge, tantot pale. *Rougour et éruption tubercuse au visage et au front, comme chez les ivrognes, avec douleurs Lincinantes au toucher

*Dartres seches et furfuracees, au visage, avec brulement un grand air. *Boutons et furoncles au front Douleurs violentes et dechirantes dans le visage, la nuit, alternant avec





lancinations dans une dent, et se terminant par horripilation, suivie d'un profond sommeil. — Glande engorgée, au-dessous du menton.

Bouche et Gorge. — Exhalaison d'une odeur fétide par la bouche. — Hemorrhagie buccale. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, pen lant et hors le temps de la degintifi que Sensation comme s'il y avant une cheville dans la gorge, avec elancements en avalant.

Appétit. — Goût de moisi, ou amertume dans la bouche — Forte soif d'eau froi le — Absence d'appetit et prompte satiete — I u mangeant vite, douleur contractive dans le sternum — Nausies avec envie de vomir en crachant — Leoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, avec douleurs crampoïdes dans le ventre.

Estomac Urines — Pression a l'estomac pour peu qu'on ail mange. — Maux de ventre comme si les intestins étaient meurtris.

Douleur tractive dans le ventre. Tranchées dans le ventre, le soit. Maux de ventre dussenterques. Expuls en frequente de vents — Constipation — Diarrhée d'excem ats meles de macosités et de sang. — Envir frequente d'arrier, avec émission peu abondante. Diminution de la secretion des urines.

Emission frequente et abondante d'arriers — Gonflement de l'arethre.

Parties genitales. Erections violentes et de longue durée.

Pollutions de sperme sanguinolent ou séreux - Inflanimation du gland Regles trop hatires et trop abondantes

Larynx. Chatouillement au lirynx Toux preceder de suspension suffoquante de la respiration. — Toux spasifique, fatigante qui ressemble a la coqueluche Toux arcc expectoration purulente, surtout le matin ou la nuit. Expectoration verdatre et d'odeur fetide, par la toux. *Toux creuse, ebraniante, avec expectoration d'un sang ronge rif.

Poitrine. Respiration genee et doub areuse. Respiration spasmodique et sanglotante, comme apres avoir pleure amerement. Respiration genee en montant un escalier. *Oppression constructe e de la podrine, aggravee par le mouvement et la marche. Douleur dans la podrine en respirant, comme s'il y avait deuans quelque chose de vivant. Etuncements dans la podrine, surteut en elevant les bras ou en les remuant. Etunction sur la podrine, ressemblant à la clavelee. *Demangeaison rongeante à la podrine, avec taches ronges, et minaires *Douleur d'executation sous le sternum.

Tronc. Roudeur douloureuse dans le dos et les lombes, après avoir été assis Dechirement depuis les reins jusque dans l'occiput, surtout le soir Violente douleur cramp ide au-dessus des hanches, le soir, avec suspansion de la respiration.

Bras. Dechirement et tiraillement pressif duns les brogi

LEDUM PALUSTRE. -- LEPTANDRA VIRGINICA. 26

Elancements dans l'épaule, en élevant les bras ou en les remuant. Daulear pressive dans les articulations de l'épaule et du conde oggrarec par le moucement - Eruption comme la cla-

D uleurs dechirantes dans les mains et les Nodus des arthritiques and arta dations des mains voles, aux bras Morteur de la paume des mains Tremblement des mants en les remainten doistsel des dougts

*D uleur rhumatismale, paralytique, a l'articulatien Haute on progret Doulear de brisement et d'eccoriation dans le en susseint an objet perioste de la suisse et dans les gen uv quant, avec craquem ut et flechissement en marchant. sion crampiale dans les genoux, les mollets et les taleus : Fais e we femorale blesse et tremblement des genoux, en ctant assis et en marchant. -*Gonflement dur et tendu du genou, nece clancements et donleurs nocturnes, pressires et déchirantes, et durete de toute la jambs. - Gonflement de la jambs, au-dessus et au-dessous du genou, avec chaleur et douleur lancinante, tractive. - Roideur des pieds. — Douleur à la plante des pieds, en marchant, comme si elle était écorchée. - *Gonstement instammatoire, ou même adémateux des jambes et des pieds. — Douleur incisive dans les orteils, la nuit, pendant le sommeil. — Gonflement de la partie charnuc du gros orteil, avec douleur en appuyant le pied.

LEPTANDRA VIRGINICA.

- Leptandre. - Voy. HALE, Remèdes américains.

IS CLINIQUES. - Les principales affections contre lesquelles dicament, encore peu connu dans ses symptômes, a été jusrecommandé ou employe avec succès, sont les suivants: stralgie, avec tranchées violentes dans la partie inférieure de astre, venant par accès en dehors d'une douleur continuelle, e et pénible dans la même partie, s'aggravant par les boissons es, ainsi qu'en se levant et s'accompagnant d'envie pressante er à la selle, qu'il est impossible de retenir un seul instant. patite et autres affections du foie, avec selles très-foncées, sque noirêtres, urines brun foncé, douleur dans la région du , langue chargée d'un enduit jaune, na de vomissement. ophie aigue, jaunatre, du foie, avec 1. Peau sèche et chaude, extrémités m

ume de la poix, langue chargée d'un end ire au milieu. — letère, avec douleux e



LEPTANDRA VIRGINICA. — LYCOPODIUM.

dans la région de la vésicule bilieuse, chaleur et douleur dans le foie jusqu'à l'épine dorsale, frissonnement le long du dos, et selles comme de l'argile. — Diarrhée par refroidissement, pendant un froid humide, évacuations aqueuses, abondantes, avec tranchées violentes dans l'intestin grêle. — Hémorrhoïdes saignant fréquemment, avec constipation et douleurs violentes au-dessous de l'os sacrum.

LYCOPODIUM.

LYC. — Lycopode, Pied-de-loup. — HARNEMARR. — Hist. nat. et prép. Yoy. Pharmac. homœop., p. 244. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 40 jours, dans plusieurs cas de maladies chroniques.

Antidotes : Camph. puls.

COMPARER AVEC: Ambr. amm. ars. bell. bry. cale. casth. caps. carb-veg. caus. cham. cic. con. graph. led. magn. mag-n. mag-m. merc. mar-ac. natr-m nitr-ac n-vom. plat. phos. phos-ac. puls. rhod. rhus. sep. sel. staph. sulf. thui. — C'est surtout après: Calc. et stlic. que es médicament convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le lycopode, conviennent quelquefois: Graph. led. phos. puls. silic.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : --Affections, principalement des personnes (et surtout des femmes) d'un caractère doux, portées à la mélancolie, ou d'une constitution lymphatique, on même leucoflegmatique, avec disposition à prendre des rhumes de cerveau, des catarrhes pulmonaires et autres écoulements muqueux; Engorgement des glandes; Suites facheuses de l'abus du mercure; affections rhumatismales et arthritiques, même avec gonflement et nodosités goutteuses; inflammations sigués et chroniques; crampes et convulsions?; Épilepsie?; Affections scrofuleuses et rachitiques; Inflammation, déviation, carie et autres maladies des os, même celles provenant de l'abus du mercure ; Paralysie?; Affections hydropiques; Atrophie (des enfants scrofuleux); Excoriation de la peau; Dartres et autres éruptions chroniques de différentes espèces; Ulcères invétérés et fistuleux; Anasarque; Varices; Anévrismes; Ulcères par l'abus du mercure; Furoncles: Fièvre typhoïde; Céphalalgie même à la suite d'une colère; Céphalalgie rhumatismale; Migraine?; Teique; Calvitie; Ophthalmies scrofuleuses?, rhumatismales?, arthritiques?; Amblyopie amaurotique; Fongus médullaire aux yeux?; Coryza chronique ou aigu; Otite et otorrhée, surtout à la suite de la scarlatine, ou chez des individus scrofuleux; Névralgie faciale; Disposition à des érysipèles à la face; Dartres et antres éruptions faciales; Croûte de lait?; Angines chroniques, même avec ulcération, et même après avoir fait abus



LYCOPODIUM.

du mercure; Odontalgies rhumatismales: Fistules aux gencives?: Dyspepsie, gastralgie et autres offections gastriques; Squirre (cancer) de l'estomac; Hépatite chronique; Coliques flatulentes; Ascite?; Inertie des intestins et constipation opiniâtre; Calculs rénaux et gravelle; Hematurie, Incontinence d'urine; Orchite; Induration des testicules?, Gonorrhée secondaire?; Dysménorrhée; Souffrances chlorotiques, Varices et constipations des femmes enceintes, Dispositions a l'avortement, avec varices au parties?; Exceriation et constipation des nouveau-nés; Catarrhe chronique; Grippe: Pneumonie chronique; Souffrances phthisiques; (Phthisie tuberculeuse;) Hemoptysie; Affections organiques du cœur, surtout hypertrophie; Goître: Goutte aux mains: Goutte arthritique, ou scrofuleuse; Tumeur blanche?, etc., etc.


Voy. la note, page 15.

428

symptomes canendre. - *Tractions et déchirements dans les membres, le plus souvent la nuit et pendant le repos, quelquefois aussi l'après-midi, tous les deux jours, et surtout par un temps venteux ou pluvieux, soulagés par la chaleur. - *Donleurs lancinantes dans les parties internes ou externes. - *Roideur douloureuse des muscles et des articulations, souvent avec torpeur et insensibilité des membres. *Engourdissement des membres.

"Grande facilité à se donner un tour de reins, qui souvent est suivi de roideur de la nuque. - *Crampes et contraction des membres. Extension et rétraction spusmodiques et involontaires de quelques muscles ou de quelques membres. --*Secousses et tresmullement de quelques membres et de tout le corps, pendant le sommeil et la veille. -- Crampes dans les parties internes et externes, même la nuit. -- Attaques d'épilepsie. quelquefois avec cris, écume à la bouche et grande angoisse de cour. - Gonflements hydropiques et inflammatoires. - Va-*Nodosités arthritiques. — Gonflement des glandes. - •Inflammation des os, arec douleurs nocturnes. — Déviation et ramollissement des os. — "Ulcération des os. — Les symptômes sont aggravés fréquemment vers quatre heures après midi, et recommencent à s'améliorer vers huit heures du soir, à la faiblesse près. -- Affections periodiques. - Bouillonnement de sing par tout le corps, surtout le soir, avec agitation et tremblement. - Sensation comme si la circulation du sang était suspendue. - Fuiblesse intérieure. - Grande susceptibilité nerveuse. -- *Faiblesse et lassitude dans les membres, sensible principalement pendant le repos, ou le matin, au réveil. - Après une promenade très-courte, fatigue, surtout dans les jambes, et sensation brûlante aux pieds. -- Crainte de monvement et désir confinuel d'être couché. - Prostration totale des forces, avec machoire pendante, yeux voilés et à demi fermés, et respiration lente par





la bouche. *Grand amaignissement, aussi chez les enfants.

Acces de défaultance, surtout le soir, et quelquefois même en étant conche, avec perte des sens, obscureissement de la vue et grande indifférence. Tremblement des nombres. -- *Manque de chaleur vitale — Grand desir on forte repugnance pour le grand air, avec sensibilité excessive à l'air frais — Forte dis-

position a se refroidir.

Peru. *Rongement et prurit, le jour, en s'échauffant, ou le soir avant de se coucher. — Tendance de la peau a se gercer facilement. *Eruptions douloureuses. Eruptions urticaires. — Grandes taches rouges sur la peau. Taches hepatiques, pruriantes. *Ephélides abondantes — Dartres insensibles d'un brun jaunatre, ridees ou hunodes, purulentes, plemes de crevasses profondes et de croûtes epaisses. — *Gros furoncles, qui reviennent periodiquement. — «Ucères saignants, avec douleur lancinante et brûlement pendant le pansement, ou avec dechirements nocturnes et prurit. — Ulcères fistuleux a bords calleur, rouges, renversés et luisants, quelquef is avec inflammation et gonflement de la partie affecter — *Plaques excorices à la peau, chez les enfants — *Vernes, surtout celles a queue Engelures — *Grande secheresse de la peau — Anasarque,

arec grande amotivité des intestins et de la peau

*Enrie de dormir le jour, et le soit de bonne heure; avec sommed tardif, par affluence d'idees et forte sur relation nerveuse -- Sommed agute et imparet arec réces annuax, effrayants, et réced frequent avec effroi. Reves voluptueux, vifs, tristes rêves de meurtres ou des occupations de la journee, etc. Tressullements eris, sursauts avec effroi, ou celats de rire, ou pleurs et gemissements pendant le sommell. *La nuit, tressullement et inquiretudes dans les jambes, mal a la tete, angoisse, cauchemar, ebullition de sang et battement du cœur, mal a l'estomac, coliques, seuffrances asthibatiques, etc. Difficulte de rester couche sur le cote gauche, a cause de battements de cœur et d'élancements. Impossibilité le rester couche, la nuit, parce qu'on ne se trouve l'en dans aucune position.

Pièvre. Frisson le soir, qui lquefois l'un seul côte, ou tous les deux jours, avec chaleur, ou suivi de sucur sans chaleur. Manque de chaleur vitale. L'ievre tièree, avec vomissements acides et bouffissure de la face et des mains après le frisson. Chaleur fugace. Chaleur brulante, avec respiration courte. Fievre maligue, avec meel meet et cit mauvaise humeur en s'eveillant, ou avec surexcitation n'eve ase, sans chab ur à la tête ni rougeur du visage, rougeur circonscrite des joues, grande friblesse, sueurs qui ne sculagent pas, langue rouge et seche et constination. Prevre lente, avec sueurs necturnes, visqueuses. Fievre avec prostration de toutes les forces, machoire inférieure pendante, veux voi-



LYCOPODIUM.

480

les et a demi fermés, et respiration lente avec bouche ouverte.

Sueur, principalement à la face, facile à eveiter le jour par un léger exercice - Sueur febrile le jour. Sacur na turne, sou-

Moral. *Melancolie taciturne et humeur chaquene on de se spere de son salut éternel *Angoisse, surte ut dans la region de l'épigastre, avec melancolie et disposition a pleurer, surtout après s'etre fache, on a l'approche d'autres personnes Misanthropie *Crainte de la solitude *Irritalidite et susceptibilité avec pleurs. Irascibilité. *Opiniatrete Alemation et fureur, qui se manifestent par l'envie, les reproches, l'irrogance et le despotisme. Caractère dour, soumes Indifference et mplete - Aversion pour la parele. - *Fat'que par des efforts intellectuels et impossibilité de se lever a des travaux de tête. - Étourdissement, - Impossibilité de s'exprimer correctement; on se trompe de mits et de syllabes. Parole embrouillée.

Tête. Etourdissement et vertiges, comme par ivresse - *Vertige tournoyant, surtout en se baissant, ou dans un appartement chau l, avec envie de vemir Mal de tête a la suite d'une emotion facheuse. -- "Mal de tete avec disposition à s'evanouir et grande agitation *Mal a la tete avec vertiges, *Pesanteur de la tete Mal à la têt en la sec mant, et en la tournant, comme aussi a chaque pas que l'en fait. Cephalalgie an-lessus des yeux, immediatement apres le dejeuner Mal le tete semilatéral le soir, aggrave jusqu'a devenir insupportable, par le travail intellectuel * Maur de tele pressets, p. 17 n.fc.s e mine si on enfonçait un clou dans la tete, la avec teasien qui angmente en chant couché. * Mance de tete dechirards, suitout l'aprèsmede on la nuit, principalement dans le front, mais souvent aussi dans toute la tête des youx, le nez, et jusque dans les deuts, avec besein de se coucher Maux de tote lanemants Battement dans la tete, le soir, après s'etre couche ... *Congestion a la tête, avec chaleur de cette partie, quelquef is le matin en se redressant dans le lit. Con motion et resonnement dans le cerveau, a chaque pas - Terebration, rail in nt et de herement an our cherely, surfact la nact. Morrowents and let ures et tremblements convulsifs de la tête. Forte disposition a se refroder la tete. * Ecupto o à la tête, vace suppor ition abondante et fetide, *quelquet as avec engergement d's glandes de la nuque et du con. Les cheveux d vo mont gris - *Calville.

Youx. Pression dans les yeux. *Brûlement rongeant et élancements dans les yeur (et les paupores, surteut le soir, à la lumière. *Cuisson dans les yeux. Sensation de fried dans les yeux, le soir *Inflammation des yeux et des paupières. Orgelet. - *Agglutination des paupières, surtout la nuit, et



LYCOPODIUM.

432

terieur de la bouche et de la langue. — Exhaluson d'une odeur putrule par la bouche. — Hémorrhagie buccale. — *Langue sale, chargee. — Meuvements involontaires de la langue — "Regayement, seulement pour le dernier mot de chaque phrase.

Gorge. - Sensation detranglement dans la gorge, avec deglutition empéchee. - *Secheresse dans la gorge. - Douleur d'excoration dans la gorge - *Douleur brulante dans la gorge, avec soit nocturne. - *Sensation comme si une beule montait du creux de l'estomac dans la gorge - Inflammation de la gorge et du palais avec douleur lancinante, qui empeche la deglutition. - Gonflement et suppuration des amygdales. - *Ulceres semblables aux chancres, aux tonsilles. *Renúclement de macosites. - *Enduit lardace concrunt tout le voile du palais et le palais même, avec ou sans cause syphilitique évidente. - *Durires sy-


philitiques dans la gorge

Appétit Perte du gont. *Bonche pâteuse ou amère, surtout le matin, seuvent avec nausees. *Aigreurs dans la bonche, surtout le matin, ou goût aigre des aliments — Absence de soif ou soif ardente. — Soif moctuene — *Perte de l'appetit, quelquéfois à la prennère bouchee — *Faim immodèree. Boulemie. — *Repugnance pour les aliments cuit, en chauls, pour le pain de seigle, la vande, le cafe et la fumée de tabae — Appetience excessive pour les donceurs. — Impossibilité de digèrer les aliments leurds — Après le repas, douleurs he patiques, oppression et plenitade dans la poutrine et le centre, nausees, chaleur à la tête, rougeur de la face, pulsation et tremblement dans tout le corps, mains chaules, battements de cœur, coliques, etc.

*Après avoir pris du lait, aigreurs et diarrhée.

Estomac. *Renvois violents apres midi. *Rencois aigres brulants, gras ou amers. Regargitation aigre des aliments, surtout du lait. *Pyrosis, surtout après le repas - Hoquet ciolent, par acces, surtout après le repas - Nausées dans l'appartement, se dissipant au gran l'air. «t rice versu. - *Nausées feequentes, continuelles, surtout le matin, avec amertume de la bouche - Nausées par le mouvement de la veiture - OS cusation de faleur à l'estomac, le matin - *Pituites de l'estomac, quelquefois tous les deux jours, avec écoul ment l'une cau amère, - *Vamissement des aliments et de l'île, surtout la nuit ou le mutin a joun - *V massements de matières verdatres, amères. - Venissement de sang - Thaleurs d'estomac avec frissons et mains n'ortes, après s'etre l'gérement réfroids. Douleurs d'estomac nortes, après s'etre l'gérement réfroids.

tomac periodi ques, soulagees a la chalcur du lit *Pression a l'estomac periodi ques, soulagees a la chalcur du lit *Pression a l'estomac, le s ar, et après chaque repus, quelquef as avec amertume de la beuch . Deuleurs compressives et contractives a l'estomac . Les douleurs l'estomac se nomifestent principalement le matin, au grand act, après le repas eu après avoir bu du em , elles dincinu at quelquefois le soir, et sont souvent accom-



LYCOPODIUM.

434

 Après le coît et les pollutions, lassitude. — Ecoulement de liqueur prostatique.


Règles. - Prurit, *brulement et rongement à la vulve. - Pression vers le dehors, au-dessus de la vulve et jusque dans le vagin, en se baissant "Expulsion de vents par le vagin "Secheresse chronique du ragin *Deuleurs lancinantes dans les levres, en se conchant. Excoriation entre les cuisses, à la vulve.

Pendant et apres le coît, deuleur brûlante dans le vagin. -*Règles (trop hâtives), trop abonduntes et de trop longue durée.

Regles faciles a supprimer pour longtemps, par une frayeur. *Avant les regles, frissons, tristesse, mélancolie Pendant les règles, delires avec pleurs, maux de tête, aigreurs dans la bouche, maux de reins, gonflement des pieds, evanouissements, vomissement de matières aigres, tranchées, coliques et douleurs dans le dos. *Leucorrhee laiteuse, jaunatre, rougeatre, et rongeante, equelquefois précédee de tranchées dans le bas-ventre. - Gonflement du sein avec nodosités. - "Excoriation et croûtes suintantes aux mamelons.

Larynx. Grattement fermicant dans la trachee-artere, la nuit. Catarrhes bronchiques des plus opinitres, avec expectoration de mucosites jaune citron et amères - Enrouement, avec raucité et douleur d'excoriation dans la postrine, apres avoir parlé. Accumulation de glaires dans la poitrine avec râle muqueux. - Voix faible et sourde. *Toux apres avoir bu, Toux matutinale opiniatre et seche. - *Tour nocturne, qui ébranle la tête, le diaphragme et l'estomac. *Toux sèche jour et nuit. *Toux provoquée par un chatouillement, ou comme produite par la vapeur du soufre, ou exertee en respirant profondement, géneralement avec expectoration gris jounditre et salce, equelquefois avec grande faiblesse d'estomac, fievre, sueurs nocturnes et amaigrissement - "Toux avec expectivation abondante de matières verdatres. - *Expectoration abondante de pus, en toussant. *Toux avec expectoration de sang. *En toussant. coups dans la tete, respiration courte, cuisson et ébranlement

dans la portrine, ou douleurs a la region stomacale. Poitrine. — Haleine courte pendant presque tout travail, même chez les enfants. *Oppression de postrine continuelle, aggravée par la promenade au grand air. - Rale muqueux et rouflement en respirant. En respirant, tressaillement et élan ements dans la poitrine et les cotes de la poitrine. Douleur de meurtrissure dans la poitrine - *Pression continuelle dans lu puitrine. - l'esanteur dans la politime. Tension à la partie antérieure de la pottrine *Lancinations dans la poitrine, surtout a gauche, et principalement en éternuant, en toussant, en riant et au plus leger mouvement, quelquefois avec impossibilité de rester couché sur le côté malade, et gêne de la respiration. - Douleur d'exceriation dans la peitrine, surteut après avoir



LYCOPODIUM. -- MAGNESIA CARBONICA. 436

ment des jambes, avec taches rouges brûlantes, étendues, et douleurs qui ne permettent pas d'appuyer le pied. -- Paralysie des jambes, avec pissement de sang et constipation. — Dartres aux jambes et aux mollets. -- "Tumeur blanche au genou. -- "Crampes et douleurs crampoïdes dans les mollets, surtout en marchant, et la nuit. - Douleur brûlante aux jambes. - Ulcères aux jambes, avec déchirements noctumes, prurit et douleur brûlante. - *Douleur à la plante des pieds, en marchant. - *Crampes dans les pieds et les orteils. - Gonflement des pieds et des malléoles ou de la plante des pieds (avec douleur lancinante). — *Pieds froids. — Sueur froide aux pieds, parfois abondante et avec excoriation de la peau. - oFléchissement des orteils en marchant. — *Contraction des orteils. — *Cors aux pieds, quelquefois arec douleur lancinante.

MAGNESIA CARBONICA.

MAGN — Magnésie. carbonatée, carbonate (sous-) de magnésie. — HANNE-MANN — Hust. nat. et prép. Yoy. Pharmac. homosop., p. 118. — Dose mattee : 30 — Durée d'action : jusqu'a 50 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

COMPARER AVEC : Bar bell bry. cale cham. con. graph. kal. lyc. magn-m.

zitr-ac. n-vom. phos. puls. rhus sil. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : --Affections, principalement des enfants, ainsi que des femmes, et surtout des femmes hystériques ou mal réglées: Affections scrofuleuses?; Epilepsie; Atrophie des enfants?; Glandes engorgées?; Dartres?; Migraine; Céphalalgie hystérique?; Ophthalmies scrofuleuses?; Cataracte; Obscurcissement de la cornée: Dureté de l'ouïc; Odontalgies rhumatismales, ou chez les femmes enceintes; Névralgie faciale?: Gastralgie; Aigreurs des enfants; Duarrhées, surtout chez les enfants : Diabète??; Coliques spasmodiques ; Spasmes abdominaux hystériques; Odontalgies des femmes enceintes; Crampes de matrice ; Dysménorrhée ; Leucorrhée ; Hernie scrutale, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensibilité douloureuse de tout le corps. — Traction et déchirement dans les membres. — Secousses doulourcuses à diverses parties. - Chute fréquente, sans perte de connaissance, en marchant ou en stant debout. ---



Attaques d'épilepsie. — Relàchement de tout le corps. — Lassitude, principalement dans les pieds, et quand on est assis. — Fatigue prompte pendant la promenade. — Le soir, inquiétude dans les membres après avoir été longtemps assis. — Les symptômes se manifestent ou sont aggravés, la nuit et pendant le repos. — Les symptômes qui se manifestent pendant qu'on est assis, sont améliorés par le mouvement.

Pean. — *Fort prurit et forte sécheresse de la peau. — Nodosités volumineuses, entre cuir et chair, avec douleurs lancinantes. — Petites dartres rouges, sans douleur, et qui finissent par s'ex-

folier. — Vésicules rongeantes. — Petits furoncles.

Sommell. — Baillements fréquents et violents. — *Envie de dormir le jour. — *Insomnie, quelquefois par oppression dans le bas-ventre ou par agitation anxieuse et chaleur intérieure, avec grande crainte de se découvrir. — Affinence de réres anxieux; avec paroles, cris et sursauts avec effroi. — Rêves de feu, de déluge, de brigands, de querelles, d'argent, de plaisirs, de malheurs, etc. — Sommeil de nuit non réparateur, avec fatigue aussi grande le matin que le soir avant de se coucher, réveil de bonne heure et difficulté à se rendormir.

Fièvre. - Frimons le soir. - Le matin, sensation de chaleur sans transpiration et sans soif. - Sueur nocturne, souvent fétide et

grasse. — Sueur acide.

Moral. - Inquiétude et peur, avec tremblement et chaleur. -


Mauvaise humeur le soir.

Tôto. — Le soir, vertige avec évanouissement. — Fatigue de la tête par les travaux intellectuels. — Maux de tête, la nuit, au lit, même pendant le sommeil, soulagés en s'asseyant. — Douleur pressire au sommet de la tête, pendant un travail intellectuel, ou au milieu d'une assemblée. — Tension et tiraillements a l'occiput, comme par roideur de la nuque. — Tractions dans le front avec nausées. — Mal de tête tressaillant, avec sensation de lourdeur après un accès de colère. — Douleurs lancinantes dans la tête, même la nuit, dans le côté sur lequel on repose. — Congestion à la tête, avec chaleur intérieure, surtout en fumant. — Desquamation du cuir chevelu, qui démange, surtout par un temps pluvieux. — Chute des cheveux.

Youx. — Inflammation des yeux, avec rougeur, élancements, sensation de brûlure et trouble de la rue. — Gonflement du globe de l'œil. — *Agglutmation des paupières, le matin. — Sécheresse des yeux ou fort larmoiement. — *Obscurcissement de la cornée. — *Taches noires devant la vue. — *Obscurcissement du

cristallin.

Oreilles. — Inflammation de l'oreille extérieure, avec rougeur et douleur d'ulcération. — Grande susceptibilité de l'oule au moindre bruit. — *Dureté de l'oule, avec bourdonnement dans les oreilles, surtout dans l'appartement. — Tintement, gronde-



MAGNESIA CARBONICA.

ment et sensation comme si un oiseau battait des ailes, dans les oreilles.

Nez - Epistaxis, le matin - Eruption vesiculaire dans le nez, avec douleur pressive Obturation du nez. *Coryza sec, qui ne

permet de respirer que par la bouche.

Visage .- - Teint broudle, pale, terreux. Reugeur et påleur alternatives de la face Air manssade - Tension a la face, comme si elle était enduite de blanc d'œuf desséche. Douleurs nocturnes aux pommettes, fouillantes, terébrantes, dechrontes et insupportables pendant le repos, et forçant à aller d'un endroit Gonflement de la pemmette, avec douleur pulsative. - *Gonflement de la face et "bouffissure tubéreuse. - Eruption dartreuse autour de la beuche.

Dents Maux de dents par le mouvement de la voiture, - * Douleurs nocturnes dans les dents, forçant à se lever et à se promener, insupportables dans le repos, et géneralement brulantes, térébrantes ou comme d'ulegration, ou décharantes, tractives et tressaillantes, s'et indant jusqu'aux tempes, avec genfiement de la joue du côte affecte, roideur de la nuque et du cou, et tressaillements dans les doigts et les pleds.—Battements et elancements dans les dents, après l'repas Maux de dents aggraves par Vacillement des dents le froid

Bouche - Sécheresse de la bouche, surtout la mut et le matin. Salive sanguine lente. - Eruption vesiculaire dans la bouche et sur la langue. -- Petites tubérosités dans la bouche, qui saignent

et brûlent au plus leger contact.


Gorge. — Mul de garge, avec douleur lancinante, en parlant et en avalant. - Donleur brûlante dans la gorge et le palais, avec sécheresse et ápreté, comme s'il y avait des l'arbes d'epis dedans.

Perte du gout. Gout amer, avec langue blanche et mucosites visqueuses sur la langue et les dents Gout acide dans la bouche. Forte soif (d'eau), surtout le soir et la nuit. Grand desir de légumes, avec repugnance pour la viande, et vice versu.

- Renvois acides Renvois fréquents avec douleurs Nausées et vertige pendant le repas, survis de voa l'estomac miturition et de vomissements d'une sérosite amere eu salee -Douleur pressive contractive a l'estomac quelquefois avec renvois aigres. Sensation de fadeur et de vale a l'estomac, Douleur d'ulcération a l'esarec nausées et envie de romir tomac,

Ventre. Induration et douleurs lancinantes dans la région hépatique. - Ballonnement excessif et tension du ventre, avec sepsation de pesanteur - Crampes abdominales, suivies de flueurs blanches. - l'incements, tranchées et tiraillements aigus dans le ventre. - Hernie inguinale.

Selles - *Constitution. Besoin frequent et inutile d'aller a



MAGNESIA CARBONICA.

439

la selle, avec selles peu abondantes ou seulement émission de flatuosités — Diarrhees verdâtres, écumeuses et muqueuses, avec tranchées — Diarrhee d'odeur aigre — Expulsion d'ascarides et de lombrics — Elancements dans l'anus et le rectum, surtout pendant les ténemes.

Urines. Secretion, plus abondante que de coutume, d'une urine pâle ou verdâtre. Émission fréquente d'urine, même la nuit.
 Émission frequente des urines. Sensation de brulure et d'ex-

conation en urmant.

Parties viriles. Diminution de l'appetit rénérien. — Defaut d'erections. — Écoulement de liqueur prostatique pendant l'émission des flatuosités. — «Hernie scrotale. — Pollutions fré-

quentes.

Règles. — Sensation, comme si tout se portait vers les aines, comme pour les règles, avec tranchees dans le ventre. — *Règles trop tardices. ou complétement supprimées, ou règles trop tardices accompagnées de beaucoup de souffrances. — Regles avec écoulement d'un sang foncé, epais, gluant et comme de la poix. Avant les regles, maux de reins, coliques, boulimies, renvois fréquents et nausées. — Pendant les regles, accablement, frissons, douleurs de tête, pâleur du visage, maux de reins et douleurs crampoides, pressives, dans le ventre, qui arrêtent le flux menstruel. — Écoulement de mucosites blanches et rongeantes par le vagin, quelquesois precedé de crampes dans le ventre.

Laryax. - Toux prevoquee par un chatouillement dans la gorge, avec expectoration sereuse et salee - Toux crampoide nocturne, - Toux matutinale, avec expectoration d'un pus jaunatre. -

Expectoration de sang par la toux,

Poitrine. — Oppression de poitrine, avec sensation de constriction.

Oppression de poitrine, avec haleine courte, surtout en marchant — Pression et sensation de pesanteur, ou douleurs incisives et lancinantes dans la poitrine. — Douleurs d'excoriation et élancements dans le coté gauche de la poitrine et dans la région du cœur

Trono. Douleurs de brisement aux reins et dans le dos, la nuit.
*Roideur de la nuque. - Elancements aux reins. - Déchi-

rement et tiraillement successifs a la nuque.

Bras. - Douleur de luxation à l'articulation scapulaire, pendant le mouvement - Acces de dechirement dans l'épaule, surtout la nuit, avec fourmillement jusque dans les doigts et impossibilité de remuer les bras, tant la douleur est vive — Douleur tractive dans les bras et les mains. — Otierçure de la peau des mains. — Veneules rongeuntes aux mains et aux doigts, avec douleur lancinante. Tension crampoide dans les articulations des doigts. Chaleur aux doigts — Gonflement rouge et inflammatoire des doigts

Jambes. Inquiétudes dans les jambes. - Douleur tractive dans



140 MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA.

les jambes et les pieds. Demangeaison aux fesses, avec taches ronges après s'etre gratte : G'inflement douleureux dans le jarret. Crampes dans les mollets, la nuit. Plaques brûlantes sur le tibia. — Furoncles aux jambes

MAGNESIA MURIATICA.

MACN-M. — Muriate ou hydrochlorate de magnésie. — HARNEMANS. — Hist, not. et prép Voy Pharmac, homosop — Doses unitées: 12, 30. — Durce d'action: jusqu'à 7 semaines, dans que ques cas de maladies chroniques.

ANTINOTES — Camph ars V
Comparen avec: Bur. bry. culc. cham con. graph, magn. mitrae. n-vom. phos. puls, sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce medicament contre :

Affections, principalement du sexe femmin, et surtout des femmes hystériques : Acces de spasmes et de faiblesse hysteriques : Glandes engorgees? : Céphalalgies hysteriques, rhumatismales et nerveuses?; Ozène serofulense : Nevralgie faciale? : Dentition difficile des enfants . Souffrances gastriques . Hépatite chromque . Coliques spasmodiques . Spasmes abdommaux . hysteriques . Crampes de matrice; Nausees des femmes enceintes . Constipation des enfants pendant la dentition : Induration squire use de l'uterus . Leucorrhee, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Douleurs terebrantes ou contractives crampoides *Tractions et dechirements paralytiques dans les nombres. *Acces de spasmes et de faiblesse hystoriques. Disposition à se refroidir. — *Faiblesse du corps qui semble quelquefois provenir de l'estomac. — Sensation de malaise et de courbature dans tout le corps, avec grande sensibilité au mandre bruit. — La plupart des symptômes se manifestent en ciant assis, on la nuit, et sont genéralement soulages par le mouvement.

Peau. - Fourmillement à diverses parties de la peau. - Boutons pruritants, avec douleur brulante apres s'etre gratté. - Eruption de pustules. - Eruptions de petites papules rouges Furoncles.

Sommeil. - Forte envie de dormir le jour, avec bâillements et paresse - Sommeil tardif et insomnie à cause de chaleur, avec soif, et grande agitation dans tout le curps, en fermant les yeux. - Rêves auxieux et effrayants, avec paroles et cris pendant le



MAGNESIA MURIATICA.

441

sommeil. Sommed non reparateur. Secousses dans le corpsi la nuit, pendant la veille. — Cauchemar

Fièvre. - Frisson le soir, qui se dissipe dans le lit. - Sueur

apres minu.t

Moral. - Inquiétude et humeur pleureuse — Maussaderie et humeur chagrine. - Aversion pour la conversation. Repugnance pour le travail. - Surimpressionnabilité nerveuse, avec

pleurs faciles.

Tôte. Hebetude dans la tête, comme si on etait ivre. — Vertige le matin, en se levant et pendant le diner, se dissipant au grand air. — Loncdeur de lu tête, avec etourdissement jusqu'a faire tomber. Douleurs soulagees en enveloppint la tête — Sensation de torpeur dans le front. —*Pression tensive, dans le front et le sincipat, avec confusion et obscureissement dans la tête, principalement lorsqu'on vient de se réveiller. — Serrement comme par une griffe, et bruit dans les temp s, le soir, au lit, avec sensation, comme si on allait avoir un vertige et perdre connaissance. — Dechirements tressaillants, ai lancinants et pulsatufs, dans la tête — Congesti n a li tête, avec chaleur, bourdonnement et bouillemement doul ureur. — *Maux de tête quotidiens. — Tiraillements nevralgiques dans la tête et le visage, et jusque dans les dents, avec sensation d'embarras dans la tête.

Yeux. — Inflammation et douleur brilante dans les yeux, avec rougeur de la sclerotique. — Larmoi, ment et brûlement dans les yeux, en regardant au graul jeur. — Aughstination nocturne des paupures. — Culcur jaune de la selerotique. — Aureole

verte autour de la lun iere le soir.

Oreilles. *Pulsation d'ins l'oreille : Torpeur et durete de l'ouie, comme si un ol pit ctait applique sur l'oreille. — Elancements, tira il ments aigus et terebrations dans les oreilles.

Bourdonnement dans les oreilles

Nes. *Croites dans les aurmes, quelquefois avec ensibilité douloureuse du nez au toucher. *Executation des narines (Leculement de scrosites corrosives par le nez — Obturation du nez, avec manque d'haleine — Douleur d'executation et de brûlure dans le nez, —*Gonflement, reugeur induration et chaleur de la partie inferieure du nez avec aggravation le matin — Sécheresse penille du nez — Obturation nocturne du nez. — Coruza, avec perte du quût et de l'od mat, et mouchement de mucosités jaunatres et fétides — Perte de l'odorat

Visage. — Temt pale, januatre, ou couleur terreuse de la face. —
Douleurs tractives dans les nerfs de la face. — Tension de la face
avec douleur crampoide dans les os du visage. — Éruption
faciale. — Levres gercées. — Sensation d'âpreté aux parois internes des levres, lorsque la langue s'y perte — Ampoules grosses.

et transparentes sur la partie rouge des levres.



MAGNESIA MURIATICA.

Dente. - Mal de dents, porte au plus haut degré par le contact des aliments. - Sensation d'allongement des dents incisives supérieures. - Gonflement douloureux et saugnement facile des

Bouche. — Sécheresse de la bouche, la nuit — Accumulation abondante de salive séreuse dans la bouche -- Sensation dans l'interieur de la bouche, comme si elle avaitété brûlec. Brûle-

ment a la langue, comme par du feu.

442

Gorge. - Sensation comme si la gorge était exceriée et a vif. avec aggravation le soir et la nuit. Mucosites visqueuses et épaisses dans la gorge, souvent mêlées de sang et difficiles à expulser.

Appêtit. Soif fréquente - Boulimie et sensation de faim dans l'estomac, suivie de nausées - Faim sans que l'on sache de quoi

on a encie Desir de friandises.

Estomac. Regurgitation des aliments, pendant la marche, et, après le diner, crolent hoquet qui rend l'estomac douloureux. -- Sensation d'une boule qui remonterait du ventre dans l'esophage, se dissipant par des renvois. Nausees surtout le matin, lorsqu'on vient de se lever. Nausees fréquentes, avec évanouissement, jur et nuit. *Nauseis continuelles, eavec couleur terreuse de la face, surexcitabilité nerveuse, et pleurs faciles. - Pression à l'estomac, avec nausees. Tension et douleur d'ul-cération et de meurtressure à l'estomac, avec sous-bilité exces-

sive au contact. — Ebfanlement douloureux dans l'estomac, en marchant et en appuyant le pied.

Ventre. — Tension et elancements dans la région hépatique. — Douleurs pressives au foie, même en marchant en en appuyant dessus, aggravées lorsqu'on est couche sur le coté droit — Ventre dur et tendu. — *Ballonnement du ventre, fort et continuel, avec constipation. *Durete douloureuse du ventre et surtout du côte droit. *Douleurs crampoides dans le ventre surtout le soir, et quelquefois saivies de le ucorrhée. — Tranchées, pincements et tiraillements aigus dans le ventre. — Élancements fourmillants dans les muscles abdominaux.

Selles *Selles dures, d'fficiles, lentes et insuffisantes *Selles noueuses, comme des crottes de mouton. Fert tenesme, avec selle peu abondante, ou seulement émission de flatu sites.


*Disposition chronique a la diarrhée Diarrhées vi l'intes de mucosités et de sang. Selles verdâtres, jaunâtres ou brunâtres. Selles enduites de mucus et de sang. *Sortie de

téuia

Urines. - Envie frequente d'uriner, jour et nuit, avec émission peu abondante. Emission des urines possibles seulement par contraction des muscles abdeminanx. Torpeur de l'urethre.

Parties viriles. Fort prurit aux parties genitales et au ser tum.

- Erections fréquentes. Après le coit, brûlement dans le dos.



MAJORANA - MANCINELLA

Sommeil souvent interrompu par des besoins d'uriner. — Rêces

vifa, anxieux, fantastiques, sensuels.

444

Moral triste, avec desespoir; dégoût de la vie, mécontentement de son sort; idées abondantes, grande vivacité et besoin d'exercice et de mouvement au grand air. — *Idées sensuelles, lascires en grande abondance. — Idées de mariage, avec gaieté folle, et abattement corporel.

Têto chaude, avec inquiétude dedans; douleurs dans les tempes;

vertiges, le soir, en se couchant.

Mez saignant; sensation de contraction et de chatouillement au bout du nez.

Appétit perdu ; hoquet ; forte soif, la nuit.

Estomac et Ventre alternativement le siège de violentes douleurs, surtout la nuit, où elles interrompent le sommeil. — *Appétit vénérien fortement exalté. — *Désir violent du coît. — *Grande surexcitation sexuelle.

Mamelons gonflés, avec prurit.

Mombres pris par des douleurs rhumatismales dans les pieds, la plante des pieds, la cuisse, les doigts et l'articulation du bras.

MANCINELLA.

MANG. — Hippomane mancinella. — Mancemilier vénéneux. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 214.
Antipote?.


SYMPTOMES GENERAUX. — Faiblesse générale, avec grand besoin de se concher, et de rester conché. — *Élancement dans différentes parties. — Convulsions. — *Suites de la scarlatine. Augmentation des symptômes par la colère, ainsi qu'après avoir mangé, ou la nuit; amélioration en dant couché, ainsi que par

la chaleur. — Peau rouge.

Sommeil profond pendant le jour; état comateux et sommolence continuelle; insomnie nocturne ou réveil fréquent. — *Sommeil interrompu par des secousses comme électriques dans la partie supérieure de la gorge, au-dessus du larynx; rêves de spectres, de fautômes; au réveil, une espèce de stupéfaction. — Fièrre nerreuse, typhoïde, avec ballonnement et endolorissement de l'épigastre, augmentée en buvant de l'eau; ochaleur fugace, avec sensation comme su des flammes sortaient de l'épigastre; mains et pieds froids; sueur nocturne; sueur à la paume des mains.

Moral triste, morose; tout dégoûte et ennuie; tendresse et piété profondes; *timidité et taciturnité; gaieté, avec envie de chan-





ter; maladresse dans les mains; grande activité, et disposition au travail; vouble prompt, en se levant pour prendre quelque chose, on ne sait deja plus ce qu'on voulait; perte subite des

pensees frayeurs faciles.

Tête. Etourdissements et vertiges, surtout en fixant longtemps quelque chose ou en lisant à haute vox. *Sensation de cule et et legerete dans la tête, sen marchant dans la chambre. Cephalalgie avec nausées et deuleur au-dessous des hypocondres droits. — Cephalalgie gravative, avec envie de romir et besoin de se coucher. — Elancements violents dans la tête. — Sensation comme si un clou était enfonce au vertex. Prurit au vertex.

Youx — Noz. — Youx cernes par un cercle bleuatre, elancements sourds ou douleur tranchante dans le globe de l'ail: forte inflammation des yeux, avec photophobie; 'brûlement dans les yeux et cephalaline par la luimere des biniques; affections des yeux alternant avec ouie dure. — Oreilles rouges et chandes; bourdonnement et bruissement dans les oreilles. — Nex couvert de taches rouges; odeur de corne brûlée ou de fumier devant le nex; evoix nasillarde.

Face. *Face januaire est houffie, on avec peau rouge du corps.

— Enflure de la face, avec jucetement, feux brulants, eruptions de petites résidules jaunaires, enfin desquamation, boutons nombreur na menton et autour de la bouche, levres pâles, chute

de la levre inferieure

Bouche et Gorge — Sécheresse, chaleur, brûlement et inflammation de la carite buccale et de la langue, ne permettant de rien
manger — Sang dans la banche, — Langue chargee de blanc
comme par des aphthes, ou avec plaques convertes de cet enduit, — *Saliration fetide jamatre — Brûlement, exceptation
et cloches au palais, — Grande secheresse, chaleur et brûlement dans la garge — Lantte tres allangee — Gonflement
frequent des amygdales, avec peril de suffacution et respiration
siffante — Angine searlationesse, mome malique — Unères
brûlants, jaune blanchâtre, aux amygdales et au pharyux.
Sensation de retrocussiment et douleur d'ulceration dans la garge,
diminuées par le baillement — Sensation d'étranglement dans
la garge, remontant de l'estomac dans la garge, avec efforts
contides pour rendre des rapports, parole empechée, faiblesse et
palpitations de cient

Goût, Appétit, Gastricismo. Goût de sang on *grande amertume dans la bouche - *Manque d'appetit; Diégoût de la rande; désir de pommes cudes. Seit avec répugnance pour le vin et les boissons alcooliques mais avec *desir de l'eou froide eque l'etranglement dans la gorge euro che cep melant d'avaler.

Malaise apres avoir bu. Renvo s d'our continuels, comme des houffees d'air : rapports bruyants et sanglotants. Vomissements rerdatres, aqueux on noirs. — Vomissement des ult-



MANCINELLA.

ments suivi de violentes tranchées et de selles abondantes.

• Vomissement de matières aigres et grasses. Vomissement par le nez et la bouche, precedé d'une sensation qui remonte de l'est, mac, et suivi de soulagement des maux le tête.

Estomac. *Brulement dans le creux ép gastrique. — «Sensation d'une boule qui paraît se contracter à l'ep gastre *Gonflement de l'epigastre, avec grande sensibilité au toucher.

Ventre. Elancements dans les hypocondres. Pouleur dans l'hypocondre ganche qui forc à le comprimer avec la main. — Gargouillements tres-disagreables et harl orygnes dans le ventre, pendant la respiration et chaque mouvement. Pouleurs erratiques dans le ventre. Maux de ventre après avoir bu de l'eau Elancements dans les intestins *Colques avec diarrhée. Émission fréquente de flatuosites. Douleurs d'excoriation et de contusion dans les téguments du ventre.

Belles et Anns. *Constipation. Evacuations diarrheiques noires et tres-fétides : Diarrhée avec brulement dans le ventre et à l'anns. *Selles diarrheiques evessirement frequentes, avec coliques et évacuation de sanq ou de matières verdatres.

Avant les selles, face rouge : Après la cessation de la diarrhée, douleur de meurtrissure dans les extremités inférieures. : Après les selles, douleurs a l'anus. : Plenitude dans le rectura avec sensation de vacuité dans la tête : Sphincter de l'anus comme paralysé : G infement et couleur blenâtre des bemorthoides.

Ecoalement d'un sang hémorrhoidal fence, tres-fetide et se

congulant facilement.

446

Urines. Miction rare Urines blanchûtres, plus ou moins abondantes. **OUrine brune qui devient blanchûtre en se troublant. Avant l'émission des urines, élancements dans la vessie.


Parties de la femme. Sang des regles pale. — Avant les règles, congestion à la tête; à leur apparition, tranchées. Pendant les

règles, tristesse et crampes dans l'hypogastre.

Larynx. Tension du larynx et sensation tranchante en dedans.

Toux viclente au mon tre effort. *Toux après avoir bu ou plus forte la nuit. Toux avec expect ration de mae sites sauguinolentes et goût donc câtre dans la bouche. Expecteration blanche. *Beso n d'expectorer, avec nausees

Poitrine. • Haleme fétule dont on s'aparçoit soi même Râle muqueux pendant la respiration • *Oppression de la poitrine, • diminuée par l'expectoration — Gêne de la respiration et suffocations, au moment de parler, de rire ou de s'endormir. Picetement comme par des aiguilles traversant le cœur. — Palpitations après avoir mange, et le soir. — Crampes dans le cœur. — • Douleur et élancements au milieu du sternum, augmentés en pressant dessus — Taches jaunes sur la poitrine, contraction spasmodique des parois de la poitrine.



MANCINELLA. - MANGANUM CARBONICUM. 447

Tronc. — Sensation de faiblesse et de brisure dans les reins, avec besoin de frotter ces parties, pandiculation, frisson et froid des extrémités, suivis de chaleur brûlante, soif et besoin de se bien couvrir. — Sensation de roideur dans l'articulation sacrale, et dans celle des doigts, qui se laissent à peine ployer. — Fourmillement dans le dos, comme par des insectes. — Faiblesse dans les muscles du dos. — Roideur douloureuse dans la nuque, surtout au réveil. — Douleur rhumatismale dans l'omoplate.

Membres supérieurs. — Dartre au bras droit. — Roideur et tremblement du bras. — Miliaire rouge, très-petite et pruriteuse, à l'avant-bras. — Douleur constrictive dans le poignet et le métacarpe. — Rougeur des mains avec enflure des veines. — Tremblement paralytique de la main. — Mains pesantes, engourdies, et comme gonflées, au réveil. — Ongles des doigts blandes.

Membres inférieurs. — *Accès de frémissement et de tressaillement dans les extrémités inférieures. — Tremblement des jambes. — Élancement dans les genoux. — Croûtes sur le tibis, et douleur d'excoriation. — *Brûlement, sensation de sécheresse et élancements aux talons. — *Desquamation de la plante des pieds, après la fièrre.

MANGANUM CARBONICUM.

MANG. — Manganèse. — HAMMEMARM. — His. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 147. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines, dans quelques affections chroniques.

Antidots : Coff.

COMPARER AVEC : Amm. coff. con. Iyc. plat. puls. thui. verstr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections arthritiques; Rhumatisme articulaire; Douleurs ostéocopes; Migraine; Angines aiguës et chroniques; Odontalgies; Catarrhe chronique; Laryngite chronique (Phthisie laryngée), etc., etc.

Voy. la note. page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élancements sourds, tressuillants, à diverses parties du corps. — Déchirement et tiraillement, surtout dans les membres. — Traction et tension dans les membres et les articulations, comme par raccourcissement des tendons, surtout en étendant la partie. — Douleurs arthri-



MANGANUM CARBONICUM.

et fouillement, aggravees le soir, souvent seint-laterales ou en croix. Of onflement rouge et luisant des articulations, quelfois a la suite d'un refroidessement. *Inflammation des os arce douleurs fouillantes et insupportables, la nuit. Accablement et traiblement, surtout dans les articulations — Sensation de malaise dans tout le corps, mais surtout dans l'est, mac,
avec humeur chagrine. Au plus leger contact, sensibilité de
tout le corps, comme s'il était ulcère. La plupart des symptômes se manifestent pendant la nuit. Les sympt mes qui
se sont manifestes dans l'appartement, sont amelières au grand
air, et vice versa. Plus eurs symptomes sont soulages ou
aggravés suivant le changement du temps en bon ou en mau,
vuis.

Peau. Brûlement par toute la peau, le soir et en se levant du lit - Dartres pruriantes - Peau maladive; toute lesion tend a s'ulcerer. Excoriation et gerçures dans le plu des artieu-

lations.

148

Bommeil. — Grande lassitude somnolente le soir, vers huit heures.

Affluence de reves tres-vifs, anxieux, et dont on garde un

soureur distinct - *Baillements frequents

Fièvre Prissennement le soir, avec mal de tête lancinant, sans soif. Frissons, avec chaleur fugace à la tête. Chaleur fébrile à la poitrine et aux joues, avec sensibilité douloureuse de tout le corps, au toucher. Sueur nocturne, quelquefois seulement au cou et aux jambes et qu. force à se gratter.

Moral. Humeur chagring, thedurne, avec concentration en soi-

meme. -- Distraction Emcussement des sens.


Tête. Tête lourde, avec sensatu n comme so elle avait augmenté de volume. Douleurs brulantes et pressives à la tête, se dissipant en plein sir. Douleurs de tête tensires, lanconantes et tractives, au grand air, soulagees dans l'appartement. - Conquetion à la tête, avec pulsation comme si le cerveau allait passer en suppuration, amelioree au grand air. Ébrantement douloureux du cerreau pendant le mouvement. Les maux de tête, qui se sont declares dans l'appartement, sont soulages au grand air, et cice versa.

Yeux. Pression dans les yeux en les fatigant, ou aux lumières du soir. *Chaleur brûlante et sécheresse des yeur. — Paupières gouflees et douloureuses quand on les remue. Agglutination des paupières, le matin. Pupilles dilatées ou contrac-

tées, Troul le de la vue. Vue très-basse empoprer.

Oreilles. - Otalgic. Douleurs tractives dans les oreilles, qui proviennent d'autres organes - Elancements dans les oreilles en parlant, en avalant, en riant, et en marchant louvelement. -- Durete de l'oure comme par obturation des oreilles, se dissipant lorsqu'on se mouche, s'aggracant on s'ameliorant selon les





changements du temps. Bourdonnement et grondement dans les oreilles — Détonation dans les oreilles en se monchant et en avalant; en baillant, eclatement.

Noz. — Coryza sec et obtavation du nez. — Coryza, avec perte de l'odorat et secretion de mucosites epaisses. — Rougeur, excoria-

tion et inflammation du nez, pendant le coryza

Visage. - Visage pule, abattu, háve. - Dechirement violent et serrant, entre la racine du nez et les sourcils - Elancements tressaillants depuis la machoire inferieure jusque dans les tempes, en riant. - Levres excessivement seches. - Eruptions et alceres au commissures des levres. - Crampes de la machoire, apres le repas.

Dents. Sensibilité douloureuse des dents. Douleurs violentes dans les dents, passant rapidement à d'autres parties. Déchitement dans les dents molaires et les parties adjacentes, avec grand abattement et inquietude, surtout le matin et le soir. Douleurs d'ulcération dans les dents, aggravees jusqu'a devenir

insupportables par le contact de quelque chose de froid.

Bonche et Gorge — Le matin, odeur d'argile dans la bouche.

Tubercules et vésicules brulantes sur la langue. — Mul de gorge aten douleur incisive et d'excornation, hors le temps de la deglutition. Élancements sourds de deux cotes du pharynx et jusque dans les oreilles, en avalant. Secheresse et grattement dans la gorge, avec sensation comme si une feuille obstruait le larvux.

Appétit et Estomac. Goût fade et hudeux. Absence de soci.

- *Repugnance pour les aliments, par sensation de satieté.

Sensation d'aigreur brolante remantant de l'estomac, comme pyrosis — Chalcur et brûlement a l'estomac, remontant jusqu'a la portrine, quelquefois avec grande agitation. Tiraillements dans la region de l'estomac, comme si l'epigastre se dilatait.

accompagnes de nausces.

Ventre. Pression dans les hypocondres. Ventre gros et ballonne Douleur pressive d'excornation dans le ventre et l'epigastre. Contraction avec sensation de chaleur, depuis le inilieu du ventre jusque dans la portrine, avec nausees. Tranchées dans la region ombilicale, en respirant profondément — Commotion dans le ventre, comme si les intestins s'entrechoquaient. Emission de flatuosites par trop abon lantes.


Balles. Constipation. - *Selles difficiles, seches, noneuses.

*Selles plusieurs fois par jour, de la consistance de la bouillie. Grondement frequent dans le rectum. - Pendant les selles.

coliques et douleurs meistres dans le rectum. - Tiraillements
successifs et dechirement dans le rectum. - Douleurs contractives

a l'anus.

Urines. Envie préquente d'uriner. - Sediment couleur de Nolette et terreux dans les urines. - Lancination dans l'urethre,



450 MANGANUM. — NENYANTHES TRIFOLIATA.

hors le temps de l'émission des urines. — Douleurs incisives dans

la région de la vessie.

Parties génitales. — Sensation de faiblesse dans les parties génitales, avec brûlement et tractions tressaillantes dans le cordon spermatique et jusque dans le gland. — Prurit à la couronne du gland. — Règles trop hâtives. — Pression aux parties génitales. — Leucorrhée.

Larynx. — *Enrouement et raucité opiniâtres, surtout le matin et au grand air, comme par inflammation chronique du larynx. — Sensation comme si le larynx était fermé. — *Catarrhe avec coryza et enrouement. — Toux avec enrouement. — Toux sèche, provoquée par la lecture à haute voix ou la parole soutenue, avec sécheresse pénible et âpreté dans le larynx. — Le matin, expectoration abondante de petits globules de mucosités vert jaunâtre, presque sans toux. — Crachement de sang.

Poitrine et Tronc. Haleine chaude et brûlante, avec chaleur désagréable dans la poitrine. Élancements dans la poitrine et au sternum, qui la traversent du haut en bas. — Battement dans la poitrine. — *Coups subits au cœur *et dans les côtés de la poitrine depuis le haut jusqu'en bas. — Déchirement dans toute l'étendue de l'épine dorsale, pendant le repos et le mouvement.

- Roideur de la nuque.


Bras. — Tractions et déchirements partant de l'épaule et s'étendant jusque dans les bras, les mains et les doigts. — Douleurs tensives dans les articulations des bras et des mains. — Térébration et fouillement dans les os du bras, comme si c'était dans la moelle. — Tension dans l'articulation du coude, comme si les tendons étaient trop courts. — Dartre pruriante à l'avant-bras. — Douleurs crampoïdes dans les mains. — Gonflement inflammatoire et ulcération du petit doigt. — Gerçures dans le pli des articulations des doigts.

Jambes. — Tressaillements des muscles des jambes, au moindre mouvement. — Tractions crampoides ou élancements tressaillants dans les cuisses. — Douleur de roideur tensive dans les jambes. — Déchirement autour du genou. — Manque de solidité et tremblement des genoux. — Gonfiement et inflammation des malléoles, avec élancements jusque dans les jambes. — Brûlement à la

plante des pieds. - Exceriation entre les orteils.

MENYANTHES TRIPOLIATA.

MEN. - Trèfie d'eau. - HABNEMANN. - Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 246. - Médicament encore très-peu connu, et qui, jusqu'ici, n'a été employé que contre quelques fièvres intermittentes, des contrêdes à la suite d'exanthèmes, et des Affections spasmodiques.



452 MENYANT, TRIFOLIATA. - MEPHITIS PUTORIUS.

— Pincements dans le ventre. — Constipation. — Selles dures avec pincements dans le ventre.

Urines et Parties génitales. - Envie fréquente d'uriner, avec évacuation peu abondante. - Exaltation de l'appétit vénérien,

sans excitation de l'imagination ni érections.

Larynx et Poitrine. — Voix enrouée et rauque, avec obturation des oreilles, comme si quelque chose s'y était introduit. — Rétrécissement spasmodique du larynx, avec excitation à la toux, en faisant des efforts pour respirer. — Compression lancinante des deux côtés de la poitrine. — Douleur pénible de brisement dans les reins, en étant assis et en se baissant. — Élancements sourds et térébrants sur l'omoplate gauche. — Déchirement entre les omoplates. Roideur et lourdeur des muscles du cou et de la nuque.

Membres. — Déchirement paralytique et tractions crampoïdes, dans les bras, les mains et les doigts. — Roideur spasmodique du bras, avec retraction involontaire des doigts. — Tressaillement-douloureux dans le bras et le petit doigt. — Douleur de brisement dans les cuisses. — Secousses et mouvements convul-

sifa dana les cuisses.



MEPHITIS PUTORIUS.

MEPH — Le suc fétide du putois. — HÉRING. — Hist. nat. et prép. Pharm. homœop., p. 334. — Dose naitée : 30. — Durée d'action : peu de temps. ANTIDOTE : Camph., ne soulage que pour peu de temps.

SYMPTOMES URNÉRAUX. — Douleurs rhumatismales, qui changent de siège, avec envie d'uriner. — Quelquefois sensation comme si on était touché par des étincelles électriques. — Sensation de paralysie, surtout pendant les douleurs. — Grand abattement et lassitude, pendant lequel les muscles sont douloureux au toucher et au mouvement. — Paresse, avec besoin de s'étendre et pandiculations. — Agitation interne dans tout le corps, avec sensation de malaise indicible. — Vibration légère des nerfs, comme jusque dans l'intérieur des os. — Beaucoup de symptômes se manifestent le matin.

Sommeil. — Forte envie de s'endormir, au point de dormir même en société. — Somnolence le jour, evec bon sommeil la nuit. — Baillement fréquent qui fait couler les larmes. — Rêves très-rifs dont on conserve le souvenir. — Rêves d'eau, de feu, de pertes pénibles, de crachement de sang, etc. — Cauchemar. — Réveil la nuit, avec congestion de sang et chaleur dans les jambes. —



Engourdessement somnolent, le matin, avec brûlement dans les veux et déchirement dans les membres, grand sonlagement en changeant de position. — Réved frequent set de bonne heure, souvent avec sensation de bien-être.

Fièvre. Froid le soir, avec b soin d'oriner et coliques, comme pour la diarrhee. Chaleur a la tête, aux parties genitales et aux jambes, la nuit. — Augm ntation de la chaleur, surtout le mutin, avec peau meins sensible au froid et à l'eau froide. Les

lotions froides paraissent tres-agreables.

Moral. Mauvaise humeur pour des bagatefies ou des peines imaginaires — Inaptitude aux travaux intellectuels, à cause d'une trop grande vivacité de l'imagination — Tres-grande loquacité, comme si on avait trop bu — Excitation avec chalcur à la tête.

Tête. — Vertiges en se baissant subitement, en étant assis, quand on reinne la tet., en se retournant dans le lit, ou le soir — Embarras sourd de la tête, comme si elle devenait plus volumineuse, accompagne de mauvaise humeur et de nausées. — Maux de tête violents, avec sensation de plenitude, comme une pesanteur ou une pression, surtout a l'occiput; sensation à diverses parties, comme si on y enfonçait le doigt — Douleur au-dessus des geux. — Maux de tête par le mouvement de la voiture, ou bien le soir.

Yeux — Lancmations dans les yeux, comme des coups d'aignilles.

— Douleurs dans les yeux en les tournant, comme si quelque objet sy était introduit, ou qu'on les eut trop fatigués. Chaleur, brûlement et pression dans les yeux, surtout le matin et le soir.— Pression sur les paupières et brulement aux bords, comme sil allait paraître un orgelet. — Injection des veines de la selectotique. — Rongeur de la conjonetire, comme par exchymose. — Myopie. — Confusion des caractères, en lisant. — Trouble de la vue. — Empossibilité de lire de petits caractères. — Cecité nocturne. — General ment, pendant la faiblesse de la vue, douleurs dans les yeux ou dans la tête. — C'est surtout le soir que les yeux sont affectes.

Orailles Dents. Declurement dans les oreilles ou dans la machoire et les dents. Otalgne. Prurit, chaleur, rougeur et erysipele a l'oreille exterieure (droite). - Sechetesse du nez. Epastaxis. - Besoin prolonge d'eternner. - Coryza fluent, avec douleur d'excernation dons la poitrine. - Douleurs dans les dents carrers (melaires), surtout dans la machoire inférieure. - Secousses subites dans les racines des dents - Traction et dechi-

rement dans les dents.

Appetit et Estomac. Nausces, avec grattement dans la gorge et sensation comme si la tête etait gonflee, a jeun. — Renvois sangi tants. — Renvois soulages par des flatuosites — Engouement facile en buyant et en pariant. — Besoin penible et mutile de renacler. — Goût métallique. — Désir d'aliments sales. — Appé-



mepritis putorius.

tit alternativement violent ou nul. — Le matin, absence d'appétit, et répugnance même pour la fumée du tabac. — Après le

repas, courbature et envie de dormir.

454

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres; douleurs rhumatismales (du côté droit), ou comme par des flatuosités (du côté gauche). Pression à l'estomac, avec coliques. — Sensation de vacuité dans l'estomac et nausées. — Coliques, comme pour une diarrhée, non suivies de selles. — Pression et mouvements dans le ventre, comme à la suite d'un refroidissement, avec sensation de froid, tremblement et besoin d'uriner, amélioré auprès du feu. — <u>Manx</u> de ventre, le soir.

Selles - Parties génitales. Selles peu fréquentes, mais liquides. Diarrhée. — Envie fréquente d'uriner, surtout la nuit, avec émission d'urine claire. — Après un accès de fièvre, le soir, urine trouble, avec dépôt. - Prurit au scrotum. - Chaleur des parties génitales. — Excoriation des parties génitales chez la femme

et gonflement des grandes lèvres.

les cors.

Larynx et Poitrine. — Toux, en lisant à haute voix, en parlant et après s'être engoué en buvant. -- Toux matutinale, avec expectoration à la suite d'un catarrhe. — "Mucosités expulsées par un toussottement tous les matins. — Souffrances catarrhales. Douleurs aux côtes (gauches), au toucher et à la pression, Douleur d'excoriamais surtout en toussant et en éternuant. tion à la partie postérieure des côtes et dans la poitrine, en res-

pirant profondément et en remuant le dos.

Tronc et Bras. - Douleurs dans un côté du cou (droit). - Tension dans les muscles de la nuque. - Douleur et sorte de paralysie dans le dos et dans tous les membres. — Lancination dans l'épine dorsale pendant le mouvement. —Brisement dans les reins. Douleurs rhumatismales dans les bras, avec tractions paralytiques, améliorées par le mouvement. - Déchirement ou sensation de brisement dans les os. — Inquiétude dans le bras, qui est comme insensible. - Tremblement dans les bras, en s'appuyant dessus. - Tressaillement de la main. - Sensation pénible dans la première phalange du doigt qui oblige 🛦 l'étendre et à le faire craquer.

Jambes. - Douleurs tractives et rhumatismales dans les cuisses. la hanche et le pied, mais principalement dans la jambe. — Brisement dans le genou. — Douleur crampoïde et subite dans le pied, qui oblige à sautiller. -- · Inquiétude dans les jumbes, comme si elles allaient s'engourdir. - Lancinations dans le pied. - Douleur dans le talon, comme la goutte. - Picotement ou sensation de pincement dans le gros orteil. - Brûlement dans le petit orteil. - Continuellement, douleurs et brûlement dans






MERCURIUS.

MERG. — Mercure. — MAMBENANN. — Hist. net, et prép. Voy. Pharuné. homosp., p. 449. — Dones mitées : 3, 12, 80. — Durée d'action : 8 à é semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

AMTIDOTES : Arn. asa. bell. camph. carb-v. chin. dulc. electr. hep. iod. lack. lyc. mex. nitr-ac. op. sass. sep. sil. sulf. — On l'emploie comme antidote de : Aur. bell. ant. chin. coff. cupr. diad. duic. fer. lach. mex. op. sulf. relec op. sulf. valer.

Comparen avec : Acon. sum. ont. arg. orn. ors. osc. aur. har. bell. bry. cale. carb. caus. cham. chin. clem. coff. colch. con. cupr. dig. datc. euphorb. guai. hep. iod. luch. laur. lyc. mez. nitr-ac. u-vem. op. phosac puls. rhus. sass. selen. sep. sel. staph stront. sulf. that. valer. versir. — C'est surtout après : Bell. hep. lach. que le mercure est d'ailleurs indiqué. — Après le mercure conviennent quelquefois : Bell. chin. dulc. hep. lach. nitr-ar sen. sulf. lack. nitr-ac. sep. self.

CLINIQUE. - Se laimant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par suite d'un refroidissement, principalement à la fraicheur du soir; Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement inflammatoire; Inflammations locales; Souffrances syphilitiques, scrofuleuses, rachitiques, hydropiques; Affections principalement des sujets lymphatiques, pléthoriques, ou des personnes d'une constitution leucoflegmatique, d'une nutrition maladite, faibles de corps et d'esprit, disposées à se refroidir et à transpirer facilement, avec tempérament flegmatique et porté à la mélancolie ; Accès de convulsions?, d'épilepsie?; Cacherie par l'abus du quinquina ou du soufre ; Souffrances chroniques par l'abus du vin ou du café, ainsi que par suite d'excès vénérien, ou de l'onanisme; Congestions sanguines et hémorrhagies; Exostièles, nécrose, carie et autres maladies des os; Arthrocace?; Gonflement et inflammation des glandes; Eruptions galeuses, miliaires, urticaires, puruleutes et pustuleuses; Dartres sèches, furfuracées, ou vives, croûteuses et suppurantes; Erysipèles simple et flegmoneux; Taches et ulcères syphilitiques, et autres ulcérations et suppurations; Ictère; Scarlatine maligne ; Petite cérole dans la période de suppuration ; Fièrres inflammatoires, arec disposition à transpirer abondamment; Fièvrea typholdes, avec caractère muqueux, ou bilieux, ou putride; Atrophie des enfants scrofuleux; Mélancolie; Nostalgie?; Ivrognerie; Congestion cérébrale, avec vertiges; Céphalalgie rhumatismale ou catarhale; Céphalalgie nerveuse?; Apoplexie sanguine?, séreuse?; Commotion du cerveau; Encéphalite; Hydrocéphale aiguë?; Teigne; Chute des cheveux; Ophthalmies scrofuleuses, rhumatismales, catarrhales (et arthritiques?); Ophthalmic syphilitique : Ulcères de la cornée; Amblyopie amaurotique : Héméralopie?;



MERCURIUS.

Blépharophthalmie; Ectropion?: Otite; Otalgie rhumatismale et caturrhule ; Durete de l'ouïe après un refroidissement ou par suite d'angines tonsillaires; Otorrhée; Polype dans l'oreille; Ozène; Erysipèle flegmoneux du nez; Croûte de lait et dartres faciales; Dentition difficile des enfants, avec fièvre; Prosopalgies et odontalgies rhumatismales, avec fluxion; Trismus; Balbutiement?; Stomacace; Aphthes des enfants; Glossite; Grenouillette; Angines tonsillaires, pharyngées et palatines, avec flegmon; Ulcères syphilitiques à la gorge; Salivation; Affections gastrico-muqueuses et bilieuses, avec vomissement, diarrhée et fièvre; Choléra?; Hépatite; Carreau; Ictère; Entérite; Péritonite; Ascite; Coliques, avec diarrhée; Diarrhée après les morbilles, ou chez les nourrissons; Diarrhée pendant la dentition ; Dyssenterie ; Choléra asiatique avec selles dyssentériques; Chute du rectum; Souffrances vermineuses; Diarrhées muqueuses ou bilieuses; Hématurie; Diabète sucré?, Uréthrite et gonorrhée; Orchite; Chancres; Bubons scrofuleux et syphilitiques; Erysipèle au scrotum; Chute du vagin; Inflammation et hydropisie des ovaires?; Péritonite puerpérale?; Métrite; Cancer de l'utérus?; Dysménorrhée; Leucorrhée; Stérilité; Erysipèle; Excoriation et ulcération des mamelles; Affections catarrhales et inflammatoires des voics aériennes et des poumons; Aphonie; Grippe; Phthisie?; Asthme humide?; Hydrothorax; Crampes de poitrine par la vapeur de l'arsenic ou du cuivre; Coxalgie; Panaris.

Voy...la note, page 15.

156

SYMPTOMES GENERAUX. — *Douleurs déchirantes et tractives ou lancinantes, aux membres, principalement la nuit, à la chaleur du lit, qui rend les douleurs insupportables. — •Gonflement inflammatoire d'un rouge luisant. - *Douleurs ostéocopes nocturnes. — Aggravation des souffrances la nuit, ou le soir, ainsi que par l'air frais (du soir). — Battements, sensation de luxation et *douleurs arthritiques dans les articulations, avec gontlement. — *Douleurs rhumatismales, avec sueur abondante, mais qui ne soulage point. - Le matin et dans le repos, et principalement en étant couché, on se trouve beaucoup mieux qu'en étant assis ou en marchant.—*Tout le corps est comme brisé, avec rudolorissement de tous les os. — Principalement le soir, grande agitation dans les membres, avec douleurs dans les articulations. *Grande fatigue, faiblesse et chute rapide des forces, avec grand malaise du corps et de l'esprit. — Bouillonnement de sang et tremblements fréquents, même après le moindre effort. — *Congestions sanguines et hémorrhagies. — Grande disposition des membres à s'engourdir. — Crampes, omouvements convulsifs et oaccès d'épilepsie nocturnes, avec cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez et soif. - Spasmes toniques et



MERCURIUS

457

tetanos. Roideur cataleptique du corps. Accès d'éranomissement. — Paralysie de plusieurs membres. Amaignissement et atrophie de tout le corps. — *Surexcitation et surexcitabl-

lite de tous les organes.

Peau. *Couleur jaune de la peau, avec transpiration qui colore le linge en jaune. - *Engorgement, inflammation et ulcération des glandes, avec douleurs pulsatives et lancinantes, goutlement dur, rouge et luisant, ou sans alferation ustable de la peau. -*Eruptions miliaires urticaires, boutenneuses, ou pustuleuses et purulentes. - Boutons pruriteux, avec brulement après s'etre gratte. *Eruptions qui ressemblent a la gale, et qui saignent facilement - "Les plaies s'ulcerent facilement let passent à la gangrene). - Inflammation erysipelateuse. Taches rouges, élèvees, ou taches hépatiques, ou semblables aux taches scorbutiques Petits boutons très-pruriteux qui s'ulcerent et se couvrentd'une croute - "l'aches dartreuses, excorrees et suintantes ou *dartres seches, prariteuses et farincusos. - Desquamation de la peau - *l'Icères phonedenques, en bleuatres, fongueux et facilement saignants, ou superficiels et comme ronges par des insectes, ou secretant un pus rehoreux et corrosif = *l'Iceres chancreux - Prurit violent et coluptueux par tout le corps, principalement le soir, on la muit, augmente par la chalcar du lit, et quelquefois avec bralement apres s'être gratte Epaississement du perioste, *erostoses et carie; abces dans les articulati us, grande tragilite des os.

Sommeil *Desposation excessive an sommed, le jour et la nuit; sommeil profond et prolongé. Envio de dornir sans le ponvoit *Le sair, sommeil tirdif, et le matin, receil de trop banne heure. — *Semmeil tres-leger et agite, avec reveils fréquents, sursauts et effroi — Insomnie pair surerectation ner reuse Réces frequents, auxieux, horriddes, fantastiques, historiques, vifs, voluptueux; reves de brigands, de chi us qui riordent, de revolte de leluge, de coups de fusil, etc., etc. *La muit, inquietule, auxiete, agitation et just dum, malaise, d'uleurs, chaleur ou sueur, ebullition de sang, eris pleurs, battements de cour, vertiges et beane up d'autres souffrances. En s'endormant, aggravation de d'uleurs, sursauts et fantoines effrayants devant la vue pendant le sommeil, paroles gemissements, soupars, respiration courte, avec bouche cuverte et mains froid si *au receil, sueur, eris, pleurs et paroles incoherentes.

Pièvre. Fraid, pressons et harripidations par tout le corpu, principalem nt opres avoir dormi le jour ou la nuit, ainsi que la nuit ou le soir et le matin au lit, et quelquefois avec e uleur bleuatre de la peau, proid glacial des mains et des pieds, palpitations musculaires, meuvements convulsifs de la tête, des bras, des jambes, sonsat en de brisement dans les membres et besoin de se concher, tremblement des membres, douleurs vives à la tête.




458

envie d'uriner, somnolence, etc. — Chalcur du visage et ditéte, avec rougeur et brûlement des joues et froid ou frisch ou horripilation par tout le corps; — *chalcur mélée de fisons ou de sueu.s — Pendant la chalcur, soif inextinguigrand désir de lait, et aggravation des douleurs en se decouvre — *Accès fébriles la nuit ou le soir, enevres avec sympton inflammatoires, ou avec un état jutride; fixvres leutes et hes ques — *Pouls irrequiser ou acceléré, fort et intermittent, faible, lent et tremblitant — *Sueurs abondantes, excessives débilitantes tant le jour que la nuit, le matin, le seir après s'écouche, et en mangeant, et quelquefois fétides ou acides, ou li leuses, colorant le linge en jaune. Sueur avec nausées et entre de vomir, grande fatigue, soif, anxiété, suspension de la respir

tion, points de cité, etc Moral. *Grande angoisse, inquiétude et agitation, avec pettr perdre la raison, ou avec tourment intérieur, excessif, princip lement le soir ou lu muit au lit, cemme si l'on avait commis que que crime. *Accablement incral, ave: grande indiffére découragement, horreur du travail et dégoût de la vie. App hensions. Mauvaise humeur, disposition à se facher et à 🐔 porter, grande susceptibilité de caractère, humeur querelles mefiance et soupçens *Morosité et repugnance pour la consation - *Gemissements. Surexcitation et grande irritabil morale, avec hisposition a s'effrayer facilement Distraction *Inaptitude à toute ma inadvertance, conception difficile tation, et facilité à se tromper en parlant - Fuiblesse de memoire Instabilite des idees, dent l'une chasse constamme Radotories — Acces de mame et de demence, 🎎 disposition aux pleurs Perte de connaissance et de la parole.

Fureur, avec horreur des liquides.

Tôte *Obnubilation, ivresse et étourdissement, principalem le mutin au reveil ou en se levant. *Vertiges, principalemi en se levant ou en redressant la tête. ou etant assis ou cousur le dos, ainsi que pendant cu après la promenade au grand ou le soir, et souvent arec nausees, obscureissement des yechaleur anxieuse : t besoin de se coucher - - Pesanteur, plénies et pression dans la tête, comme si le front était serre par bandeau on que le crâne dút ecluter. — (Le soit) sensibilit**é à** loureuse du cerveau, avec fatigue de la tête par le truit, amélie. en appuyant la tete sur le bras. Mune de tete excessifs è forcent a comprimer la tête des deux mains — *Chab ur et bro ment, ou douleurs déchirantes et tractires, ou clanciments 🐗 la tete, n'e cupant souvent qu'un seul côté et se propageant d qu'aux oredles, aux dents et au cou Bouillounement, te brati in et fouillement, coaps et battements dans la tete 🕒 🗖 leur et meurtrissure au cerveau, le matin au lit. - Céphalos nocturne. Donleurs ostéogopes à la tête, et *exostoses au cris



459

— Gonflement de la tête; *endolorissement du cuir cherelu; douleurs vives et brûlantes au tegument du crâne. Éruption sèche a la tête, petites croûtes dans les cheveux, quelquefois avec prurit brulant, * croûtes suintantes, avec excoriation du cuir cherelu et destruction des cheveux. (Inte de chereux.

*Sueur a la tête et au front, quelquesois froide et visqueuse.

Youx. Youx troubles, ternes, cernes. - *Pression dans les yeux, comme par du sable, oprincipalement en s'estorgant de firer un objet. L'ancements, *prurit, démangeaison, et brûlement aux yeux, principalement au grand air - *Yeux rouges, ensammes, avec rougeur de la conjonctive ou de la selerotique, et injection des veines de la selerotique ou de l'angle externe des yeux. *Larmoiement abandant des yeux, principalement le soir. *Sensibilité excessive des yeux à la lumière et a l'éclat du seu. - oPastules sur la conjonctive et ulceres de la cornée.

*Paupières rouges, enflammees, gonflees, rulecrées sur les bords, et courertes de croûtes -- *Sensation sons la paupière, comme s'il y avait la un instrument tranchant. Tumeur à la paupière, comme un orgelet. *Agglutination nocturne des paupières. - *Occlusion spasmodique les paupières, avec difficulté de les ouvrir. *Croûtes autour des yeux. *Amblyopie et trouble de la vue, comme par un broudlard; perte momentance de la vue, points noirs, monches voluntes, flammes et étincelles devant les yeux. Me bilité des caractères en lisant.

Oreilles. *Douleurs dechirantes, lancinantes et tractives dans les oreilles, parfois avec sensation de troid, comme s'il y avait de la glace dans l'oreille, augmentees par la chaleur du lit.

L'oreille et le conduit auditif sont comme enflammes, avec douleurs crampoides et lancinantes. - *Exconation et ulceration de la conque - *Otorrhee purulente et reicroissances fongueuses dans l'oreille, *avec dechirement dans le cote affecte de la tete et du visage. Écoulement de sang par les oreilles - Ecoulement de cerumen. Tumeur sous-cutance, et boutons furfuracés et suintants au lobe - *Dureté de l'ouir, quelquefois avec obturation des oreilles, qui cesse en avalant ou en se mouchant, ou avec retentissement extraordinaire de tous les sons dans l'oreille.

Tintement, *bruissement et bourdonnement dans les oreilles, principalement le soir. Sensibilité douloureuse et gonflement

inflammatorre des parotides.

Hez. - *Gonflement des as du nez, avec sensibilite douloureuse au toucher. - Prunt au nez. Tension, pression et sensation de pesanteur du nez. - of ouleur norratre du nez Gonflement inflammatoire et rougeur luisante du nez, avec prurit Croûtes dans les narines. Écoulement d'un pus fétide et corrosif par les narines. *Saignement de nez, frequent et abondant, même pendant le sommeil, et quelquefois en toussant. Obturation et osécheresse du nez. - Éternument fréquent. -



| | | | | |

of orver sec, avec obturation du nez, ou *coryea fluent, ravec ecoulement abondant de serosites corresives. Odeur putride par le nez. — Pustule douloureuse au nez

Visage. - *Face pale, ou januaitre, ou teint plombe, *ou terrenc. — Traits decomposes tirés. — Cercle d'un renge bleuatre autour des yeux - Chaleur febrile et rougeur des joues. -*Bouffissure et gonstement du resage, principalen ent autour des yeux. - *Gonflement de la joue * Dechirement dans les os et dans les muscles (d'un côte) du risage : Pression et points dans l'os zygomatique Sensation de tension de la peau, an visage et a la tete. Sucur du visage. - Taches rouges et dartreuses a la face - *Croûte jaunitre au rouge, avec suintement d'une humeur fétide, prunt continuel le jour et la nuit, et saignement apres s'etre gratté - *Levres rudes, seches et enoiritres, avec brulement en les touchant. Gonflement et ulcération des l'ores. - *Croites jaunitres, pustules purulentes et petits ulceres aux lèvres et autour du mentin. - *Gerçures, rhagades et ulcération aux coins de la bouche. -- Distorsion de la bouche, et mouvements convulsifs des levres. *Serrement et immobilite des machoires, Tavec gonflement inflammatoire de la machoire inferieure et *tension dans les tauscles du cou - Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes sousmaxillaires, avec douleurs lancinantes ou pulsatives, ou same douleurs. Carie de la machoire.

Dents. - *Douleurs déchieantes, lancinantes, in pulsatives, dans les dents curies, on dans les rac nes des dents, se propageant souvent jusqu'aux orcilles et dans toute la jone du cote affecté, quelquefois même avec gonflement douloureux de la jone on des glandes sous-maxillaires, salivation et frissons - *Apparation ou aggravation des maux de dents, principalement le soir, ou la nuit, à la chilleur du lit, ou ils sont insupportulées, renouvellement par l'air frais, ainsi qu'en mangeant et en penant dans la bouche quelque chose de chaut en de froid. - *Agacement, noireeux, vacullement et chute des dents - *Prurit et ringent des geneives. - Geneives fongueuses et saignant facilement -- *Decollement et gonflement des geneires, principalement la nuit, avec douleur brulante et sensation d'excornation en y touchant et en mangeant. -- *Geneives livides, décolurées et tres-sensibles.

Bouche. *Odeur fetide cadavéreuse, de la houche. Conteur bleuatre, excoriation et *ganflement inflammatoire de l'intérieur de la hauche. — Douleur brulante, vesicules, ampoules, *aphthes et alcères d'ins la bouche. — Sensation de secheresse dans la houche et le palais, ou *accumulation de mincosites tenaces — l'heratien de l'orifice des i-induits silivaires, et *éconlement aboudant d'une salure excessivement fetide, et quelquefois ineme sanguinalente, — *Langue humide, chargée de mucosités






blanches et épaisses, ou sèche, sbrune ou noirâtre. — *Dureté, gonflement inflammatoire et ulcération de la langue, avec douleurs lancinantes. — Roideur, insensibilité et immobilité de la langue.-- *Sensation sur la langue, comme si elle était brûlée. — Tremblement de la langue. — *Parole accélérée et balbutiante; *perte entière de la parole. — Ulcération et carie du palais. Gorgo. — *Sécheresse douloureuse de la gorge, qui empêche de parler. - *Douleur d'excoriation et cuisson dans la gorge, ou sensation de chaleur qui remonte dans le gosier. —*Douleurs lancinantes dans la gorge et dans les tonsilles, principalement en aralant. — *Allongement et gonfiement de la luette. — *Suppuration des amygdales. - Pression et douleurs d'excoriation et d'ulcération dans l'œsophage. - *Gonflement inflammatoire et rougeur de toutes les parties de l'arrière-bouche et de la gorge. --- • Accumulation de mucosités épaisses et tenaces dans la gorge. *Sensation comme s'il y avait une tumeur ou quelque corps étranger dans la gorge qu'il fallût avaler. — *Besoin continuel d'avaler. — Déglutition douloureuse, difficile, et quelquefois même spasmodique, avec péril de suffoestion. — *Impossibilité d'avaler le moindre liquide, qui sort par les narines. — *Les maux de gorge s'étendent ordinairement jusqu'aux oreilles, aux parotides, aux glandes sous-maxillaires et à celles du cou; ils **s'aggravent, pour la** plupart, en avalant à vide, sinsi que la muit à l'air frais et en parlant, et ils sont souvent accompagnés

de salivation. Appétit. — *Gout putride, salé, douceatre, ou métallique. — Godt amer, principalement le matin, à jeun. - Goût amer ou douestre du pain de seigle. -- *Goût acide et muqueux pendant et hora le temps des repas. — *Soif riolente, ardente, le jour et la muit, avec désir de boissons froides, et principalement de lait et de dière. — *Désir de vin et d'eau-de-vie. — *Appétit et faim insatiables, avec insipidité des aliments. — Boulimie avec grande faiblesse. — *Manque d'appétit. — Nul désir d'aliments, qui oependant sont agréables au goût en les mangeant. — Soif plus prononcée que l'appétit. - Satiété prompte en mangeant. -Dégoût de tous les aliments, principalement des aliments solides, de la viande, des sucreries, des aliments cuits et du café. — Grande faiblesse de la digestion avec faim continuelle, et pression dans l'estomac, rapports fréquents, pyrosis et beaucoup d'autres incommodités après le repas. — Le pain pèse sur l'estomac.

Intomac. — *Nausées et envie de vomir excessives, souvent arec douleurs incisives et pressives dans l'estomac, la poitrine et le ventre, anxiété et inquiétude, mal à la tête, vertiges, obscurcissement des yeux, et chaleur fugace. — Les nausées augmentent souvent après le repus, et sont accompagnées d'une sensation dans le gorge, comme si l'on avait mangé des choses sucrées.—





dantes de mucosités sanguinolentes. * *Selles muqueuses on bilieuses, ou putrides; ou acides, ou d'une couleur verdatre ou brunâtre, ou rougeâtre, ou jaune de soufre, ou d'un bianc grisatre. - Selles de la consistance de la bouillie, ou écumeuses, ou comme des matières hachees. — *Evacuation de matières corrosires et brûlantes. - *Sortie de sang ou de mucosités par le recium, même avec des selles non diarrhéiques, et hors le temps des selles, quelquefois avec tenesure à l'anus. — Sortie des hémorrholdes. — *Sortie d'ascurides et de lombrics. — Prurit, Clancements et exceriation à l'anus. -- Chute du rectum, qui, à ra sortie, paraît noir et saignant. — Selles de matières non digé-

rées, ou noires et comme du goudron.

Urines. — Envie continuelle d'uriner le jour et la nuit, quelquefois avec des efforts inutiles, ou avec émission man abondante. -Jet d'urine excessivement mince. — Éracular fréquente et abondante d'urine, comme dans le diabète, avec amaigrissement excessif. — Envie pressante d'uriner, avec incontinence d'urine. – Pissement nocturne. – Emission d'urine goutte **à go**utte. -l'rines de couleur foncée, ou rouges, ou brunes, ou blanches. comme mêlées de farine ou de craie, ou couleur de sang. *Urines fétides, troubles et formant un dépôt, ou sanguinalentes, ou d'une odeur acide. — *Urines corrosites et brûlantes. - Dépôt épais dans les urines. - Nuage blanc et floconneux dans les urines. - Sortie de mucosités dures ou de flocons et de filets blancs pendant ou après l'émission de l'urine. — *Écoulement de sang par l'urèthre. - Douleurs incisives et contractives dans la région rénale, la nuit. — Pulsations, douleurs incistres. brûlement et élancements dans l'urèthre, même hors le temps de l'émission des urines. -Inflammation de l'orifice de l'urêthre, et écoulement de matières épaisses, jaunatres, ou serouses, blanchâtres.

Parties viriles. — Exaltation de l'appétit vénérien et grunde lascivité, avec éruptions et pollutions fréquentes. - Erections nocturnes douloureuses, et quelquefois pollutions sanguino-lentes. — Verge petite, froide et flasque. — Prurit voluptueux, fourmillement, déchirement et élancements au gland et au prépace. — Enflure ou gonflement inflammatoire du prépuce, quelquefois avec douleurs brûlantes, gerçures, rhagades et éruptions. — Sécrétion purulente entre le prépuce et le gland, quelquefois avec gonflement; chaleur et rougeur de la partie antérieure de la verge. - *Vésicules et ulcères phagédéniques à fond lardacé et à bords élevés, au gland et au prépuce. --Sensation de froid dans les testicules. — Testicules durs et gonflés, avec rougeur luisante du scrotum *et douleur tractire dans les testicules et le cordon spermatique. - Prurit, fourmillement et élancements dans les testicules. - Forte transpiration des parties on marchant. - Exceriation ontre les parties et les cuisses.




Régles. - *Suppression des règles. Règles trop abondantes. avec inquiétudes et coliques. - Metrorrhagie. - *Avant les règles, chaleur seche, avec ébullition de sang et congestion à la tête. Pendant les règles, langue rouge, avec taches foncées et brûlement, goût salé de la bouche, dents agacées et generves décolorées. Flueurs blanches purulentes, corrosares, avec démangeaison aux parties. - Prurit, boutons et nodesites aux lèvres. - Gonflement inflammatoire du vagin, avec semation comme si tout était a vif et excorré ... Gonflement des levres avec chaleur, durete, rougeur luisante, grande sensibilito au toucher, et douleurs brûlantes, pulsatives et lancinantes ... *Chute du rugin. Conception facile et certaine *Tumefaction dure des mamelles, avec douleurs d'ulcerations, ou carge suppuration et méération reelle. *Excoriation des mamelles

Larynx - *Columne, avec frissons febriles, humeur hypocondriaque, degoût de tous les aliments et constipation Enrouement continuel et perte de la roix. - Voix nasillarde. Brulement et chatouillement au larynx. *Toux seche, quelquefois satigante et chranlante, principalement le soir au lit, ou la nuit, même pendant le sommerl, et le matin, en se reveillant, excitée par un chatouillement ou une sensation de secheresse dans la poitrine, et aggravée en parlant. Toux comme par une irritation de l'estemac. -- Tour convulsive, avec vomiturit,on. - En toussant, douleurs a la tête et dans la postrine, comme si ces parties devaient éclater, "ou elancements à l'occiput, "ou douleur d'excornation dans la poitrine et mal aux reins. Envie de vomir et acces d'étouffement en toussant. - Tour, avec expectoration de sang pur - Toux rauque, avec sensation de séche-

resse et élancements dans la gorge

Poitrine. - Respiration difficile, comme si l'haleine manquait, ou courte et bruyante. * Haleine courte, en montant l'escalier et en marchant vite. — Oppression anxieuse de la poitrine, et gêne de la respiration, avec besoin de respirer prefondément, principalement après le repas, ou avec accès de suffocation la nuit, ou le soir au lit étant couché (sur le côté gauche). - Manque d'haleine, avec serrement et tension dans la portrine, et sensation comme si, au moindre mouvement et a la moindre parole, la vie allait s'éteindre - Pression dans la poitrine, quelquefois jusqu'au dos, avec impossibilité de respirer profondement. Brûlement dans la poitrine, quelquefois jusque dans la gorge. Elamements (comme par des couteaux) dans la postrine et dans les cotés, ou jusqu'au dos, principalement en respirant, en étermuant et en toussant. Sensation de meurtrissure et de gouilement, et douleur d'executation et d'ulcération dans la poitrine. *Battemente de cœur.

Trono. — Douleurs vives et sensation de meurtrissure dans les muecles de la poitrine. — Elancements, manque de solidité et fai-



MERCURIUS. - MERCURIUS CORROSIVUS

165

blesse aux reins. — Douleur de meurtrissure aux reins, an des et aux emoplates. — Brûlement et *douleur tractive au des et à la nuque. — Reideur et gonflement rhumatismal de la nuque et du cou. — Elancements dans les muscles du cou. — Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes du cou, arec douleurs

lancinantes et pressives.

Bras. — *Douleurs erres dans les épaules et les bras, principalement la suit et en remunt ces parties. — Tressaillements dans les bras et les doigts. — Gonflement chaud et rouge du coude jusqu'à la main. — Miliaire proriante aux bras. — *Dartres furfuracées et brûlantes à l'avant-bras et au poignet. — Craquement, faiblesse et sensation de paralysie de la main. — Sueur à la paume des mains. — *Éruption galeuse aux mains. — *Contraction crampoïde des mains et des doigts. — Gonflement des articulations des doigts. — *Gerçures et rhagades profondes et saugnantes aux mains et aux doigts. — Douleurs crampoïdes et enroidissement facile des mains, en travaillant. — Gonflement du poignet, avec douleur au toucher et en le remnant. —Roideur des poignets. — Ulcération aux ongles. — Exfoliation des doigts. — Doigts morts.

Jambes. — *Douleurs vices et lancinantes dans l'articulation coxo-fémorale, ainsi que dans les cuisses et les genoux, principalement la nuit, et pendant le moncement, et souvent avec sensation de froid dans les parties malades. — Grande faiblesse, lour-deur et courbature dans les cuisses et les jambes. — Sensation de roideur, de torpeur et de crampes dans les cuisses. — Boutous pruriteux aux cuisses. — Gonflement ædémateux, transparent, des cuisses et des jambes. — Tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts. — Miliaire pruriante, aux jambes. — *Dartres aux cuisses et aux jambes. — Contraction des jambes, et crampes aux mollets et aux orteils. — Gonflement du cou-de-pied ou des talons, avec douleurs vives ou lancinantes. — Douleur de luxation au pied. — Froid et sueur aux pieds «Gonflement douloureur des os du métatarse. — Gonflement

des orteils. - Ulcération des ongles.

MERCURIUS CORROSIVUS.

MERC-COR. — Mercurius sublimatus, mercure corrosif, sublimé corrosif. — Durce d'action : 3 à 4 semaines. — Hint. not. et prep. Voy. Pharmac homosp., p. 124.

ANTIBOTES : Voy. Mercurius.



MERCURIUS CORROSIVUS.

466

tous les membres, comme après une attaque de fièvre intermittente — Violentes douleurs dans tous les membres. — Crampes
continuelles dans les membres. — Membres ingourels et insensibles. — Roideur paralytique et paralysie des extranites, parfois avec sensibilite tres-diuloureuse au moindre changement de
position, céphalalgie a la racine du nez, your fixes et brillants,
peau seche et sueur au front — Tremblement des membres. —
Manque de forces et faiblesse génerale excessive; acces de faiblesse subite. — "Grande agitation, avec anxiete, inquietude
et jactation continuelles. — "Acces fréquents de défaillance,
syncope — "Douleurs ostencopes dans les membres et à la tête.
— Grande faiblesse dans les articulations. — Convulsions des
bras, des jambes et des muscles de la face. — Douleurs dans le
corps, avec roideur genérale et augmentation les douleurs par le
mouvement. — Plusieurs symptômes s'aggravent par la promenade au grand air.

Pean Peau sèche, chaude, brûlante et mordicante Prurit lacinant et brûlant. Peau pâle, decolorée et courerte de sucur.

— Fourmillement dans la peau, comme par engour lissement — Éruption miliaire par tout le corps — Taches par tout le corps, comme scorbutiques, et dans les intervalles eruptions scabiciformes, dartres et furoncles, bulles aux bras et au ventre

Gonflements glandulaires, tres-douloureux, autour des mamelons.


Sommeil. Insumme continuelle. En s'endormant, sursauts violents avec ebranlement de tout le corps. La nuit, repos nulle part, par sensation de chaleur et anxiete. Sommeil trop léger. Etat comateux. Réves les nuits a 3 heures du matin. Réves effrayants d'incendies, d'assassinat. Décubitus sur le dos, pendant le sommeil, les membres abandonnes a eux-mêmes.

Fièvre. Froid, très-souvent, la nuit aussi. Extremités froides. - Tremblement de froid avec claquement des dents. -Peau et extrémites froides - Frissons avec tranchees, au moindre mouvement et meme en se levant de s. n siège, ou bien au grand air, avec ténesme. - Frissons a la tête - Chalcur, surtout en se baissant, diminuce en se redressant - Sueurs nocturnes - Sueurs froides - Frèvre avec cephalalgie violente, face rouge, peau brûlante, yeux brillants, pupille rétrécie, front couvert de gouttes de sueur, corps roide et très-douloureux au moindre mouvement.

Moral. — Mauvaise humeur et grande propension à la colère, alternant quelquesois avec hilarité. — *État de stupeur, comme dans la fièvre typhoide aussi. — Compréhension affaiblie, il ne comprend pas ce qu'on lui dit et regarde tout hebeté ceux qui lui parlent. — Idées confuses avec paroles sans linison

Tôte. Céphalalgie violente, aggravée en se découvrant la tête.

Accès de vertiges. — Congestion a la tête et à la face, avec joues



MERCURIUS CORROSIVUS.

467

brûlantes et émission abondante de vents. — Douleurs lancinantes au front. — Céphalalgie frontale, surtout à la racine du nez. — Élancement, déchirement et pression au-dessus de l'œil gauche, comme dans l'os. — Froid à la tête, particulière-

ment aussi le soir, en se couchant.

Yeux. — Contraction du muscle sourcilier. — Conjonctive rouge et injectée. — Yeux termes, abattus, cernés d'un cercle bleuâtre, exprimant la souffrance et l'horreur d'une mort prochaine. — Yeux étincelants et très-mobiles, ou proéminents et fixes. — Regard qui exprime l'exaltation et la douleur. — Pupilles insensibles à la lumière. — Pupille inégale. — *Les objets paraissent plus petits et plus éloignés qu'à l'ordinaire. — Photophobie en se promenant au soleil.

Oreilles et Nez.—Pulsation et élancements, surtout dans l'oreille gauche. — Oreilles comme bouchées. — Bruissement, comme de l'eau courante, dans les oreilles. - Narines sèches, surtout au

grand air. - Coryza très-violent.

Face. — Face pûle, amaigrie, décomposée, hâve; face jaune et ridée. — Face rouge et bouffie. — Tuméfaction de la partie inférieure de la face, d'une couleur rouge brunâtre. — Gonflement douloureux des parotides, des glandes sous-maxillaires et des glandes sublinguales, avec ou sans salivation. — Roideur des muscles masticateurs. — Lèvres très-gonflées et proéminentes, comme ches les singes. — Lèvres pâles. — Lèvres sèches et gercées.

Dente. - Douleurs déchirantes, brûlantes, dans les molaires superieures, jusqu'à l'œil gauche, avec douleurs rhumatismales dans d'autres parties du corps, coliques, diarrhée, sommeil empêché et angoisse nocturne. — Dents agacées et branlantes. — Inflammation et tuméfaction des geneires avec douleurs brû-

lantes.

Bouche. — Inflammation de la cavité buccale, avec gonfiement brûlant et ulcération. — Odeur fétide de la bouche. — Sécheresse de la bouche. — Langue rouge et brûlante. — Langue humide et chargée de blanc ou de jaune. — Langue gonfie, parsois au point de remplir toute la cavité buccale. — Parole difficile. — Salvation abondante, parsois avec douleur à la bouche. — Écoulement abondant d'un mucus albumineux, par

la bouche. - Gonflement spongieux du palais.

Gorge. — Douleurs brûlantes dans la gorge, le pharynx et l'æsophage jusque dans l'estomac, riolentes et atroces. — Grattement douloureux dans la gorge et le pharynx, avec parole difficile, déglutition pénible et douloureuse pour les liquides, forçant quelquesois à cracher souvent. — Sensation de constriction et de resserrement du pharynx, avec dysphagie. — Douleurs atroces au pharynx, et dans toute l'étendue du canal digestif. — Détachement, dans la gorge et la bouche, de mor-



MERCURIUS CORROSIVUS.

465

cenux d'épithélium amorti. - Deglutition difficile, très-doulourcuse, et us une entièrement impossible.

Goût et Appétit. - Goût de la bouche, métallique, astringent, on amer, ou salé. Goût amer des aliments. -- Anorexie complète. Soif violente, inextinguible, parfois avec nausées, vomituritions et vomissements après l'injection du moindre liquide.

Gastricismo. Eructations douloureuses. — Hoquet fréquent et violent. — Vomissements abondants, fréquents, continuels, surtout la nuit, et quelquesois avec douleurs atroces à l'épigastre et à la région ombilieule. — Vomissements bilieux, verdâtres, amers, méles quelquesois d'aliments ou de stries de sang. — Vomissements de matières muqueuses, blanchâtres ou bleuâtres, ou filandreuses, écumeuses ou sanguinoleutes. — Vomissement des aliments. — Vomissements de sang pur. — Vomissements de matières noires, comme du mare de casé, entremèlées de caillots de sang. — Vomissements avec diarrhée bilieuse.

Batomac. — Chaleur, brûlement et douleurs riolentes, atroces, dans l'estomac et au creux épigastrique. Pression pénible.

pincements douloureux et picotements dans l'estomac.

Ventre. Elancements dans la region hépatique. - Grande sensibilité de l'épigastre à la moindre pression. — Douleurs violentes, atroces, dans les régions épigastrique et hépatique. ---Tranchees, pincements et fortes douleurs dans la région ombiheade. -- Douleur de contusion dans la région du cœcum. --Fortes colliques, déchirement, tranchées violentes et douleurs atroces dans les intestins; quelquefois avec selles sanguinolentes. Tranchees après avoir mangé des pommes de terre. — Tranchées avec froid, frissons et sensibilite au grand air - Ventre bullonné, gonflé, météorisé et excessivement douloureux au moindre contact. — Douleurs dans l'épigastre, arec crampes dans les membres petriens et ménostasie. — Peau de l'abdomen froide sur tous les points. - - Ventre excessivement douloureux me toucher. - Sensation de gonflement dans les glandes inguinales.

Anns et Belles. Suppression des écacuations alvines et urinuires. - Constipution opiniâtre et invincible. -- Fréquents
besons d'aller à la selle, sans résultat, et très-fatigants. -Selles fréquentes en forme de bouillie, noirâtres et très-fétides.
Selles de diverses matières, rubanées, gluantes, argileuses,
brunaires et rougeâtres, ou bleuâtres, en grunieaux et très-fétides - Évacuations abondantes, muqueuses ou bilieuses. -Eracuations fréquentes, surtout la nuit, arec coliques et témesme. -- Envies excessivement pressantes d'aller à la selle, -Evacuations très-douloureuses. -- Durrhées très-fétides, jaunâtres ou muqueuses. -- Diarrhées avec ténesme. -- Diarrhées
sanguinolentes, -- **Dyssenteries avec écacuation de mucosités
sanguinolentes, coliques et tranchées continuelles, envies inces-



santes d'aller à lu selle et tenesme des plus douloureux. — Évacuations involutaires de sang pur. — Douleurs brûlantes dans le rectum et l'anus.

Urines Suppression des urines - Retention d'urine - Urines rares et rouges avec emission difficile. — Urines trestroubles, d'une couleur brun fonce — Urine jaune pâle, avec dépot prisutre — Prurit, bruh in int et élancements au meut urinaire. — * Écoulement gonorchéique de matieres épaisses, avec euisson en u mant et élancements le long de l'arethre.

Parties viriles Emucements dans les testicules. Fortes crections avec desir du . it Epiculations rares pendant le coit. Après le cest, clancement brulant dans la partie anterieure de l'ureta ...

Régles et Parties de la femme Suppression des regles, avec cept deg et tremblement les bras, des jambes et du em. - Avant les régles, tremblement des membres Régles trop abondantes, comme une perme Metrerrhègie violente et de longue dure. It de ur pressive au museux de tanche, en le teschant pendant le cit. L'ucorrhèc blan jamatre, d'une odeur d'uccette et museum le. Gonflement douleureux des glandes autour les manuelons.

Larynx. Elan emeats dans la partie superieure du larynx, en avalant a vi l' Secheresse du larvnx, le soir Voix enrouec et fail l'. Tour sechr, creuse et fatigante. Toux spasmodique. Expert ration de n deos tes malees de sang Hemeptysie.

Poitrine. Haleine fet de Respiration très-lente Oppression le poutrine et respiration gênei. Crampe dans le côte ducit le la poitrine en se linge dans le bras Elancements que tracersent le postrine Elancements pleuretiques. — Pleuropheamonie constater, suitout du clte gauche. Palpitations de cara: Battements urreguliers du cour, ondulatoires et te a bl. tents.

Trone — Dimleurs dans la region lombure, se propageant dans l'an joga tre et les annes, et alternant avec convulsions et contractions museulaires general. — Cou doubureux a la pression. — Sensation de giutil mint dans les glandes axillaires.

Extrémités superieures. Crampes des extremites supérieures.
Sensati à de fat que dans les leltoides Froid des mains et des parts dans les os du métacarpe. Douleurs fortes dans les artisulations du peuce Crampes dans les doigts et les mains

Extremites inférieures - Sensation de fatigue, chancements et deux que changet, smales d'uns les extrematés inferieures - Paralys et neens labité complete des extremités inferieures - Decharements et clancements dans l'articulation coxo-femorale. - Jambes engourdies. - Froit glacial des pieds. - Crampes



MEZEREUM.

470

MEZERBUM.

MEZ. — Bois gentil, Daphné mezéreum. — Harremann — Hist. nat. et prep Voy Pharmac homosop., p. 286 — Hones natees: 15,30. — Dures d'action: jusqu'à 30 jours, dans quelques affections chroniques.

Antidotes: Camph. merc. — On l'emploie comme autidote de : Merc. ditrac
Comparer avec: Euphor. hell. hyos. ignat. merc. nitr-ac. puls. staph. veratr. zinc.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Inflammation, ramollissement, carie et autres affections des os; Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Affections scrofulenses avec glandes engorgées; Rachitisme?; Carreau?; Fièvres intermittentes; Teigne; Ophthalmies; Prosopalgie et odontalgie rhumatismales?; Hématurie; Flueurs blanches opiniatres: Raccourcissement des tendons de la jambe, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Tractions, déchirements rhumatismaux et tension dans les membres, avec faiblesse paralytique. Douleurs tressaillantes qui laissent longtemps après elles une sensation pénible. — Douleurs tractives dans un côté du corps, *Accès de douleurs et autres souffrances avec frissons. accompagnées de frissons et d'horripilation. — **Douleurs ron**geantes d'excoriation dans les membranes muqueuses. — Brûlement dans les organes de la digestion. oInflammation et gonflement des os. - Viceration des os. - Tressaillement et frémissement des muscles. Tractions et sensation d'accablement dans les articulations. — Brisement et pesanteur dans Lourdeur et paresse du corps. - Marche tous les membres. – courbee. - "Amaigrissement ou bouffissure du corps et du visage, avec ventre gros, chez les enfants. Glandes douloureuses. -Predominance des souffrances d'un seul côté du corps. Exacerbation des symptomes le soir. — Douleurs aggracées en touchant la partie affectée et par le mouvement. - Grande susceptibilite a l'air froid.

Ponú. Desquamation générale de la penu du corps. - *Prurit.
surtout la nant, plus violent et plus douloureux après s'être
gratté, et quelquefois avec gonflement de la partie qu'on a
grattée. - Prurit rongeant, comme par de la vermine. -- Éruptions miliaires, quelquefois chroniques. - Furoncles. -- Ulcères





enflammés, avec brûlement et élancement, on avec douleur rongeante d'excoriation.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, ayes sommeil agité et non réparateur, la nuit. — Secousses dans le corps pendant le sommeil. — Réveil de bonne heure (vers 2 ou 3 heures du matin), par un cauchemar.

Fièvre. — *Frissonnement, frisson, et froid de tout le corps, surtout aux mains et aux pieds, avec soif violente, et quelquesois sans désir de se réchausser. — Après les frissons, sommeil avec sueur. — Fièvre, accompagnée de mal à la tête, pâleur du visage, région splénique douloureuse, gonssée et dure, faiblesse, et *grande susceptibilité à l'air froid; *type tierce. — Fievre inflammatoire, violente.

Moral. — Humeur hypocondriaque, avec tristesse et pleurs. —
Angoisse et inquiétude, surtout dans la solitude, avec désir de
la société. — Maussaderic. — Emportements. — Inaptitude
au travail. — Faiblesse de la mémoire. — Émoussement de
l'intelligence. — Conception lente. Les idées ge perdent fréquenment.

Tôte. — Embarras stupéfiant dans la tête, comme si on était ivre, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige à faire tomber de côté, avec scintillement devant les yeux. — Manx de tête, avec horripilation et frissons, aggravés en plein air. — Manx de tête pressifs et étourdissants, d'un seul côté du cerveau. — Douleur d'écartement compressive ou crampoule dans la tête. — Violentes douleurs pulsatives et pressives dans toute la tête, le front, le nez et les dents, aggravées par le mouvement le plus léger. — Mal de tête martelant, avec vomissement de mucosités. — Sensation de torpeur avec douleurs tractives dans un côté de la tête. — Douleurs ostéocopes dans le crâne, aggravées par le toucher. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu et des cheveux au toucher. — Prurit rongeant au cuir chevelu et des cheveux au toucher. — Prurit rongeant au cuir chevelu.

*Eruption pruriante à la tête, parfois avec suintement.

Yeux. — Douleur comme si le globe des yeux était trop volumineux, avec pression. — Cuisson dans l'angle interne des yeux. — Inflammation des yeux. — Myopie ou presbyopie. — Étincelles devant les yeux. — Pupilles contractées.

Greilles. — Otalgie avec traction et tiraillements aigus. — Éruption pruriante et suintante derrière les oreilles. — Durete de l'ouie. Sensation d'obturation des oreilles. - Tintement dans les oreilles, quelquefois avec envie de dormir.

Non. — Excoriation de l'intérieur du nez. — Diminution de l'odorat, avec sensation de sécheresse dans le nez, et quelquefoisenvis inutile d'éternuer. — Éternument fréquent, accompagne de douleur d'excoriation dans la poitrine. — Coryza fluent, avec sécrétion de mucosités liquides et jaunes, excoriation et brûlement dans le nez, et éruption aux lèvres.



MEZEREUM.

472

Visage. — *Pålent du visage. — *Pression crampoide et étourdissante, dans les os des joues, oquelquefois d'un seul côté, et
s'étendant jusqu'a l'œil à la tempe, à l'oreille, aux dents, au cou
et dans l'épaule. — Tractions dans les os des machoires. — Tressaillement continuel et penible dans les joues et les paupières.
Furoncles à la face — Excornation et brilement aux l'yres et
aux commissures des levres. — Lèvres gonflees et gence, avec
exfoliation. — Levre superieure ulceree avec douleur brukante au
toucher. — Elancements dans les glan les sous-maxidaires.

Dents. -*Douleurs dans les dents carreer - *Elancements tractifs, brulants ou terebrants, dans les dents et jusque l'ens les os des joues et les tempes *Douleurs tressull'intes et dechirantes dans les dents -*Sensation comme si les dents tauent agacees, et qu'elles tussent trop longues. Les n'aix de lents sont aggraves par le toucher et le mouvement, ainsi que pendant les frissons, le soir. - Pendant les maux de dents, banethemement de sang a la tête, frissons et constipation. - Dents en luites de mucosités fetides. - Dents que se carrent promptement. - Vésicules brûlantes aux geneives

Borche et Gorge. — Vesicules brulantes dans la bouche et sur la langue. — Brûlement continuel dans la bouche — Parole embarrassee — Douleur pressive dans la gorge en avalant. — Aprete, exconation, grattement cuisant, et elancement dans la gorge et le palais. — Brûlement dans la gorge et dans l'assephage. Inflammation de la gorge. — Construction et retrecessement du pharyne.

Appétit et Estomac Gout amer de la biere que l'on rejette Faim violente l'après-midi et le soir. - Repugnance pour la viande. - Renvois frequents et a cule, surtout apres avoir bu.

Nausées avec accumulation d'eau dans la bou le, liberropilation et tremblement de tout le corps. - Vomisser ents violents de mucosités verdâtres et ameres, accompagnes de maux de tote. Vomissement de sang. - Pression a l'estomac. - Brûlement et sensation de chaleur dans l'estomac. - Inflammation de l'estomac. - Contraction du diaphragme.

Ventre. Ventre dur et tendu - Douleurs abdominales, chroniques, crampoules, traillantes, aigues, pressives, constr. tives
et lancinantes - Pesanteur dans le ventre - Sensation de chaleur et brûlement dans le ventre. Inflammation des intestins.
Pression expansive dans l'anneau inguinal. - Trait, il dus les
glandes de l'aine. - Coliques flutulentes avec gargo allements
et borborygmes dans le ventre, géne de la respiration et
frissons

Selles. Evacuations alvinos difficiles, de la consistance d'une bouillie epaisse, avec besoin pressant. *Constipat. in. Selles peu abondantes, molles, frequentes. Diarrhees r clentes avec douleurs insupportables dans le ventre. — Après la selle, con-





striction de l'anna qui se referme sur le rectum qui est sorti. — Avant et après la selle, froid et horripilation.

Urines. — Diminution de la sécrétion des urines. — Nuages floconneux et sédiment rougeâtre dans les urines. — *Pissement de sang. — Douleur d'excoriation dans l'urèthre. — Écoulement de

mucosités par l'urèthre.

Parties génitales. — Déchirement, tressaillement et lancination dans la verge. — Lancinations déchirantes et brûlantes au bout du gland. — Sécrétion abondante du smegma derrière le gland comme une gonorrhée bâtarde. — Gonfiement du scrotum. — *Leucorrhée chronique comme du blanc d'œuf; quelquesois aussi séreuse.

Larynx. — Enrouement, avec brûlement et sécherense dans la gorge, irritation qui provoque la toux et gêne de la respiration. - *Toux violente en étant couché. — Toux sèche avec vomitu-

rition et comissement le soir et la nuit.

Poitrine. - Gêne de la respiration. — Douleurs dans la poitrine en inspirant, comme si les poumons étaient adhérents et la cavité de la poitrine trop resserrée. — Pression à la poitrine. - Tension douloureuse des muscles de la poitrine. — Douleur d'excoriation et brûlement sur le sternum. — Points dans la poitrine, aggravés en inspirant.

Tronc. — Douleurs aux reins. — Douleur contractive et tensive dans le dos et jusque dans le sacrum. — Élancements dans le dos. — Roideur douloureuse de la nuque et du cou. — Déchirements saccadés dans les côtés du cou. — Douleur d'excoriation dans les

aisselles.

Bras. - Douleur dans l'articulation de l'épaule, comme si elle allait se déboiter. — Tension tractive et rhumatismale dans les bras, avec faiblesse paralytique. — Douleurs tressaillantes dans les épaules, les bras, les mains et les doigts. — Gonfiement et chaleur du bras et de la main, avec tressaillement et picotement dans les muscles.

Jambes. — Tressaillement dans l'articulation coro-fémorale, et jusque dans le genou. — •Raccourcussement de la jambe. — Douleurs ostéocopes dans les cuisses et les jambes. — Déchirement, tractions et tension dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils. — Tension et roideur dans les genoux. — Tressaillement et douleur pressive dans le tible. — Gonflement dur des mollets. — Douleur tressaillante dans les orteils.

THE STORIUS.

MILL. — Millefeuille. — Hénung, Études pathogénésiques de l'Amérique du Mord. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoup., p. 247. — Dooes



MILLEFOLIUM.

174

unitées: 0, 30. — Médicament qui, jusqu'ici, n'avait été emplisé que contre des Hemorchagies et surtout que ques espèces d'Hémotiques et d'Hémop-tysie surtout chez les philhisiques, mais qui mérite bien d'être placé au rang de nos polychrestes).

CLINIQUE. En examinant les symptômes caracteristiques de ce medicament, en verra les cas où l' n pourra le consulter avec succes centre l'une ou l'autre des affections suivantes · Affections rhumatismales et arthritiques, aigués et chroniques. Contractures: Hysterie; Hypocondrie, Convulsions des personnes hysteriques, des enfants, des femmes en cenches; Epilepsies; Eclampsies. = Eruptions pustuleuses, scabe formes et autres : Pour pre hémorrhaque; Varices des femmes enceintes, Ulcères de toute nature, fistuleuses, gangreneuses, atoniques, scerbutiques, carieuses. Contusions; places et blessures; Suites fücheuses d'um chute; Morsures venimenses. - Fièrres intermittentes, tierces, pernicienses, pestilentielles. - Hemorrhogies de toute nature; S. offrances particulières de la vieille-se et du sexe feminin : Blennorrhees. - Mélancolie, Cephalalgies, Blennorrhee des yeux et larmoiement, Taies de la cornee; Vue trouble; Otalgies; Maux de dents; Angines catarrhales. - Dyspepsies; Cardialgies; Coliques de diverses sortes, venteuses, hystériques, hémorrhoidales : Ascite : Hernies incarcérées; Lombries; Dyssenteries, Diarrhées muqueuses; Hémorrhagres intestinales; Hemorrhoides. Hématurie; Gravelle et calculs vésicaux : Retention d'urine : Gonorrhée : Condylômes, Regles trop abondantes; Métrorrhaques. Suppression subite de regles ordinairement trop abondantes, Avertement imminent; Chloruse; Leucorrhée. Diverses souffrances des femmes en conches, surtout affections spasmediques, lochies trop fortes ou supprimees; Mamelons ecorchés. - Toux et blennorrhée des poumons, Hemoptysies et hémorrhagies pulmonaires ; Phthisie tuberculeuse et autres affections pulmonaires.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Dechirement, clancements dans les membres. — Faiblesse et sensation de malaise, avec pandiculations. — L'usage du cafe produit des congestions à la tête et des douleurs dans les numbres. — «Convulsions, sursauts faciles à la moindre occasion. — Éruptions boutonneuses; «Carie des os «Dans bien des cas de lésions traumatiques aussi important qu'Armea (jahls). — *Hémorrhagie. — *Fievres avec froid et horripilations, chaleur extérieure et interieure; clinleur febrile avec soif, chevres intermittentes. — Envie de dormir, avec bâillements et pan heulations, bâillements violents, acces de congestion au cerveau, pendant le sommeil.

Moral et Tête. - Caractere violent et emporté: frayeur facile. -





Confusion et embarras dans la tête, avec sensation continuelle comme s'il avait oublié quelque chose, ne sait ni ce qu'il fait, ni ce qu'il veut, avec aggravation le soir, ainsi qu'après l'usage du vin et du café. — Stupeur, vertiges, ivresse; ventige à faire tomber à droite ou en arrière, à tout mouvement léger et en marchant, avec nausées en se baissant. — Congestion à la tête, avec douleur comme si le crâne allait éclater; tapage et sensation d'un courant de flammes dans la tête; douleurs dans l'occiput, au reveil surtout; sensation comme si un cordon entourait le front; eviolente céphalalgie, avec tressaillement des paupières et des muscles du front. — Les chereux s'entortillent souvent et d'une manière extraordinaire; lors même qu'on les fait un peu raccourcir.

Yeux — Oreillos — Nes. — Une trouble comme par un brouillard, mais dans le lointain seulement; yeux brillants. Oreilles comme bouchées; tintement; sensation comme si de l'air froid ou de l'humidité sortait de l'oreille; *douleurs d'oreille surtout a gauche. — Dans le nez, élancements vers la racine, partant de

l'oril : *saignement du nez.

Pace et Dente. — Rougeur de la face mas chaleur; teint frais et rose; lèvres gercées; petits ulcères au côté interne de la lèvre inférieure. — *Manx de dents, partant de la face; oulcère aux

gencives.

Bouche et Garge. — Sécheresse de la bouche; estomacace; langue sèche et gonfiée; brûlement et sensation de contraction à la langue. — Au palais, douleur comme d'une coupure; erelachement de la luette?. — Mal à la garge, pendant et hors le temps de la déglutition; mal à la gorge chaque soir; douleurs lancinantes, très-sensibles, passant cà et là à droite de la gorge, près du larynx; eulcères dans la gorge?.

Appétit et Souffrances gastriques. Sensation de faim augmentée, avec rongement et fouillement dans l'estomac; *manque

d'appétit. Renvois à vide et hoquet.


Estomac. Sensation de plénitude dans l'estomac: estomac comme rembourré de terre astringente: crampe d'estomac, avec la sensation comme s'il y avait un liquide dedans qui se dirigeat vers les intestins et l'anus: douleurs violentes dans le creux de l'estomac;

*gastralgies; brûlement dans l'estomac.

Ventre. — Douleur, tiraillement et brûlement dans l'hypocondre droit; "douleur dans la région du foic. — Flatuosités, douleurs de ventre comme par des vents incarcérés, borborygmes et tranchées; sortie fréquente de vents fétides. — *Coliques renteuses; "coliques tranmatiques, par lésions mécaniques du ventre ?. - Ascité ?. — "Hernies incarcérées?.

Sellos et Anus. — Petites selles molles, fréquentes; edyssenteries: ediarrhées muqueuses; flux collaque; lientérie?. — *Hémor-rhoïdes saignantes, gonflées, douloureuses; *hémorrhagies intes-

timales, surtout à la suite d'un effort, - el ombries?.



MILLEFOLIUM. - MOSCHUS.

478

Urines. — Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante; urines rouges et abondantes. — «Incontinence d'urine?.— *Hématuries. — «Catarrhe de la vessie?.— «Gravelle, calculs vésicaux et dysurie provenant de ces causes?.

Parties viriles. — "Gonorrhée?. — "Rétention du sperme dans le coît. — "Condylômos?. — "Gonflement et induration des testicules?.

Règles et Parties de la femme. — *Règles trop abondantes; menstrues irrégulières, tantôt trop faibles, tantôt trop fortes; *métrorrhagies; *souffrances par suite de suppression des règles ?. — *Leucorrhée. — *Infertilité avec règles trop abondantes?: *fausses couches imminentes?. — *Convulsions et autres souffrances des femmes en couches; *lochies trop abondantes. — *Ecorchure des mamelons?. — *Manque de lait avec lochies supprimées et fièvre?.

Larynx et Poitrine. — *Toux: -avec expectoration écumense: avec vomissement; *hémoptysie, *par suite d'une chute ou d'un coup sur la poitrine, *chez les personnes phthisiques. — *Blennorrhée des poumons; *phthisie tuberculeuse?. — *Dyspuée; souffrances asthmatiques. — Élancements dans la poitrine.

Trono et Membres. — Douleur dans la région du rein gauche, suivie de pissement de sang. — *Douleurs dans les bras; pression lancinante dans le bras droit; engourdissement, picotement et douleurs (ostéocopes?) dans le bras droit; bras droit comme paralysé. — Douleurs au-dessus de l'articulation de la main gauche; douleur pressive, pulsative, dans les os du métatarse; douleur comme d'un abcès sous l'ongle du pouce. — Douleur de contusion, comme à la suite d'une chute, à la fesse droîte et au tendon d'Achille et dans le jarret; douleurs violentes, comme ostéocopes, dans le pied droit; fourmillement et sensation d'engourdissement dans les pieds.

MOSCHUS.

MOSCH. — Musc. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 335 — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 24 heures anviron. Antidotes : Camph. n-vom.
Companer avec : Asa. bry. cocc. coff. con. croc. ign. n-vom. op. puls. spig. staph. stram.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Convulsions; Syncope; Faiblesse hystérique; Différentes affections hystériques et hypocondriaques; Surexcitation nerveuse, avec



MOSCHUS.

477

insomnie; Céphalalgies hystériques et nerveuses; Migraine; Épistaxis; Impuissance?; Souffrances asthmatiques; Asthme de Millar?; Croup?; Spasmes pulmonaires, surtout ches les personnes hystériques, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Picotement dans les membres, quelquefois avec douleurs des parties affectées. — Douleurs crampoides dans les membres. — Tremblement et tressaillement par tout le corps. — Faiblesse que l'on ressent plutôt pendant le repos que dans le mouvement. — "Faiblesse jusqu'à tomber évanoui, avec froideur nocturne de toute la peau du corps. — Accès de défaillance, surtout la nuit, le soir ou au grand air, suivis de maux de tête. — Douleur de luxation et de brisement à la partie sur laquelle on est couché. — Les souffrances s'aggravent lorsque le corps se refroidit. — Forte susceptibilité au grand air. — — Pincements, élancements et prurit qui force à se gratter, à différentes parties du corps. — Tétanos. — "Convulsions avec crampes de la poitrine. — Symptômes hystériques, même chez des hommes.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, avec baillements fréquents et profonds. — Somnolence. — La nuit, impossibilité de rester longtemps couché dans la même position; la partie sur laquelle on repose est douloureuse, comme si elle était luxée ou brisée. — Rêves vifs de choses infamantes, et dans lesquelles rien ne réusit. — *Insomnie pendant toute la nuit, par surexcitation du système nerveux.

Pièvre. — Circulation du sang accélérée. — Sensation fréquente, comme s'il soufflait un air frais, surtout sur les parties découvertes. Sensation de froid, le plus souvent à la colonne vertébrale, avec douleurs tractives. — Le grand air semble froid, on recherche le feu. — Horripilation fréquente et légère, partant de la tête et se répandant sur tout le corps. — Accès de chaleur

brûlante, le soir. — Tous les matins, sueur.

Moral. Grande distraction et absence d'esprit, parfois avec paroles confuses. — Préoccupation, pendant laquelle on se parle à soi-même et on gesticule, comme si on avait perdu la tête. — Grande activité, avec faiblesse qui fait qu'on laisse tout tomber des mains. — Plaintes et lamentations à cause de souffrances excessives, sans que le malade puisse dire où est son mal; en le questionnant, il se plaint plus violemment encore, mais sans dire ou il souffre. — Crainte de mourir et peur excessive de la mort. Anxiété hypocondrisque, quelquefois avec battements de cour. — Humeur excessivement querelleuse et grande iras-cibilité, avec emportement juagu'à la fureur. — Perte de la mémoire.



MOSCHUS.

行角

Tôto. Vertige et vaeillement devant les yeur, au moindre monvement de la tête - Vertige jusqu'à faire perdre commissance,
ou avec evan dissement - Vertige, avec sensation e mime si l'on
faisant une élaite - Vertiges avec nausées et commissements,
besoin de se coucle r. et desir de cafe à l'eau - Etourdissement
commissant l'avresse - Maur de tête avec nausées et commissements,
qui farent à se coucher - Pesanteur de la tête - Mil de tête
compressif et étairdissant, surficit immediatement auslessus de
la racine du nez - l'Iraction crampoide et tensive dans la
tête, et surfout dans l'occiput, et jusque dans la naque - Congestion à la tête. - Doubear pressive et terebrante dans la tête
comme si un clou était enfonce dans le cervean

Your fernes, avec dul ur pressive dans les angles.
Larme iement l'eux fixes, ctincelants, avec une sorte d'étourdissement et absence il esprit. Obscure ssement subit les yeur.
Petits hontons rouges sur les paupières superieures. - Prurit.

dans les angles des yeux

Oreilles. Eruptions aux oreilles, avec douleur brulante après s'être gratte. Crépitation et craquement dans les oreilles. Bruissement devant les oreilles. Dureté de l'ouie. Ecoulement

de céramen par les oroilles

Visage et Nez Chalcur du cisage, quelquefois sans rougeur et avec veux ternes — Chalcur d'une joue sans rougeur, tandis que l'autre est rouge sans chalcur. — Temp terreux — Tension dans les muscles de la face, comme s'ils étaient trop courts. — *Epistares — Fourmillement au bout du nez, comme par des insectes. — Exfoliation des levres,

Estomac. Gout putride des aliments. Rapports violents, quelque fors avec n'insees. Accès de nausées subites. Nausées
qui remontent de l'epigastre, avec retraction du nombril et douleurs crampondes. Vomissements riolents surtout le matin,
et souvent a l'impagnes de douleur à l'estomac et à la portrine,
et de ballonnement de l'epigastre. Pression à l'estomac.
Sensation de plenitude et de gine dans la régum de l'estomac
et de l'epigastre, quelquefois avec malaise, augment e après
avoir mange moderement. Sensitiva d'expiration enisante,
brûlante, dans la region de l'estomac, après le repis.

Ventre Acces de contraction d'influercuse dans la région ombilieule, avec suspension de la respiration — Sensation de tension d'ins le rentre, comme si tous les cétements ét uent trop justes, accon pagnée d'un anxieté qui ne permet de se livrer a aucun travail, in de rester a la meme place, mais oblige a courir constanament de côte et d'autre. — Incarcération de

flatuosités.

Selles - Constipution, surtout après avoir pris du cafe Diarrhee, surtout la nuit, et quelquefois pendant le sommeil. Diarrhee avec tranchées violentes - Les selles diarrhéiques sont





toujours mêlées de matières stercorales. — Selle couleur de sépia. — Envie pressante et inutile d'aller à la felle.

Parties viriles. — Forte exaltation de l'appétit rénérien, quelquefois avec chatouillement insupportable dans les parties, douleurs tensives à la verge. — Impuissance à la suite d'un froidissement. — Pollutions douloureuses, sans érection. — Érection avec douleur brûlante dans l'urêthre. — Après le cost, nausées et vomissements.

Règles. — Menstrudion trop hâtire et trop abondante. — Traction et sensation comme si tout se portait vers le bas-ventre et

les parties génitales, pendant les règles.

Poitrine. — Constriction dans le larynx, comme par la vapeur du soufre. — Respiration difficile et haleine courte, avec élancements dans la poitrine. — Constriction erampoïde et suffocante de la poitrine, surtout lorsqu'on prend froid. — *Crampen de poitrine, odébutant quelquefois par un besoin de tousser, et s'aggravant ensuite jusqu'à porter au désespoir. — Douleur pressive dans la poitrine, qui va jusqu'à suspendre la respiration. — Élancements dans la poitrine et dans les côtés, quelquefois avec rougeur et bouffissure de la face, pupilles dilatées, langue rouge et sèche, et soif ardente. — La poitrine est fortement attaquée et douloureuse dans toutes les parties, avec toux violente et sèche.

- Sensibilité douloureuse de la poitrine, sous les bras, surtout à

la pression... Battement de cœur anxieux.

Trong et Membres. — Tractions violentes dans la nuque et le dos, comme si tout était tendu. — Tractions dans toute l'étendue du bras, et surtout au poignet, comme par une crampe. — Brûlement avec sensation de froid aux dernières phalanges des doigts. — Gonflement des mains, avec douleurs lancinantes. — Mouvements convulsifs des mains et des doigts. — Inquiétude dans les jambes, avec faiblesse paralytique qui oblige à les remner constamment. — Vibration dans les jambes, comme après une grande fatigue, en étant assis. — l'aiblesse paralytique dans les jambes, dès qu'on s'assied, après avoir marché.

MUREX PURPUREA.

MCR. — Pourpre antique, Mures, à pourpre, — Pernoz. — Journal de Méd. homorop. — Hint. not. et prep. Voy. Pharmac. homosp., p. 328

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grand jount les symptômes sont plus forts et ils coment quand on marche et repara

; pendant plusieurs wie qu'en marchant; aand on est assis.— Peau sèche, comme si elle allait se gercer. — Envie de dormir, quelquefois avec tristesse; grand besoin de dormir, vers 9 heures du soir; sommeil interrompu par des douleurs, comme celles des règles; reveil avec effroi, avec fort besoin d'uriner et émission abondante; rères pénibles, quelquefois avec réveil en sursaut. — Moral, anxi ux, craintif, peureux; grande tristesse vers le soir, avec repugnance pour la conversation et desordre des idées.

Tête Nez. — Memane ethélèlie, avec dinientes de trouver les expressions, — Embarres de la tête, avec maptitude au travail; quelquefois avec envie de dermir en tête leurde; tête lourde, comme par un temps etonile, on bien frequente, alternant de temps en temps avec grande charte des ides; céphalalaie, le matin au reveil, se dissipant lersqu'en se leve; do deur dans l'occipat, quelquefois tres-vive; douleur dans la temps ganche; douleur pressive dans le front, on bien aussi dans la tempe droite; serrement crampoïde au derrière de la tête, avec besoin d'y porter la main ou de renverser la tête, ce qui soulage. — Derrière les oreilles, serrement crampoïde, bruit dans les oreilles, avec aggravation de la pesanteur de la tête. — Nez froid tout le jour, très-pénible. — Brûlement dans une joue, la droite le soir, la gauche le matin.

Estomac — Selles. — Faim, quelquefois seulement le matin et absolument nulle pendant le repas. — Dans l'hypocondre droit, douleur tensive. — Coliques, douleur vive, comme un coup tranchant dans le côté gauche du bas-ventre, qui reste doulou-reux pendant toute la soirée. — Selles difficiles; constipation, pendant plus de 5 jours; pression sur l'anus, comme des élance-


ments douloureux.

Voies urinaires. — Fréquent besoin d'uriner, le jour; la nuit, avec urine sans couleur. — Urine : fétide, avec sédiment blanc et écoulement d'un peu de mucosités après avoir uriné. — Écoule-

ment d'un peu de sang en urinant.

Parties génitales (chez la femme). — Forte irritation des parties génitales, avec désir ardent du coît, presque jusqu'à la folie; le plus léger contact renouvelle le désir. — Dans la matrice, sensation de sécheresse et de constriction; pulsation; douleur incisive. comme par des instruments tranchants; douleur violente dans le côté droit, traversant le ventre jusque dans le côté gauche; violent élancement à gauche, le soir. — Dans les grandes lèvres, sensation de pesanteur et d'extension; sensation de pesanteur dans le vagin, pendant les maux de ventre. — Leucorrhée: séreuse; verdâtre paisse; devenant sanguinolente; pendant la selle, réapparition d'une leucorrhée sanguinolente. — Dans les seins, douleurs violentes; élancements aigus.

Larynx — Poitrine. — Voix altérée, enrouement ; toux, l à jeun; sèche, rare, avec oppression de poitrine. — En re sifflement dans la poitrine, le soir. — Douleur de



MUREX PURPUREA. - MURIATIS ACIDUM.

comme si elle était brisée; élancements et brûlement au-dessous des petites côtes gauches, vers le dos. — Palpitations de cœur, et battement des artères.

Dos — Extrémités. — Lumbago, quelquefois brûlant et comme à vif; en étant allongé, surtont au lit, douleur dans les hanches et les lombes; douleurs dans la région du bassin. — A l'avant-bras, douleur au-dessous du coude; chaleur dans les mains. — Dans les jambes, grande faiblesse et fatigue, quelquefois fléchissement et besoin insurmontable de s'asseoir. — Dans les cuieses, forte douleur de meurtrissure; chaleur ardente, devant; douleur aiguê, devant, en se levant, ne supportant aucun contact; sensation de pulsation, devant.

MURIATIS ACIDUM.

MUR-AC.— Acide muriatique ou hydrochlorique.— HARREMARN. — Hist. not. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 127. — Doses usitées : 3, 30. — Durée d'action : jusqu'à 5 semaines, dans quelques affections chroniques.

ANTIDOTES: Campb. bry.
COMPARER AVEC: Ars. aur. bell. bry. cale. chin. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom.
phos. ac. puls. rhus. squilt.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : —
Affections hydropiques?; Éruptions, dartres et autres affections scrofuleuses; Fièvres typhoïdes, putrides: Surdité; Affections scorbutiques : lyrognerie?; Hémorrhoïdes; Impuissance, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉMÉRAUX. - Déchirement et douleurs incisives dans les membres pendant le repos, améliorés pendant le mouvement. Douleurs de brisement dans toutes les articulations. — Sensibilité douloureuse du périoste dans tous les os, comme dans une fièvre intermittente. Gonflements hydropiques. — Paresse et crainte de mouvement, avec désir de rester constamment assis. — Accablement excessif; dès que l'on s'assied, les paupières s'affaissent. — Marche chancelante des genoux. — Grande sensibilité au temps humide.

Peau. — Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant, avec besoin de se gratter. — Eruptions croûteuses, qui démangent à la chaleur du lit. — Furonclande douleur lancinante au toucher. — Utelres putrides et deulouseux, avec brûlement sur les

bords. — Pustules noires.

ommeil. — Forte envie de dormir le jour, se dissipant dès qu'on prend de l'exercice. — Insomnie avant minuit. — Avant minuit, ronflement continuel, gémissement, jactation, paroles et dispositions à glisser en bas du lit. Réveil fréquent et de bonne heure, à cause du froid qu'on éprouve au lit.

Fièvre. — Predominance du froid. — Frissonnement, avec bâillements et pandiculations, sans soif, et non suivis de chaleur. — Chaleur sans soif, avec agitation et besoin de se découvrir le soir. — Pouls intermittent. — Saeur nocturne, le soir en s'en-

dormant, ou avant minuit.

Moral. Tristesse. — Taciturnité et concentration en soi-même, avec anxiété, appréhensions et maussaderie. - *Hésitation et inquiétude. — Affluence d'idées sur des évenements récents, pen-

dant le travail. - Disposition à se fâcher et à s'emporter.

Tête. -- Vertige tournoyant, avec marche chancelante. -- Mal de tête par la marche au grand air, et surtout par un vent apre. -- Mal de tête aggravé en se redressant dans son lit et en remuant les yeux, se dissipant par un exercice coporel. -- Pesanteur surtout à l'occiput, avec obscurcissement des yeux, fortement aggravée en regardant fixement un objet. -- Mal de tête, comme si le cerveau était meurtri. -- Aècès de secousses, déchirements ou élancements dans la tête.

Yeux. — Cuisson pruriante dans les angles des yeux. — Elancements au travers des yeux. — Gonflement et rougeur des pau-

pières. — *Hémiopie verticale.

Oreilles. — Otalgie, comme des tiraillements crampoïdes et aiguation dans les oreilles. — Insensibilité du conduit auditif. —Éruption croûteuse dans les oreilles. — *Dureté de l'ouïe, et surdité. — Acuité de l'ouïe, avec sensibilité au bruit. — Tintement, bourdonnement et sifflement devant les oreilles.

Nez. — Narines ulcérées. — Obturation du nez. — Coryza avec

mucosités épaisses, jaunes, ou séreuses et corrosives.

Visage. — Chaleur du visage, avec rougeur ardente des joues, en marchant au grand air, sans soif. — *Éphélides. — *Eruption de boutons croûteux au visage, au front et aux tempes. — Füroncle sur la tempe. — Brûlement aux lèvres. — Bouffissure de la lèvre inférieure. — Éruptions aux lèvres, parfois se couvrant de croûtes.

Dents. — Odontalgie, avec douleur pulsative, aggrarée en burant froid, soulagée par la chaleur. — Maux de dents, avec pression écartante. — Fourmillement dans les dents. — Gencires scor-

butiques.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche, avec paralysie de la langue. — Accumulation abondante de salive. — Pesanteur de la langue en parlant, comme du plomb. — Ulcères profonds pustules sur la langue. — inidité de la langue. — *Mal de go avec douleur d'excoriation et cuisson dans la gorge et le pa



Appétit. Goût le graisse rance dans la gorge. Goût âcre et putride dans la gorge. - Goût douceâtre de tous les aliments, et surtout de la biere, qui repugne. Boulume et soif immodérée -*Degoût de la vian le

Estomac - *Renno * putri les ou amers. Vomissement des aliments. Vomissement de bile, la nuit, avec nauses et renvois. Malaise à l'estomac, comme si l'on était gravement malaite. Sensation de vacu te dans l'estomac. Douleur contractive dans l'estomac, avec sensation comme s'il était retracté. Tension pressive et douleur compoule d'uns les hypocondres.

Ventre. - Malaise dans le ventre comme dans une grave maladie.

*Plenitude et billonnement du rentre. - *Douleurs crompondes dans le rentre : avec tranchées et pincements depuis la région ombilicale jusqu's dans les cotes, accompagnes de borborygmes. Sensation de vacuité dans le ventre Lancination dans les aines

Belles. - Evacuation difficile des selles, comme par inactivité du rectum. Selles d'un moule trop mince. Diarrhée avec cuisson et brûlement au rectum et a l'anus. Duarrhée d'excrements, Evacuation involontaire d'une selle liqui le et séreuse en urinant. - Ecoulement de sang pendant les selles. Chute du rectum en urinant. Prurit a l'anus. *Boutons hémorrhoidaux, gonfles et blevatres, avec douleur brûlante d'excoriation. Hémorrhoides fluentes. Sartie douloureuse et pénible de gras boutons hémorrhoidaux a chaque selle.

Urines. Tenesme de la vessie Encue frequente d'uriner a rec émission aband inte Emission immodéree d'une urine aqueuse. Relachement de la vessie et du cal de la vessie.

Parties genitales. - Exceriation du prepuce. - Appetit vénérien engourds. *Impuissance. Sensation comme si tout affluait vers les parties genitales, comme pour les règles. Regles trop hâtives.

IATYDA Enrouement chronoque. Toux violente et sanglotante, suivie de gargonillem et dans le fond de la portrine

Poitrine. Respiration profende, avec genussements. Elancements dans la portrine pen lant un mouvement violent et en respirant. Doubleur tensive sur le sternum. Comps incisifs dans la poitrine, avec pression sourde à la partie posterieure de la poitrine, et avec oppression. Elancements dans la region du cour. La anit, comp se violent dans le cœur, qu'on le ressent dans le visage.

Tronc. Douleur pressure dans le dos comme si on avait été courbé trop longtemps ou qu'on se fut donne un tour de reins Etancements dans les omoplates Furoncles au dos

Bras. Factione paralytique et deuleur de luxation dans l'épaule.

Pesanteur dans les lu 19 * Dechurement, pression et tiraillement dans les hous : Tension tractive dans l'articulation du

4 MURIATIS ACIDUM. — NATRUM CALLES

coude. - Tractions crampoïdes et pesanteur de l'avant-bras. - Déchirement incisif dans les avant-bras, les mains et les doigts.

Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant dans la paume des mains. Erreption crouteuse sur le dos de la main, et la partie supérieure des doigts. Douleur crampoïde à la partie charmue du pence, en ecrivant. Conflement du bout des doigts, avec brulement. Torpeur necturne et palissement des doigts qui sont comme merts.

Jambes. Dechirement et tiraillement crampoïde dans les cuisses.

Taches dartreuses et pruriantes sur les cuisses. --- Gonflement des genoux. -- Tension tractive dans le nollet et le tendon d'Achille en marchant. -- Lancinations dans le tendon d'Achille, le jour et la mait, emplé hant de marcher et de dormir. --- Ulceres putrides aux jambes. -- Froid aux pieds. -- Gonflement de l'ex-

trémite des orteils, avec brûlement.

NATRUM CARBONICUM.


NATR. — Sous-carbonate de soude. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 128. — Doses usitées: 12, 30. — Durée d'action: jusqu'à 40 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.
Antidotes: Ars. ?camph. nitr-spir.? — On l'emploie comme antidote de: Chin. Comparer avec: Arn. ars. carb-an. carb-veg. caus. chin. ign. kal. lyc. merc. natr-m. n-vom. plumb. puls. sabad. sep. spig. staph. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Souffrances rhumatismales, avec racçourcissement des tendons; Affections scrofuleuses; Glandes engorgées; Faiblesse par suite de pertes d'humeurs ou d'autres causes débilitantes; Tabes dorsualis?; Dartres; Verrues; Eruptions galeuses; Souffrances des lépreux; Souffrances des ivrognes?; Mélancolie et hypocondrie; Suites fâcheuses d'un excès d'étude?; Ophthalmies chroniques; Ulcères de la cornée; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurotique; Presbyopie; Coryza chronique; Ozène?; Balbutiement?; Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques; Hépatite chronique; Coliques venteuses?; Orchite?; Priapisme?; Stérilité?; Dysménorrhée; Flueurs blanches; Catarrhe; Souffrances phthisiques; Maladies du cœur?; Goître, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement crampoïde, pupalement dans les bras et dans les jambes. — Tractions p





NATRUM CARBONICUM.

tiques et déchirement dans les articulations, surtout le soir et la nuit. — Raccourcissement des tendons. — Tressaillement dans les membres, les articulations et les muscles. — *Lancinations fountillantes dans les muscles. — *Grande disposition aux inxations et aux tours de reins. - Gonflement des glandes. -Exacerbation des symptômes pendant l'orage. - La plupart des symptômes se manifestent pendant qu'on est assis et se dissipent par le mouvement, la pression et le frottement. — *Pendant les douleurs, angoisse, tremblement et sueur. - Forte agitation générale du corps, le soir. - Grande sensibilité maladive, avec tremblement, même en jouant du piano. - *Relâchement et manque de solidité dans tout le corps. — Marche incertaine. — Lourdeur et paresse surtout le matin, avec crainte du mouvement. — Brisement paralytique le matin, et grande lassitude dans les membres. — *Après une marche modérée, lassitude à se laisser tomber. — *Faiblesse prolongée. — Amaigrissement, avec teint pâle, pupilles dilatées et urine foncée. — Répugnance pour le grand air. — Grande disposition à se refroidir, suivie de rhume de cerveau ou coliques, avec diarrhée.

Pean. — *Sécheresse de la peau, avec sueur abondante par le moindre exercice ou le plus léger travail. — Fournillement sous la peau. — Gale. — *Éruption dartreuse. — Les dartres s'étendent et suppurent. — *Cercles jaunes, comme restes de taches dartreuses. — *Tubérosités lépreuses. *Verrues. — *Elancements, douleurs incisives et brûlement, dans les parties blessées. — *Éruptions galeuses (au ventre, chez les lépreux).

Sommeil. — *Envie de dormir insurmontable le jour, avec sommeil tardif le soir, et difficulté à se réveiller le matin. — *Sommeil agité, et plein de rêves rifs et quelquesois confus et lascifs, avec violentes érections et pollutions. — Rêves anxieux, qui, après le réveil, semblent être vrais. — Rêves effrayants de morts, de déluges, de querelles, de brigands, de diables, de voleurs, etc. — Rêves de voyages. — La nuit, grande agitation dans le corps, ébullition de sang, battement de cœur et cauchemar, mal aux dents, coliques, vertiges avec angoisse, etc. — Tressaillement et secousses pendant le sommeil. — Réveil de trop bonne heure.

Fièvre. — Horripilation fébrile, avec mains froides et joues chaudes, et vice versa, mais toujours sans soif. — *Froid aux mains et aux pieds. — Sueur nocturne, souvent alternant avec sécheresse de la peau. — Sueur froide et continuelle, comme par angoisse. — *Sueur abondante au moindre travail.

Moral. — Tristesse, et découragement avec pleurs et inquiétude sur l'avenir. — *Inquiétude, avec accès d'angoisse, surtout pendant l'orage et les travaux intellectuels. — *Eloignement pour les individus et la société. — *Humeur hypocondriaque et dégoût de la vie. — *Découragement. — Disposition à s'effrayer. — *Dépit et malveillance. — *Disposition à se fâcher et violents



NATRUM CARBONICUM.

188

accès de colère, — *Difficulté à concevoir et à combiner des idées en lisant et en écoutant *Inaptitude au trarail intellectuel et à la méditation, qui futique lu tête. Instabilité de l'esprit.

Tête. *Embarras de la tête. surtout dans l'appartement et pendant le repos. *Vertige, surtout après avoir bu du vin, et apres un travail intellectuel. *Mal de tête au soleil, ou en tournant promptement la tête. Sensation d'obturation pressive dans la tête, comme si le front allait celater. Mal de tête pressif, avec nausées, renvois et obscureissement des yeux. Dechirement crampoide dans le front, jusque dans les veux et le l'out du nez.

*Mal de tete, avec clancements, equelquefois au travers des yeux. Secousses a travers la tête. Mal de tête pulsatif dans le vertex, tous les matins. Congestion et chaleur a la tête. *Déchirement à l'exterieur du sinciput, tous les jours, à une hence 6xe.

Yeux. — Brulement dans les yeux, surtout en lisant et en écrivant.

L'ancidations au travers des yeux. *Inflammation des yeux et des paupières, avec photophobie. Gonflement des paupières. — *Ulceres a la cornée. Alces a la glande lacrymale. Affaissement frequent des paupières, avec difficulte de les euvrir. — Trouble de la vue, avec points noirs voltigeants, ou scintillement éblouissant devant les yeux. *Impossibilité de lire des caractères fins, comme par presbropse, *Duvet devant les yeux. — Pupilles dilatées.

Oreilles. Élancements dans les oreilles. *Grande susceptibilite au bruit Sonsation de surdité, comme par obturation des oreilles. *Dureté de l'oure Tintement, musique, bourdon-

nement, bruissement et pulsation dans les oreilles.


Nos. — Grande sensibilite du nez. Desquamation du dos et du bout du nez. — Ulcération au fond des narines. Obturation du nez, quelquefois avec sortie de morceaux de mucosites dures et fétides — «Coryza tous les deux jours. — «Coryza contanuel, et toux provoquée par un refroidissement et le plus léger courant d'air, se dissipant seulement après la transpiration. Mucosités aprèses destates et ienne dans le ner

epaisse, vertes ou jaunes dans le nez.

Visage. et halear du resage. Bouffissure de la face. Gonflement et rougeur des joues. Rongeur et chaleur brûlante, ou grande pâleur du visage, avec yeux cernés. Face alternativement pâle et rouge — eÉphélides a la face. Eruption pruriante, et humide au nez et à la bouche. eTaches jaunes sur le front et la lerre supérieure. Couleur jaunâtre de la face. Gonflement des levres. Eruptions, dartres et ulceres autour de la bouche et sur les levres — Engargement des glandes sous-maxillaires.

Dents. *Odontalgie, "avec douleur fouillante, térebrante, surtout après et pendant le repas, et particulièrement après avoir





mangé des choses sucrées ou des fruits. - Maux de dents pressifs, la nuit, avec gonflement de la lèvre inférieure et des gencives - Grande sensibilité des dents inférieures.

Bouche et Gorge. — Vesicules dans la bouche et ulcères lisses, avec brûlement — Régayement a cause de lourdeur de la langue. — Apreté, grattement et secheresse de la gorge et du palais. —

Accumulation de nucosite- dans la gorge.

Appétit. *Amertume de la bouche. - Goût acide de la bouche, avec langue charges d'un enduit spais. - *Forte sof et malaise après avoir bu froid. - *Fam violente, dévorante, surtout le matin, par une sensation de defaillance et de vacuite. Gourmandise. Répugnance pour le lait et diarrhée après en avoir pris - *Grande faiblesse de la digestion avec maussaderie et humeur hypocondenque après le repas ou le mondre écart de régime. Après le repas, ballonnement, lourdeur et pression dans l'estomac et l'épigastre. - *Souffrances par l'usage du vin.

Estomac. — Renvois fréquents pendant et après le repas. — Rapports douloureux. *Sensation de fadeur à l'estomac et naunées continuelles. — Hoquet frequent, surtout après le repas. —
Pyrosis et grattement dans la gorge, curtout après des aliments
gras *Pression à l'estomac, surtout après le repas. *Sen
sibilité douloureuse de la region de l'estomac et de l'epigastre,
au toucher et pendant que l'on parle *Douleurs d'estomac,
tractives, pressives et incisives. *Crampes d'estomac, contractives Sensati n de vacuite dans l'estomac, avec nausées. ~

Ballonnement de l'estomac et de l'epigastre.

Ventre Douleurs dans les Lypocondres. *Lancinations dans l'hypocondre gauche, que lqueseis après avoir bu froid. Lancinations dans la région hépatique. Maux de ventre, le matiu, après le réveil. *Ventre gros, ballenné. Maux de ventre noctures, avec tension dans la partie superieure du ventre et diarrhée. Colique avec retraction de l'ombilie, et durête des teguments du ventre. *Elancements et seu llements dans le ventre. Elancements et tractions dans les cotes du ventre. Gonfiement des glandes de l'aine. *Accamulation, incarcération et montements doulouveux de flatuosides dans le centre. Expulsion abondante de vents l'odeur aigre ou set ide.

Selles. *Enrie pressante d'aller a la selle, sans resultat, ou enrie d'une évacuation peu abondante et *insufficante selle dure, diffic de Selles molles, ou liquides, avec envie torte et tres pressante et tenesme a l'anus. Selles diarrheiques, jaunes. Diarrhée avec tranchees, après un refroidissement, ou après avoir pris du lait — Selles sanquinolentes — Sortie de tonia, pendant la selle. Pendant et après la selle, brulement et douleurs incisives dans l'anus et le rectum — Prurit et fourmillement a l'anus — Lancinations au perinée.

Urines. Fuenc fréquente et pressante d'uriner, jour et nuit, a ce combine et plus allement au hour de le combine et plus allement de la combine et plus de la combine et plus de la combine de la comb

4 sept and the first till -

Parties vertex in the second of the second

transpirer

Règles. — Pression comme si tout se portait vers les parte surnitales, et allait sortir. — *Règles hatives, avec many de tête, de reins et de ventre. — •Métrorrhagie. — La conception paraît être favorisée par ce médicament— •Difformité du col de la matrice. — Excoriation à la vulve, entre les cuisses. — •Après le colt, écoulement de mucosités par le vagin. — *Leucorrhée abondante, épaisse et jaunâtre, •ou fétide, quelque précédée de tranchées.


Laryan. — Enrouement et âpreté dans la poitrine, avec coryan, frieson fébrile et toux grattante et douloureuse. *Catarrhe continuel, avec coryza, et toux excitée par le moindre courant d'air de plus léger refroidissement, ne se dissipant que par la transpiration. — Toux provoquée par un chatouillement dans la gorge. — Toux violente et sèche, en passant du froid à la chaleur — *Toux avec expectoration d'un goût sale ou d'un pus rerdâtre et fétide. — Expectoration de petits morceaux, avec râle muqueux dans la poitrine. Toux et expectoration de sang.

Poitrine. — *Haleine courte, quelquefois avec gêne de la respiration. — *Dyspnée. — En respirant, tension sur la poitrine. — Pression à la poitrine. — *Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — *Froid continuel au côté gauche. — *Battements de cœur violents et anxieux, surtout en montant un esca-

lier, ou la nuit, en étant couché sur le côté gauche.

Tronc. *Douleur d'excoriation aux reins. — Lancinations aux reins, en étant assis. — Traction et tension crampoïde dans le dos et la nuque. — Fourmillement dans le dos. — *Roideur de la nuque. — Gonflement des glandes du cou. — Gonflement dur de la glande thyroïde.

Bras. — *Pression sur les épaules. — Traction et déchirement dans les épaules, les bras et les coudes, avec lassitude dans con ties. — Pesanteur, roideur et douleurs dans les bras, at ne pouvoir les lever. — Tressaillement et sensation de 1



NATRUM CARBONICUM. — NATRUM MURIATICUM. 489

ment dans les bras, les mains et les doigts, surtout en saisissant un objet. — Tension tractive dans les avant-bras et les mains. — Verrues aux bras. — Douleurs incisives dans les mains. — Déchirement et térébration dans les os du métacarpe, surtout le soir et le matin, au lit. — Brûlement dans les articulations de la main, le soir. — Tremblement des mains. — Peau des mains sèche, râpeuse et gercée. — Verrues sur le dos de la main. — Taches rouges et dartres sur les mains. — Tressaillements dans les articulations des doigts. — Distorsion des doigts. — Prurit brûlant et vésicules brûlantes sur les doigts, comme par des orties.

Jambes. — Grande pesanteur des jambes et des pieds, avec roideur en étant assis et en marchant. — Tressaillement dans les cuisses. Eruption dartreuse aux fesses. — Raccourcissement des tendons du jarret. - Dartres au jarret. - Traction pressive et crampoïdes dans les jambes. — *Crampe et traction dans les mollets, comme s'ils étaient trop courts. — Jambes enflées, Douleurs incisives rouges, oenflammées et couvertes d'ulcères. et *crampes dans les pi**ed**s. -Brûlement dans les articulations du pied, le soir. - *Gonflement des pieds ou de la plante des pieds, avec élancements en appuyant le pied. Disposition a se luxer et se fouler l'articulation du pied. Pieds froids.—*Ulcères chroniques au talon, provenant de vésicules rongeantes. - Crevasses et excoriation entre les orteils. — Gonflement des orteils, avec déthirement et douleur d'excoriation qui ne permet pas de dormir. - Ampoules au bout des orteils, comme par une brûlure. — Térébration, traction et élancements dans les cors aux pieds.

NATRUM MURIATICUM.

NATR-M. — Muriate ou hydrochlorate de soude — HARNEMANN. — Hist. nat et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 130 — Doses usitées : 12, 307— Durée d'action 40 à 80 jours, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES: Ara camph. nitr-spir. — On l'emploie comme antidote de : Chin.

COMPARER AVEC: Arn. ars carb a. carb-veq.caus chin. igu. kal. lyc. merc natr. n com. plumb. pull. Babad. sep spir staph sulf. — C'est surtout après merc. que natr-m. fera du bien, lorsqu'il se trouve indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant quider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales avec raccourcissement des tendons; Paralysie des membres ; Affections scrofulenses ; Glandes engorgées; Suites facheuses de contrariétés et de colère ; Faiblesse per perte



NATRUM MURIATICUM.

490

d'humeurs et autres causes debilitantes, menus par suite d'onanisme; Faiblesse et syncope hystériques; Chloroses anciennes, négligées; Verrues. Varices, Fièrres intermittentes, meme celles qui ont ete denaturces par de fortes doses de quin jama; Fievre typhoide, Melencolie et hypocondrie, Souffrance par execs d'etale; Migraine Chute des cheveux, par suite de fortes maladies aigues, amsi que chez les fennaes en couche, Ophthalmies chroniques, et blepharophthalmies, surteat chez les in lividus scrofuleux; Amblyopie ameurotique; Presbyopie, Otite avec ecoulement purulent, Coryva; Croute de lait?, Affection scorbutique des gene.ves. Stomacace t: Dyspepsie, gastralgie et autres offections gastropues Hepatite chronique?, Coliques venteuses; Constipation chronique; Epaississement du rectum; Relachement chronique du ventre: Diabete?, tionerrhee chronique?, Prinpisme?; Impuissance: Dysmenorrhee, Amenorrhe. Dysmente des jeunes filles, Sterilité acce règles trop hatees et trip abondantes?; Flacurs blanches, Catarrhe, Scuffrances phthisques, Maladres du cœur, Goitre. Panaris; Suppression de la sucar des pieds, etc., etc. Voer la note, page 15

SYMPTOMES GENERAUX. - Traction pressive dans les mentbres. - Roideur de tontes les articulations qui craquent quand on les remue. - Raccourcissement des tendons. - Tressaillement dans les muscles et les membres. Disposition aux luxations et a se denner un teur de reins. - *Paralysies. - Conflement des glandes. Accès de malaise, surtout le matin ou le soir arec mausées, faiblesse, paleur mortelle du visage, mul a la tête, engourdissement des membres, besoin de se concher, etc. *Suites fâcheuses d'une contrarieté. Les symptomes se manifestent, se renouvellent et s'aggravent generalement en etant couche, et surtout la nuit ou le matin, ils sont sonlages en se redressant dans le lit. - Les douleurs necturnes suspendent la respiration et decasionment une sorte de paralysie semi-laterale. · Bouillounement desang, general, avec pulsation dans tout le corps au plus leger mouvement. - Congestion a la tete a la postrine et a l'estomae, avec froid aux jumbes. *Malaise et meoramodites apres avoir beaucoup purle. - Grand relachment de toutes les forces physiques et morales, apres une fatigue corporelle Pesanteur et paresse, surfout le matin apres s'etre leve, avec repugnance pour le mouvement et la marche *Beisement et lussitude excessive dans les membres, surtout le mateu et en étant assis. *Faiblesse hysterique. - Grande fachlesse. Abattement et agilite alternativement dans les membres. - Grand amangressement - Disposition a sc refreidir. Inquietudes dans le corps avec frissonnement.

Peau. - Eruption unhance avec douleur lancinante. - Tuberosites





pruriantes. — Éruption urticaire après un exercice violent. — Dartres. — Furoncles. — Verrues. — Panaris. — «Varices. — «Cors. — «Peau sale, flasque et sans vie, chez les personnes »

chlorotiques.


Sommeil. — Forte envie de dormir le jour. — *Sommeil tardif et insomnie nocturne, avec efforts inutiles pour s'endormir. — *Difficulté à se rendormir la nuit, lorsqu'on s'est réveillé. — Difficulté à se réveiller et grande lassitude somnolente, le matin, de bonne beure. — *Sommeil agité, plein de réves vifs et lascifs, avec érections prolongées et pollutions. — *Rêces anxieux, pénibles, avec pleurs et paroles pendant le sommeil. — Rêves effrayants de querelles, de meurtres, d'incendie, de voleurs, etc. — Rêves qui occupent encore l'esprit après le réveil, et que l'on

croit être des réalités. — Bouillonnement de sang la nuit, avec chaleur anxieuse et battements de cœur. — Cauchemar. — Somnambulisme. — *La nuit, douleurs dans le dos, tremblement comme dans les nerfs, émission d'urine fréquente, mal à la tête, coliques, souffrances asthmatiques, grande angoisse dans le

corps, etc.

Flèvre. — *Frissons intérieurs, fréquents. — *Frisson continuel et manque de chaleur vitale. - Frisson avec ou sans soif. -Frisson et horripilation avec envie de dormir, suivie d'une légere transpiration. -- Chaleur et frissons alternatifs, avec maux de tete. - Chaleur avec soif ardente. - Accablement avant la fièvre. — •Avant le frisson, maux de tête; pendant le frisson, haleine courte, baillements et envie de dormir. -- "Pendant la chaleur, maux de tête violente, étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et rougeur de la face. — Fièrra avec douleurs ostéocopes, douleurs dans le dos, teint jaunaire, mal à la tête, faiblesse, amertume de la bouche, commissure in levres ulcérées, absence d'appétit, pression au creux de l'estomac, avec grande sensibilité de cette partie au toucher, etc.; type quotidien, ou tierce ; début de la fièvre, généralement le matin, par des frissons suivis de chaleur et de soif. — "Fièrre typhoïde arec faiblesse, sécheresse de la langue et forte soif. - Pouls irrégulier et sourent intermittent. - *Sueur matutinale. — *Sueur abondante, trop facilement excitée par le mouvement et la marche. **Moral.** — *Tristesse mélancolique qui fait rechercher toutes les

choses désagréables, et pleurer abondamment; les consolations ne sont qu'aggraver cet etat. — *Inquietude sur l'avenir.
*Angoisse, "quelquesois pendant l'orage, mais surtout la nuit.
-- Indifférence, laconisme, morosité et inaptitude au tratail.
-- *Précipitation impatiente, et irritabilité. — *Disposition à s'estrayer. — Haine pour des personnes dont on a reçu anciennement des ossenses. — *Irascibilité et violent emportement, sacilement provoqués. — Envie de rire. — Mauvaise humeur et gaieté alternatives. — *Faiblesse de mémoire, et oublis * " —



NATRUM MURIATICUM.

Irréflexion et distraction. — On se trompe en parlant et en écrivant. — Incapacité de réfléchir, et fatigue par le travail intellectuel. - · Maladresse.


Tôto. – *Embarras douloureux dans la tête. — *Vertige ¬pendant lequel tout semble tourner devant les yeur, et où l'on risque de tomber en avant, surtout en marchant et en se levant du lit. Vertige avec secousses dans la tête et étourdissement. *Maux de tête le matin en se réveillant, -en se retournant, et pendant le mouvement du corps ou de la tête, en courant, ou à l'air froid, ou après une contrariété. — *Pesanteur de la téte, tous les jours, surtout à l'occiput, et forçant à fermer les yeux.-*Mal de tête comme si la tête allait éclater, ou comme si elle était tendue et comprimée, surtout en écrivant. — Accès de man.c. de tête avec nausées et vomissements. — *Pression et compression dans la tête et surtout dans les tempes et au-dessus des yeux. *Tiraillements aigus et aggravées en fronçant les sourcils. élancements dans la tête, surtout au-dessus des yeux, avec besoin de se concher et obscurcissement de la vue. — Seconsses lancinantes a travers la tête. - *Battement, pulsations et martellement dans la tête, surtout pendant le mouvement. - *Battement et tractions dans le front. — Sensation comme si le cerveau vacillait en remuant la tête. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, comme s'il était excorié. — Contraction et mobilité du cuir chevelu. — Facilité à se refroidir la tête. — Sueur à la tête, surtout le matin et la nuit. - *Croûtes sur le cuir chevelu. — *Chute abondante des cheveux, même des poils de la

Year. — Prurit dans les yeur. — Elancements, *cuisson et brûlement dans les yeur. — Inflammation des yeur. — *Larmes
corrosires. — *Larmoiement fréquent. — *Chassie dans l'angle
externé des yeux. — *Agglutination nocturne des yeur. — Paupières continuellement rouges et ulcérées. — *Occlusion spasmodique des paupières, surtout le matin, le soir (pendant le crépuscule) et la nuit. — Obscurcissement de la vue en se baissant
et en marchant, ainsi qu'en lisant et en ecrivant. — Yue trouble
comme par du duvet ou à travers un voile. — Confusion des
caractères en lisant. — Diplopie. — Hémiopie. — *Presbyopie.
— Vue faible, comme par une amaurose commençante. —
*Points noirs, traces lumineuses et étincelles devant les yeur. —
Myopie.

Oreilles. — *Élancements dans les oreilles. — Pulsations et battements dans les oreilles. —Gonflement et chaleur dans les oreilles. — *Ecoulement (de pus) par les oreilles. — *Dureté de l'ouic. — *Tintement, sonneries, "grondement et bourdonnement dans les oreilles.

Nez. — Engourdissement et insensibilité d'un seul côté du nez. — Inflammation et gonflement du nez, d'un seul côté, avec douleur

492



NATRUM MURIATICUM.

493

au toucher. — Térébration dans les cs du nez. — Excoriation de l'intérieur du nez. — Croûtes sur le nez. — *Perte de l'odorat. — *Éternuments avortés. — *Obturation et sécheresse du nes. — *Corpse sec, quelquefois le matin setfichent? — *Violent coryza, fluent ou sec, avec perte de l'odorat et du goût, et éternument.

Visage. — Face journâtre, terreuse. — Visage luisant comme de la graisse. — Gonfiement de la face. — *Prurit et éruption de boutons à la face et au front. — *Douleur dans les pommettes, pendant la mastication, comme par ulcération. — Lèvres sèches, gercées, crevassées ou excoriées et ulcérées, avec croûtes et éruptions brûlantes et cuisantes. — *Éruption dartreuse autour de la bouche. — *Gonfiement des lèvres. — *Vésicules sanguinolentes à la face interne de la lèvre supérieure, avec douleur brûlante au toucher. — Éruption granulée et ulcères au menton. — Gonfiement fréquent des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Dents très-sensibles à l'air et au contact. — Traction, comme un arrachement dans les dents, s'étendant jusque dans l'oreille et la gorge après le repas et la nuit, avec gonflement de la joue. — Élancements, térébration et pulsation dans les dents cariées. — Vacillement et carie des dents. — *Fistules aux gencives. — Gencives gonflées, saignant facilement et très-sensibles aux choses froides ou chaudes. — Inflammation putride des gen-

cives. - Ulcères aux gencives.

Bouche. — Ulcères et vésicules sur la langue et dans la bouche, avec cuisson brûlante et douleur au contact des aliments et des boissons. — Crachement de sang. Parole embarragué à cause de la pesanteur de la langue. — Torpeur et roideur d'une moitié de la langue. — Sensation prolongée, comme s'il y avait un cheveu sur la langue. — Salivation abondante.

Garge. - *Pendant la déglutition, sensation comme s'il y avait une cheville dans la gorge. — Spasme dans la gorge. - Inflammation de la gorge, avec douleur lancinante et ulcération. —

*Expuition de mucosités en renaclant, surtout le matin.

Appétit. — Perte du goût. — *Amertune dans la bouche. — Goût putride de l'eau. — Arrière-goût des aliments, surtout des acides. — *Soif continuelle, souvent avec nausées, ballonnement du ventre, et autres incommodités après avoir bu. — *Perte de l'appétit, surtout pour le pain, et répugnance pour la fumée du tabac. — *Dégoût pour les aliments, surtout lorsqu'ils sont gras. — Souffrances par les aliments acides et le pain. — *Appétit immodéré, l'aprèsmidi et le soir. — *Boulimie, sans appétit, avec plénitude et estiété pour peu que l'on ait mangé. — *Appétence pour les acides. — *Pendant le repass sueur à la face. — Après le repas, renvois à vide, nausées, plénitude et ballonnement du ventre et de l'estomac, sommeil, tête embarrassée, aigreurs dans



NATRUM MURIATICUM.

la bouche, *pyrosis, battements de eœur et pouls intermittent Apres des aliments gras ou du lastage, renvois on accelere. désagreables.

Estomac. Renvelsavec gout des aliments. Renvers acides et deres, quelqueleis avec gout des aliments. - *Pyrosis qui remonte de l'estomac — Nausces, surtout le matin. — * Ecoulement d'eau comme des pituites, avec tournoiement dans l'estomac, suivi quelquetois de vomosement aigre des alitaents. "Vomissement des aliments et de bile. "Pression à l'estamue,

le matin ou dans la journée, nausces et chute subite des forces. *Pression a l'epigastre, comme s'il y avait un corps dur dans l'estomac. Epigastre goufle et douloureux un toucher et a la pression, comme s'il etait ulcere. - *Crampes d'estomac contractives, quelqueles avec nausces. "S cousses et griffement au creux de l'estomac Taches rouges au creux de l'estamac.

Ventre. *Traction, tension, pression, pinerment *t clancements dans la region hepatique. *Douleur et clane-ments dans la region splenique - "Crampe dans le diaphragine en se baissant.

*Ballonnement du centre - *Gondement du ventre. Malaise tensif, pressif et hypocondriaque dans le bas-ventre. *Douleurs pressives dans le ventre. Douleurs abdominales. tractives et contractives, comme les douleurs d'enfantement. *Tranchees quotidiennes et pincement dans le ventre, quelquefois le matin et la nuit. *Roideur dans le cote gauche du ventre. *Incarcération de flatuosites, quelquefois la nuit. *Gargouillement bruyant et borborggmes dans le rentre.

Sortie des hermes

494


Selles. - *Constipution, quelquefois prolongee, ou tous les deux jours. "Enrie frequente et pressante d'aller a la selle, sans aucun resultut, ou avec evacuation peu abondante "Constrpation par fuiblesse ou paralysie de la moelle épimere. Epaississement du rectum. - Selle dure et interrompue. Eracuation difficile des selles, souvent avec dechirement et élancements dans le rectum et l'anus. *Selles par trop fréquentes. *Relachement prolonge du ventre. · Diarrhee avec colliques et evacuation de matieres muqueuses . Selles incolontaires. Ecoulement de sang pendant les selles. Pen dant et apres les selles, brûlement a l'anue, et au rectum. Elancements, exercition et pulsation au rectum. Constriction erampoide de l'anus, et sensation de retrocussement du rectum-

Chute du rectum et douleur brulante a l'anus, avec ecoulement de matières sanguinolentes et sameuses *Boutons kimorrhoidatus a l'anus, douloureux et lancmants. - Excornation a l'unus et entre les fesses, et surtout en marchant. Dartres #

l'anus Lombries,

Urines. - Envir frequente et pressunte d'armer le jour et le nuit, quelquefois toutes les heures, avec ecoulement abondant.





NATRUM MURIA CUM.

495

 *Émission involontaire des grines, quelquesois en toussant, en marchant ou -en éternpant *Emission d'urine, la nuit. --- Urine claire, avec sédiment rouge, briqueté.-- *A près l'émission des urines, écoulement de mucus par l'urèthre. — Ecoulement de mucosités, quelquefois jaunâtre, par l'urèthre, comme dans la gonorrhée.

Parties viriles. --- Prurit, dartres et excoriation entre le scrotum et les cuisses. — Sécrétion derrière le gland, comme une gonorrhée bâtarde. — *Excitation immodérée des parties génitales et de l'imagination pour le cost, ou engourdissement de l'appétit vénérien. - Manque d'énergie pendant le coît. -- *Impuissance. - Après le coît, pollutions. - Odeur forte et fétide des parties

génitales.

Règles. - Pression et sensation comme si tout affinait vers les parties génitales. -- * Règles trop hâtires et trop abondantes ou tardires et rares. — *Règles de trop longue durée. — *Suppression des règles. — *Maux de tête avant, pendant et après les règles. — *Arant les règles, morosité et irritabilité. — *Au début des règles, tristesse. -- Pendant les règles, crampes abdominales. - *Prurit aux parties génitales. Répugnance pour le coit, chez la femme. — "Flueurs blanches, avec mal à la tête, disposition à la diarrhée, coliques et selles muquenses. — *Leucorrhés acre, envec couleur jaune de la face. — Ecoulement abondant de mucosités transparentes, blanchâtres et épaisses, par le vagin. — Elancements dans les seins.

Laryax. — * Enrouement et sensation de sécheresse dans le laryax. Accumulation de mucosités dans le larynx, le matin. trine embarrassée, avec catarrhe et toux. — *Toux provoquée par un chatouillement dans la gorge ou dans l'épigastre, le jour et la nuit, surtout en marchant ou en respirant profondément -*Toux*Toux suffoquante, spasmodique, le soir, au lit. — *Toux courte, chronique, avec expectoration de mucosités et gonflement dans la poitrine. - Tour arec expectoration sanguinolente, vomitarition et vomissement.—*En toussant, douleurs

dans la têle, comme si le front allait se briser.

Poitrine. - *Haleine courte, surtout en marchant vite. piration génée, surtout pendant un travail manuel, soulagée au grand air. - *Respiration sibilante, le soir, au lit. - Haleine fétide, -*Douleur de poitrine, comme par une tension intérieure. - *Elancements dans la poitrine et dans les côtés de la poitrine, avec gêne de la respiration, quelquefois en respirant profondément et en toussant. - *Buttements de cœur anxieux et violents à chaque mouvement du corps, mais principalement en étant conché sur le côté gauche. - Tressaillement et douleur lancinante dans la région du gamer. — Battement du cour irré-gulier et intermittent. — Moderment tressaillant du cour. Tronc. — *Douleur de brisement et de paralysie aux reins, unt-



496 NATRUM MURIATICUM. - NITROGLYCERINUM.

tout le matin. - Élancements, douleurs incisives et fortes pulsations aux reins. - *Déchîrement à travers les teins et les hanches. - *Douleurs nocturnes dans le dos. - *Lassitude, tension pressive et tiraillement dans le dos. - *Pression, roideur et tension dans la nuque. - Goître volumineur. - Croûtes sous l'aisselle. Engorgement des giandes axillaires.

Bras. — Douleur de luration dans les articulations de l'epaule et des doigts. *Lassitude et pesanteur paralytique des bras.

Douleur de brisement dans les bras et les mailes, mais surtout dans les épaules, qui ne permet ni de lever ni de remuer les bras.

"Fouillement dans les bras — Secousses dans le coude.

"Lancinations dans les muscles et les articulations des mains et des doigts — Taches brunâtres sur le dos de la main. — Verrues dans les paumes des mains. — Peau des mains seche et gercée, surtout autour des ongles. — Mains froides. — Sueur aux mains. — Difficulte a flechir les articulations des doigts. — *Engourdissement et fourmillement dans les doigts. — Enries fréquentes aux ongles — Panaris.


Jambes. - *Douleurs de luxation dans les hanches, avec elancements - * Douleurs tractives dans les cuisses, les genoux et les jambes. Inquiétudes et tressaillement dans les jambes. *Faiblesse paralytique des jambes, et surtout de l'articulation du pied. - Tressaillement des muscles des cuisses. Raccourcissement douloureux des tendons du jurret. Douleur de luxation dans les articulations du genou et du pied. *Lassitude dans les genoux et les mollets. *Dartres dans les jarrets. Tension dans les jambes et les mollets. - *Grande pesanteur des jambes et des pieds. - Brûlement dans les pieds -- Gonflement des pieds. - Froid aux pieds. Douleur d'ulceration aux malleoles, en appuyant le pied et en y touchant. Suppression de la transpiration des pieds. - Rougeur du gros orteil, avec tiraillements aigus et élancements en marchant et en se tenant longtemps debout - Dartres and malleoles. - Cors aux pieds, avec douleurs lancmantes et térébrantes.

NITROGLYCERINUM.

NITGL. — Nitroglycérine, glonoinum, glonoine. — Hering, Études pothogénétiques de l'Amérique du Nord. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac homoop. p. 134.

ANTIOTES: N-rom. acon. Café en boisson, camph. Pourra servir d'anti-

dote contre . dig. plumb



NYTROGLYCERINUM.

497

ee médicament, on verra les cas dans lesquels on pourra l'administrer avec succès contre l'une ou l'autre des affections suivantes: — Empoisonnements par la digitale, le plomb; Suites d'émotions saisissantes, telles que peur, frayeur, colère; Suites de commotions physiques; Suites d'un changement rapide dans les efforts intellectuels; Suites d'exercices inaccoutumés, tels que ceux à cheval, en voiture; Suites d'un refroidissement subit après s'être échauffé; Suite de l'influence d'un froid violent; Convulsions; Épilepsies; Éclampsies; Fièvres congestives, apoplectiques; Fièvres typhoides; Typhus de choléra; Typhus cérébral; Affections mentales; Manies puerpérales; Congestions cérébrales; Apoplexies; Céphalalgies; Suites d'un coup de soleil; Méningites; Hydrocéphale; Ophthalmies; Otite; Mal de mer; Affections vermineuses; Congestions pulmonaires; Cardites et péricardites; Hydropisie du péricarde; Myélite; Congestions à la moelle cérébrale.

dans le cas de pléthore apparente que dans la pléthore réelle, et surtout chez les personnes disposées à des oscillations rapides dans la circulation; paraît surtout indiqué dans les congestions à la tête, ou cœur, à la moelle épinière, principalement à l'époque des règles, pendant la grossesse ou les couches, ainsi que dans l'âge critique, et à la suite d'une hémorrhagie supprimée quelconque; ne pourra remplacer la saignée de l'ancienne école que là où l'application de celle-ci aurait évidemment empiré l'état du malade. — Inquiétude dans les membres, forçant à se lever; lassitude, comme par manque de sommeil; odéfaillance sans perte de connaissance; oaffaissement, défaillance, avec perte de connaissance. — Battement, fourmillement, sensation singulière de chaleur, par tout le corps, de bas en haut. — Convulsions, surtout à gauche, avec doigts écartés.

Demmeil. — Baillement : avec congestion à la tête; avec besoin de respirer profondément : avec rongement dans le creux de l'estomac. — Envie de dormir, le soir de bonne heure; Réveil

difficile.

Fièvre. — Chaleur : surtout à la face; avec bouillonnement, rementant du croux de l'estomac à la tête. — Sueur : surtout à la face : apres avoir dormi. même dans un endroit frais; la sueur fait cesser les nausées. — Pouls : *uccéléré ; *alternatives d'accélération et de lenteur ; pouls irrégulier, intermittent ; *plein ; *trèsdur =ou bien très-souple ; petit et accéléré ; effiliforme.

chemin de retour trop long; le menton paraît trop long, le cougonflé. — Laconisme, ne veut pas repondre. — Perte de connaissance, avec cris et fureur; perte des sens et chute sans con-

naissance, pendant les congestions à la tête,

994.



NITROGLYCERINUM.

498

Tête. — *Vertiges, surtout en se baissant; démarche incertaine. - Pesanteur dans la tête : surtout au front ; au-dessous des yeux; jusqu'aux oreilles, céphalalgie sourde avec sueur chaude au front. - Maux de tête : pression de bas en haut, surtout au vertex; "du dedans au dehars, surtout aux tempes; "comme si le cerreau etait trop rolumineur, sil augmentait de volume, on B'il faisait des ondulations, *Plemiude, principalement au vertex, avec battement ou chaleur. *('ongestion de sang, battement et chaleur dans les tempes, *au sommet; jusqu'a la nuque, a chaque pas; a chaque mouvement de la tête, edouleur brulante au milieu de la tête, depuis une fievre typhoide. -Elancements au coté droit du front, ou aux tempes. - * Douleur de brisure et d'erision au cerveau, augmentée en secouant la tête. - *La douieur, la chaleur et la pleustude de la tete remontent de bas en haut, commençant dans la poitrine, la nuque ou l'occiput. - *Les douleurs augmentent en secouant la tête, en se baissant, pendant les mouvements du corps et surtout en montant les escaliers. Les douleurs reclament la pression extérieure. - Amelioration apres la promenade au grand air. - Pendant les maux de tete : pouls acceleré, face accelerée, front mont. Maux de tête à la suite d'un coup de soleil - Migraine inveterce, avec douleur violente a ganche, vomissement et sensation comme si le point visuel de l'ord gauche etait derange. Cephalalgie insupportable, avec fureur, chaleur de la tete, face rouge, veur proeminents et pouls finforme. Mal a la tête pendant un temps hunnde, apres un refreidissement, et a la suite d'une vie sédentaire et de travaux intellectuels forces. - «Céphalalgie violente a la suite de violents efforts corporels, on d'un échauffement avec transpiration arretée,

Youx. - Regard étrange, youx sans vie, fixes, creux; mouvements incertains. *Rougeur du blanc, avec youx procemments, regard farouche; *douleurs comme si les youx étaient pousses au déhors; chaleur dans le globe des youx, les paupières et autour des youx; dans le globe des youx, douleur, chaleur, chancements, tressaillement. Derant la rue étimolles, cela es, brouillard, taches noires, trouble, les lettres paraissent plus petites, en lisant.

Perte de la vue, pendant la défaillance.

Oreilles. — Plenitude: dans les et illes, autour des oreilles: élancements dans les oreilles. — Obturati n des oreilles, bourdonnement, sen de cloches, chant, crepitation, édurete de l'ouis. Nes. — Douleur dans la racine du nez et la glabelle. — Les dou-

leurs de tête vont jusqu'au nez.

Face. *Paleur me me pendant la chaleur; *pendant les congestions à la tête ou a la portrine — *Chaleur · *pendant les battements de tête, pendant les palpitations. *Rougeur, surtout de la partie superieure, pendant le mai de tête. Sueur froide, pendant les congestions à la tête. Prurit, surtout au milieu de





la face.— Sensation comme ni la lèvre inférieure était gonfiée. — Douleurs et roideur dans l'articulation sous-maxillaire.

Dents. — Maux de dents pulsatifs, pendant les maux de tête.

Bouche et Gorge. — Langue gonfiée; cuisson et élancements à la langue. — Palais sensible, comme gonfié, avec battement; voile du palais sec, contracté. — Dans la gorge : chatouillement,

érosion, chaleur.

Organes de la digestion. — Nausées: jusqu'à ce que la sueur arrive; pendant les maux de tête; avec des douleurs d'estomac; avec congestion à la tête et à la poitrine, et face pâle.—Sensation de vide dans l'estomac; rongement dans le creux; creux de l'estomac sensible, surtout en se baissant. — Maux de ventre, tranchées au-dessus du nombril, réveillant le matin et persistant toute la journée; avant et après les selles liquides; borborygmes dans le bas-ventre, le plus fort, en étant couché sur le côté gauche. — Selles liquides, avec borborygmes émission de vents, toute la journée, dès le matin. — Urines et la plus abondantes.

Système féminin. — Avant et pendant les règles, ou à leur place, ainsi que pendant la grossesse : congestion à la poitries et à la.

tête; maux de tête; défaillance.

Laryux et Pettrine. — Besoin de respirer profundément; gamissements; oppression de la poitrine alternant avec mal à la tête; poitrine comme servée par une constriction; inquiétude, angoisse dans la poitrine. — Elancements: sous le sternum; autour du mamelon; depuis l'épaule jusqu'à l'estomac. — Dans la région du cœur: douleurs violentes jusqu'au dos; plénitude, pesanteur. pression, chaleur, avec pulsation difficile du cœur. — *Palpitations de cœur, avec chaleur de la face, pou ls accéléré: *battement des carotides.


Trenc. — Le long de tout le dos : douleur, chaleur, horripilations; chaleur brûlante entre les épaules. — Dans la nuque : sensation de gonflement ; douleur crampoïde, pulsations ; plenitude. — Au cou, roideur : les vétements gênent, comme serrant trop.

Membres thoraciques. — Dans le bras, pesanteur, cittulation gênée, faiblesse; torpeur et fatigue dans le bras gauché. — Dans le coude, endolorissement du nerf cubital. — Sensation du pouls dans le bout de tous les doigts, produisant un tremblement.

Membres pelviens. - Dans la cuisse gauche, faiblesse et torpeur; manque de force, de solidité, dans les genoux.

TRUM.

NITR. — Kali mitricum, Nitrate de potasse. — HARREMANN. — Hist, nat. et prép. Voy. Pharmac. hommop., p. 412 — Boses unides : 26, 20. — Durce d'action : jusqu'à 7 somnince, dans des affections chroniques.



500 NITRUM.

Antipore : Nite-spie. — Le compère augmente les effets du nitre. Conparen avec : Amm. aen cale. decs. nete-m. nite-se. nite-apir.

CLINIQUE. — Se laisant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : —— Inflammations internes; Gastrite; Gastralgies; Coliques venteuses; Entérite; Diarrhées colliquatives; Phthisic laryngée?; Pueumonie chronique: Souffrances phthisiques, etc., etc.

Voir la note, page 15.

symptomes déchirement dans les membres avec faibleme paralytique.—Déchirement dans les membres; le jour et la nuit, ne s'apaisantéer la friction que pour peu de temps. — La plupart des symptomes se manifestent le soir, après minuit et après midi. — Les symptomes qui se sont manifestés le jour, se dimipent le soir, lorsqu'on est couché. — Gonflement rapide et tout le corps. — Grand accablement, le matin, avec sensation de chaleur à la face et front brûlant.—Lessitude plus grande en étant assis que pendant le mouvement. — *Tremblement involontaire de tout un côté du corps.

Peau. -- Laucinations à la peau, comme par des aiguilles, suivies de brûlement, principalement à la face. -- Nodosités de la gresseur d'un pois, même à la face. -- l'ésicules brûlantes, remplies d'une sérosité jaunâtre, qui crèvent lorsqu'on gratte, et cessent

alors de brûler.

Semmeil. — Envie de dormir, le jour. - Sommeil de nuit agité; on ne fait que sommeiller, avec réveil fréquent. -- Sommeil comateux. - Rêves anxienz, agités, de choses périlleuses. -- Cauchemar.

Pièvre. - Frisson le soir, avec douleurs. -- Froid après midi, avec soif you froid précédé de mal à la tête, avec adipsis et suivi de chaleur nocturne, sans soif ni sueur. - Fièvre quotidienne. avec douleurs tractives dans les jambes. -- Sueurs abondantes et colliquatives. -- Sueur matutinale, surtout à la poitrine.

Moral. -- Anxiété et agitation. - Découragement et peur de la

Tôte. — Maux de tête, après aroir mangé du reau. — Maux de tête. avec contraction des paupières. d'un soir à l'autre, insupportables en baissant la tête. — Maux de tête alternant avec déchirement crampoïde dans les articulations des doigts. — Pesanteur étour-desante de la tête, le matin, comme à la suite d'une ivresse. — Douleurs pressives dans la tête, aggravées par le café et soulagées par le mouvement de la voiture. — Compression à





l'occiput, avec roideur de ces parties. — Contraction dans la tête qui semble aboutir au nez. — Traction crampoide dans l'occiput et la nuque, qui force à renverser la tête. — Maux de tête lancimants. — Les douleurs dans l'occiput sont soulagées en détachant les cheveux. Sensibilité douloureuse du cuir chevelu.

Youx. — Brûlement dans les yeux, avec larmoiement et photophobie, surtout le matin après les lotions d'eau froide. — Cécité passagère. — Obscurcissement de la vue. — Cerclès colorés devant les yeux. — Auréole irisée autour de la lumière, le soir.

Oreilles. — Elancements dans les oreilles, le soir, aggravés en se conchant dessus. — Tension, élancements et déchirement derrière les oreilles. — Inflammation et gonflement du lobe de l'oreille avec douleur brûlante et tressaillante. — Tintement et

l'oreille avec douleur brûlante et tressaillante. — Tintement et sonnerie dans les oreilles. — Surdité permanente, par paralysie du conduit auditif.

Nen. — Brûlement dans le nez, avec fouillement et douleur de griffement, aggravée par le toucher. — Inflammation du bout du nez, avec douleur lancinante. — Gouffement dans l'intérieur du nez. — Ulcère dans la narine. — Épistaxis avec sang âcre. — Coryza violent, avec obturation du nez et perte de l'odorat.

Visage. — Teint pâle et maladif. — Rougeur et tension dans les joues, avec exacerbation des maux de tête. — Déchirement dans les os du visage.

Dents. — Maux de dents, avec traction lancinante ou douleurs déchirantes dans les dents et la tête. — Élancements dans les dents cariées, au toucher. — Maux de dents pulsatifs, la nuit, aggravés par les choses froides. — Gonflement des gencires, inflammatoire ou scorbutique; elles saignent facilement.

Bouche et Gorgo. — Haleine fétide. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Mal de gorge, avec douleur lancinante et inflammation du voile du palais et de la luette. — Douleur nocturne dans la gorge, comme si elle allait se contracter, avec suspension

de la respiration.

Estomac. — *Absence d'appétit, et soif ardente et continuelle. — Appétit, le soir principalement. — Nausées, comme si on allait vomir, surtout la nuit. — Vomiturition et vomissement de mucosités mélées de sang. — Maux d'estomac, avec sensation comme si quelque chose s'y retournait. — Rongement, faiblesse spasmodique et pression à l'épigastre. — *Crampes d'estomac, violentes, arec douleur contractive. —Élancement dans l'estomac et dans l'épigastre. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomac et dans l'épigastre. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomac. — (Inflammation de l'estomac.)

Ventre. — Maux de ventre, après avoir mangé du veau, excessivement violents, surtout dans le côté droit. — Fort ballonnement du ventre. — Tranchées qui se dissipent vers le soir. — Douleurs lancinantes dans le ventre. — *Incarcération de flu-



NITRUM.

303

tuosités, surtout l'après-midi. — "Entérite avec froid glacial des pieds.

Selles. -- Selles durcs, difficiles et lentes, évacuées avec beaucoup d'efforts. Besoin pressant d'aller à la selle, avec tenesme Selles molles, avec tranchées -- *Diarrhees, quelquefois sans douleurs, ou colliquatives. Selles sanguinolentes.

Urines. - Besoin fréquent d'uriner, et emission abandante d'une

urme claire, avec un nuage rougeatre,

Parties génitales. Exaltation de l'appetit venerien. Regles trop hatives et trop ab indantes, arec econlement d'un sang noir.

Avant et pendant les regles, d'uleurs violentes dans le ventre et aux reins. Leucorrhée sereuse, blanche, qui reidit le linge.

et s'échappe pendant les douleurs aux rems

Larynx. Enrouement avec rancite et grattement dans la gorge.

Tension et douleurs meisives dans le larynx, avec deglutition empêchee. Toux qui reveille vers 3 heures du matin, avec maux de tête étourdissants. *Toux au grand air, ou en montant un escalier, comme aussi chaque fois ca'on retient la respiration. Tous seche, surteut le matin. En toussant, douleurs incisives dans la pontrine, jusqu'à ce que les mucosites se soieut détachées. *Toux avec elancements dans la pontrine, et expectoration de sang pur. Toux avec expectoration puruleute et sueurs colliquatives.


Poitrine. — Gene de la respiration, qui ne permet pas d'être conché la tôte basse. — Oppression de poitrine, en montant Douleur de poitrine, avec tension pressive, accompagnée d'une sensation d'aprete seus le sternum, qui oblige a tousser fort. — Douleur contracture dans la poitrine, partant du des, avec sensation de constriction des poumons. — Lancinations dans la poitrine, surtout en respirant protondement, et étant ouché et en toussant, accompagnées d'angoisse et d'oppression excessives.

(Inflammation des poumons) Violents hattements de

cour, surfout la nuit, au lit

Trone. Douleurs lancinantes dans la region des reins Douleurs riolentes aux reins, la muit et le matin, au reveil. Douleurs dans le dos, en se baissant. Pression dans les lembes, pendant le repos, aggraves surtout en toussant. Elancements dans et entre les omoplates, souvent accompagnes de suspension de la respiration, la nuit, en étant enucles sur le dos, sontagés en se couchant du côte droit. Douleur dans la nuque et jusque dans les epaales, comme si on tirait violemment les cheveux.

Bras. Decharement dans les epanles, la nuil. Dechirement et elancements dans les articulations des bras, du cende, des mains et des doigts, principalement la nuit, avec pesanteur et sonsation comme si la main était plus volunineuse, et gonflement des doigts.—Torpeur et l'armillement dans le bras et les mains. —Traction et decharement dans les bras, depuis l'epaule jusque



NITRUM. - NITRI ACIDUM.

50**\$**

dans les doigts. — Douleur de luxation dans les articulations des doigts. — Faiblesse dans les bras, les mains et les doigts, qui ne permet de rien tenir solidement. — Déchirement crampoide dans les articulations des doigts, alternant aves maux de tête. — Crampes et roideur dans les articulations des doigts.

Jambes. — Déchirement dans les jambes. — Grande lassitude et faiblesse paralytique dans les jambes, après une marche modérée. — Déchirement tressaillant dans la plante des pieds. — Torpeur et fourmillement dans les pieds. — Contraction des orteils.

NITE ACIDUM.

NITR-AC. -- Acide nitrique. -- HARREMANS. -- Hist, nat et prép. Voy. Pharmac. homopp., p. 133. -- Duses usiteen: 8,30. -- Duree d'action : jusqu'à 8 semines dans les affections chroniques.

ANTIBOTES: Cale. camph con. hep. mez. petr. sulf. — On l'emploie comme

autidote de : Calad.? Cale. merc.

Comparen avec : Acon. sur bell. calad. calc chel. con. graph hep. kal. lyc magn. merc. mrz. mur-ac, nitr op. petr phos-ac. plat. puls. rhus. selen. sep. sil. sulf-ac, thui. C'est suriout après : Bell. calc. hep kal. natr. puls. sulf. et thui., que l'acide nitrique fera du him, lorsqu'il se trouvera indiqué; sprès l'acide nitrique, on emploiera seuvent avec succès : calc. petr. puls. sulf.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce medicament contre :--Affections des personnes a teint brun, cheveux et yeux noirs ou bruns et d'une constitution maigre, sèche et bilieuse, caractère vif et irritable; ou bien des personnes d'une constitution faible, lymphatique ou leucoflegmatique, avec disposition à des diarrhées, des rhumes de cerveau, des flueurs blanches ou autres écoulements mu-Affections rhumatismales: Douleurs osteocopes, inflammation, carie et autres affections des os, surtout par l'abue du mercure; Affections syphilitiques et sycosiques; Dartres, rhagades, taches et autres suites fücheuses de l'abus du mercure; Inflammation. engorgement et ulcération des glandes; Affections scrofuleuses et rachitiques; Affections hystériques; abcès; souffrances chlorotiques (?) et icteriques; inflammations locales internes; Épilepsie?; Engelures; Ulcères mercuriels; Verrues; Loupes?, Mélancolie; Surexcitation nerceuse, surtout par l'abus du mercure; Migraine; Céphalalgies rhumatismales, congestives, hystériques et nervenses; Chute des cheveux par suite de céphalalgies fréquentes; Corona Veneris; Ophthalmies aigues et chroniques, surtout celles qui proviennent de l'abus du mercure ou d'ulcères syphilitiques réperentés; Obscurcis-



sement de la cornée ; Amblyopie amaurotique ; Myopie ?; Otite, et otorrhée purulente; Dureté de l'oule; Coryza chronique; Ozène; Dartres faciales; Affections scorbutiques des gencives et stomacace, surtout par l'abus du mercure; Amygdalite et autres angines flegmoncuses; Angines syphilitiques et mercurielles, même avec ulcération. Odontalgies, surtout celles provenant de l'abus du mercure ; Affections gastriques et hépatiques; Ictère; Coliques flatulentes (et inflammatoires)?; Ulcération des intestins dans le typhus : Bubons suphilitiques, mercuriels et scrofuleux; Hernies inguinales; Constipation, ou relachement chronique du ventre; Diarrhées et dyssenteries; Hémorrhoïdes; Incontinence d'urine; Gravelle; Gonorrhees chroniques; Condylomes; Orchite; Cancer (?), squirre(?) de l'uterus: Aménorthée, Chlorose?; Flueurs blanches; Induration des glandes mammaires?, Laryngite chronique (phthisie laryngée); Toux convulsive; Coqueluche?; Hemoptysie; Souffrances phthisiques (surtout apres l'usage de kalt carb) ; Pneumonics des personnes agées, maigres, colériques et très-débiles; Spasmes pulmonaires; Rhagades et taches mercurielles aux mains; Engelures aux mains et aux pieds, etc., etc.

Voir la note, page 15.


504

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs lancinantes, comme par des échardes, surtout au toucher. - *Décharement dans les membres, ou tiraillement, surtout après un refroidissement. --•Inflammation et sensibilité douloureuse des os. — •Ulcération des os. - Rachitisme. - Inflammation, gonflement et suppr-Craquement dans les articulations. ration des glandes. Attaques d'épilepsie, précédées de tiraillement dans les membres. et suivies de roideur du corps et de ronflement. -- *Douleurs aux *Douleurs sensibles pendant le somchangements de temps. Exacerbation des symptômes, le soir et la nuit. — La promenade en voiture soulage la plupart des symptômes. -*Grande faildesse et lassitude générale, avec tremblement, pesanteur des jambes et besoin de rester couché, surtout le soir, ou le matin. - · *. Amaigrissement excessif. - · *Facilité à se refroidir.

Peau. *Sécheresse de la peau. — *Eruptions articaires, pruriantes, même à la face et surtont au grand air. — *Pores noirs.

*Taches brun rongeatre *et éphélides foncées sur la peau. —

*Taches curvrées ou violettes. — *Dartres pruriantes. — *Douleurs dans les engelares et les cors aux pieds. — *Par un froid
modere, membres comme gelés, enflammés et pruriants, avec
peau gercée. — Gros furoncles. — Plaies et alcères avec élancements comme par des échardes, ou avec douleurs brûlantes, et
saignant facilement. — Ulcères, avec suppuration aniesse,
sanguinolente et corrosive. *Doulours dans les ancies



رة ارة

39

nes cicatrices, par le changement de temps, - *Verrues. -

Sommeil. Envie de dormir le jour par faiblesse, avec vertige.

Sommeil tardif le soir, *et réveil de bonne heure ou difficile. le matin. Insomnie, comme par surexcitation Sommeil inco. plet et agité, avec reveil fréquent en sursaut. Sommeil neu reparateur. La nuit, saignement de nez, mal à la tête, mal aux dents, soif, gastralgie, coliques, douleurs dans les membres, cauchemar, angoisse, battements de cœur, nausces, vomissement et beaucoup d'autres souffrances. Affluence de reves fantastiques, voluptueux, anxieux, effrayants, et souvent avec cris, gemissements plaintifs, paroles et sursauts avec effroi. Révisi de morts. de spectres, des occupations de la journee, de crimes, de festius, etc. — Secousses du corps et tressaillement dans les membres.

Fièvre. Froideur generale de la peau. *Froid continuel.
*Fièvre après midi, frisson et chaleur. - Chaleur intérieure,
sans soif, continue ou par acces Chaleur seche la nuit, avec
forte soif. - *Sueur nocturne fétide. acide. - *Sueur acide.
comme de l'urine de cheval, le jour.

pendant le sommeil.


Moral. — *Tristesse. — Melancolie excessive et acces d'angoisse, surtout le soir eu la nuit. *Inquiernde sur l'état de sa sante, avec peur de la cart — *Inaptitule au trivial. — Surce de la trête. — Concentration en soi-même. *Irraione. — to trête. — En portement — Rangure prolongée. — Accès de fureur de desexpeir, avec — in mile en la selfage. — Nestalgie. — tre desexpeir, avec — in mile en la competitude aux travaux d'esprit. — Faiblesse excessive de la mémoire.

Tête. - *Vertiges en marchant et en étant assis - *Vertiges qui forcent a se coucher, surtout le matin ou le sour. - Vertiges avec faiblesse, nausées ou mal a la tête. - Mal de tête, le matin, au réveil. - Grande sensibilité de la tête au bruit d's voitures ou d'une marche pesante - Acces de manc de tête, ovec nausées et vomissements. - Sensation de plénitude et de peranteur dans la tête, avec tension et pression jusque dans les veux. *Dechirement dans le frent, le vertex et locciput. L'anconations dans presque toutes les parties de la tête qui obligent quebquefois a se concher et troublent le semment de la nuit *Maux de tête pulsatifs. - *Congestion a la tête, avec chaleur intérieure.

Douleurs ostéocopes dans la tête, tractives et pressives. *Sencibilité douloureuse du cuir chevelu, la conflue gene. - Tension du cuir chevelu. - *Prurit au cuir chevelu, - Leuption humide

Youx Youx to me et creux Pression et elancements dans les yeax. — *Inflammation des geux. — *Ulceration de yeax.

h in tete *Chute des cheveux. Plaques ulceress, suintantes



506

- *Taches et ulcères de la cornée. — tiondement des paupieres.

— Larmonement fréquent, surtout en lisant, avec sensibilité douloureuse des yeux. — Difficulté d'ouvrir les yeux (ils sont entourés
d'un cercle jaune). — «l'aralysie de la paupière supérieure. —
*Pupilles difficiles à contracter. — Myopie. — Diplopie. —
*Brouillard, taches, filets, étincelles et points noirs, roltigeunt
devant la vue. — Vue trouble et obscurcissement des yeux. —
Éblouissement à la lumière du jour.

Oreilles. —*Elancements dans les oreilles. — Sécheresse de l'interieur de l'oreille. — "Ulcération de l'apophyse mastoide. — *Écoulement par les orcilles. — Excoriation derrière les oreilles avec prurit et suppuration. — *Obturation des oreilles. — Dureté de l'onie, principalement par allongement des amygdales. *Éclatement, battement et grondement dans les oreilles. — Craquement dans les oreilles, pendant la mastication. — Gonfiement

des parotides. - Loupe sur le lobe de l'oreille.

Dartres pruriantes aux ailes du nez. — Picotements laucinante dans le nez, au toucher. — *Douleur d'excoriation, brûlement et croûtes dans le nez. — *Saignement de nez, "provoque par des pleurs, ou le matin, d'un sang noir. — *Sensation d'une odeur fétide en respirant par le nez. — *Éxeroissance, comme un fie, dans le nez. — *Éternuments avortés.—*Sécheresse et obturation du nez. — Violent coryza finent avec mans de tête, toux, goulement et ulcération du nez. — Écoulement de mucosites épaisses et corrosives, par le nez. — Mucosités fétides et jaunûtres dans le nez.

Visage. — Páleur du cisage, avec yeux enfonces. — Couleur jaune de la face, surtout autour des yeux, avec rougeur des joues. — Douleur crampoide et déchirement dans les joues et les pommettes. — Gonflement des joues. — *Eruption boutonneuse à la face, au front et aux tempes. — *Pustules au visage, à bords rouges et larges, se recouvrant de croates. — Gonflement érysipélateux de la joue; avec douleur lancmante, nausées et fièrre. — Peau furfuracée sur toute la face. — Éruptions pruriantes et dartres dans les favoris. — Pores noirs au visage. — Gonflement des lèvres. — «Lèvres gereces. — Ulcération des lèvres et des commissures des lèvres. — «Ulceres à la partie rouge des lèvres.

- Furoncles an inenton. - - Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires.

sous-maxillaires.

ents. -- Odontalgie, avec douleur tressaillante, laneinants, tractive ou *pulsative, principalement la nuit, ou le soir, au lit.

des dents. — *Gencives saignantes, blanches et gonfiées.

Bouche. — Odeur fétude et putride de la bouche. — Exemption de la langue, du palais et de la face interne des gencives, avec douleur lancinante, aigus. — *Salication, equelquefais

Douleurs dans les dents cariées. - - Jaunissement et *racillem





par acces febriles. - Grande secheresse de la bouche, avec soif ardente.

Gorge. - Ulcere, avec douleur lancinante dans la bonche et la gorge. *Inflammation de la gorge, aver douleurs lancinantes. surtout en avalant les liquides. " l'onsilles rouges et gouflées - *Sonsation brulante et douleur d'excorration dans la gorge.

Appétit. - * Amertume de la bouche, surtout après avoir mange. *Goût aigre avec bralement dans la gorge. *Goût douceâtre dans la bouche - Forte soif, meme le matin en se levant. - *Degout pour la viance et les cheses sucrées. - Répugnance pour le pare, qui laisse un gout aigre et fait votnir. Appetence pour la torre, la craie, la chaux, ou pour les aliments gras et le haveng - Fann vive avec legent de la vie. Difficulte de digerer le luitage ... Nausces par des almaents gras. *Sucur pendant et apres le repris. Après avoir bu pendant le repas, douleur d'experiation lans la gonge, resophage et l'estomac, ou coliques. - * Aures le repus, plendude, dans l'estomac, lassatude avec chal ur, seeur et battement de cœur par le moindre mour ment, ou nause's, renews, laturates, mai de tele avec romissement, sommed, angot se, etc.

Estomac. *Renvois aigres . Envie de vouir. l'yrosis. Econlyment dean par la bouche, comme les pituites, apres avoir bu vite. Hoquet. *Nausees for prentes et encue de comer, souvent avec angons, tremblement et trosonnement. Tomassements amera et aigres, avec renvois trequents (apres le repas). Press, a l'est una Brancingat ou sensation de froid a l'estource le il ur au carma en mogerant les aliments. -Crampo d'est mac contractive. Luncinations dans l'épigastre.

Vontre. Presson tensave et eluncements dans l'hypocondre gauche. - Douleurs abdonordes comme a la suite a un refrondissement *Fort ball mement to venter, in me le matin. -*Frequention of parements et douieurs maisires dans le centre "Deuleur Luby,", on tans I bas-ventre. "Elunctments dans le centre sertout en y tou hant s'Herric inquinale,

*Longlement et suppuention des meher les cutants au . glandes de l'a ne "facilité ese refreidir le ventre . "Aceumulation de flataosites d'ens le rener. - Crondement et borborggmes dans le verte . Incurerration de flatuosites, sur-

teut le matin et le soit.

Selles *Expenations alvines, hillades, pregulates *Selles dures well. Siller trop to puentes, "Envir present d'aller à la selle . Sedes dourcheques, queiquel es muqueuses on d'odeur putride. Es suits à le id et non aigure. Selles sunquinolentes his inter mes, are tenesia. Ol. do savant les selles. Après les selles, surracitabilité et accablement. Douleur brulante et *prurst à l'anus et au roctain. - Exconstion



suintante à l'anus. - *Gonflement des boutons hemorrhoïdaux de l'anus, qui saignent a chaque selle.

Urines. — Besoin fréquent d'uriner, avec emission peu aboudante d'une urine fétide, de couleur foncée ou brunatre. — *Incontinence d'urine *Emission d'urine douloureuse. Urine froide. — *Urine fétide. Sediment roug; et sable dans les urines. — Cuisson et brûlement en urinant. -- Ecoulement de mucosites quelquefois sanguinolentes, ou de pus, par l'urethre.

- Gonflement de l'orifice de l'urethre.

300

Parties viriles. - Fort prunt aux parties genitales. Chute des poils aux parties. — Excoriation entre le scrotum et les cuisses. — Taches rouges se recouvrant de croûtes, au prépuce. Sécretion derrière le gland, comme une gonorrhée batarde. — Gonflement, inflammation et phimosis du prépuce. *Ulceres comme des chancres, au prépuce et au gland. *Ecorossance comme des fies, au prépuce et au gland. avec douleur cuisante et saignement au toucher, et sumtement d'un pus d'odeur fetide et doucettes. — Testicules relaches. Gonflement inflammatoire des testicules, avec traction douloureuse dans le cordon spermatique, jusque dans le côte du ventre — *Absence d'appetit venérien et d'érections. — Grande lascivite avec écoulement labondant de liqueur prostatique. — Erections nocturnes, deuloureuses et presque spasmodaques — *Pellutions par trop fréquentes.

Règles. - Prurit, douleur brulante et sensation de sécheresse à la vulve. - Lancinations dans le vagin. - Excoriation a la vulve, entre les emisses. - Ulceres avec prurit brûlant dans le vagin. - Regles trop hâtives. *Suppression des regles. - Pendant les regles, crampes dans le bas-ventre, et pression vers les parties genitules. - Le acorrhec fetide, lauqueuse, rongeante. - Écoulement fetide, brun rougeatre, par le vagin. - Nodosités dures

au sein. - Atrophie des mamelles.

Laryux. — *Enronement avec cory za, toux et douleurs lancinantes dans la gorge. — *Aprete dans les bronches. — Grattement et élancements dans la trachée-artere, surtout après une lecture eu une conversation sontenne. — Toux avec elancements et douleur d'excoriation dans la gorge et la poitrine. — *Toux, seulement le jour. — *Toux seche, surtout le soir, en se conchant. — *Toux aboyante. — Toux avec vomissement. — Toux ébranlante, la nuit, avec suspension de la respiration, presque comme dans la coqueluche — En toussant, lancinations dans les reins, ou mal a la tete, a l'estomae, aux hypocondres, ou douleur d'excoriation et élancements dans la poitrine. — *Expectoration purulente, jounaitre, par la toux. — Toux courte, avec expectoration d'un sang noir, coagulé.

Poitrine. - *Respiration sibilante, surtout pendant un travail manuel. - *Gêne de la respiration. - *Haleine courte. Perte d'haleine et battement de cœur en marchant et en montant un



510 NUPHAR LUTEUM. -- NUX JUGLANS.

encore peu connu, contre : Diarrhées chroniques matutinales, presque sans douleurs, avec faiblesse des parties génitales. — Dépression des facultés sexuelles, et pollutions sans érection, avec faiblesse des parties génitales.

NUX JUGLANS.

N-JUGL — Noix du noyer, Jugians regia. — Gazette antrichienne. — Hist. nat et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 248.
Antidotes? — Durée d'action? — Doses usitées?

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament, n'ayant été malheureusement étudié, jusqu'ici, que par l'école autrichienne ou spécifiste, c'est-à-dire à de très-fortes doses seulement, n'a encore fourni aucun de ces symptômes qui indiquent les médicaments d'une manière speciale et précise dans les cas particuliers d'une maladie, et qui ne s'obtiennent ordinairement que lorsque les substances sont étudiées aussi au moyen des dernières atténuations. Toutefois l'on verrazi les symptômes suivants pourront indiquer quelquefois les cas précis dans lesquels on emploierait avec succès la noix contre certaines maladies, telles que : — Fièvres intermittentes; Affections serofuleuses de toute sorte; Souffrances rachitiques; Glandes engorgées; Ulcères, durtres, ophthalmies, diarrhées syphilitiques, scrofuleuses et mercurielles; Flucurs blanches; Colère, etc., etc.


Voir la note, page 15.

GÉNÉRALITÉS. — Lassitude, abattement et sensation de relachement des muscles. — Aggravation de quelques souffrances, le soir et la nuit, ainsi qu'après le diner; soulagement après les selles.

Peau. — Prurit à divers endroits, sans éruption visible. — Petites pustules à la face, surtout à la bouche, comme dans la couperose.

Petits boutons rouges, se remplissant d'une humeur épaisse, au cou, à la face, aux épaules et au dos. — Petites vésicules, comme de l'eczéma rubrum, avec prurit brûlant, rougeur et gerqure à la peau, suintant un liquide qui roidit le linge et le teint en jaune verdâtre, et s'aggravant par la transpiration. Petites papules comme celles du lichen, sur le cou-de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et croûtes dures. — Taches rouges, avec des papules, ou bien avec un point purulent au milieu. — Petite tumeur dure, rouge et ronde, au bras, comme une petite glande endurcle, ou une tumeur enkystée. — Ulcère au pé-





nis, a bords épais et durs, à fond lardace et saignant facilement.

Tumeur dure, rougeâtre et tres-douloureuse sur la joue, partant de la gencive et ayant au milieu une tache ronde, rouge foncé, molle et affaissee, firmant un abcès qui se vide à l'intérieur.

Sommeil. Pandiculations et baillements fréquents Grande agutation et jactation, le soir au lut, parfois avec sensation comme si l'un velait lans l'air, avec vertige tournoyant. — Sommeil nocturne, aquié avec beaucoup de rèces effenyants. — Réveil en sursaut, pendant la sieste, comme par des seconses électriques auxavant-bras et aux mains, à chaque effort de s'endormir.

Pièvre I e soir, face brûlante avec extremités froides. -- Accès frequents de chaleur fugace Pouls plus fréquent, le soir, parfois avec chaleur brulante des mains.

Moral. Humeur chagrance et mecontente, le soir. Grande répugnance pour la conversat, n'et les discussions - Paresse d'esprit, inattention en lesant, et répugnance pour le travail.

Tôte. Vertige. Agitation et excitation comme par ivreese, avec sensation comme si l'on volait dans l'air — Pesanteur dans la tête. In atin, avec tête entreprise — Douleur au front, parfois surtout en secouant la tête et en remunit les yeux. — Mal de tête au-dessous des yeux, surtout du côté gauche, parfois pressif et augmenté par le mouvement. Céphalalgie avec embarras de la tête et brulement dans les yeux. — Mal de tête, comme une migraine, sur une petite place circonscrite de l'os parietal gauch , s'exacerbant fortement par la conversation. — Chabeur brûlante à la tête, avec froid glacial aux extrémités, le soir, un lit

Yeux. Douleur aux 'yeux, comme si un coryza allait se déclarer Brilement dans les yeux

Pares. I inharras au nez e nome le commencement d'un coryza.

Pares. l'étites pustules à la face surtout autour de la bouche,
comme lans la couperos. Tumeur dure, rougeatre et douloureuse, à la jeue et à la bert, famount abces suppurant.

Donts Od intulgie sourde, tractive dans les deuts carides, le soir et augmente : par la chaleur du lit - Abees très-douloureux aux cencis

Bouche Afflux de salive à la bouche. Langue converte de mucosites blanches, le mutin en se reveillant

Gorge A cumulation de mucosités forçant à rendeler souvent.

Appetit et Goût. Goût amer de la banche, particulièrement le matin au reveil à la banche est aussi pâteuse. — Appétit augmente. Soif vive, ou tien adipsie complete au diner et au souper avec une sorte de deplateir au vin, et plaisir à garder la beuche sèche. Repugnance pour la pipe, le soir. — Après le repas, aggravation de la plupart des symptemes.

Estomac. Renrois molents et bruyants, et grande disposition à



MAN JUGLANS.

rondre le rapports. Hoques, surrout apres avoir mange des aliments loards Mal an en ir et nausres, avec accamulation d'eau dan la bouche et curre de vomir, ou bien avec brûlement dans l'estomac. Vomissement des aliments, le seir au lit. -Grande plemitude, sensation et ballons ement de l'estomac, ne

permettant de rien manger malgré le meilleur appétit, et soulagés

par des rapports. — Pression dans l'estomac

Ventre. — Elancements dans le côté gauche, tant du ventre que de la région hypocondriaque, surfout en se baissant, en riant et en marchant vite. - Pression douloureuse dans le bas-centre, surtout du côté gauche, soulagee par des rapports ou par l'emission de vents. Douleur violente dans la partie inferieure du basventre, passive et tractive, avec regles trop hâtives. - Grande plénitude, ballonnement, tension, pesanteur du ventre, parfois avec besom frequent d'aller à la selle, ou apres la selle name, ou nvec améliaration par des rapports et l'émission de rents. Flatuosites continuelles et émission fréquente de rents, surtont dans la positiou couchee. Gargouillement dans le ventre et borborygmes - Les vents emis n'ont presque pas d'odeur. -

Durete tympanitique du ventre. Selles. Parfois selles dures et constipation, on bien besoin fréquent d'aller à la selle. - Selles liquides, precédees de pincements dans le ventre — Après la selle, amelioration du ballonnement et de la pesanteur du ventre, ou bien brûlement et pression à l'anus. Prurit à l'anus, le soir, au lit, avec élancements qui forcent

à se lever.

112

Urines. Besoin presque continuel d'uriner, émission très-fréquente, jour et muit, et sécrétion des urmes fortement augmentée. - Emission d'urme involontaire, goutte a geutte, si le besoin pressant n'est pas satisfait sur-le-champ - Urines claires, conleur de vin blanc, et sans dépôt.

Parties viriles. - Erections fréquentes, jour et mait. - Ulcère, près du frein du prépuee, à bords épais et durs, à fond lardsee et

saignant facilement.

Règles trop hatives de quinze jours, précedées de fortes douleurs dans les aines, et durant huit jours, avec sang abondant en caillots noiratres.

Poitrine. - Elancements fugaces, comme dans les deux poumons, Oppression de la poitrine pendant et avant la marche. -

Prurit au sernum, forçant à se gratter.

Trone. Elancements au sacrum, tellement violents qu'els font tressaillir - Boutons rouges, comme ceux de l'acné, se remplissant d'un pus épais, au dos, a la nuque et aux épaules. - Sous les aisselles, petites vésicules, comme d'un eczema rouge, avec prurit brûlant, suintement leger et rougeur, excoriation et gercure à la peau. - Furoncles très-douloureux, gros et purulents, à l'epaule et a la région du foie.



NUX JUGLANS. - NUX MOSCHATA.

513

Extrémités supérieures. Taches larges, pruriteuses, avec une bosse purulente au milieu, au pli du coude. Petite tumeur indolore, dure, rouge et ronde, au bras, contine une petite glande endurcie, ou une tumeur enkystée. Papule doubureuse et purulente, se formant à l'avant-bras sur une petite place rouge, brûlante, et pruriteuse. Furoncle très-douloureux, gros et dur, au biceps du bras droit. Ancienne dartre à la main, redevient pruriteuse et rouge. Tiraillement et sensation de faiblesse paralytique à la main droite. Prurit aux doigts, ou bien au bras, le soir au lit. Tiraillement au pouce et à l'index de la main droite, comme par foulure.

Extrémités inférieures. Douleurs dans l'articulation coro-fémorale, en marchant. Douleur génant le marche, a l'articulation du genou, tantôt lancinante, ou rhumatismale, ou comme faiblesse paralytique. Tiraillement comme par foulure, au gros orteil droit. — Brûlement et prurit aux jambes, le soir au lit. Petites papules, comme celles du lichen, au cou-de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et croutes dures


NUX MOSCHATA.

N MOS — Nots muscade. — Het Big. — Hist. nat. et prép. Voy Pharmac. homosop., p. 250. — Rose usitée : 30. — Durée d'action :

ANTIDOTE Semina cari carvi cumin

Comparer avec : Con ign magn. mosch. n vom. « p. sep puls saif.

CLINIQUE - Se laissant guider par l'ensemble des symptomes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections principalement des femmes et des enfants; Affections occasionnées par l'influence d'un froid (humide). Affections thumatismales. Névralgies . Affections scorbutiques?; Eclampsie des enfants?; Accès de defaillance et autres paroxysmes hysteriques; Convulsions; Affections scrofuleuses et rachitiques?; Tabes dorsalis?, Atrophie des enfants? Frevres intermittentes; Fievres ty-phoides; Coma?; Imbecilite?; Apoplexie?, Cephalalgie par indigestion, Ambly mic amaurotiquet, Ephelides?, Odontalgie des femmes encemtes; Odontalgie par l'air froid et humide du voir: Paralysie de la langue et des organes de la déglutition?, Angines?; Aphthes dans la bouche ?, Nousees et comissement des femmes encemter; Dyspepsie, surtout thez les vieillards?, Gastralgie?, Engordement du foie cet de la rate); Coliques flatalentes, nephretiques et vernuneuses f; Coliques des enfants f. Diarrhées, surtout par suite de faiblesse ou par refroidissement : Diarrhees putrides et sanguinolentes; Diarrhees chez len enfants; Dyssenterie; Calculs 90.



NUX MOSCHATA.

Gorge. Grande sécheresse et sensation de sécheresse dans la

gorge, avec grattement

516

Appétit. Gout dar s la bouche, comme apres avoir mangé beaucoup de sel. - trout piteux ou quit de crare dans la bouche. -Facm et appetet immoderes, surtout vers midi. - Diminution de l'appétit et prompte satiete. - Absence de soif. - Aceablement et malaise après le repas. - *Faiblesse de la digestion et de l'estomac.

Estomac. Renvois acres, peu apres le repas, Nausées par le mouvement de la voiture - Apres le repas, et surtout après le déjeuner, aggravation des souffrances, et principalement des manr de tête. Plenitude de l'est mae, avec gene de la respiration -Sensation de chalcur et douleur brulante à l'estomac. Ballonnement d. l'estomac. Crampes d'estomac, avec grunde fuiblesse de la digestion. - Pression de l'estomae, comme par incarceration de flatuosites.

Ventre. - Pression dans le foie, comme par des corps durs et pointus - et attement du fino. Sensation de pesantene dans les hypocondres et la partie supérieure du rentre. Colique avec douleur dechirante. *Bullonnement du ventre, avec nausees et fouillement de la region ombilicale. par des vers, avec encre de dormir, *Souffrarees par des

flatuorités, la muit, troublant le sommeil.


Selles. Selles molles, lentes, difficules à évacuer. Duarrhées par furblesse, on a la suite d'un refro dissement. *Diarrhées sanguinoleutes, opairi les. Diarrhees comme des œufs biouitles, avec absonce complete d'appetit (chez les enfants) - Diarrhee de matures non digerees. - Diarrhees avec absence d'appétit et enva de dormir chez les enfants. Diarrhée coliques et somnolence

Urines et Parties viriles. En urinant, douleurs brolantes et meisives Strangurie douloureuse Utine d'od ar de violette Absence d'appetit venerien Faiblesse des fonctions genitales. Defaut d'erections, même pendant des ideas volup-

tueuses. Feordera at a liqueur prostatique.

Règles Menstrues rerégulières. Avant les règles, maux de reins et lassitude, avec pression à l'estomac, ecoulement d'enu par la bouche, comme des piturtes, et douleurs hepatiques. -- Pendant les regles, sensation comme si test affluait vers le baseventre, et tractions dans les membres. - Plux menstruel epais et de couleur foncée Suppression des regles. Métrorchagic éparage, fource, aree pression qui pousse vers en has. Mamelles trep petites et vides de lait,

Larynx. Your chevrotante. Taronement et charle. - Enrodem ent subit en marchant e le vent - Toux avec douleur date la portrine, comme si ell it a vif. - loux sèche, avec



NUX MOSCHATA. - NUX VOMICA.

517

suspension de la respiration, après un refroidissement dans l'eau.— Toux sèche, qui s'établit pendant un travail échauffant, ou à la chaleur du lit. — Toux avec expectoration de sang.

Poitrine. — Dyspnée. — *Haleine courte, surtout après le repas. — Gêne de la respiration. — Rétrécissement de la gorge, comme un étranglement. — *Oppression de postrine, venant ordinairement de l'épigastre. — Plénitude et sensation pénible d'un fardeau sur la poitrine. — *Battement de cœur, quelquefois avéc accès d'évanouissement. — Tremblement du cœur.

Tronc. — Tractions dans les muscles de la nuque, à l'impression d'un air humide. — Douleurs de brisement aux reins et dans le dos. Douleurs dans le dos, en étant en voiture. — Lassitude

nux reins et dans les genoux.

NUX VOMICA.

N-VOM. — Noix vomique. — HAMMEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosp., p. 251. — Dores usitées : 15, 24, 30. — Eurée d'action : 15 à 20 jours, et même plus longtemps.

ANTIDOTES: Acon. alcohol. camph. cham. coff. cocc. puls. vinum. — On l'emplore comme antidote de : Ambr. urs. calc. cham. chin. cocc. coff.

colch. cupr. dig. graph. lach petr. phos puls. stram. sulf. labac.

COMPARER AVEC: Acon. alam. ambr. amm. arn. arn. bis. bry calc. cann
caps. carb-veg. caus. cham. chm. cocc. coff. colch. con. cupr. dig. dros.
dulc. fer. graph. hyos. ign. ipec. lach. laur. lyc magn. magn-m. merç.
mur-ac. nutr. nair-m. n mos. op. petr. phos. sep. stram sul, tabac.
tart. mgs. — C'est suriout après : Ara, ipec. lach. petr. phos. et sulf.,
que la noix vomique fera du bien, lorsqu'elle se trouvera indiquée. —
Après la noix vomique, on trouvera souvent convenables liryou. puls.
sulf.

CLINIQUE. — Se laisant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par l'abus du café, du vin, ou d'autres boissons spiritueuses ou drogues narcotiques; Suites facheuses d'un refroidissement, d'une colère, ou d'un excès d'étude, ou de veilles prolongées, ou d'une rie sédentaire; Affections principalement des personnes d'un tempérament ver colérique on sanguin, aux yeux et aux cheveux noirs, teint pâle ou jaunâtre ou virement coloré; Constitution bilieuse, sèche et maigre, on pléthorique et forte, ou lymphatique, faible et épuisée, ou constitution veineuse, avec disposition aux hémorrhoides, à l'hypocondrie, à l'hystérie et à la mélancolie; Affections périodiques et intermittentes; Souffrances et douleurs dans les membres par un temps rude et tempêtueux; Affections rhumatismales; Prodromes et métastases arthritiques; Congestions sanguines à la tête, à la poitrine, ou au ventre; Eaiblesse physique



et nerveuse par suite d'onanisme, de pollutions ou autres pertes débilitantes: Acces d'évanouissement et de faiblesse hystérique ou hypocondriaque; Atrophie des enfants scrofuleux; Faiblesse musculaire et difficulte d'apprendre a marcher, chez les enfants?; Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques : Accès de convulsions, d'epitepsie, do tétanos et de danse de Saint-Guy; Paralysies, principalement des extrémités inférieures: Souffrances chlorotiques, ou icteriques; Furoncles; Engelures; Ecchymoses; Eruptions miliaires; Affections à la suite des morbilles, telles que miliaire blanche, toux catarrhale, etc., etc.; Fiòvres inflammatoires avec affections gastriques, muqueuses on bilieuses; Fièvres quotidiennes tierces et quartes; Fièvres typhoïdes; Fièvres lentes; Aliénation mentale des irrognes; Affections morales par exeès d'étude, on par suite d'une humiliation ou d'une colère; Manie: Melancolies hypocondriaques et hysteriques. Congestion cérébrale avec vertiges; Apoplexic sanguine; Cephalalgie catarrhale, congestive, nerveuse, ou hysterique; Migraines; Maux de tête par l'abus du cafe, ou de boissons spiritueuses, par des études forcées, ou par un temps àpre et venteux; Ophthalmies catarchales, ou serofuleuses (ou arthritiques?); Photophobie serofuleuse: Hémorrhagie des yeux; Coryza dans la période inflammatoire; Otalgie inflammatoire : Prosopalgie et odontalgie rhumatismales avec fluxion ; Odontalgie par l'abus du café ; Dentition difficile des enfants, avec flèvre ; Stomacace; Augine scarlatine; Augine catarrhale; Augines pharyngée, uvulaire et tonsillaire: Gastralgie: Gastrite: Affections gastrico-muqueuses on bilicuses; Dyspepsie même avec comissement des aliments: Vomissement des ivrognes, des femmes enceintes, etc., etc.; Rétrécissement et squirre du cardia?; Choléra?; Douleurs hépatiques?; Hépatite: Engorgement et dureté du foie et de la rate, même par l'abus du quinquina : Carreau : Congestions abdominales et stagnation dans le système de la veineporte; Coliques spasmodiques, flatulentes et hemorrhoidales; Coliques par la gravelle : Hernies ombilicales et crurales? ; Hernies incarciries: Hernies inguinales: Peritonite; Constipation opin'iltre, principalement par suite d'une vie sédentaire ou par l'abus du cufe: Darrhees rinqueuses et sanguiablentes; Dyssenterie; Rétrécissements spasmodiques de l'anus et de l'urêthre: *Hémor*rhoules arengles et saignantes; Ischurie et strangurie spasmodiques, ou par suite de la gravelle; Catarrhe de la vessie; Gonorrhée bâtarde: Orchite; Inflammation du cordon spermatique; Satyriasis?; Coliques menstruelles avec règles trop hâtives; Suppression des lochies: Aménorrhée?: Flueurs blanches; Chute de la matrice et du vagin; Céphalalgie; Odontalgie, nausées, vomissement, coliques, constipation et autres souffrances des femmes enceintes: Métrite? : Douleurs d'enfantement ou tranchées trop violentes: Abortus; Péritonite puerpérale; Excoriation des mamelles: Ophthalmic, catarrhe nasal, hernies, constipation, convulsions et

518



- *Le cafe, le vin, la fanore du tabac, la méditation et les veilles, ainsi qu'un temps venteux, provequent ou aggravent aussi beaucoup de souffrances. *Le matin, au lever, ou le soir, vers les × ou ? heures, ainsi qu'après le diner, on se trouve ordinairement le plus mal, et bien des souffrances apparaissent périodiquement à l'une ou à l'autre de ces époques. — *Amai-

grissement du carps.

520

Peau. — Conleur pule *ou juunâtre de la peau. - *Journese, avec dégoût des aliments et accès d'evanouissement. *Peau fronie et bleuâtre pendant les frissons. Prurit p'eotant et brulant, le matin ou le soir, en se déshabillant, et meme la nuit Sensibilité et douleur d'excornation sur toute la peau, avec sensation de torpeur a l'endroit que l'on touche. Eruptions d'un prurit brulant. *Engelures avec prurit brulant, *gerçures saignantes et gouflement d'un rouge pâle - *Furoncles. *Taches bleuâtres, comme par des sugillations après une contusion. - offleères à bords élevés de couleur rouge pâle. Eruptions mi-

liaires et bontonneuses, avec prurit brûlant.

Sommeil. *Grande envie de dormer, principalement le matin, en se levant, on après le diner, ou le soir de bonne heure, et souvent avec insomme la nuit - Sommeil du matin excessivement doux et prolongé, avec reveil difficile. - *Sommed trop court avec difficulté de s'endormir avant minuit, et impossibilité de rester au lit. après trois heures du matin. - *Le soir, au lit, grande affluence d'ideex, empéchant souvent, de dormir jusqu'au matin. - *Etat comuteux avec sommer! lourd et profond pendant le jour, *Sommeil nocturne, léger, avec reveil frequent, ou comme une espèce de coma vigil, avec récasseries plemes de trouble et d'agitation, et sorte d'ennui, comme si la nuit était trop longue *Pendant le sommeil, sursauts fréquents avec effroi, génussements, lumentations, beaucoup de paroles, pleues, delires, avec envie de s'enfuir de son lit, respiration ronflante ou sibilante, et coacher sur le dos, les bras lerés sur la tête. *Rèces continuels, fantastiques, terribles et anxieux, ou roluptueux, pleins de cruautes et d'horreurs, ou de méditations et de soncis; rêves de vermine, de corps mutiles, de la chute des dents, des occupations de la journée et d'affaires urgentes. La nuit, agitation dans les cuisses, anxiete et inquietude, chaleur et bouillonnement de sang. - Au réveil, le matin, douleur de meurtrissure dans les membres, grande lassitude avec besoin de rester couché, et accès de pandiculations et de baillements conrulufs. Cauchemar

Pièvre. *Frissonnement, horripilation et froid, principalement la nuit, ou le soir après s'être couche, ou le matin, ou au grand air, ou au moindre mourement, même pendant la chaleur, ainsi qu'après avoir lui, après s'être faché, et en se decouvrant. *Froid, frissons et horripilations particles, principalement au






dos et aux extremités. - *Pendant les prosons, pena, mains et meds, risage ou ongles froids et blenatres - on douleur, congestion de sang, et chaleur a la tête, avec rougeer et chaleur du risage on (de l'une) des jones; soif de biere, contraction crampoide des pieds et des orteils, ou elancement dans le côté et dans le ventre, douleurs au dos et aux rems, tiraillement dans les membres, pandiculations, baillements -pasmodiques et besoin de se coucher. *Chaleur prine palement la nuit, ou vers le matin ou en se promenant au grand air, et quelquefois seulement à la tête, ou au risage, avec rougeur des joues, ou aux pieds et Bux mains, avec froid partiel on horripilations et frissons au reste du corps. - *Pendant la chaleur, vertige, mal a la tête, frissono pour peu qu'on se remne ou qu'on se decouvre, soif, ou répugnance pour les bousons, avec secheresse de la bouche, nausees, vomissements, bourdonnements des oreilles, urines rouges, douleurs a la portrine. *Acces febriles, surtout le matin ou le soir, ou la nuit, et composes pour la plupart de frissons arecchaleur partielle (suivie de sueur), ou de chaleur precédée, suivie ou mêlee de frissons, on de chaleur alternant avec des frissons avec sinf continuelle de lière, quelquefois même avant les frissons et après la chalcur; type quetidien ou fierce. Accès fébriles avec conquision et douleurs à la tête et souffrances yastrico-muqueuses ou bilienses, on avec perte de connaissance, grande faiblesse et prostration, meme deja au debut de l'acces. - *Pouls plein et frequent, ou petit, acceleré ou faible, ou intermittent. — Sueurs abondantes, quelquefois fétides, ou acides, ou d'une odeur de misi; suours froides et visqueuses, sueurs partielles ou semi-laterales, principalement a la tête et aux parties supérieures du corps, sueurs nocturnes principalement apres minut on vers le maten; sueurs pendant le mouvem nt au grand air; sueurs alternant avec des frissons, ou survies de chaleurs et de soif de biere Pendant les sueurs, qu'iquefois remission des d'ulcurs, ou endolorissement des parties sur lesquelles on est coucles, horripilation on colliques pour peu qu'on se decouvre, envie de vemir chaleur au visage et aux mains, secheresse des levres et de la partie antérieure de la bouche.

Moral. *Humeur hypocondraque et chagrine, morose, soucieuse et triste, quelquefois avec envie de pleurer, sans le pouvoir.

*Mélancolie, avec grande inquietude sur son état, besoin de parler de sa maladie, desespoir de la guerison, et crainte d'une mort prochaine. Desir de la solitude, du repos et de la tranquillité, avec répugnance pour la conversation. — *Angoisse, auxiete et inquietude excessices, souvent avec agitation qui ne permet de rester nulle part, comme si on avait commis un crime, et qui pousse jusqu'au suicide. — *Les acces d'angoisse ont lieu le pius souvent le soir en se couchant, ou après minuit, vers le matin, et sont quelquesois accompagnes de battements de cœux,



chaleur et sucur, nausées et vomiss monts, pupilles dilatées et serrement de cœur - *Exaltation et sure redation morale avec empressionnabilité extreme de tous les organes, sensibilité excossive a la moindre douleur, au moindre brint ou meavement. facilité extraordinaire a s'effrager, et grande sentimentalité qui tait que memi par la musi jue on est tou he jusqu'aux larmes. - * Exasperation inconsolable et lamentations, plaintes et eris (pendant les souffrances), quelquef us avec hal un et rougeur des joues. Caractere craint, i, mehant et soupconneux, avec meertitude et indecision . Humeur pleureuse avec grande su ceptibilite et irritabilite, disposition a se facher et a s'emporter · facilement, eur e de critiquer et de faire des reproches . *Humeur acariatre, mechanecte, querelles, injures et invecti es avec pareles impudaques plemes de jalousie, melées de plemis et de cris. Mancaise humine, dep t et colere, jusqu'à se porter a des violences Haladresse et gauch rie *Ennui, avec déplaner et maptitude a tout tracail, de corps et d'esprit, --*Incapacité de méditer, disposition a se tremper en parlant, difficulté de trouver des expressions convenal les, erreur sur les poids et les mesures; confusions frequentes en écrivant avec omission desyllabes et de mots entrers, - «Thyagations et actions

maniaque, visions effrayantes, pert de connaissance et delires

quelqu or avec minmures.

392

Tête. * Tet entreprise et embarrassée av c obnubilition, comme apres and debauche, principalement an grand air et an soleil Irresse stupeur et etourdissements. * Vertiges avec sensation de tournoiement et de vacillement du cerrenu, principalement pendant ou après le répas, ainsi qu'en marchant et en se promenant au grand air, en eternuant, en toussant, en se baissant, ou en se redressant, le maten ou le soir au lit, en étant cenché sur le dos, et souvent aver obscurcessement des yeur, péril de tomber, chancellement, acor d'evanouissement, chourdonnement des oredles et perte de connaissance. *Congestion de sang a la têle, avec l'airdonnement des orailles Perte de connaissance avec etat de coma somnolent, et paralysie de la machoire infér, ure, des organes de la deglutition et des extremités. *Pesanteur, pression et sensation d'expansion dans la tête. comme si le front allait écluter, principalement au-dessus des yeux *Douleur de meurtressure asis l'ecryeau - *Douteurs decharantes et tractives ou tressa llantes dans la tete, ou clane ments, ou coups et douleurs pulsatives, ou fouillemente et sensation comme si un clou etait enfonce dans le cerreau, ou tension et serrement, ou deuleur d'ulceration. - Secousses et résonnement dans le cerv au à chaque pas *Les mus de tête sont souvent profond ment dans le cerceun, ou a l'occiput, au d'un seul côte, on dans le front jusqu'aux yeur et à la racine du nez; ils apparaissent principalement le matin apres le réveil ou



121

Nez. Prurit insupportable au nez Douleur d'excoriation on d'alcération dans les narines. *Obtaration du nez quel pief is d'un seul côte, et souvent arec peurit dans les narines et écoulement de mucosités - *Enclafrènement, principalement le matin ou la nuit, et coryza sec, arec chaleur et pesanteur au front et obturation des narines. *Coryza fluent le jour ou le matin, avec sécheresse et obturation necturne du nez. Grattement dans le nez et la gorge, chaleur dans les narines et éternument fréquent pendant le coryza. - Mucosités sanguinolentes dans le nez. Saignement de nez, et sortie de caillots de sang par les narines. Exhalaison fétide dans le nez. - *Grande sensibilite de l'odorat. Odeur devant le nez, comme du soufre brûlé, du fromage pourri, en de la mouchure de chandelle.

Visage. Aspect maladif, avec yeux cernés et nez pointu. *Vouge pâle, jannâtre (surtout autour du nez et de la bouche) et terreux. - *('haleur et rougeur du visage ou (de l'une) des jones, alternant quelquefois avec paleur — Sueur froide au visage. Palpitations musculaires, le soir au lit, ou fourmillement pruriant au visage. - *Douleurs décharantes et tractives dans le visage, equelquefois seulement d'un côté jusque dans l'orcille, avec gonflement de la joue. Tension autour de la bouche, du nez et des yeux, avec enflure de ces parties, -- *Gonflement du risage, quelquefois sculement d'un côté, et avec couleur pule de la tumeur. · · l'étits boutons purulents aux joues et à la tête. — *Sécheresse, gerçure et exfoliation douloureuse des levres. Crostes et alcérations à la partie rouge des lècres et aux coins de la bouche. Petits boutons purulents autour des lèvres et au menton. Sensation d'excoriation et petits niceres a la surface intérieure des levres. — Eruption dartreuse au menton. — Distorsion de la bouche. - Serrement spasmodique des máchoires.

- Liancement dans les glandes sous-maxillaires en avalant Dents. - *Douleurs d'excoriation on d'ulcération, ou douleurs tractives tressullantes, avec élancements, ou fauillement et térebration dans les dents et dans les machoires, ou seulement dans les dents cariées; principalement la nuit, ou le matra au reveil. ou après le diner, ou en se promenant au grand air, ou en inspirant l'air frais, ou le soir, ou en meditant et par un travail intellectuel; souvent jusque dans lu tête, les oreilles et les pammettes, ou avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires. gonflement et endolorissement des geneires, taches rouges et chaudes aux jones et au cou, humeur plaintive et de couragement. - Les maux de dents n'occupent souvent qu'un seul côté. ils s'aggravent quelquefois a la chaleur de la chambre et s'ameliorent au grand air - *Les boissons et les soupes chaudes, ainsi que l'eau froide, ele vin et le café, renouvellent ou aggravent egalement les maux de dents. Vacillement et chute des dents. *Gonflement putride et douloureux des geneires, quelquefois



525

avec pulsation comme dans un abcès, brûlement, tiraillements et

saignement facile. - *Ulcere aux gencives.

Bouche. *Odeur fétide, oputride et cadavereuse de la bouche, principalement apres le repus et le matin a jeun. -- Grande secheresse, principalement de la partie anterieure de la bouche et de la langue, surtout apres minuit. -- Douleur dans la bouche, à la langue et au palais, comme si tout était à vif et excerie.

*Accumulation de mucosites d'un blanc jaunatre, dans la bouche. -- ollheres d'une odeur fetide, *boutons et vesicules douloureuses dans la bouche, a la langue et au palais. -- *Gonflement inflammatoire du palais. -- *Accumulation d'eau dans la bouche; salivation nocturne; salive sanguinolente; crachement de sang. -- *Langue chargee d'un enduit blanc, oépais, ou jaunâtre, ou langue sèche, gercee, brunatre ou noiratre, avec rougeur vive

des bords. — *Grande pesanteur de la langue avec difficulté de parler, et sensation. en parlant, comme si la langue s'epais-

sissait. — Parole balbutiante.

Gorge. — *Grattement et douleur d'excoriation dans la gorge, principalement en avalant et en inspirant l'air frais. — Sensation de gonfiement un palais, et *douleur en avalant à cide, comme s'il y avait une tumeur ou un tampon dans la gorge, ou comme si le pharyux était retreci. — Elancements dans la gorge, principalement en avalant, et quelquefois jusqu'aux oreilles. — *Gonfiement de la luette ret des tonsilles, *avec douleurs pressives et lancinantes. — "Étranglement et contraction spasmodique dans la gorge, — Brûlement dans la gorge, principalement la nuit, et

quelquefors jusque dans la bouche et l'œsophage

Appétit. - Gout de bouche sale, sonfré, donceâtre, metallique, herbace, ou muqueux. - *Gout acide de la bouche, principalement le matin, ou après avoir ingeré des aliments - *Goût acide des aliments, et principalement du pain ide seigle et de froment) et du lait. - "front putride, principalement le matin. - Goût amer de la houche, des crachats, des aliments et principalement du pain. - Insepudite des aliments, principalement du lait, de la vi inde, du cafe et du tabae ... Manque d'appetit et dégoût des aliments, et principalement du pain de seigle, du tabac et du rafe, et quelquefois avec soif continuelle *Soif, quelquefois avec dégoût de toutes les boissons, principalement du lait et de la biere, on avec deser de la hiere ou du lait ... *Desir d'eau-de-vie on de crate. Faim, quelquefois avec degont des aliments, ou prompte satiete. - Boulimie périodique apres midi. - *Pendant le repas, chaleur a la tete, sueur au front, nausée et acces de *Après le repas, rapports et regurgitations. defaillance. wausees, curic de romir et comissements des aliments, pressions et douleurs crampoides dans l'estomac, ballonnement pressif à l'épigastre, coliques pyrosis, the entreprise et douloureuse, malane et huneur hypocondiet jue, auxiete, rertiges, e. acces



de défaillance, froid et frissons, avec chaleur à la tête et au cosage et rongeur des joucs, fatigue et cause de dormir. — Les boissons génent l'estomac et causent souvent des nausées, avec envie de vomir. — The pain de seigle et les acides causent également des souffrances; mais les aliments les plus gras sont quel-

quefois bien supportés.

526

Estomac. - Envie inutile d'expulser des renvois, avec sensation douloureme de contraction spannodique de l'esophage. — *Rapports et régargitations fréquentes et souvent amères et acides. *Hoquet fréquent et molent. - *Pyrosis, principalement apres avoir pris des acides ou des aliments gras. - "Nausées et encie de romir continuelles, principalement le matin, ou pendant le repas, ou après aroir bu ou mangé. -- Recylement d'eau de l'estomac. - *Vomiturition et romissements riolents de mutières muqueuses ou aigres sou des aliments, ou de matières insipides, ou de bile, *principalement après avoir bu ou mangé, con le matin, ou même la nuit, et souvent avec mal à la tête, crampes aux jambes et aux pieds, anxieté et tremblement des *Régargitation et romissement de sang, vinélé de caillots et de matieres noires, avec tranchées, bouillonnement dans la poitrine, et ecoulement d'un sang noir avec les selles *Pression à l'estomue et à l'épigastre, comme par une pierre, on douleurs crampoides, contractives, et rongeantes; principalement après acour bu ou mangé, ou le matin, ou en se promenant au grand air, ou apres avoir pris du caté, ou la nuit, et souvent avec tension et ballonnement à l'épigastre, oppression et constriction de la poitrine, rapports, vomiturition et vomissements. — *Douleurs de meurtrissure, pulsation, douleur brúlante, sensation d'excoriation et douleurs pénibles à l'estomac. - * Sensibilité douloureune du creux de l'estomac au toucher et à toute pression; les vétements serrés sont insupportables. - *Grande anxiété dans la région précordiale, comme si le cour allait celater. - . "Sensation an cardia, comme ai les aliments s'y arrêta**ient** et remontaient dan**s l'æsophage.**

Jontre. Douleur contractive aux hypocondres. -- Sensibilité douloureuse de la région hépatique a tout contact et à tout mouvement, avec douleurs pulsatives, lancinantes, pressives et tensives. — Gonflement et dureté de la région hépatique. — *Pression, tension, et plénitude et ballonnement du ventre, et surtout de l'epigastre, principalement après le repas. — *Coliques, avec douleurs crampoïdes, contractives et compressives, os tranchées et elancements, ou douleurs vives et tractives, dans la region ombilicale, dans les côtés et dans le bas-ventre, principalement après le repas, ou après avoir pris du café, ou le matin, et souvent arec envie de romir, rapports, chaleur du visage, lassitude et envie de dormir. — Mol de ventre au grand air, comme par un refroidissement, avec sensation, comme si une diarrhée




327

affait se déclarer. *Sensation de pesanteur et de gouffement dans le ventre *Chaleur et brulement, ou sensation d'execriation comme si tout était à rif su douleur de meuririssure dans le rentre, - *t ongestion de sang et bouilleauement dans le ventre *Mouvement dans le ventre, comme par quelque chose de vivant, et commotion des intestins en la archant . *Coliques flatulentes quelquefois le matin, mais prin ipalement apres arour bu ou mange et souvent avec douleurs pressives, comme par des pierres, affluence de flatausites qui s'incarcerent dans les hypocondres ou remortent vers la portrine, borborygmes frequents et grondement dans le rentre, pressi a sur l'apas, le permee et les vies urmaires mant de teins, ballemement du ventre, anxiete fatigue et beson de se coucher *Douleur de meuriressure dans les tequiments du ventre principalement en toussant, en mant, etc., etc., avec sem bilite douloureuse au toucher. - l'alp tation des mascles ao commaux, avec sensation comme si quelque chose y courait - Sensation de faiolesse dans lannesu inguinal, comme a dallast sorter une hirnie :--Gonflement des glandes inguinal s Excoriation dans le pli

Sollos. *Envie fréquente, mais mutile et ancieuse, d'uller à la selle avec sensation comme si canus clait retrect ou ferme *Constipation opiniatre so sout comme per intereste ou par etranglement des intestins, avec seles dures, d'fie des et trop volumineuses. * Eracuations incompletes, avec col. ju s et sen-tion et de selles diarrheignes. - Selles moitie molles ou liquides. mortie dures avec beaucoup de vents Petites selles digrtheigues aqueuses on maqueuses et sangumoleutes avec coliques et tranchees, mans de rous et tenesme, decles a excoristion dans le rectum et donieur bridante à l'anus, ... 'Selles muqueuses blanchatres, ou verdatres, culour top ee - "Nort e de glaires et de mucouter sang unolentes on de sang pur, meme avec les velles nen diarrheiques - Houleur contractive dans le rectum pendant et nors le temps des selles (construction et retrécisaement spoomodique du rectum tent ment et seclusion de *Hemorrhoides avec douleur d'execution, elancement, douleur brulante et presson o l'anns el dans le rectum, principalement en mentet unt et pendent un tenent de tetr : lecoule ment desang para anus - Frant, chat sails ment et fearmallement dans l'anus et le peture, comme par des ascarides Sortid'ascari les. Prosqui et print au perince

Urinos. - *Enrice inutile d'uriner, avec pression sur les roles urinaires douleur pendles au cot de la couse, et semission douloureuse des urines quatte a goutte. Retrecissement spacemolique de l'arcture. *Evacuation douloureuse d'urines opaisses. - *Evacuations fréquentes d'urines aqueuses et phles,



quelquefois avec sortie de mucosités epaisses ou de matieres purulentes, par l'urethre. «Urines rougeatres avec dépot couleur de brique. «Douleurs dans la région renale, comme s'il y avant un corps etranger, avec impossibilité d'être couche sur le cote malade, *emission rare de quelques gouttes d'une urine saturee, et sortie de sang par l'urethre «En urinant, douleur brâlante au vol de la vessie et à la partie anterieure de l'urethre. Prurit et douleur d'excoriation dans l'urethre, avant, pendant et après l'emission des urines. «Colique néphretique avec comissement violent.

Parties viriles. - *Démangeaison et prurit au gland et a la surface intérieure du prepuce. *Excorration et retraction du prepuce. *Secretion abondante du sucegma, derrière le gland. Prurit, clancements et douleurs constrictives dans les testicules. - *Appétit vénérien exalté, avec érections et pollutions frequentes, principalement le matin. Pollutions avec flaccidite de la verge, et quelquefois suivies de froid et de faiblesse dans les extremités inférieures *Impuissance par suite de débauches nocturnes. - Après le cost, chalcur siche du corps et secheresse de la bonche. - *Gonflement inflammatoire des testicules, avec sensibilite douloureuse au toucher, durête et retraction des testicules. **Hermies serotales volumineuses. - *Theoleur compa de la contre

d'étrangle. . . ' En le cord in spermatique. Flaccidite de la verge, pendant le cort.

328

Règles. Gonfiement de la matrice avec grande sensibilité au toucher. *Chute du vagin ou de la matrice. Douleurs crampoides et contractives dans la matrice et le bas-ventre, jusqu'aux cuisses, avec pression douloureuse vers les parties (et écoulement de mucosités) *Chaleur br. lante dans les parties, avec desus veneriens *Extase érotique facile a la moindre excitation, principalement le matin au lit. *Regles trop hâtices et trap peu abondantes. Retour des regles à l'époque de la pleine lane. *Pendant les règles, coliques spasmodiques, nausces et acces d'éranomissement le matin, grande fatigue, céphalalgie avet trissons et d'uleurs rhumatismales dans les membres. *Ecoulement de mucosités jaunâtres et fétides, par le vagin. - *Douleurs d'exconation aux manistres et fétides, par le vagin. - *Douleurs d'exconation aux manistres et fétides, par

Larynx. *Enrouement catarrhal et apreté douloureuse du larynx et de la poitrine, principalement le matin, ou le soir au lit, avec grattement dans la gorge, accumulation de macomtés tenaces qu'il est impossible de détacher, nul a la tête, chaleur et reugeur du visage, frissonnements et constipation. — *Sensation d'etranglement dans le gosier, avec peril de suffocation. — Impossibilité de parler a haute voix. — *Tour serhe, quelquefois continuelle, fat.gante, et même spesmodique, *excitée le plus souvent par une sensation de titillation et de prurit, ou d'aprete et de grattement dans la gorge, apparaissant principa-



NUA VOMICA.

200

lement le maten ou le soir an lit, en la mait, suitout après minuit, ou après le deuer, ou périodiquement tous les deux jours. —
*Renouvellement ou provocation de la toux par le mouvement, la meditation ou la lecture, et étant couche sur le dos. *En toussant, elancements et douleurs d'excornation au laryne, mal à la tête comme si le crâne allait éclater, aculeur de meurtrissure à l'epigastre, est quelquefois même avec vomissement, peril de suffocation et saignement par le nez et par la bouche. En se promenant au grand air, la toux sèche devient humide, et l'expectoration s'établit. Crachats d'un sang coagule par la toux.

*Gene de la respiration, haleine e urte, construction Poitrine. asthmatique et oppression de la poitrine, principalement la mut, ou le matin, ou le soir au let, en étant couché ainsi qu'on montant, ou en marchant, ou après le diner, et souvent avec étouffement, anxiete, pression dans l'epigastre, bourdonnement - des oreilles, pouls accelere et sueur. - "l'endant les acces asthmatiques, tout vetement serre autour des hypocondres est insupportable. - *Respiration lente et sibilante, alternant quelquefois avec respiration accelérée. Haleine fetide et d'une odeur acide. - Besoin de respirer pr. fon lement *Deuleur de constriction et de contraction erampoide à la portrine. *Pression tensive dans la pottene, comme par un poids, principalement la nuit et au grund uar, et souvent avec gene de la respiration. *Elancements dans la portrare et dans les cotes, augmentés en respirant et par le mouvement du thorax. Chaleur et brulement dans la poitrine, quelquefois la nuit, avec agitation, anxiéte et inscinnie. — Douleur de meurtrissure à la portrine. souvent avec haleme courte, et principalement au sternum et dans les cotes. — Pulsation dans la portrine et dans les côtés. Elancements et coups dans la region du cour - *Battements de cœur, principalement apres le diner, étant couché, ou le matin, et quel ju fois cavec nausces et envie de vomir, et sensation de pesanteur à la pritrage.

Tranc. *Douleurs de meartrissure dans le dos et aux reins, avec sonsation de faiblesse dans ces parties, comane apres l'enfantement. *Maux de reins nocturnes qui ne permettent pus de se retourner dans le lit. L'ouleur de luiation, ou comme apres un tour de reins, dans le dos et dans le omoplates. *Douleurs rhumatismales tractices, et brulantes, au dos, quelqueiots le soir. *Convulsions dans le dos, avec renversement de la tete. Elancements et deuleur de constriction entre les omoplates. Tiraillement, douleur de meurtrissure, roideur, et sensation de pesanteur dans la nuque. Gonflement des muscles

du cou, avec douleur, comme s'ils etaient trop courts

Bras. Douleurs rhumatismales, avec sensation de faiblesse dans les épaules et les bras. Pare a lourdeur, fatigue et manque




NUX YOMICY

530

de force dans les bras - Paralysie du bras, avec insensibilité sensation comme si le sang y bouillonnait. - *Tiraillement des les bras, avec sensation de torpeur et immobilité, principalemen la nuit Miliaire pruriante aux bras. Gonflement des nui cles de l'avant-bras, avec douleur, comme s'ils étaient brules. -Engourdimement et torpeur des avant-bras, le matin Doc leur de luxation dans les poignets. - Faiblesse paralytique de l main. Engourdissement facile des mains et des doigts. -Mains froides et frileuses Sueur forte et quelquefois fraich à la paume des mains (haleur à la paume des mains flure des veines aux mains et aux bras Gonflement pale de mains et des doigts. Contraction crampoide des mains et de dougts, avec douleur comme si les tendons etaient trop courts principalement pendant les frissons, ou apres minuit. - Gonfiement chan l'et douloure ux du pouce, et qui passe en abcès à l'articulation. - *Rougeur et prurit brûlant aux doigts, comme des engelures.

Jambos. Boutons avec prurit rongeant is la fesse. - *Elancements, douleur de luxation et tressaillements dans l'articulation coxo-femorale *Douleurs rives et lancinantes dans les cuisses, uvec torpeur et faiblesse paralytique, aggravées par le mouvement et le contact. Douleur de brisure aux emisses. - Miliaire, avec prunt brûlant et furoncles aux cuisses et aux genoux. Froid, on sucur, aux cuisses, la nuit. Grande pesanteur, chancellement, fuiblesse et tremblement des jambes avec flechesement des genoux, et impossibilité de marcher ou de rester debout L'enfant tombe facilement en marchant. -*Roideur et tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts, principalement en se levant de sen siège Sensttion de secheresse dans l'articulati in du genou, avec craquement en le remunit . Conflement douloureur du genon, avec nodosités goutteuses. Disposition des jambes à s'engourdir facilement. Paralysi froid et insensibilité des jambes. Douleur tensive et crampes dans les mollets principalement la nucl: on le soir, on apres minuit, on le matin, au lit - Crampes dans les pieds et les orteils. "Gonflement rouge de la jambe, avec taches noires, douloureuses. I uxation facile du cou-depied. Gonfiement lu dos des pieds. - Engourdissement facile des pieds (pieds morts). Contraction des ortells. *Prurit brulant aux orteils comme par des engelures.





OLEANDER.

OLBANDER.

OLEAND. — Laurier-rose. — HARREMARK. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 263. — Doses nuitées : 6, 30. — Durre d'action : 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

ANTEROTES : Camph. escc. n-vom.

COMPARER AVEC : Anne. chin. cocr. n-tom, puls, sahad,

CLIMIQUE. — Jusqu'ici, on n'a encore employé ce médicament que contre : - Paralysies ; Dartres aux oreilles ; Eruptions à la tété et sorte de faiblesse intellectuelle se manifestant par la distraction.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMINE GAMERAUX. — Tension crampolde, comme si les os étaient brisés, dans les membres et autres parties du corps. Grande faiblesse, qui permet à peine de marcher.
 Sensation de vibration et de résonnement dans tout le corps. -- Tension dans tout le corps. — Roideur paralytique des membres, et paralysies sans douleurs. — Accès d'évanouissement, comme par faiblesse, quelquefois avec perte de connaissance, se diasipant après avoir transpiré. - Faiblesse et lassitude générale, avec tremblement des genour, en étant couché, et des mains, en écrivant. — Accahlement, comme si la vie allait s'éteindre. – Besoin d'étendre les mains. — Torpeur et insensibilité de tout le

Pean. - Prurit rongeant qui force à gratter, quelquefois en se déshabillant. - Peau très-sensible, avec rougeur et excoriation

pour peu que l'on gratte.

Sommeil. — Baillement fréquent avec horripilation et tressaillement des muscles. — Besoin de se coucher, avec une sorte de somnolence. — Insomnie et agitation la nuit. — Réves agités et *lascifs*, et réveil fréquent.

Fievre. — Accès frequents d'horripilation subite. — Sensation de chaleur avec frisson général. Chaleur fugace, surtout pendant un travail intellectuel. - Poule fréquent et plein, on irrégulier

et variable. --- Manque de chaleur vitale.

Moral. — Tristesse et manque de confiance en soi-même. — Répugnance pour le travail, et grande pareme. — Irascibilité, morosité, et mauraise humeur. — Humeur qui ne supporte aucune contradiction. - Emportement colerique, suisi d'un prompt repentir. - Paiblesse de la mémoire. - Grande distraction et





OLEANDER.

3 12

inadvertance. - Étourdissement. - Esprit obtus, avec conception difficile. - Rêveries poétiques sur l'avenir.

Tête. — Vertige tournoyant, avec chancellement des jambes. — Vertige, en se levant, après avoir été couché, ou en regardant et bas lorsqu'on est debout. — Vertige, avec tournoiement, obscurcissement et scintillement devant les yeux. — Maux de téte avec étourdissement, comme si le cerveau était tendu. — Pesanteur douloureuse de la tête, soulagée en se couchant. — Pression sourde dans la tête comme si le front allait éclater. — Battement douloureux et pulsatif dans la tête. — Térébration dans le cerveau. — Pression à l'extérieur de la tête. — Prurit rongeant au cuir chevelu, avec cuisson après s'être gratté. — Croûtes furfuracées ou humides, à la tête, avec prurit, surtout la nuit, et brûlement après s'être gratté. — Desquamation du cuir chevelu.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme après les avoir trop fatigués par la lecture. — Pression dans les yeux. — Douleur brûlante et tension dans les paupières, surtout en lisant. — Obscurcissement des yeux, en regardant de côté.

Oreilles. — Pression aiguë dans les oreilles. — Traction crampoïde à l'oreille. — Chant, tintement et roulement dans les oreilles. — Taches dartreuses, rouges et râpeuses devant l'oreille, avec suintement fétide derrière l'oreille.

Wes. — Pression étourdissante et sourde, au nez. — Prurit autour du nez.

Visage. — Face pâle, hâve, avec cercles bleus autour des yeux. —
Pression sourde et engourdissante dans les os de la face, et
surtout dans les pommettes, jusque profondément dans la tête.
— Chaleur des joues sans rougeur et vice versa. — Paleur du
visage, alternant avec rougeur foncée. — Gonflement rouge du
visage autour des yeux. — Éruption tuberculeuse à la face et au
front. - Lèvres brûnâtres et sèches. — Sensation de torpeur et
de gonflement dans la lèvre supérieure. — Gonflement autour
des commissures des lèvres.

Dents. — Maux de dents pendant la mastication, avec pression incisive. — Déchirement et traction dans les dents, parfois la nuit, mais seulement au lit, se dissipant dès qu'on se lève. — Sensation de vacillement des dents, avec gencives d'un blanc bleuâtre.

Bouche. — Sécheresse de la bouche, avec langue chargée d'un enduit blanc. — Langue rude, sale, blanche, avec érection des papilles. — Perte de la parole. — Douleur brûlante dans la gorge.

Appétit. — Tous les aliments ont un goût trop fade ou insipide. — Goût pâteux dans la bouche. — Boulimie, avec tremblement des mains, tant on désire des aliments, souvent avec absence d'appétit. — Soif, surtout d'eau froide. — En mangeant avidement, à midi, étourdissement.



OLEANDER.

533

Estomac. Renvois d'odeur putride. Renvois à vide, riolents, quelquefois après le repas. Nausées avec envie de vomir, accumulation de salive dans la bouche, suivie de faim violente.

— Vomissement des aliments ou de sérosités amères d'un vert jaunaire. Sensation de vacuité à l'estomac, avec plénitude du ventre Battements et pulsations dans l'épignstre, comme après un fort échauffement.

Ventre. Pincements dans le ventre, comme par une diarrhée. Élancements et rongement dans le ventre. — Sensation de vide et de faiblesse dans les intestins. — Gargouillement et borboryques dans le rentre, avec émission abondante de rents d'une odeur putride.

Selles. Envie d'ailer à la selle, sans resultat. — Selles liquides, molles, jaunes — Eracuation, presque involontaire, d'une selle non digeree. Douleur brûlante à l'anus, avant, après et hors le temps des selles.

Urines. - Augmentation de la sécrétion des urines. Urines brunatres, bruiantes, avec sediment blanchâtre. Émission d'urine frequente, surtout apres avoir pris lu cafe.

Larynx. Toux c'urte, chranlante, provoquee par un chatouillement dans le pharynx — Accumulation de mucosités visqueuses dans la trachée-artere

Poitrine. - Oppression de poitrine, en étant couché, avec respiration profonde et lente Respiration faible - Douleur gravative et compressive, ou sensation d'un grand vide dans la poitrine

Lancinations sourdes on tensives dans la poitrine, sur le sternum et les côtes, surtout en respirant prefondement. Sensation de froid dans la pritrine Points au diaphragme. Traction au-dessus du cœur, aggravées en se baissant. Battements de cœur riolents et quelquefois anxieux, avec sensation comme si la poitrine se dilatait.


Tronc. — Douleur dans le dos, comme si l'on s'était donné un tour de reins. Lancinations tensives, brûlantes et aigués dans le dos. Pulsation violente des carotides. Déchirement dans la

nuque, le soir, au lit.

Bras. Douleur de luxation dans les bras, en les levant. -- Tressaillement dans les muscles des bras. *Tractions crampoides ? et déchirement dans les bras et les doigts : Pression sourde dans les avant-bras, les mains et les doigts, comme après : un coup ou une meurtrissure. Veires gonflees aux mains. - Gonflement et roideur des doigts, avec douleur brulante

Jambes Douleur de f ulure dans les fesses Sensation de faiblesse dans les cuisses, les jambes, les pieds et la plante des pieds, comme si ces parties étaient engourdies. Pression sourde et quelquesois lancinante dans les cuisses, les pieds et les orteils.

"l'aralysic des jambes et des pieds. - Sensation de vibration et de résonnement dans les jambes et les pieds, surtout dans le



534 OLEANI

OLEANDER. - - OPIUM.

plante des pieds. — Traction crampoïde dans les jambes et le pieds. — Crampes dans les mollets, en étant assis. — Froid con tinuel aux pieds.

OPIUM.

OP.— Opium. Habnemann. — Hist. nat. et prép. Voy. Phermac. homosop. p. 254. — Doses usitées . 3, 9, 30. — Durée d'action : 24 houres à 5 jours, selon les circonstances

Antidotes : Camph. calc. con. hep. mez. petr. sulf. — On l'emploie comme untidote de . Calad calc. merc

COMPANER AVEC: Acon. bell. bry. camph. cann. chin cic. coff. colch. con. croc dig. hep. hyos. ipec kal. men. merc. mosch. nitr-ac. n-mas. n-vom. petr. phos. phos-ac plumb. puls. rut. samb. stram. tab. tart. thai. — C'est surtout après: Bell. hep. kal. merc. puls. thui. que l'opinm est efficace, lorsqu'il est indiqué; après l'opium, on trouve quelquelois convenables: Colc. petr. puls.

CLINIQUE. -- Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections plutôt récentes qu'anciennes; Torpeur nerveuse et manque de réaction vitale contre les médicaments administrés; Souffrances des ivrognes; Affections des vieillards; Convulsions, tétanos, épilepsie et autres *affections spasmodiques; Paralysie;* Suites sacheuses d'une frayeur avec peur, ou d'une joie subite; Asphyxie; Coma somnolent ou vigil; Fièvres intermittentes, Apphoides, et soporeuses; Delirium tremens; Manie; Imbécillité; Cephalalgie congestive, arec vertiges; Apoplenie; Encephalite; Amblyopie amaurotique; Cataracte; Trismus; Ptyaliumo par l'abus du mercure ; Ileus ; Hernies enflammées et étranglées ? ; Constipation, principalement par torpeur du canal intestinal; après des diarrhées fréquentes, ou par manque d'exercice, et surtout chez des personnes vigoureuses, pléthoriques et bien nourries, ainsi que chez les enfants et les femmes enceintes : Tempanite, Ischurie : Fièvre de lait, avec état soporeux; Douleurs d'enfantement supprimées, fausses ou spasmodiques; métralgie puerpérale;. Orthopuée paralytique : Toux et asthme suffoquants : etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Insensibilité générale de tout le système nerveux. — Fortes inquiétudes dans les membres. — Tremblement dans tout le corps, avec secousses, tressaillements dans les membres, et froid général. — *Accès de conrulsion, osurtout le soir, vers minuit, avec sommeil, mouvements involon-



taires de la tête et des bras, et poinga fermes. *Conculsions épileptiques, la nuit, ou le matin, arec accès de suffocation, perte de connaissance et de sensibilite, et mouvements violents des membres. — Après chaque accès de convulsions, sommeil. — Relâchement de tous les muscles. — *Convulsions avec cris. — Sensation de bourdonnement et de vibration dans tout le corps.

- Absence de douleurs pendant les affections. — Irritabilité excessive des muscles qui sont sous l'empire de la volonté, et diminution de celle de tous les autres. — Les personnes qui font abus de l'opium vicillissent de bonne heure, — *Tetanos. *Rencersement du corps — Paralysies. — Sensation de force et de vigueur, ou evanouissement et grande faiblesse. — Amaigrissement general. — Gonflement hydrop que de tout le corps.

Aggravation et renouvellement des souffrances en s'echauffant.

Peau Peau bleuatre, avec taches bleues. Prunt continuel a la peau, avec petites elevations rondes et incolores. — Desqua-

mation de l'epiderme. - Engelures.

Sommeil. — *Somnolence comatense, arec ronflement et bouche ouverte, yeux ouverts et convulsés, face rouge et bouffie, machoire pendante, perte de connaissance, respiration difficile, lente ou même intermittente, pouls lent ou même supprimé, et mouvements convulsifs des mascles de la face, des coins de la bouche et des membres. **Enrie excessire de dormir, avec impossibilité absolue de s'endormir. Sommed incomplet, sans que l'on puisse se reveiller. Sommeil agite, avec rêves anxieux — Insomme, avec jactation anxieuse, inquietude et délire Carphologie pendant le sommeil. — Gémissements en dormant. Secousses effrayantes dans les inembres pendant le sommeil. Cauchemar. — Réres lascifs, effrayants et anxieux.

Fièvre. — Froid général de la peau, surtout aux membres.


Froid et roideur de tout le corps. (haleur brûlante du corps., avec forte rougeur de la face, annête, delires et agitation.

*Pouls généralement plein, lent et intermitteut, ou acceleré et dur. — Fièvre, avec sommeil sopareux, ronflement, mouvements convulsifs des membres, excretions supprimées et sueur chaude. Fièrre, quel 1 fois avec perte de connaissance ou

délire.

Moral. — Insouceance on grande anxiete et impuétude — Inconstance et versatilite — Grande disposition à s'effrayer, et caracractère peureux — Hardiesse témeroure et inconsidérée. — Tranquillite de l'âme, avec réveries agreables, et oubli des souffrances.

Stupulité et imbeculite Perte des sens. Grande affluence d'idées, avec gaiete et disposition a faire des réflexi us sublinant prefondes l'encurs de l'imagination *Manie avec idees bizarres con fixes, il en ble qu'on n'est pas chez soi -*Délires, avec visions effeaquates ede souris, de scorpions, etc. et envi le s'enfuir Diragatione.



OPIUM.

536

Têto. -- Embarras dans la tête, avec sensation de chalcur dans les yeux, et besoin de les fermer. — Tête entreprise comme à la suite de l'ivresse. — "Etourdissement comme dans l'ivresse. — Vertige en se redressant dans le lit, qui force à se recoucher. — Vertige, après une frayeur. • Accès comme un coup de sang, avec vertige bourdonnement d'oreilles, perte de connaissance, face rouge, chaude, bouffie, yeux rouges et à demi fermés, pupilles dilatées et insensibles, écume à la bouche, mouvements convulsifs des membres, respiration lente, ronflante; avant l'accès, insomnie ou sommeil, avec rêves anxieux; ébullition de sang et chalcur générale; après l'accès, surexcitabilité nerveuse, rires et divagations. — Mal de tête aggravé en remuant les yeux. — Céphalalgie, avec tension pressive dans la tête. — Sensation comme si le cerveau se déchirait. — Grande pesanteur de la tête. — *Congestion à la tête, avec forte pulsation.

Youx et Oreilles. Paupières pendantes, comme paralysées. —
Sensation comme si le globe des yeux était trop volumineux. —
*Yeux rouges, enflammés. — Tremblement des yeux et des paupières. — *Yeux fixes à moitié fermés, consulsés, proéminents, vitreux. — *Pupilles dilatées et immobiles. — Obscurcussement de la vue. - Étincelles devant les yeux. — Bourdonnement d'o-

reilles. - Tintement dans les oreilles.

Visage. — Visage pûle, terreux, have, avec yeur creux et taches rouges sur les joues. — *Face rouge foncé, quelquefois brunatre, chaude et bouffie. — Paleur et rougeur alternatives de la face.— Veines gonflées, à la face et à la tête. — *Relâchement de tous les muscles de la face. — *Tremblement, secousses et mouvements conculsifs des muscles de la face. — Lèvres gonflées. — *Lèvres et machoire inférieure pendantes, par l'arité. — Tressail-lement des coins de la bouche. — *Distorsion de la bouche. — Crampes de la máchoire.

Bouche et Gorge. — Dents vacillantes. — Sécheresse de la bouche avec forte soif. — Salication abondante. — Crachement de sang. — Ulcères dans la bouche et sur la langue. — Langue noire. — Paralysse de la langue. — Parole faible, basse, avec impossibilité de parler haut sans faire de grands efforts. — Sécheresse de la gorge. — Gonflement et mouvements dans la gorge, avec déglutition gênée, par accès quotidiens. — Impossibilité d'acaler.

Appétit. Perte du goût. — Goût amer ou aigre dans la gorge.

- Soif ardente, surtout pour la bière. — Accès de boulimie, avec absence d'appétit et répugnance pour tous les aliments. — Leu-

teur et faiblesse de la digestion.

Estomac. — Nausées avec envie de vomir et vomiturition. — Vomissements avec douleurs violentes à l'estomac et convulsions. — Vomissements de sang ou de matières verdâtres. — «Vomissement de matières fécales et d'urine. — Sensibilité dou-loureuse et ballonnement de l'estomac et de l'épigastre. — Pres-



sion e astrative a l'estomac, avec angoisse excessive. - Pesonteur à l'estomac. - Compression du diaphragm

Ventre. *Ventre dur et ballonne, comme par une tympanute.

Pesanteur dans le centre, comme par un fardeau. Pulsation, pression, pesanteur et tiraillement dans le ventre.— *Selles jamais sans lacement, comme de pet tes boules dures.

Selles. *Constipation, quelquefois de longue durée. - Selles fétides, noires. - Diarrhees ecumenses et liquides, avec douleur brûlante à l'anus et tenesme violent. Selles involontaires.

Urines. - *Retention d'arine, comme par mactivité de la vessie.


Urine rare, foncee, avec sé liment briqueté - Pissement de

Parties génitales. *Evaltation de l'appetit vénerien, avec érections et rellations frequentes. Extans amoureuses. - Diminution de l'appetit venerien et implissance -- *Douleurs crampoides dans la matrice. - "Métralgie violente, pendant la grossesse, avec rapports, comituation, agitation extreme et contact du ventre insupportable.

Larynx. — Enrouement pénible, comme par accumulation de mucosites dans la trachee-artère, avec grande secheresse de la bouche et langue blanche. — Voix faible, basse. — Toux violente,
sèche, creuse, aggravée après le repos. — Toux, pendant la déglutition, ou en respirant, avec suspension de la respiration, et
couleur blene du visage. — Toux, avec expectoration de sanq
et de mucusités epaisses et écumeuses. — Toux grappeuse, fatigante, sèche, suivie de bâillement. — Toux chutouillante, sèche
tourmentant jour et nuit.

Poitrine. *Respiration bruyante, rouflante et valante. Respiration difficile, l'ute et intermittente, comme par paralysie du poumon. *Gene de la cesp ration et étauffement avec forte angoisse. Asthme spasmedique. - Acces de suffocation, en faisant des efforts pour tousser. Pression à la poitrine, avec elancements dans les côtes, en respirant. Tensi met construction dans la poitrine. Chaleur et douleur brulante dans la poitrine, eurtout dans la region du cœur. *Eréthisme du cœur.

Trono et Membres. Rencersement du dos. - trontlement des veines et battement dans les art res du cou. Tressadiements et moncements convulsifs dans les livres - Paralysie des bras. - Tremblement des bras et des mains. - Engelures aux doigts. Gonflement des veines des mains. - Tressadiements et moncements convulsifs des jambes - Faiblesse, torpeur et paralysie des jambes. - Pesanteur et gonflement des pieds. - Engelures aux orteils.



OXALIS ACIDUM.

588

OXALIS ACIDUM.

OX-AC. — Acide oxalique. — Hist. nat. et prép. Voy. Phormes. homesop., p. 136. — Hening, — Études pathogénésiques de l'Amérique du Nord. Companen avec. Hippom. rumes. rhab.

CLIBIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas où l'on pourra l'administrer avec succès contre l'une ou l'autre des affections suivantes : — Paralysies; Rhumatismes articulaires : Jaunisse ; Emphysèmes ; Donleurs violentes dans les cancers ; Fièvres typhoïdes. — Manies ; Apoplexies ; Vertiges ; Lippitude. — Aphthes de la bouche ; Angines ; Pyrosis ; Vomissement des femmes enceintes ; Gastrites ; Cancer de l'estomac ; Coliques ; Entérites ; Diarrhéos ; Dyssenterie ; Choléra. — Gravelle et calcula urinaires. — Laryngite ; Catarrhe bronchique ; Tour muqueuse ; Pusumonies ; Affections du cœur. — Maraeme dorsal (Tahes dorsalis).

SYMPTOMIN GÉNÉRAUX. — Douleurs dans les membres, avec lassitude, faiblesse, engourdissement; lassitude, avec mal à la tête, pandiculations et bâillement, améliorés au grand air; malaise et fatigue, avec soulagement dans la position couchée; lassitude, comme à la suite de grands efforts, avec sueur, après la diarrhée; lassitude, avec soif et vertiges. — "Amaigrissement, avec battements de cœur. — Défaillance; sensation d'engourdissement; membres très-légers, en marchant. — Tremblement; convulsions; paralysie du côté gauche. — Les douleurs occupent une petite place oblongue, et se monirent, de préférence, d'abord à gauche, puis à droite. — Douleurs par paroxysmes. — Le soir : douleurs, tour, frimons. — La nuit : Flatuosités, palpitations de cœur. — En matin : diarrhée, pouls accéléré, maux de gorge, souffrances de l'estomac.

Peau. — Peau sensible, en se rasant. — Prurit, à la nuque, aux doigts. Peau marbrée, comme chez les enfants. — Eruptions verruqueuses, avec prurit et rougeur; pustule douloureuse au doigt indicateur; exfoliation de la peau des ongles. — Emphysème général de la peau. — Jaunisse. — Ulcères.

Sommeil. Baillements fréquents, violents. — Envie de dormir, le jour; sommeil profond, prolongé. — Réves avec peur; avec sursauts comme par frayeur, il se redresse et regarde autour de



lui; reves comme si l'on glissait; comme si l'on fût arrose d'eau Le matin : mai de tête, courbature, douleurs néphretiques.

Fibre. Herripilations montant de bas en hant; frissonnement avec éternument, le soir, frissons, après la diarrhée, après-midi; le soir, frisson grelottant, avec rougeur de la face; ofroid et frisson, avec constitution apoplectique. Chaleur a chaque effort, aux mains, intérieure, surtout a la face; chaleur avec sueur. Sueur, pendant la faiblesse, savec les vertiges; la nuit, froide, visqueuse. — Pouls plus fréquent le matin (comme sulf ars); plus rare, inégal, plus faible; petit et lent, après la diarrhée, avec frisson; tremblant; decenant imperceptible. olievre typhoède.

Horal et Intellect. Excitation, vivacite, gaiete. Affection de l'organe de l'amour filial, et douleur dans l'occiput. — Angoisse; peur, (cris et pleurs). Stupeur; méditation difficile, lente. — Repugnance pour la conversation : peudant le mal de tête, avec sensation de plemitude à la face. Sagacité; *en pensant aux

douleurs elles reparaissent.

Tôte. *Vertiges pendant la fatigue avec soif, angoisse et mal de tête; "pendant la sueur en regardant par la fenêtre; en se levant de son siège. Vacuite dans la tête; *embarras de la tête, otous les matins, front entrepris le matin. "Apoplexie.

Brûlement au front — Douleurs dans le succeput et le vertec : dans le côte gauche du front, en s'everilant — Presson sur de petites places circonscrites, presson, comme le serrement par une vis, derriere les deux orcilles. — Mal de tête, après être resté couche; après avoir dornn, en se levant; amélière après la garde robe — L'usage du vin fatigne la tête.

Year. Douleurs dans le globe des yeux, surtout a gauche.

*Lappitude Disposition a fermer les yeux - Les petits objets,
surtout ceux de forme lineaire, paraissent plus grands, parce qu'ils
nont supposes être plus éloignes. Perte de la vue pendant les

vertiges, avec sueur et saignement de nez

Hos. Élancements dans la narine droite, en respirant.

Petites veneules dans la narine droite, avec gonfiement de l'aile. – Eternuments et frissons. — Epistaxis avec perte de la vue.


Face. Chaleur de la face, rougeur, sensation de plonitude.

*Face pal , bleme, your creux.

Denta. Houleurs dans les molaires carrees plients comme emonsces, geneires saignantes, douloureuses que et la petits ulcères aux gencives.

Bouche. — Mucosites abondantes dans la bouche, douleur, *beaucoup de saliv : accumulation d'eau — Langue charges de blanc;
rouge, gontière sensible, so die brulante. *Inflammation de l'
bouche; *ulceres; uphthes

Gorge. Grattement, aprete dans la gorge : augmentation de la



OXALIS ACIDUM.

secrétion muqueuse. — Secheresse de la gorge, dans la matinée, après la diarrhée. — Déglutition douloureuse, surtout le matin; dysphagie, avec renvois aigres. — Brûlement dans la gorge et

l estomac. — Angines, aiguës et chroniques.

Goût et Appétit. - Goût aigre de la bouche; *pyrosis.— Appétit augmenté. — Manque d'appétit : avec insipidité des aliments, soif, nausées; anorexie, tant avec langue chargée qu'avec langue nette. — Soif : pendant les vertiges, le manque d'appétit, les nausées et les douleurs d'estomac. — Après avoir mangé ; renvois, nausées, douleurs autour du nombril, coliques, borborygmes, besoin d'aller à la selle, fatigue. — Le manger soulage les mans d'estomac; un potage chaud est agréable dans les rongements d'estomac. — Digestion faible, difficile.

Symptômes gastriques. — Rapports d'air; renvois aigres. — Pyrests. — Hoquet; hoquets subits, avec renvois. — Nausées et soif, avec tranchées; envie de vomir, après la diarrhée; enau-

secs des femmes enceintes.

540

Estomac. — Brûlement dans l'estomac et la gorge. — Sensation de vide dans l'estomac, forçant à manger. — Estomac sensible au toucher. — Douleurs violentes dans l'estomac; les douleurs d'es-

tomac réveillent la nuit; ogastrite; *gastralgies.

Ventre.—Dans l'hypocondre gauche : douleurs persistantes comme de contusion ; élancements ; élancements dans la rate, se dissipant en respirant profondément; douleur entre l'hypocondre et le nombril. — Douleur pénible entre le nombril et le creux de l'estomac, dans la grossesse. — «Elancements dans la région du foic. — *Douleurs dans la région ombilicale; coliques; ombilic comme écorche ; oinflammation chronique des intestins ; élancements ; *douleur avec envie d'aller à la selle et ténesme ; avec émission de vents; avec augmentation par le mouvement, amélioration dans le repos. — Brûlement sur de petites places circonscrites, dans le ventre : tranchées. — Flatuosités, borborygues, gargouillement et autres bruits dans le ventre, avec ou sans douleurs, surtout le soir, la nuit ou après midi; flatuosités, avec pression ou fourmillement dans l'anus. -- Douleurs comme avant une diarrhée; douleurs, pression; coliques avant la diarrhée. -Paine gauche: flatuosités, incarcérées; douleur aiguë; contraction. — Dans l'aine droite: coliques, borborygmes; douleur, sur une petite place circonscrite du côté droit du ventre ; élancement au dessus de la hanche droite; douleur dans la lombe droite.

Anus et Selles.—Garde-robes retardées; envie d'alter à la garde-robe, arec pression et sensation de pression vers l'anus; ténesmes; douleur, ténesme, le long d'une bande étroite, dans le rectum.

—Le matin: garde-robes liquides ou en forme de bouillie, avec coliques autour du nombril et pression sur l'anus; les selles diarrhéiques reviennent dès qu'on se couche; la douleur pendant



OXALIS ACIDUM.

les garde-robes provoque des maux de tête; garde-robes avec du sang et des mucosités. — Arant les selles : mal à la tête. — Pendant les selles, miction (defaillance, vomissement). — Après les selles : nausées, crampes aux mollets; sécheresse de la gorge; maux de reins ameliorés.

Voies urinaires Douleur dans la région des reins. — Envie frequente duriner, urines abondantes. Brulement dans l'urèthre, comme par des urines acres, en urinant, douleur dans le gland. - «Gravelle et calculs urinaires?

Parties viriles. — Appétit vénerien augmenté, erection, le matin. Douleurs dans les testicules, surtout a droite; pesanteur et

tressaillements, jusque d'ins les cordons spermatiques.

Larynx et Toux. Dans le larynx, sensation de genflement et d'ecorchure; contraction, chatouillement. Enrouement; renâclement frequent. Laryngite, catarrhes bronchiques. Toux chatouillante, le soir; toux seche, pendant un fort exercice du corps. Mucosités de la gorge augmentees, ou bien diminuées; mucosités en morceaux, dures, friables, epaisses; pendant l'econlement du nez, sortie de morceaux durs de la gorge; morceaux

noirs dans l'expectoration jaunatre.


Poitrine et Respiration. Dyspnée, avec oppression; respiration difficile, pendant le mouvement, le soir; pendant la respiration, elancements; en bâillant et en respirant, douleur au-dessus
de la hanche, élancements qui coupent la respiration. Douleurs de portrine, sourdes; pressives, comme si la poitrine était
a vif; deuleur a travers le milieu de la portrine, élancements, à
gauche. — Douleurs dans la région du cour : élancements;
comme dans une partie ulcérée; de derrière en avant; de haut en
bas. — *Palpitations de cour, la nuit, après s'être couche, *en
y pensant, les battements de cœur s'arretent; cendocardite?;
*pericardite?, hypertrophie du cœur?

Tronc. - *Mal auc reins, comme par engourdissement ou comme si les os étaient brises. - Douleurs au dos : sous la pointe de l'en oplate; entre les épaules, depuis l'épaule jusqu'aux lombée, du dos jusque dans les cuisses; douleur dans la region lombaire, possant tout d'un coup aux extremites inférieures. - Torpeur, picotement froid et manque de force au dis qui est trop faible

pour porter le corps. - Marasme dorsal?

Membres thoraciques - Douleurs aux épinales : élancements dans l'articulation : passant vers le dos ; venant de la poitrine. -- Pouleur, d'abord dans le deltoide gauche, puis dans le droit ; douleur au milieu du bras droit, comme dans l'os, avec besoin de mouvoir le membre ; bras comme roide et engourdi. - Mains froides, comme mortes ; douleurs dans le metacarpe et dans le gras du pouce, avec sensation de foulure dans l'articulation de la main droite, forçant a l'etirer, avec élancements dans la region ulnaire. -- Lourdeur à la main droite, mouvement lent des

541



542 OXALIS ACIDUM. — PARIS QUADRIFOLIA.

doigts. — Douleurs arthritiques dans les doigts, contraction des doigts, de la main gauche; tressaillements convalsifs des doigts.

- Ongles de couleur foncée.

Membres pelviens. — Dans les membres inférieurs: faiblesse, inquiétude, engourdissement, paralysie, roideur, horripilation, froid, chaleur.—Genoux fatigués; douleurs dans le jarret gauche. — Douleurs dans l'articulation du pied droit. — Contraction des orteils du pied droit.

PARIS QUADRIFOLIA.

PAR. — Parisette à quatre femilles, Herbe à Pâris, Raisin des renards. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy Pharmac. homosop., p. 257. — Doses naitées : 9. 30. — Durée d'action : 2 à 4 jours, suivant les circonstances.

ANTIDOTES : Acon. coff.

COMPARER AVEC : Hell. ign. kal. natr-m. n-vom. puls. sabad.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Lancinations continuelles dans tous les membres. — Serrements crampoïdes dans les articulations, ou sensation en les remuant et en les tournant, comme si elles étaient brisées, goufiées et luxées. — Sensation de lourdeur dans tout le corps.

Peau. — Fort prurit à diverses parties. — Fourmillement souscutané, sans prurit. — Douleur d'excoriation de la peau, au tou-

cher. - Panaris.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour et le soir, de bonne heure. — Sommeil incomplet, interrompu et agité, la nuit, avec jactation continuelle et affluence de rêces. — Rêves voluptueux, avec érections et pollutions.

Fièvre. — Frissons, surtout à la poitrine, au ventre et aux jambes, avec chair de poule et buillements. — Froid intérieur continuel, avec tremblement intérieur. — Sueur matutinale, printinte.

qui force à se gratter. — Froid d'un seul côté du corps.

Moral. Disposition à traiter les autres avec mépris et dédain.

— Disposition à dire des fadaises, et à se complaire dans cé que l'on dit. — Manie avec loquacité. — Répugnance pour le

travail de tête. — Mécontentement, mauvaise humeur.

Tôte. -- Tête entreprise, embarrassée. -- Vertige en lisant à haute 'voir, avec difficulté de parler et d'y voir. -- Douleurs de tête aggravées par la méditation. -- Douleur pressive dans la tête, qui se dissipe en appuyant la main dessus. -- Sensation de gon-flement dans la tête, avec pression, comme si tout allait sortir par les tempes et les yeux. -- Tension dans le cerveau et les tégu-



PARIS QUADRIFOLIA.

ments du front. Élancements et lancmatione dans la tête. — Céphalalgie pulsative la nuit, avec grande agitation. Céphalalgie pulsative, avec sensation de balancement en montant un escalier. — Mal à la tête, après avoir fume. Douleur d'exconation à l'extérieur du vertex, au toucher. — Sensibilité douloureuse et chute des cheveux. Tension du cuir chevelu au front et à l'occiput — Croûtes sur la tête.

Your. Douleur dans les yeur, comme une pression dans les os des orbites. Sensation comme si le globe des yeur était trop volumineux ou gonflé — Deuleur brulante dans les yeur, avec écoulement de larmes, surtout le matin, après le lever. Tressaillement et frémissement dans les cils de la paupière supérieure. Vue incertaine, et vacillement devant les yeur.

Oreilles. - Otalgie, avec dechirements. Diminution de l'ouie. Tintement d'oreilles.

Nez. — Nez comme obstrué dans le haut, avec mouchement de sang. — Odeur putride du lait et du pain. Obturation du nez, le matin, avec mouchement de mucosites épaisses et sanguino-lentes. — Coryza sec, alternant avec coryza fluent. — Ecoulement de mucosites liquides par le nez et les yeux, et qui provoque une respiration haletante. Mucosites nasales, rouges ou verdâtres.

Visage — Douleurs de la face, avec elancements brûlants dans les os des joues. — Boutons purulents sous le nez et au menton.

Boutons sangumolents, comme des grains de millet, a la mâchoire inférieure. — Boutons au front, avec douleur pressive au toucher — Levres gercées — Dartres autour de la bouche

Deuts. - Odontalgie tractive ou avec pulsations tractives, surtout dans les dents cariées, aggravée par des choses froides Douleurs incisives dans les gencives, tous les matins. Gencives ridées, comme si elles étaient brûlées.


Bouche et Gorge. Bouche sèche, aride, le matin, au réveil. Accumulation de salive apre et astringente — Ecume blanche et
muqueuse aux coins de la bouche, le matin. — Douleur d'exeriation et desquamation du voile du palais. — Gonflement dur, de
la grosseur d'un œuf, au palais, qui est dur — Langue apre et
sèche, avec sensation comme si elle était trep volumineuse.
Mal le gorge, comme par la pression d'une boule dans la gorge.

- Elancements, grattement et douleur brulante dans la gorge.

Appétit. - Goût pateux et fade. Appétit violent. Renvois degoutants ou pressifs Regurgitations aqueuses. - Nausees, avec gout aigre Faiblesse et lenteur de la digestion. - Hoquets continuels après le repas

Betomac. Pression à l'estomac, comme par une pierre, soulagée par des renvois - Douleur brûlante depuis l'estomac jusque dans le ventre.

Ventre. - Douleur tensive dans tout le ventre. - Pression dure



PARIS QUADRIFOLIA. -- PETROLEUM.

dans le centre. --- Traction incisive et térébration dans un côté du ventre, le soir au lit, en étant couché dessus.

Bollos. - Évacuations alvines fréquentes, mais insuffisantes, et de la consistance de la bouillie. — Selles diarrhéiques fétides,

comme l'odeur de chair pourrie.

544

Urines et Parties génitales. — Diminution de la sécrétion des urines. — Envie pressante et fréquente d'uriner, avec douleur brûlante pendant l'émission. — Urine enflammée, avec nuages dans le milieu, sédiment rougeâtre et pellicule irisée après avoir reposé. — Douleur brûlante et élancements dans l'urèthre. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Règles trop hâtives.

Larynx. - Le matin, sensation de sécheresse dans la trachéeartère. — Enrouement pénuble et voix basse, avec renaclement continuel de mucosités. — Enrouement périodique. — Douleur brûlante dans le pharynx. - Toux, comme excitée par la vapeur du soufre, dans la trachée-artère, ou comme par des mucosités visqueuses dans le pharynx. — Toux nocturne en étant couché sur le côté gauche. — Toux arec expectoration de mucosités visqueuses, verdâtres, venant du larynx.

Poitrine. Gêne de la respiration, avec besoin de respirer profondément. — Pression dans le côté droit de la poitrine. — Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — Battement

de cœur, pendant le repos et le mouvement.

Trono. — Douleurs dans le dos et la nuque en se baissant, comme si un fardeau pesait dessus. — Élancements et lancinations dans le dos, comme aussi dans et entre les omoplates. — Fension et

faiblesse dans les muscles du cou et de la nuque.


Bras. — Pesanteur et faiblesse paralytique dans les bras et les articulations des doigts. — Déchirements et tractions dans les doigts, depuis l'épaule jusqu'aux doigts. — Tremblement des mains. — Élancements dans les doigts. — Doigts tantôt chauds, tantôt froids, tantôt morts. — Engourdissement des doigts. — Panaris.

Jambes. — Déchirements et traction dans les jambes, et surtout dans l'articulation coxo-fémorale. — Douleur paralytique dans l'articulation du pied. — Fourmillement dans le tendon du talon. — Déchirements, tractions et élancements dans les orteils. — Froid aux pieds, la nuit au lit.

PETROLEUM.

PETR. — Huile de pétrole. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 437. — Doses usitées : 48, 50. — Durée d'action : jusqu'à 50 jours dans des affections chroniques.
Antipotes : Acon. n-vom.

COMPARER AVEC: Calc. camp. cham. ign. lyc. magn. nitr-ac. n-vow. phos.



PETROLESM.

545

puis. suif. - C'est surtout après : nitr-ac. et phos., que le pétrole est efficace lorsqu'il se trouve indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrance, par suite de contrariétés; Affections acrofuleuses et rachitiques Accès de défaillanée; Atrophie des enfants; Dartres; Rhagades; Engelures; Éruptions pustuleuses; Fièvres intermittentes; Mélancolie; Vertiges chroniques; Céphalalgie causée par des contrariétés, ou même par une chute; Migraine; Teigne; Ophthalmies scrofuleuses; Myopie et presbyopie; Fistules lacrymales (en alternant avec sil.); Otite, et otorrhée purulente; Dureté de l'ouie (surtout après l'usage de l'acide nitrique); Surdité par paralysie du nerf acoustique; Affections gastriques; Mal de mer; Souffrances causées par le mouvement de la voiture; Dyspepsie chronique; Hernie inguinale; Diarrhées magnances; Hémorrholdes; Rétrécissement de l'urèthre; Dartres au mains es; Hémorrholdes; Eruptions parallès des femmes enceintes; Catarrhe avec encouement; Riemannes et que pieds, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs tractives dans les membres. — Enroidissement et engourdissement facile des membres. — Craquement dans les articulations, avec roideur arthritique et douleurs tractives, déchirantes. — Gonflement et induration des glandes, même après une contusion. — Tressaillement des membres, le jour et pendant le sommeil. -- Attaques d'épilepsie. -- Accès d'évanouissement avec bouillonnement de sang, chalcur, palpitations et pression au cœur. — *Au moindre effort, grande faiblesse, equelquefois avec trouble de la vue, tremblement du corps, bourdonnement d'oreilles et nausées. - Faiblesse, nausées et autres incommodités par le mouvement de la voiture. Aggravation et apparition de plusieurs symptômes par un temps d'orage. - *Chaleur fugace, ébullition de sang et sueur après une promenade ou après s'être faché. — *Amaigrisseme ochez les enfants aussi. - Sensation d'un malaise insupportable et général, avec tremblement et accablement. - Pesanteur et lamitude dans tous les membres. — Grande lassitude le matin et le soir. — Forte disposition à prendre des refroidissements. — Répugnance pour le grand air, avec frissonnement des qu'on w est. - Plusieurs symptômes se manifestent le matin. Peau. — Grande sensibilité de la surface de la peau. — Miliaire



PETROLEUM.

urticaire. — Dartres pruriantes. — Plaques pruriantes, excoriées et suintantes, à la peau. — Taches brunes et jaunes à la peau. — *Éruption de pustules pruriantes et brûlantes. — *Rhagades. — Peau maladire; toute lésion tend à s'ulcérer. — Furoncles. — Ulcères avec douleur lancinante. — *Chairs luxuriantes dans les ulcères. — Verrues. — Cors aux pieds. — *Engelures, quelquefois douloureuses.

Sommeil. Envic de dormir le jour et le soir, en étant pais tranquillement. - *Sommeil incomplet et agité, la nuit, avec affluence de rêves vifs, anxioux et effrayants, réveil fréquent en sursaut et chalenr anxieuse.—*Le matin il semble qu'on n'a pas

assez dormi.

546

Fièvre. — Frisson avec mal à la tête, et froid aux mains et au visage. — Frissonnement fréquent par tout le corps, et en se réchauffant, fort prurit à la peau. — Frissonnement eu froid, généralement le soir, et quelquefois avec ongles bleus. — Sueur immédiatement après le frisson. — *Fièvre, le soir, °avec chaleur de la face, et pieds froids après le frisson. — Chaleur fugace, fréquente. — Fièvre avec pouls plein et sensation brûlante à la peau. — *Chaleur nocturne. — *Sueur nocturie.

Moral. — *Anxiété et disposition à s'effrage. Tristeme et abattement moral, "quelquefois avec sensatures hiblesse au cœur (au creux de l'estomac?). — *Grande irrésolution. — •Inquiétude sur l'avenir. — *Humeur hypocondrisque. — Caractère irascible, violent, avec injures. — •Pleurs fréquents, et pour la moindre chose. — *Absence de mémoire. - Inaptitude à réflé-

chir. - *Faiblesse de la pensée.

Tête. — *Tête entreprise. — *Vertige fréquent. — Vertige, comme un fort ballonnement. — * Vertige en se baissant, ou en se levant du lit ou de son siège. — *Maux de tête après s'être fâché, ou -le matin, à jeun, comme aussi le soir après une promenade. ---Accès de mai de tête semi-latéral, qui force à se coucher. — *Pesanteur et plénitude dans la tête, le matin et en se baissant. — *Douleurs pressives ou lancinantes pressives, dans la tête, et surtout dans l'occiput. — Mal de tête aggravé par tout travail intellectuel, jusqu'à l'hébétude complète. — Tension dans la tête. comme si la dure-mère était tendue. - Douleurs de tête crampoïdes, tractives, pinçantes. — *Maux de tête pulsatifs, surtout dans l'occiput. --- Sensation comme si tout était vivant dans la tête. — Cuir chevelu douloureux au toucher, comme s'il était meurtri ou ulcéré. -- "Traction à la tête, au front et aux tempes, jusque dans les dents. — *Eruption à la tête et à la nuque. — Gonflement codémateux et croûtes au cuir chevelu. — *Chute des cheveux.

Your — Prarit dans les your. — Pression, cuisson, élancements et douleur brûlante dans les yeur. — • Inflammation des yeur. — • Fistule lacrymale. — Larmoiement. — Tressaillement et fré-



missement, des yeux et des paupières. — Convulsions des yeux. — Myopie ou presbyopie. — Diplopie. — *Scintillement et voile devant la vue, ou étineelles et points noirs.

Oreilles. — Otalgie avec douleur crampotde et tresmillants. —

«Sécheresse et sensation de sécheresse pénible dans l'intérieur de
l'oreille. — Écoulement de sang et de pus par les oreilles. —

Eruption aux oreilles. — Rougeur, exceriation et suintement derrière les oreilles. — *Surdité. — *Tintement, roulement, grondement et bourdonnement dans les oreilles.

Hez. — Epistaxis. — Vésicules purulentes au nez. — Narines ulcérées. — «Gonflement du nez, avec écoulement de pus et douleur au-dessus de la racine du nez. — «Obturation du nez. — «Sécheresse et sensation de sécheresse pénible dans le nez. — «Coryza avec enrouement.

Face. — *Chaleur de la face, quelquefois après le repas, et avec soif. — *Teint jaundtre, pâle. — Éruption boutonneuse à la face. — Boutons croûteux, avec douleur langinante, aux lèvres et aux commissures des lèvres. — *Gonfiement des glandes sous-maxillaires. — Luxation facile de l'articulation de la mâchoire, le matin, au lit, avec douleurs vives.

Dents. -- Odontalgie au contact du grand air, plus violente la nuit, avec gonfiement de la joue. -- Torpeur des dents, avec douleur eu les serrant. -- Vésicule purulente aux gencives, comme une fistule. -- Gonfiement des gencives, avec douleur lancinante au toucher.

Bouche. — *Haleine fétide, quelquefois comme de l'ail. — Ulcères à la face interne des joues. — Accumulation de mucosités dans la bouche et la gorge. — *Langue chargée d'un enduit blanc. — Grande sécheresse de la bouche, avec forte soif.

Gorge. — Mal de gorge, pendant la déglutition, avec douleur lancinante. — Gonflement et grande sécheresse dans la gorge. — En avalant, les aliments (liquides?) remontent vers les foeses nasales. — Renâclement de mucosités, le matin.

Appétit. — *Goût putride, fade, muqueux, ou bien amer ou acide. — Forte soif de bière. — Boulimie. — *Faim, avec prompte satiété. — *Voracité. — Friandise. — *Absence d'appétit. — Répugnance pour la ciande et la graisse, comme aussi pour les aliments chauds et cuits. — Incommodités pendant la digestion, après presque tous les aliments, quelque peu qu'on en ait mangé. — Après le repas, obscurcissement et vertige, mausées, *lourdeur et pression dans l'estomac; sommeil, ou coliques avec rapports, —ou renvois aigres, congestion à la tête, crampes de poitrine, etc.

Butomac. — Renvois bruyants. — Renvois aigres et régurgitations. — Pyrosis. — Nausées fréquentes, surtout le matin, souvent avec accumulation d'eau dans le bouche, gêne de la respiration, renvois aigres, langue sèche et blanche, points dans la région.



PETROLEUM.

hépatique, chaleur du visage, vertiges, etc. — Nausées par le mouvement de la voiture. - *Ecoulement d'eau par la louche, comme des pituites. — *Envie de vomir. — oVomissement verdâtre, amer. — Pression à l'estomac. — Crampes d'estomac. — Sensation de vacuité et de faiblesse dans l'estomac. — Douleur dans l'épigastre, comme si quelque chose s'en arrachait. -- •Gonflement de l'épigastre, avec douleur au toucher. — Sensation

de plénitude à l'ép**iga**stre.

Ventre. — Mal de ventre peu après le repas. — «Sensation d'un grand vide dans le ventre. — Ballonnement et tension dans le ventre, avec crampes. - *Pincements et tranchées dans tout le rentre, quelquefois avec besoin pressant d'aller à la selle. - *Coliques nocturnes, vers le matin, avec diarrhée. — *Borborygmes dans le ventre, cavec sensation comme si l'abdomen était entièrement vide. — "Hernie inguinale. — Vente fétides. — "Sensation de froid dans le ventre.

Selles. — *Selles difficules, dures, noneuses et insuffisantes. -*Selles fréquentes, le jour, equelquefois avec évacuation de matières séreuses, jaunûtres. -- *Diarrhée, souvent précédée de tranchées. — * Selles muqueuses, souvent avec du sang. — Douleur brûlante au rectum, après la selle. — Dartres pruriantes au

périnée.

548

Urines. — Émission d'urine fréquente, avec écoulement peu abondant d'une urine rouge ou brune et fétide. — Suintement d'urine involentaire. — Emission d'urine, la nuit. — Pissement au lit.

Parties viriles. — • Rétrécissement de l'urêthre. — Douleur brûlante, *prurit, rougeur, excoriation et suintement, ou boutons pruriants et dartres, au scrotum et à côté, à la cuisse. — Diminution de l'appétit vénérien. — Pollutions fréquentes. -- • Ecoulement de liqueur prostatique. — Après le coît, faiblesse et irritabilité nerveuse.

Bègles. — *Prurit, excoriation et suintement autour de la vulve. - Répugnance pour le coît, chez la femme. - Règles trop hâtires, avec écoulement d'un sang qui provoque la démangeation. Leucorrhée comme du blanc d'œuf - • Leucorrhée, • avec


réves lascifs. — Prurit et furfures aux mamelons.

Larynx. — Enrouement avec ou sans coryza. — Toux avec sécheresse dans la gorge. - *Toux suffocante, ela nuit. - *Toux sèche. la nuit, ou le soir, caprès s'être couché. -- Toux sèche, avec

élancements sous le sternum,

Poitrine. — Gêne de la respiration, à l'air froid. — Ralement et ronflement dans la trachée-artère. - Sensation de pesanteur, d'anxiété et d'inquiétude dans la poitrine. — Oppression de poitrine, la nuit. — *Elancemente dans les côtés de la poitrine. --Dartres sur la poitrine. — *Battement de cœur.

Tronc. - *Maux de reins, equi ne permettent pas de se tenir debont. - *Douleur dans le dos, qui ne permet pas de bouger. -



PETROLEUM, - PHOSPHORUS.

549

Faiblesse et roideur dans le dos et aux reins. — Darires à la nuque. — Gonflement des glandes et éruption à la mique. —

Suppuration des glandes axillaires.

Bras. — Douleur tractive dans les bras et les doigts. — Grande faiblesse des bras. — Enroidissement des bras et des doigts. — Inflammation érysipélateuse au bras. — Taches jaunes au bras. — Furoncles à l'avant-bras. — Déchirements dans les mains. — Sensation brûlante dans la paume des mains. — Sueur aux mains. — Taches brunes au poignet. — *Crevasses saignantes aux mains ét aux doigts, surtout en hiver. — Engelures et verrues aux doigts. — Roideur arthritique dans les articulations des doigts.

Jambes. — Craquement dans les articulations des jambes. — Crampes dans les cuisses, les mollets et la plante des pieds. — Furoncles aux cuisses et aux jambes. — Tension dans les jarrets. — Lancinations dans le genou. — Faiblesse du genou. — Dartres au genou. — Éruption tubéreuse, pruriante, au mollet. — "Dartre à la malléole. — Sensation brûlante à la plante des pieds. — "Froid aux pieds. — "Gonflement des pieds. — Gonflement chaud à la plante des pieds. — Gonflement et rougeur du talon, avec douleur brûlante et élancements, aggravés en marchant. — "Engelures aux orteils. — "Cors aux pieds. — "Ulcères opiniâtres aux orteils, à bords élevés et à fond rouge, superficiel et suintant.

PHOSPHORUS.


PHOS. — Phosphore. — HARREMANN, — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 438. — Dose usuée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines dans des affections chroniques ; 3 à 5 jours dans les affections sigués.

ANTIDOTES : Camph. coff, n-vom, vinum.

丧

COMPARER AVEC: Acon. agar. alum. amb. amm. ars. bell. bry. colc. carb.veg. caus. cham. chin. cin. colf. con. graph. hell. hyos. iod. ipec. bal. broos. lyc. magn. merc. n-vom. op. petr. plumb. pais. rhus. sep. sil spong. sulf. verstr. — C'est surtout après - Colc. bal. breos. lyc. et rhus. que le phosphore est efficace, lorsqu'il est indiqué; après le phosphore, on trouvers parfois convenable: Petr. rhus.

CLINIQUE. -Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des personnes d'une constitution faible, phthisique, irritable et lymphatique, des personnes aux cheveux blonds, aux yeux bleus, taille svelte et d'un tempérament vif et sensible, ou d'une constitution affaiblie par de longues maladies, ou par des causes



dibilituates qui ont exerci une influence lente, mais continue, sur l'économin vitale : Souffrances par suite d'un refreidissement, ou d'une colère ; Affections rhumatismales et arthritiques chroniques ; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de longues influences nuerbles à l'économie ritale; Affections lymphatiques, scrofulouses et rachitiques; Affections des glandes, anses par suite d'une contusion ; Douleurs ostéocopes, exostoses et autres maladies des os ; Affections hydropiques; Taches hepatiques; Abobs lymphaterees; Fongus hématoide; Hémorrhagie et congestion sanguines; Engulures; Scarlatines, morbilles, et suites facheuses de la répercussion de ces maladies ?; Chlorose ?; Atrophie ?; Furoncles; Engelures; Futures hectiques; Fièvres typholdes?; Affections hypocondriaques et hystériques; Somnambulisme; Congestion à la tête; Vertiges congestifs; Céphalalgies rhumatismales, nerveuses et hystériques; Migraine; Chute des cheveux, par suite de fortes maladies aiguës; Teigne; Ophthalmie et photophobie scrofuleuses; Ophthalmie arthritique; Cataracte; Glaucome; Amblyopie ameurotique et surdité par suite de congestions à la tête; Affections de l'onle, à la suite de maladies nerveness et inflammatoires; Polype au nea; Incammation scrofuleuse du nex; Prosopalgie rhumatismale ou congestive; Odontalgie rhumatismale ou congestive; Dyspepsie, gustralgie, aigreurs et autres affections gustriques; Gastrite: Squirre de l'estomac; Choléra; Cholérne; Collques spasmodiques et flatulentes : Entérite ? : Relâchement chronique du rentre ; Diarrhées, surtout chez des personnes sensibles, d'une constitution faible ainsi que chez les vieillards ou les phthisiques; Diarrhées chroniques et colliquatives; Diarrhées avec phénomines typhoides; Calculs urinaires?; Dyaménorrhée; Stérilité par suite d'un appétit vénérien trop exalté; Vomissement des femmes enceintes; Erysipèle abcès et induration aux mamelles (après l'usage de bell. ou de merc.); Aphonie ; Catarrhe pulmonaire ; Grippe ; Laryngite chronique (après l'usage de : acon. spong. hep.); Disposition au croup, ou souffrances chroniques à la suite de cette maladie ; Pneumonie chronique *Bouffrances asthmatiques*, surtout à la suite d'une pneumonie, ou chez des personnes sensibles; Souffrances phthisiques; Maladies de cour; Manx de reine rhumationaux; Gonflement adémateux des pieda, etc., etc.

Voy. la noté, page 15.

550

STMPTOMMO GÉMÉRAUX. — *Déchirements et élancements arthritiques et rhumatismaux, principalement dans les membres, quelquefois après un léger refroidessement, surtout la nuit, au lit. — Douleur brûlante dans les membres. — Tension, crampes, tresmillement et distornion de plusieurs membres. — Convulsions. — Enroidissement de quelques parties. — Acobs de philisoment




551

et de torpeur dans quelques membres, qui paraissent alors comme morts. - Tremblement des membres, surtout pendant le travail. – «Facilité à se donner des tours de reins. — *Bouillonnement de sang et congestions, quelquefois avec pulmtion dans tout le corps. — *Saignement par différents organes. — *Faiblesse et brisement des articulations, surtout des genoux. - Grands faiblesse et lassitude paralytique, quelquefois subite, surtout le matin, au lit, ou pour peu qu'on dit marché. — Accès d'évanonimement. — Sensibilité excessive de tous les organes. — *Lassitude hystérique. — *Abattement général et faiblesse nerveuse. — *Pesanteur des membres et paresse. — *Paralysies, avec fourmillement dans les parties affectées. - *Amaigrissement et consomption. — *Engorgement des glandes. — *Im-possibilité de rester à l'air, surfout quand il fait froit. — Grande disposition à prendre des refroidissements, qui, souvent, sont suivis de mal à la tête et aux denta, coryza avec fièvre, frissonnement, etc. — Douleurs dans les membres aux changements de temps. — La plupart des symptômes se manifestent le motis et le soir, au lit, comme aussi après le diner, tandis que plusieurs autres apparaissent au commencement du repas, et se dissipent après.

Pour. — Desquamation de la peau. — Plaques excoriées à la peau, avec crevasses et élancements. — *Taches rondes, dartreuses, par tout le cosps. — Dartres sèches, furfuracées. — *Taches jaunes ou brunes à la peau. — *Taches cuivrées ou bleuâtres, comme des pétéchies. — *Taches cuivrées après l'abus du mercure, avec desquamation et exfoliation de la peau. — *Furencles. — *Empstoses, avec douleurs nocturnes. — *Abcès lymphatiques, *avis alcères fistuleux, à bords calleux, sécrétant un pus fétide et incolore, et fièvre hectique. — *Fongus hématoide. — *Saignement abondant par de petites blessures. — *Engelures et cors aux pieds, quelquefois douloureux. — Four-

millement à la peau. — Éruptions urticaires.

Semmeil. — *Forte envie de dormir, le jour, comme par somnolence. — Sommeil stupéfiant. — *Sommeil tardif, le soir, et insomnie nocturne, ou réveil fréquent avec difficulté de se rendormir, à cause d'inquiétude, avec angoisse, jactation, chaleur, vertige et bouillonnement de sang. — Impossibilité de rester couché sur le dos ou sur le côté. — *Sommeil non réparateur; le matin, il semble qu'on n'a pas asses dormi. — La nuit, vertiges avec nausées, sensibilité douloureuse des membres, maux d'estomac et de ventre, asthme suffocant et spasmodique, etc. — Réveil fréquent, avec sursauts et effroi. — Pendant le sommeil, tressaillement des membres, cris, paroles, pleurs, plaintes, lamentations et gémissements. — *Réves anxieux, pénibles, effrayants et horribles, ou vils et inquiels. — Rêves d'animaux qui mordent, de brigands, d'incendie, des affaires du jour, d'hé-



morrhagies, de morts, de querelles, de vermine, etc. — Cauchemar. — •Somnambulisme.

Flèvre. — *Horripilations et *frissons*, surtout *le soir, au lit*, quelquefois avec baillements, suivis ou non de chaleur. - Froideur des membres. — Frissons, suivis de chaleur, avec soif et sueur, surtout la nuit et l'après-midi. — *Chaleur fugace =ou anxieuse. - *Chaleur nocturne. - *Fièvre hectique, -avec chaleur sèche vers le soir, surtout & la paume der mains, sueurs et diarrhees colliquatives, rougeur circonscrite des joues, etc. — *Pouls accéléré et dur. — Sueur nocturne et visqueuse. — * Sueur matutinale. — • Fièrre typhoïde avec état putride, sommeil soporeux,

bouche ouverte, lèvres et langue sèches et noires.


Moral. — Tristesse mélancolique et mélancolie, quelquefois avec pleurs violents, ou interrompus par des attaques de rire involoutaire. — *Angoisse et inquiétude, surtout en étant seul, -ou par un temps d'orage, principalement le soir, avec disposition à la peur et épouvante. — *Angoisse sur l'avenir, -ou sur l'issue de la maladie. - Disposition à s'effrayer. - *Tristesse hypocondriaque. — Dégoût de la vie. - *Grande irascibilité, colère, emportementa et violence. - Pleurs et rires involontaires et spasmodiques. — Misanthropie. — *Répugnance pour le travail. Impudence, comme par aliénation. --- Grande indifférence pour toutes choses, -et même pour les siens. — Grand oubli, surtout le matin. --- Grande affluence d'idées difficiles à ordonner.

Etat de clairvoyance.

Tôte. - *Obnubilation et étourdissement, surtout le matin. -*Accès fréquents de vertige de diverses natures et à différentes heures du jour, surtout le matin, dans le milieu de la journée et le soir, au lit. – Vertige en étant assis; Il semble que le siège s'élève, avec humeur hypocondrisque. — *Vertige avec nausées et douleurs pressives dans la tête. - Vertige opiniatre. -*Vertige avec perte des idées. — Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements, et douleurs battantes, tressaillantes. — Maux de tête nocturnes, précédés de nausées, le soir. — Mal de tête après une contrariété. - *Mal de tête, le matin. -- Fuiblesse de la tête, qui est fatiguée par la musique, le rire, une marche lourde, etc., etc. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau. - *Mal de tête étour dissant, quelquefois avec fort bouillonnement de sang, et pâleur du visage. — *Sensation de pesanteur et de plénitude, et pression dans la tête. — Déchirement dans la tête, et surtout dans les tempes, ou semi-latéral. - Lancinations à diverses parties de la tête, surtout le soir. — *Congestion à la téle, avec battement, bourdonnement, chaleur et sensation brûlante, surtout au front. - Sensation de froid dans la tête. --Les maux de tête sont soulagés au grand air. — Elancements extérieurs au côté de la tête. — Sensation pénible, comme si la peau du front était trop tendue. — Facilité à se refroidir la tête,

552






avec sensation, en plein air, comme si le cerveau se congelait. -*Prurit au cuir chevelu. — *Chute des chereux, surtout audessus des oreilles. — *Croûtes sèches, -et écuilles abondantes
au cuir chevelu. — Exostoses à la tête.

Orailles. — Otalgie. — Déchirements aigus et élancements dans les oreilles et à la tête. — *Battement et pulsation dans les oreilles. — *Congestion de sang aux oreilles. — Sensation de cécheresse dans les oreilles. — Écoulement jaune par les oreilles, alternant avec surdité.—*Sensibilité excessive de l'oule. — Fort retentissement des sons et surtout des paroles, dans les oreilles, avec résonnement dans la tête. — *Surdité, surtout pour la parole humaine.—Murmure devant les oreilles.—*Bourdonnement

d'oreilles.

Mes. — Nes rouge, gonflé et douloureux au toucher. — *Croûtes sèches et dures dans le nez. — Polype au nez. — Excoriation des angles du nez. — Narines ulcérées. — Éphélides abondantes sur le nez. — *Exhalaison fétide par le nez. — *Mouchement de sang. — Épistaxis, quelquefois pendant la selle, ou le soir. - *Sensibilité excessive de l'odorat, surtout pendant les maux de tête. — Absence d'odorat. — *Sécheresse pénible du nez. — *Coryza sec ~et fluent, avec mal de gorge et embarras de la tête. — *Ecoulement continuel par le nez, de mucosités jaunes, verdâtres. — Éternument fréquent. — *Obturation du nez, surtout le matin.

Visage. — *Visage pâle, hâre, sale, terreux, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu. — Pâleur alternant avec rougeur du risage et chaleur fugace. — *Rougeur et chaleur brûlante des joues. — *Bougeur circonscrite des joues. — *Bouglissure de la face, surtout autour des yeux. — Transaillement des muscles de la face. — *Tension de la peau du visage, quelquefois d'un seul côté. — Desquamation de la peau du visage. — *Bensibilité dou-



lourense d'un seul côté du visage, en ouvrant la bouche. —

*Élancements douloureux, tractifs et déchirants dans les os du visage, surtout le soir ou la nuit, au lit, ou après le plus léger refroidissement. — *Les douleurs à la face se renouvellent en parlant, ou au moindre contact. — Eruptions de boutons et de croûtes à la face. — *Lèvres bleuâtres. — *Lèvres sèches, "couvertes de croûtes brunâtres. — Lèvres gercées. — Dartres et boutons autour de la bouche. — Ulcération de la commissure des lèvres. — Crampe de la mâchoire. — Engorgement des glandes sous-maxillaires.

Dents. — *Odontalgie tractive on déchirante, ou bien rongeante, térébrante, pulsative, tressaillante et lancinante, surtout au grand air, ou le soir et le matin, quelquefois aussi la nuit seulement, surtout à la chaleur du lit, ou bien au contact des aliments chauds. — *Maux de dents, après le plus léger refroidissement, avec salivation. —Dents douloureuses le matin, pendant la mastication, comme par ulcération. — Carie des dents. — Fort vacillement des dents. — Saignement des dents. — Grincement des dents. — Sensibilité douloureuse, inflammation, décollement, *ulcération, *gonflement et saignement facile des gencives.

Bouche. — *Excoriation de la bouche. — *Accumulation de salive,

-salée ou douceatre, ou sécheresse excessive de la bouche. —

*Mucosités visqueuses dans la bouche. — *Crachement de sang.

-- Vésicules purulentes au palais. — Peau ridée au palais, comme si elle allait se détacher. - *Langue sèche, chargée d'un enduit

brun noirâtre. — *Langue blanche.

Gorge. — *Sécheresse de la gorge, jour et nuit. · Pression dans la gorge. — *Cuisson, grattement et douleur brûlante dans la gorge. — *Rendelement de mucosités, le matin. — Douleur d'ex-

coristion dans la gorge. — Gonflement des amygdales.

Appétit. — Goût pâteur ou comme du fromage. — Amertume dans la bouche et la gorge, avec âpreté. — Goût aigre dans la bouche, surtout après le repas. — Perte du goût. — Absence d'appétit par une sensation de plénitude dans le gosier, et forte soif. — Désir excessif de choses rafraîchissantes. — Faim après le repas. — *Boulimie, même la nuit. — Après le déjeuner, sensation de fadeur et de mollesse au ventre. — Après le repas, envie de dormir et paresse, chaleur et anxiété, sensation brûlante dans les mains, aigreurs plus pronoucées, pression et plénitude dans l'estomac, la poitrine et le ventre, accompagnées de gêne de la respiration, vomis sement des aliments, ballonnement du ventre, ou mal à la tête, rapports, hoquet, faiblesse, coliques et beaucoup d'autres souffrances.

Estomac. — Renvois avec douleur dans l'estomac, comme si quelque chose allait s'en arracher. — La fumée du tabac produit des nausées et des battements de cœur. — *Renvois abondants, généralement à ride, surtout après le repus, et après avoir bu, quel-

554





quefois aussi avortés, ou spasmodiques, ou bien aigres, "ou avec gout des aliments.-- *Régurgitation aigre des aliments.-- *Pyrosis.—Hoquet.—*Nausées de déverses natures, surtout le matin, ou le soir, ou bich après le repas. — Nausées, aves forte faim ou soif, se dissipant en mangeaut, ou en buvant de l'eau. — «Ecoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, surtout après avoir mangé des acides. — *Vomissements avec fortes dou-leurs à l'estomac, et grande faiblesse. — Vomissement verdâtre ou noiratre. — Vomissement de matières acides. — *Vomissement des aliments, surtout le soir. — *Vomissements de bile, la nuit, ou de mucosités, quelquefois avec froid et torpeur des mains et des pieds. — Vomissement de sang. — Vomissement avec diarrhée .- Douleur d'estomac, surtout au toucher. - Douleurs violentes à l'estomac, soulagées en buvant froid. 🕳 ° Sensotion de rétrécissement du cardia; les aliments, à peine ingérés, remontent dans la gorge. -- *Plénitude d'estemac. - Elancemente et pression dans l'estomne, surtout après le repus, avec vomissement des aliments.— *Scrobicule dealoureux au toucher, le matin anasi. — Sensation de froid, ou chalcur, et *sensation brülants à **l'est**omac et au scrobicule.—Inflammation d'estomac. - *Bouleur crampoide, sensation de griffement -et contraction dans Pestomac, quelquefois avec étouffement.--- Malaise général, mais qui est ressenti plus particulièrement à l'estomac, les maux d'estomac se manifestent surtout après le repas, ainsi quele soir et la nuit.

Ventre. — Elancements dans la région hépatique. — *Ballonnement du ventre, surtout après le repas. — Ventre dur, tendu. — Douleur contractive dans le ventre. — * Coliques spasmodiques. — *Pincements, tranchées et déchirement dans le ventre, surtout le matin, as lit, la nuit et le soir, et souvent avec envie presente d'aller à la selle et diarrhée. — Maux de ventre lancinants, quelquefois avec phieur du vienge, friesons et maux de tête. — Sensution de froid, avec chaleur *et sensation brûlante dans le ventre. - Inflammation des intestins. — *Sensation de faibleme et de vide dans le ventre, comme une sorte d'atonie. — Malaise dans le ventre, après le déjeuser. — Pression comme si tout affinait vers les côtés du ventre. — *Hernie inguinale. — *Taches jaunes an ventre. — Gonflement et suppuration des glandes inguinales. — *Incorcération de flatuoestés. — *Coliques flatulentes, profondément dans le bas-ventre, empirées en étant couché, avec grondement et borborygmes.

Selles. — *Constipation. — Selles dures, lentes, interrempues, difficiles à évacuer et par trop sèches. — *Envie pressante et pénible d'aller à la selle. — *Laxité prolongés du ventre. — *Selles de la consistance de la bouillie. — *Diarrhées séreuses. — *Diarrhées avec chute des forces. — *Diarrhées muqueses. — *Diarrhées sanguinolentes. — *Gelles pan diagrées. — Selles per-



556


dâtres, grises ou noires. — «Selles involontaires. — «Écoulemen de mucosités par l'anus qui reste constamment ouvert. — «Ténis — ou ascarides du rectum, pendant les selles. — *Écoulement de sang pendant la selle. — Après la selle; pression, douleur brû lante, et ténesme à l'anus et au rectum, avec grand affaissement — *Prurit et élancement à l'anus et au rectum. — *Sortie et saignement facile des boutons hémotrhoidaux du rectum et de l'anus, avec douleur d'excoriation en étant assis ou couché.

Urines.— Sécrétion plus abondante d'une urine aqueuse.—Émission fréquente d'une urine peu abondante. — Urine avec sédiment blanc, séreux, sablonneux et rouge, ou bien jaune. — *Urines troubles, avec sédiment briqueté. — Urines pâles. aqueuses ou blanchâtres. — Pellicule irisée sur les urines. — Pissement de sang. — *En urinant, cuisson et sensation brûlante. — *Tension et tressaillement, ou douleur brûlante dans l'urèthre, hors le temps de l'émission des urines.

Parties viriles. — *Forte exaltation de l'appétit rénérien, avec désir constant du coît. — *Érections trop violentes, le soir ou le matin. — *Pollutions par trop fréquentes. — •Éjaculation sans énergie et trop prompte pendant le coît. — Douleurs dans les

testicules et gonflement du cordon spermatique. Bègles. — Déchirement dans les parties génitales et élancements, depuis le ragin jusque dans la matrice. --- *Règles trop hâtires et trop abondantes, ou trop peu abondantes et séreuses. - º Ecoulement de sang, par la matrice, pendant la grossesse. — Règles de trop longue durée, avec maux de dents et coliques. — Avant les règles, saignement abondant des ulcères, oflueurs blanches, envie d'uriner et pleurs. — • A l'apparition des règles, tranchées incisives, douleurs dans le dos et vomissements. — Après les règles, faiblesse, carcles bleus autour des yeux et anxiété. — Règles de trop courte durée. — *Retard des règles. — *Pendant les règles, maux de tête lancinants, fermentation dans le ventre, expectoration de sang, douleurs dans le dos, brisement des membres, grande lassitude et fièrre, ou battement de cœur, friecons, gonflement des gencives et de la joue, et beaucoup d'antres souffrances. — *Leucorrhée* cuisante, corrosive. — «Nodosités dures et douloureuses dans les seins. — *Inflammation érysipélateuse des seins, avec gonflement, douleurs brûlantes, élancements. --*·Abcès dans les seins*, même avec ulcères fistuleux.

Larynx. — *Enrouement et grattement dans la gorge, equelquefois prolongés. — *Aphonie, de manière à ne pouvoir chuchoter
que très-bas, en parlant. — *Catarrhe avec toux, efièvre, et
crainte de la mort. — *Sensibilité très-douloureuse du larynx,
qui ne permet pas de parler. — *Grande sensibilité du larynx,
avec douleur brûlante. — Sécheresse dans la trachée-artère et la
poitrine. — *Expectoration de mucosités par le larynx. — *Toux
proroquée par un chatouillement et une démangenison dans la



558 PHOSPHORUS. — PHOSPHORI ACIDUM.

-- *Gonflement des mains, même la nuit. -- Chaleur des mains,
-- Froid aux mains la nuit. -- Contraction et tresmillement des doigts. -- Poigts morts. -- Paralysie des doigts. -- *Torpeur du bout des doigts. -- Peau gercée aux articulations des doigts.

- Engelures aux doigts.

Jambes. — Douleur d'ulcération dans les fesses, en étant assis. — Douleur de lux**ation d**ans les articulations coxo-fémorales, et celles des genoux et des pieds, avec chaleur extérieure. -Fatigue douloureuse et pesanteur des jambes. -- Sensation brûlante dans les jambes et les pieds. — Tension et crampes dans les jambes, surtout dans les genoux. — Secousses dans les jambes, le jour et la nuit, avant de s'endormir. - *Traction et déchirement dans les genoux, jusque dans les pieds.—*Faiblesse paralytique dans les jambes eet roideur arthritique des genoux. — Darires au genou. — Taches comme des pétéchies aux jambes. — Exostose au tibia. — Tressaillements dans les mollets. — Déchirement et élancements dans les pieds, surtout la nuit. - *Gonfiement des pieds, ou sculement des malléoles, surtout le soir, ou après une promenade, quelquefois avec douleur lancinante. - Luxation facile de l'articulation du pied. — *Froid aux pieds, surtout la nuit. - Douleur d'ulcération à la plante des pieds, en marchant. -- Secousses dans les pieds, le jour et la nuit, avant de s'endormir. --- Torpeur du bout des orteils. -- Inflammation et rougeur de la partie charnue du gros orteil, avec lancinations. -- Engelures et cors aux orteils.


PHOSPHORI ACIDUM.

PHOS-AC. — Acide phosphorique. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 139. — Doses usitées : 3, 20, 30. — Durés d'action : 3 à 4 jours, dans les maladies aigués ; 6 à 7 semaines dans les affections chroniques.

ANTIDOTES: Camph. coll. — On l'emploie comme antidote de: Lach.
COMPARER AVEC. Asa. beil. caus. chin. coll. con. ign. lach. lyc. merc. op.
Phus sep. staph. sulf. thui. veratr. — C'est surtout après: Lach. et
rhus. que l'acide phosphorique sera efficace, lorsqu'il se trouvera indiqué.
— Après l'acide phosphorique convispment quelquefois: Chin. tach. rhus.
veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Arthrite invétérée; Arthrocace; Faiblesse phthisique et nerveuse par suite de fortes maladies aiguës, par perte d'humeur et autres causes débilitantes, surtout lorsqu'elles ont rapidement miné une constitution forte jusqu'alors; Souffrances par suite d'onanisme;





PHOSPHORI ACIDUM.


Faiblesse des jeunes gens qui grandissent rapidement; Suites fécheuses d'un chagrin avec soucis et inquiétude ou d'un amour malheureux, etc.; Dartres; Ulcères invétérés; Varices; Scarlatine et suites fâcheuses de la répersussion de cette maladie; Fièvres by-phoides, Fièvres nerveuses, lentes, par suite de chagrin; Maladies des os; Chute et grisonnement des cheveux par suite de chagrin; Cholérine; Diarrhées, surtout après un chagrin, ou après la répercussion de la scarlatine; Diarrhées épidémiques; Diabète sucré; Pollutions par suite d'onanisme; Impuissance par suite d'excès dans le cott; Dysurie des femmes enceintes, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tructions, et déchirements tressaillants dans les membres. — Douleurs crampoides, pressivés. Sensation comme si on ráclait avec un conteau sur le périoete. — Douleurs ostéocopes, brûlantes, déchirantes, la nuit. — *Gonfloment des os. — *Sensation brûlante dans toute la partie inférieure du corps, quoique les membres soient froids au toucher. — Gonflement des glandes. -- *Brisement dans les membres et les articulations, comme par une paralysie ou par la croissance, "surtout le matin et le soir. -- Engourdissement et faiblesse des membres. — Pesanteur dans les membres et les articulations, avec grande paresse. — Grande fatigue après la marche. — *Grande faiblesse générale, physique ou nerveuse, avec forte disposition à la transpiration, le jour, ou avec sensation brûlante dans le corps. — Amaigrissement, avec teint maladif et yeux cernés. Fort bouillonnement du sang, avec grande agitation. — Les douleurs sont aggravées dans le repos, et soulagées par le mouvement, et celles qui se manifestent la nuit sont soulagées par la pression.

Peau. — Insensibilité de la peau. — Fourmillement sous la peau. — Taches rouges et brûlantes aux membres. — *Éruption comme la scarlétime. — Inflammations érysipélateuses. — Éruption de petits boutons et de méliaires séunies en groupe, et rouges. — — Éruptions boutonneuses avec douleur brûlante ou d'excoriation. — Vésicules galeuses. — Dartres humides et sèches. — Cors aux pieds, avec élancements et douleur brûlante. — Enguignes. — *Condylomes. — *Furoncles. — *Ulcères lisses, indolesses, avec sécrétion d'un pus sale et fond dentelé. — *Ulcères pruriteux.

Sommell. — Forte envie de dormir, le jour, le soir de bonne heure, et le matin, avec difficulté de s'éveiller. — Sommolence. — Sommell tardif et insomnie nocturne, à cause d'agitation et de chaleur sèche. — En s'endormant, apparition de chiffres devant les yeur. — Sommel profond. — Tressaillement et mouvements automatiques des mains, gémissement, paroles et chant, ou six tantité.



PHOSPHORI ACIDUM.

560

riant, tantôt pleurant, pendant le sommeil, avec your moitié ouverts et convulsés. — Rêces anxieux de morts, avec peur au réveil. — Rèves lascifs.

Flèvre. — Horripilation et friesons, quelquefois avec grelottement, ou avec froid aux mains et aux doigts, généralement le soir, et sans soif. Sensation de froid, avec frieson et froid dans le ventre. — Chalcur fébrile le soir sans soif, avec angoisse et grande activité de la circulation du sang. — Frissons alternant avec chalcur. — °Fièvre matigne avec grande faiblesse, apathie, stupidité, aversion pour la parole, diarrhée, etc. — *Sueurs nocturnes. — Sueurs matutinales.

Moral. — Envie de pleurer, comme par nostalgie. — *Tristesse et inquiétude sur l'avenir. — *Recherches inquiètes sur sa maladie. — Agitation et précipitation. — *Morosité taciturne et répugnance pour la conversation. — *Grande indifférence. — Impossibilité de supporter le bruit ou la conversation. — *Esprit . obtus et paresseux, sans imagination. — *Manque d'idées et inap-

titude aux travaux de tête. — Illusions des sens.

Tête. — *Tête entreprise, comme après l'ivresse, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige étourdissant, en étant debout ou en marchant, surtout le soir. — Maux de tête, le matin. — Maux de tête continuels qui obligent à se coucher, aggravés jusqu'à devenir insupportables par la plus légère commotion, ou par le bruit. — Pesanteur de la tête, comme si elle était pleine d'eau. — Pression crampoïde et dure dans la tête, aggravée en pressant dessus, et en tournant la tête, comme aussi par la méditation, et en montant un escalier, mais surtout après minuit, dans la partie de la tête sur laquelle on repose. — Compression dans le cerveau. — Maux de tête déchirants. — Loncinations dans les tempes, ou au-dessus des yeux. — Tressaillements ou secousses, coups et martellement dans la tête. — Douleurs tractives dans les os de l'occiput. — C'heveux gris, flasques, comme de l'étoupe. — Chute des cheveux.

Youx. — Yeux ternes, vitreux, abattus. — Pression dans les yeux, avec sensation comme si le globe de l'œil était trop volumineux.

*Froid du bord interne des paupières. — Douleur brûlonte dans les paupières et dans leurs angles, surtout le soir à la lumière. — *Inflammation des yeux, avec veines injectées dans les angles internes. —Inflammation des paupières. — Orgelet. — Tache jaune à la selérotique.
*Larmoiement. — Pupilles dilatées. — Regard fixe. — Vue trouble, comme à travers un brouillard. — Muopie. — Bande noire devant les yeux.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, quelquefois avec traction dans les joues, les mâchoires et les dents, aggravés seulement par le son de la musique.—Tractions crampoldes dans les oreilles.—*Impossibilité de supporter la musique, le bruit et la conversation. — l'orte répercussion de tous les sons dans l'oreille.



PHOSPHORI ACIDUM

561

- Surdité, pour les sons éloignes. - Cris dans l'oreille, en se mouchant.

Hez. — Gonflement du dos du nez. avec taches rouges. — Croûtes sur le nez. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — Exhalaison fétide par le nez. — Ecoulement de pus par le nez. — Épistaxis. — Coryza violent, avec rougeur du bord des narines. — Coryza fluent, avec toux et douleur brûlante dans la poitrine et dans la gorge.

Visage. - Visage pale, have, avec yeux caves, bordes d'un cercle bleu, et le nez effile. - Traction dans les joues, et les machoires. Traits irreguliers. Chaleur à la face, avec tension de la peau

du asage, comme si elle etart anduite de blanc d'œuf desséché.

"Gos bautous a la face. "D'uleur brulante dans les joues.

*Dartres humides et croûtenses aux joues, aux levres et aux commes un sides levres Levres convertes de crevasses suppurantes, avec d'uleur d'exercitation — Boutons et croutes sur la partie rouge des lèvres — Boutons au menton — Gonflement des glandes sous-maxillaires — Douleur dans la machoire inférieure, comme si elle était debeitee.

Dents Odontalgie, avec d'inleur dechirante, aggravec a la chaleur du lit, et par les choses froides ou chaudes. — D'inleurs violeutes dans les deuts meisives, la nuit **Dents jaunes - **Gencues saignantes, gonflees et décollées. N'idosite douloureuse


Bouche. — Secheresse de la bouche, sans soif. — Mucosités risqueuses, tenaces, dans la bouche et sur la langue Élancements et sensation brûlante sur la langue. — La nuit, on se mont la langue, sans le vouloir — Gonflement de la langue, avec deuleur en parlant. — Nasillement. — Cuissen dans l'interieur de la bouche pendant la mastication d'aliments solides — *Excoriation et ulceration du roile du palais, avec douleur brulante.

Gorge. It uleur de accornation dans la gorge, avec cuisson et élancements, surtout pendant la deglutition (des aliments) — Douleur contractive dans la fossette du cou. Renaclement de mucosites visqueuses.

Appetit — Goût putride, acide, herbace — Arriere-goût prolongé des aliments et surtout du pain. — Repugnance pour le pain qui semble amer. — *Forte soif de lait freid, ou de biere, ainsi qu'en general *de choses rafraichissantes et succulentes, le pain paraît trop sec. — *Soif inextinguible, provoquee par une sensation de scoheresse dans tout le corps — Les acides provoquent des renvois amers et antres incommodites. — *Après le repas, pression, con sensation d'un balancement dans l'estomac, cavec imbarras de la tête, mulaise, plenitude et envie de dorture, ou abatt ment, e mine s, en allait s evanour.

Estomac. - Remois acides, incomplets on brulants. *Nausées continuelles, clans la gorge. - *Nausées qui forcent à se con-

123



PHOSPHORI ACIDUM.

562

cher. — Vomissement des aliments. — Vomissement acide. — Pression dans l'estomac, comme par un fardeau, en étant à jeun, et après des aliments quelconques, comme aussi en touchant le creux de l'estomac. — Sensation de froid ou sensation de brûlement à l'estomac.

Ventre. — Pression crampoïde, avec angoisse, dans les hypocondres, et surtout dans le foie. — Sensation et pesanteur du foie. — Élancements dans les régions du foie et de la rate. — Ventre ballonné et tendu. — Contractions dans le ventre, — des deux côtés de la région ombilicale. — Maux de rentre crampoïdes, surtout dans la région ombilicale. — Élancements et tranchées dans le ventre. — *Sensation brûlante dans le bas-ventre. — Gonflement dans le ventre, comme s'il y avait de l'eau, surtout au toucher et en se pliant en avant ou en arrière. — *Grondement fréquent et borborygmes dans le rentre. — *Production et expulsion de flatuosités abondantes, surtout après avoir mangé des acides. — Gonflement des glandes inguinales.

Selles fréquentes. — *Selles diarrhéiques non affaiblissantes. — *Selles diarrhéiques non affaiblissantes. — *Selles diarrhéiques, muqueuses, gris blanchâtre. — *Selles diarrhéiques séreuses on non digérées. — Selles involontaires de la consistance de la bouillie, avec sensation comme si on allait expulser un vent. — Pendant la selle, sortie des boutons hémorrhoidaux du rectum. - Après la selle, ténesme. — Déchirement,

cuisson et prurit à l'anus et au rectum.

Urines. — Envie pressante d'uriner, avec émission d'urine moins abondante, pâleur du visage, chaleur et soif. *Émission fréquente et abondante d'une urine aqueuse, qui dépose immédiatement un nuage épais et blanc. — *Urine comme du lait, avec des morceaux sanguinolents et gélatineux. — *Urines fétides. — Flux d'urine, avec douleurs crampoldes dans les reins. — Besoin pressant et irrésistible d'uriner. — *Urines comme dans le diabète sucré. — Angoisse et inquiétude avant d'uriner. — *Émission d'urine la nuit. — *Douleur brûlante dans l'urèthre, pendant et après l'emission des urines. — Constriction crampoide dans la vessie. — *Douleurs incisives dans l'urèthre, en urinant. — *Gonorrhées chroniques, avec laxité des parties et de la membrane muqueuse.

Parties viriles. Douleurs lancinantes dans le gland. — Fourmillement et vésicules suintantes autour du frein. — *Condylomes. — Éruption à la verge et au scrotum. — Gonfiement
inflammatoire du scrotum. — Douleur des testicules au toucher.
— Douleur rongeante dans les testicules. — Gonfiement des testicules, et cordon spermatique gros, dur et tendu. — Absence
d'appétit vénérien. — Érections fréquentes sans désir du colt. —
*Pollutions fréquentes et très-débilitantes. — Écoulement de

sperme, par les efforts que l'on fait pour aller à la selle.



PHOSPHORI ACIDUM.

Règles. — Pendant les règles, douleurs hepatiques. — Leucorrhée jaunâtre, prurfante, après les regles. Pallonnement de

l'uterus, comme par des gaz

Larynx. Fort enrouement et apreté dans la gorge. — Douleur contractive dans la fossette lu cou, qui retrécit la gorge. — *Toux provoquée par un chatouillement et un grattement dans le larynx, ou au-dessus de l'épigastre, seche le soir, et avec expectoration blane jaunâtre, le matin *Toux avec romissement des aliments, et mal de tête. — Expectoration pendant la toux, avec odeur et gout herbaces. Toux, avec expectoration purulente et douleurs de poitrine:


Poitrine. — Haleme coarte et impossibilité de parler d'une manière soutenue, par faiblesse de la poitrine. — Oppression crampoide et contractive de la poitrine, comme si elle était serrée. — Faiblesse dans la poitrine, après avoir parle. — Pression dans la poitrine, souvent crampoide ou incisive. — Lancinations dans

les cotes de la portrine.

Tronc. Eruption douloureuse au toucher, au dos, aux omoplates, au cou et a la poitrine. — Fourmillement dans le dos et aux reins. — Tension et traction crampo de dans les muscles du cou, surtont en remuant la tête — Miliaire au cou. — Furoncles sous l'aisselle.

Bras. - Pression crampoide aux bras, aux mains et aux doigts. —
Tractions et dechirements tressaillants dans les bras et les doigts — Eruptions l'outonneuses aux bras. — Douleurs tractives, incisives, dans les articulations des coudes, des mains et des doigts. Faiblesse et trembiement des bras. — Ganghon sur le dos de la main — l'eau des mains et des doigts, seche, ridec. aride. — Doigts morts, quelquefois d'un seul côté et d'une manière bien circonscrite. — Lancinations dans les doigts et leurs articulations.

Jambes - Conflement et furoncles aux fesses. Douleurs de brisement dans les hanches et les cuisses, surteut en marchant et en se levant de son siège. Crampe dans l'articulation corofemorale, avec dechirement dans toute la jamba, insupportable en etant assis, et pendant le repos. Douleurs pressires, crainpordes, dans les carses, les jarabes, les pieds et les orteris. Dechirement dans toute la jambe, avec pesanteur dans les articulations Faiblesse des jambes, au point de tomber en faisant un faux pas, - Decharement brülant dans le tibia, la nuit. Bontons any genoux -t aux jambes, qui devienment confinents et se transforment en ulceres saign int facilement - "Ulceres pruriteux aux jambes - Sensation l'illante dans les pieds et a la plante des pieds, avec excentation entre les intels ... "Genflement despieds "Sucur atta preds Cors aux pieds gelures aux orteils Gonflement de l'artreulation du gros orteil, avec battement brulant. "t douleurs incisives et sourdes, au toucher.




564

PHYTOLACCA.

PHYT. - Phytolacca decandra. - Voy. HALE, Remêdes américains.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament a été employé jusqu'ic avec succès coutre : - Rhumatisme chronique, aggravé pendant le mauvais temps: Rhumatisme syphilitique du périoste, avec glandecervicales et axillaires enflées, et aggravation nocturne. — Opisthotonos; Tétanos; Triamus. — Syphilis congéniale, avec affection de la gorge, ulcères aux parties génitales, douleurs violentes dans les bras et les jambes, avec gonflement codemateux, taches d'un ronge pale aux extremités, à la face et au cou: Ophthalmie syphilitique, avec enflure rouge bleuktre des paupières, surtout à gauche. granulations et douleur autour de l'orbite. — Parotite, avec formation d'abcès et fistules; Catarrhe nasal, avec obturation d'une narine, écoulement de l'autre et obturation complète en allant à cheval. - Angine granuleuse, avec sécheresse, sensation d'une boule ardente dans la gorge, en avalant, étranglement et incapacité d'avaler des liquides chauds : Angine conenneuse, avec grande prostration, impossibilité de rester debout ou de se redresser dans le lit, et violentes douleurs dans la tête, le dos et les membres. --Constipation chronique, avec douleurs passant comme des coups. le long du périnée jusqu'au milieu de la verge. — *Dysménorrhée* très-douloureuse, chez des femmes manifestement stériles ; Ménorrhagie, avec augmentation simultanée des larmes, de la salive, de la bile et des urines. -- Gonflement douloureux des mamelles, empêchant le lait de sortir ; Abcès dans les mamelles, avec fistules, ulcères d'un mauvais aspect et sécrétion d'un pus sanieux; Excoristion très-douloureuse des mamelons; Anciennes cicatrices aux mamelles, empêchant le lait de bien sortir. — Sciatique, avec douleurs pressives, lancinantes et tiraillantes au côté extérieur de la cuisse, et aggravées par le mouvement et la pression extérieure, ainsi que la nuit.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Toutes les douleurs ont un caractère névralgique, et s'aggravent par le mouvement et la pression; les douleurs dans les extrémités affectent toujours les parties du côté extérieur. — Beaucoup de symptômes, surtout ceux de la tête, s'amélioront après le déjeuner; quelques souffrances abdominales disparaissent pendant la nuit; les douleurs de tête s'aggravent après le repas de midi; ceux de la poitrine, après mi-



ວັບວັ


nuit; ceux de la bouche, de la gorge et de l'estomac, ainsi que les symptômes des yeux et des paupières, le matin ; la vue est pire, le soir. — Des douleurs internes se jettent parfois subitement sur les extrémités. — Baillements fréquents et somnolence : sommeil agité, avec position couchée sur le ventre : nausée. étant réveillé, la nuit. - Furoncles : derrière l'oreille et sur le dos; pustule derrière l'oreille; éruption de petites taches, comme des lentilles et élevées sur la poitrine, avec prurit violent ; beaucoup de douleurs sont suivies de prurit et de brûlement ; douleurs dans d'anciennes cicatrices; suppuration dans des tumeurs indolentes. — Plusieurs symptômes sont accompagnés de chaleur. — Indifférence complète pour la vie, et grande répugnance pour les affaires du jour, le matin, en se réveillant.

Tôte. — Vertige avec obscurcissement des yeux. — Sensation d'excoriation au fond du cerveau. -- Douleur dans toute la tête: douleur sourde, continuelle, dans le sinciput, particulièrement après le repas de midi, ou avec oule plus fine. -- Mal de tête avec nausée : au-dessus des sourcils; en marchant. — Aggravation des maux de tête en regardant en bas, ou en se baissant, --Cerveau comme meurtri, en descendant d'un endroit élevé sur le sol. — Affection catarrhale de la tête. — Douleur pressive, surtout dans les tempes, le sinciput et au-dessus des yeux. — Pression dans les tempes, avec sensation de constriction dans la région précordiale, comme au début d'un mal de mer. — Sensation d'excoriation dans la tête, comme si une migraine allait éclater, pire à droite et aggravée par le temps humide. — Douleurs fugaces, changeant de place, dans plusieurs parties de la tête,

mais surtout du côté droit. — Chaleur dans la tête.

Youx. — Pression autour et en dedans des yeux, comme s'ils étaient trop volumineur. --- Brûlement et cuisson dans les yeux, surtout à gauche, avec larmoiement abondant; cuisson dans les angles internes, pire à gauche, et fortement aggravée, le soir, à la lumière du gaz. — Sensation comme par du sable dans les yeur, surtout sous la paupière gauche, avec larmoiement de cet œil. — Sensation dans les yeux et le nez comme si un rhume allait survenir. — Impossibilité de fermer les yeux sans douleur, comme par excoriation, toute la matinée. — Agglutination nocturne des paupières. — Larmoiement continuel des deux yeux, amélioré au grand air. — *Gonfiement bleu rougeatre des paupières, plus ort à gauche et le matin. — Photophobie, le matin. trouble. — Presbytie.

Oreilles et Nez. — Douleurs dans les oreilles, surtout du côté droit ; trompe d'Eustache comme bouchée, du côté gauche, avec bruissement dans l'oreille et sensation comme ai l'oule était diminuée, tandis qu'elle est en réalité beaucoup plus fine; oule plus fine, avec douleur dans le sinciput. — Coryan finent. — Écoulement muqueux d'une narine, tandis que l'autre est houchée, ou écou-



lement tantot de l'une, tantot de l'autre narine. — Obturatio

complète du nez, en allant à cheval.

566


Pace et Dents. — Pâleur de la face; chaleur de la face, surtou du côté gauche, après midi, ou bien avec rougeur, pieds froid et sensation de plénitude dans la tête; éruption du côté gauche de la lèvre supérieure. — Envie stréssatible de serrer les dents

Bouche et Gorge. — Petits ulcères à l'intérieur des joues, comme des ulcères mercuriels; sensibilité et chaleur du palais et de la langue; accumulation, dans la bouche, d'une salive jaunatre, d'un goût métallique; gonflement du voile du palais. — Mal de gorge, avec enflure du voile du palais, avec accumulation, le matin, de mucosités épaisses et jaunatres, et amélioration après les avoir expectorées, ainsi qu'après le déjeuner; en avalant, ainsi qu'en tournant la tête à gauche, sensation comme s'il s'était formé une grosseur dans la gorge. — Endolorissement général des parties de l'arrière-gorge, se répandant vers la trompe d'Eustache. — Sensation d'une grande sécheresse dans la gorge, surtout le matin.

Symptômes gastriques et Estomac. — Goût de noisettes dans la bouche. — Appétit furibond; faim immédiatement après le repas; l'appétit ordinaire reste malgré les nausées. — Renvois, parfois avec salivation; nausées dans l'estomac, surtout pendant le mal de tête, ou étant réveillé la nuit; vomissement sans sensation désagréable dans l'estomac. — Pression dans l'estomac, le matin en se réveillant, avec accumulation d'eau dans la bouche.

Constriction dans les précors, avec pression dans les tempes.
Ventre et Hypocondres. — Douleur fouillante dans la partie supérieure et extérieure du foie, tous les matins, avant le jour, et rendant la marche impossible; douleur pénétrante, dans l'hypocondre droit, après minuit, ne permettant pas de rester couché sur le côté droit; violente douleur pressive dans l'hypocondre gauche, le soir, ne permettant point de rester assis, et se dissipant la nuit, en restant couché sur le côté douloureux. — Douleur et sensation d'excoriation dans l'hypocondre droit, pendant la grossesse. — Douleur névralgique dans les régions iliaque et inguinale du côté gauche; tranchées, toute la journée, et sortie de vents fétides.

Selies et Urines. — Selles dures; constipation chronique; diarrhée avec sensation de nausées dans les intestius; évacuations bilieuses abondantes. — Au milieu de la nuit, douleur névralgique, passant comme un coup, de l'anus, le long du périnée, jusqu'au milieu de la verge. — Envie pressante d'uriner. — Pissement abondant, la nuit.—Douleur dans la région vésicale, en urinant et après avoir uriné. — Douleur dans la région des reins et sensation désagréable, le long des urethères. — Sédiment calcaire dans les urines; urines rouge foncé, déposant un sédiment couleur acajou, très-difficile à enlever.



567

Parties sexuelles. — Semutica roulante dans la prostate. — •Métrorrhagie; «règles trep abondantes et trop hâtives; «menstruation douloureuse; edouleurs de ventre violentes, pendant les règles, chez une femme infertile; oflueurs blanches. — oInflam-

mation, gonflement et suppuration des mamelles.

Laryax et Peitrine. — Chatouillement au côté gauche de la trachée, avec toux d'irritation, endolorissement du côté droit de la poitrine et grande séchereme de la gorge; toux bronchique sèche, avec sensation de raucité et de chaleur dans la trachée et les bronches. — Haleine courte. — Douleur dans le côté droit de la poitrine, jusqu'au dos, se manifestant en respirant profondément et en effaçant les épaules, et s'améliorant dans l'après-midi ; ou s'aggravant après minuit, en restant couché sur le côté droit, empéchant le sommeil et disparaissant le matin, après s'être levé. Sensibilité des muscles de la poltrine, comme s'ils étaient contusionnés. — Seconsses doulourenses dans la région du cour, suivies d'une douleur semblable dans le bras droit.

Tronc. — Douleur dans la région lombaire droite, suivie immédiatement d'un prurit violent. — Douleur persistante dans l'omoplate gauche, comme à la suite d'un coup, et de temps en temps, acneation comme si l'on y appuyait dessus un morceau de fer froidi - Sensation de premion et de lourdeur sur les deux omoplates, comme après avoix porté une lourde charge. — Roideur du côté droit de la nuque, plus forte su lit, après minuit. - Sensation d'une tension premire dans les deux parotites; dureté d'une glande au côté droit de la nuque; suppuration d'une tumeur der-

rière l'oreille, avec écoulement de pus et de sang.

Membrea supériours. — Radolorissement sourd et sensibilité au haut de l'épaule et au bord supérieur du muscle trapèse, augmenté en pressant sur les parties et en contractant le muscle. — Endolorissement de tous les muscles de l'épaule gauche, dans tonte leur épaisseur. — Pression et sensibilité des parties extérieures de l'un ou l'autre bras, au-dessus du coude, comme à la suite d'une contusion, avec aggravation en pressant les parties et en étendant le bras. — Faiblesse et douleur dans l'os du bras droit, avec aggravation par le mouvement et la pression. -Douleurs rhumatismales dans les avant-bras, les mains et les doigts. — Douleurs lancinantes et névralgiques dans les doigts. Douleurs picotantes dans le bout des doigts, comme par des étincelles électriques.

Membres inférieurs. — *Scietique; douleurs névralgiques dans les parties extérieures des culsues, et dans l'aine gauche. — Lourdeur dans les genoux, avec fatigue, après une petite promenade ; lourdeur dans les extrémités inférieures, comme si elles étaient endormies. — Douleurs rhumatismales aux genoux, avec concetion, comme si les muscles étaient trop courts, et surfact per un temps busside; - Donloge an pled droit et au





cou-de-pied, vers 4 heures du matin. -- Pieds froids, avec au mentation de la circulation capillaire à la tête et à la face. -- Forte sueur aux pieds, surtout sous les orteils -- Donleur névralgique au gros orteil droit, au milieu de la nuit; douleur des la partie charnue du pied droit et dans un cor.

PLATINA.

PLAT. — Platine. — HAMNEMANN — Hist. nat. et prep Voy Plantmae. homosop, p 140 — Doses unitées : 6, 30. Durée d'action : 40 à 50 jours, dans quelques affections chroniques.

ANTIBOTI. Puls — On Complose comme antidote de Plumb
Comparen avec. Ang osa bell, ranth, croc. fer. hyos lyc magn mang,
natr nitr-ac plumb puls rhus, sabad, stram, stront, valer, verh —
C'est surfout après belt, que le l'Iauna est efficace, lorsqu'il se trouve
nudique

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce medicament contre : — Affections diverses du sexe feminin, et principalement des femines irritables, qui ont les règles abondantes et l'appetit vénérien trèsprononce, Souffrances par l'abus du plomb; Suites facheuses d'une colère ou d'une mortification; Nevralgies et nevroses, Catalepsie, éclampsie et autres affections spasmodiques, Spasmes hysteriques; Mame; Melancolie; Hysterie; Cephalalgies nerveuses et hystériques, Nérralgie faciale; Odontalgies nerveuses et congestives; Péritenite puerpérale : Colique saturmine, Constipation par suite de voyages en voitures; Dysmenorchee; Metrorchaqie, meme après l'acconchement, ou a la suite d'un avortement; Constipation, nymphomanie, Eclampsie, et autres affections des femmes en couche, etc., etc.

Γοη, la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Douleurs compressives, crampoides, constrictives ou pressives, comme par la presence d'une cheville, ou bien comme de coups obtus — Douleurs crampoides, tressaillantes et tractives, dans les membres et les articulations. — Tension dans les membres, comme s'ils étaient entoures de ligatures trop serrées. — Douleurs comme après une contusion, un coup, ou une meurtrissure, surtout en pressant sur la partie affectée. — Douleurs faibles à leur debut, qui augmentent peu à peu, souvent à intervalles réguliers, et diminuent de la même manière, — Sensation de torpeur et d'enroidessement paralytique à diverses parties, souvent avec tremblement et battement





de cœur. — Accès de roideur spasmodique des membres, sans perte de connaissance, mais avec serrement des mâchoires, perte de la parole, yeux convulsés et mouvements involontaires des commissures des levres et des paupières — Les accès de spasmes se manifestent surtout au point du jour. — *Affections à la suite d'une frayeur, d'une mortification, ou d'une colère. — Affections morales et physiques alternant les unes arec les autres; quant les unes se manifestent, les autres se dissipent, et vice versa. — Faiblesse excessire — Inquietudes fourmillantes, sensation de faiblesse et tremblement dans les membres, surtout dans le repos et en plein air. — La plupart des symptômes sont aggraves dans le repos, et soulages par le mouvement. — Les affections qui sont soulagées en plein air sont généralement aggravees vers le soir, et dans l'appartement.

Peau. Rongement fourmillant, avec douleur d'excoriation, et prurit un douleur brûlante, picotante et lancinante, avec besoin de gratter a diverses parties de la peau. - Ulcères (aux doigts

et aux orterls).

Bommeil.— Baillements conculsifs et spasmodiques, surtont après midi. Forte envie de dormir, le soir.— Sommeil prolonge, le matin — Rèves anxieux, de guerre et de sang répandu. — Réces luscifs. Réveil, la nuit, surtout après minuit, avec pensées finneuses, tristes et pénibles. — Etourdissement, la nuit, en se réveillant — La nuit, on est couche sur le dos, les bras passés au-dessus de la tête, les jambes retirées, et l'on eprouve le besoin de les decouvrir.


Pièvres Frissonnement continuel et horripilation par tout le

corps, surtout en plem air.

Moral. *Tristesse, surtout le soir, arec grand besoin de pleurer, souvent étous les deux jours), alternant avec gaiete folle et
bouffounerie. *Pleurs involontaires. «Uns au secours, de
toutes ses forces. — *Angoisse de cœur excessive, avec peur
excessive de la mort, qu'on croit très-prochaine, accompagnée
de tremblement, battement de cœur et gene de la respiration.
— Peur avec tremblement des mains et des pieds, et desordre
des idées, comme si toutes les personnes qui s'approchent étaient
des dem ns. «Humeur hysterique, avec grand accablement
moral, faiblesse perveuse et surexcitation du système vasculaire.

Disposition a s'effrayer. Crando irritabilite, avec mauvaise humeur, longtemps encere apres qu'on s'est mis en colere. — Indifférence apathique et distraction. — *Organil et trop bonne opinion de soi-même, avec dedain pour tous les autres, même pour ceux qu'on venere et qu'on aime le plus, surtout dans l'appartement, moins au grand air et au soleil. — Distraction et oubli.

*Perte de commissance. Divagations. Errours des sons; il semble que l'on soit très-grand, et qu'au contraire toutes les autres choses ou personnes soient très-petites et tre-



570 PLATINA.

basses. — *•Envie irrésistible d'une mère, d'assassimer sec* enfant.

Tête.—Embarras tensif, comme s'il y avait un étau devant la tête

— Accès passager de vértige, le soir, avec perte de connaissance

- Maux de tête qui augmentent peu à peu, ou par accès, jusqu'à devenir très-violents, et s'affaiblissent dans la même progression.—Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements.

— Sensation de torpeur dans la tête, et à l'extérieur, au vertex.

— Douleur dans les côtés de la tête, comme par la présence d'une cherille. — *Douleurs pressives, crampoides, dans le front et les tempes, surtout à la racine du nez, comme une compression, fortement aggravées par le mouvement et en se baissant, equelquefois avec chaleur et rougeur de la face, inquiétude et pleurs, on arec leucorrhée. — «Fourmillement dans les tempes, comme par des insectes. — «Bourdonnement et bruit dans la tête, comme celui que ferait un moulin. — Sensation de contraction du cuir chevelu, au vertex.

Youx. — Douleurs dans les yeux après s'être fatigué la vue à regarder un objet. — Tension dans les orbites, avec douleur rongeante d'exceriation aux bands. — *Douleur crampoide aux bords des orbites. — Tension compressive dans le globe des yeux. — Pression dans les yeux avec sommeil. — Fourmillement dans les angles des yeux. — Sensation de chaleur ou de froid, et cuisson dans les yeux. — Tremblement ou frémissement spasmodique des paupières. — "Yeux convulsés. — Les objets paraissent plus petits qu'ils ne le sont en effet. — Yue trouble, comme à travers un voile, souvent avec tiraillements indolores autour de l'œil. - Tremblement et scintille-

ment devant la vue.


Oreilles. — Otalgie avec douleur crampoïde. — Secousses dans les oreilles. — Sensation de torpeur et de froid dans les oreilles, jusque dans les joues et les lèvres. — Fourmillement rongeant dans les oreilles. — *Tonnerre sourd et roulement dans les oreilles.

Nes. — Douleur crampoide, avec sensation de torpeur au nez. — Besoin inutile d'éternuer et fourmillement dans le nez.—*Coryen

sec, souvent d'un seul côté.

Visage. — Visage pále, have. — Chaleur brûlante et rougeur ardente de la face, avec soif violente et sécheresse de la bouche, surtout le soir. — Distorsion des muscles de la face. — Sensation de froid, avec fourmillement et *sensation de torpeur de tout un côté de la face. — Crampe et pression tensive dans les pommettes. — Fouillement pulsatif dans les mâchoires, surtout le soir, et pendant le repos, avec pleurs involontaires. — Rongement avec douleur d'excoriation, qui oblige à gratter, aux lèvres et au menton. — Vésicules cuisantes et lancinantes aux lèvres. — Lèvres sèches, geroées. — Réseau veineux rouge bleuâtre, au menton. —





PLATINA.

Sensation de torpeur on de froid autour de la bouche et au menton. — Crampe de la mâchoire,

Dents. — *Odontalgie, avec douleur pulsative et fouillante. — Traction crampoide, et par accès, dans les dents. — Crevasses aux gencives.

Bouche et Gorge. — Douleur brûlante sous la langue. — Sensation sur la langue, comme si elle était brûlée. — Sensation, comme si la gorge était à vif, pendant et hors le temps de la déglutition (à vide). — Traction crampoide dans la gorge, comme un étranglement. — Sensation d'allongement de la luette. — Grattement et accumulation de mucosités dans la gorge. — Renâclement de mucosités.

Appétit. — Goût muqueux, pâteux. — Goût douceâtre, sur le bout de la langue. — Absence de soif. — Perte de l'appétit, dès la première bouchés.—*Perte complète de l'appétit. — Répugnance pour les aliments par l'effet de la tristesse. — Dégoût de la viande. — Bouthaie; on mange avec une vitesse vorace, avec disposition à mégaler toutes choses. — *Après le répas, renvois, pression à l'estente ut coliques.


Estomac. — Besois inutile d'expulser des renvois. — Renvois à vide, bruyants. — Sérosités d'une amertume douceâtre et désagréable, qui remontent dans la gorge, et font qu'on s'engoue facilement. — Nausées continuelles, avec lassitude, tremblement et anxiété. — *Pression à l'estomac, surtout après le repas. — Douleur contractive au scrobicule comme si l'on était trop serré. — Pression aux secousses, ou bien battement, élancements et pincements au scrobicule. — Sensation brûlante dans le scrobicule, quelquefois aussi depuis la gorge jusque dans le ventre.

Ventre. — Maux de ventre, avec pression sourde et saccadée. —
Ballonnement du ventre, avec expulsion difficile et interrompue
des flatuosités. — *Constriction dans le ventre. — Pincements
dans la région ombilicale. — Elancements dans les côtés du ventre et la région ombilicale. — Rongement dans le ventre. —

Tractions dans les aines, partant du sacrum.

Selles. — *Constipation, quelquefois très-opinitre. *Besoin fréquent, avec selles peu abondantes, par inorceaux, et expulsées sculement avec de grands efforts. — Selles de la consistance de la bouillie. — Ténia et ascarides du rectum, pendant et hors le temps des selles. — Après la selle, horripilation générale, ou sensation de faiblesse dans le ventre. — Fréquemment, fourmillement pruriant et ténesme à l'anus, surtout le soir. — Lancinations violentes et obtuses dans le rectum.

Urines et Parties génitales. — Urine rouge, avec nuage blanc, ou bien se troublant et déposant un sédiment rouge. — Écoulement des urines, lent, mais fréquent. — Douleur brûlante et rongement au scrotum. — Exultation peu naturelle de l'appétit rénérien, avec érections fréquentes, surtout la pait. — *Facule-



PLATINA,

ment de liqueur prostatique. — Coït de trop courte durée et avec

peu de jouissance.

572

Règles. — Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales, avec pression dans le bas-ventre. — *Exaltation peu naturelle de l'appétit vénérien, chez la femme, avec sensibilité douloureuse et —fourmillement voluptueux dans les parties génitales internes et externes. — o'Induration de l'utérns. — Congestion sanguine à l'utérus. — o'Avortement. — o'Métrorrhagies, d'un sang épais, foncé, avec tractions dans les aines. — *Règles trop hâtives et trop abondantes, oquelquefois avec mal à la tête, inquiétude et pleurs. — *Règles de trop longue durée. — Avant les règles, tranchées et douleurs comme celles de l'enfantement, dans le bas-ventre. — Crampes au début des règles. — *Pendant les règles, pression comme si tout se portait vers les parties génitales, qui sont très-sensibles. — Leucorrhée comme du blanc d'œuf, coulant surtout après avoir uriné et en se levant de son siège.

Poitrine. — Aphonie. — Tour courte et sèche. — Haleine courte, avec oppression constrictive de la poitrine. — Oppression anxieuse de la poitrine, avec sensation de chaleur qui remonte de l'épigastre. — Respiration courte, difficile et anxieuse. — Douleur de poitrine, comme s'il y avait un fardeau qui pressat dessus, avec besoin de respirer profondément qui est empêché par une sensation de faiblesse. — Tension, pression et élancements dans les côtés de la poitrine, qui ne permettent de se coucher ni d'un côté ni de l'autre. — Prestion et coups obtus dans la poitrine. — Pression crampoide dans un côte de la poitrine. — Douleur crampoide dans la poitrine, commençant faiblement, augmentant jusqu'à une certaine intensité, et diminuant dans la même progression. — Lancinations sourdes, dans les côtés de la poitrine,

en inspirant. - Battement de cœur auxieux.


Tronc. Douleur brisement aux reins et dans le dos, surtout en pressant dessus, ou bien en se penchant en arrière. — Douleur crampoïde aux reins. — Sensation de torpeur dans le coccyx. — Roideur de la nuque. — Faiblesse et sensation de torpeur tensive

dans la nuque.

Bras. — Pesanteur et lassitude des bras, avec tiraillement paralytique. — Pression et douleur crampoïde dans les avant-bras, les mains et les doigts, surtout en tenant solidement un objet. — Rongement pruriant, picotement et sensation brûlante dans les bras, les mains et les doigts. — Sensation de roideur dans les avant-bras. - Battement douloureux dans les doigts. — Distorsion des doigts. — Torpeur des doigts. — Ulcères aux doigts.

Jambes. — Douleur crampoide et tension dans les cuisses, les pieds et les orteils. — Faiblesse des cuisses et des genoux, comme si ces parties étaient brisées. — Secousses et coups dans les jambes. — *Lassitude des jambes. — Agitation et tremble-





PLATINA. - PLUMBUM.

ment dans les jambes, avec sensation d'engourdissement et od'enroidissement. — Lassitude et torpeur dans les pieds, en étant
assis. — oFroid aux pieds. — Rongement, excoriation et cuisson
aux malléoles, fortement aggravés par le moindre contact. —
Battement douloureux dans les orteils. — Gonfiement de la
partie charnue de l'orteil, avec déchirement et pulsations nocturnes. — Ulcères aux orteils.

PLUMBUM.

PLUMB. — Plomb. — HARTLAUS et TRIKES. — Hist. nat. et prép. Yes. Pharmac. homosp., p. 441. — Dose usités: 30. — Durée d'action : 30 242 jours dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Alum. bell. hyos. op. plat. stram. et electricites.


ANTIDOTES: Alum. bell. hyos. op. plat. stram. et electricites.
COMPAREN AVEC: Alum bell. chin. con. for. hyos. natr-m. n-rom. op. phos.
plat. pals. rives. sabed. sep. stram. zinc.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre quelques espèces de Constipation.

SYMPTOMES GÉBÉRAUX. — Tractions et déchirement dans les membres, plus violents la nuit, se transportant parfois à un autre endroit par l'effet du grattement. — Sensation mainte à diverses parties du corps. — Violentes douleurs ostéocopés, four-millantes et par accès. — Crampes et douleurs constrictives dans les organes internes. — Transissement, roideur, courbure et raccourcissement de quelques membres. — Paralysies. — — Tremblement convulsif et tressaillement des membres, convulsions et crampes, quelquefois suivies de paralysies. — Attaques d'épilepsie. — Evanouissements, surtout dans une assemblée nombreuse. — Pesanteur et paresse dans les membres.

Grande faiblesse arec tremblement des membres. — Après une léger exercice, abattement avec besoin de se coucher, et pulsation dans tout le corps. — Muscles flasques et machés. — Amaigrissement général, et surtout des parties paralysées suivi du gonflement de ces parties. — Gonflement hydropique, quelquefois de tout le corps. — Sensibilité au grand air. — Les symptômes se développent lentement et disparaissent quelquefois pendant un certain espace de temps, pour reparaître ensuite.

Peau. - Couleur plombée, bleuâtre ou jaunâtre de la peau. Taches d'un brun foncé, sur tout le corps. — Inflammation facile
et suppuration de légères bleurures. — Doulour brûlante dans
les ulcères. — Excoriations. — Décubitus. — Sphacèle.



PLUMBUM.

Semmeil. — Forte envie de dormir le jour; on s'endort facile ment, même en parlant. — Sommeil et sommolence, quelquefois avec engourdissement. — Sommeil tardif. — Insomnie nocturne avec crampes abdominales. — Tressaillements pendant le sommeil. Affluence de rêves, quelquefois lascifs, avec érections. — Paroles pendant le sommeil.

Fièvre. — Prédominance des frissons et du froid, surtout dans les membres et en plein air. — Sueurs froides ou visqueuses. —

Chaleur fugace, anxieuse.

574

Moral. - Mélancolie tucuturne et abattement. Grande angoisse et inquiétude, avec soupirs. — Ennui et éloignement pour la conversation et le travail. — Découragement. Dégoût de la vie. — Faiblesse de la mémoire. — Imbécillité. — Démence. — Marie. — Divagations. - Fureur. - Délires furieux, parfois

avec aspect d'un fou.

Tête. — Tête entreprise, lourde, comme par apathie et mélancolie. — Étourdissement, au point de tomber sans connaissance. — Ivresse. — Vertiges, surtout en se baissant, ou en regardant en l'air. — Mal de tête, comme par une boule qui, de la gorge, monterait dans le cerveau. — Pesanteur de la tête, surtout à l'occiput et au front. — Déchirement dans le front et les tempes. — Maux de tête lancinants. — Congestion à la tête, avec pulsation et chaleur. — Grande sécheresse des cheveux. — Chute des cheveux, même des sourcils et des moustaches.


Yeux. — Douleur pressive et très-sensible, comme si le globe de l'ail était trop volumineux. — Pesanteur des yeux, pendant le mouvement. — Paralysie des paupières. — Contraction dans les yeux et les paupières. — Déchirement dans les paupières, avec sommeil. — Congestion sanguine aux yeux. — Inflammation des yeux et de l'iris. — Agglutination nocturne des yeux. — Gonflement des yeux. — Couleur jaunâtre de la sclérotique. — Occlusion spasmodique des paupières. — Yeux convulsés. — Pupilles contractées. — Vue trouble, comme à travers un brouillard, qui force à se frotter les yeux. — Myopie. — Cécité, comme par amaurose.

Oreilles. — Déchirement dans les oreilles. — Térébration et élancements dans les oreilles. - Sensibilité au bruit. — Diminution

quelquefois subite de l'oute. — Surdité.

Nez. — Nez froid. — Inflammation érysipélateuse du nez. — Vésicalés purulentes dans les angles du nez, qui sont rouges. — Odeur fétide du nez. — Perte de l'odorat. — Obturation du nez. — Accumulation de mucosités tenaces dans les narines, et qui ne peuvent être expulsées que par les fosses nasales. — Coryan fluent, avec écoulement de mucosités séreuses.

Visage. — Face pâle, jaune, hippocratique. — Air d'un aliéné. — bouffissure de la face. — Gontlement d'un seul côté de la face. — Peau luisante, huileuse, à l'œil et au toucher. — Déchirements



PLUMBUM.

dans les os des máchoires; se dissipant par la friction, ou reparaissant à un autre endroit. — Térébration dans la mâchoire inférieure. — Exfoliation des lèvres. — Crampes de la machoire.— Gonflement des glandes sous-maxillaires.

575

Dents. — Douleurs déchirantes, tressaillantes, dans les dents. aggravées par les choses froides. — Dents enduites de mucosités jaunâtres. — Dents qui se noircissent. — Dents fétides, cariées, qui s'ébrèchent. — Vacillement et chute des dents. — Grincement des dents. — Gencives pâles, gonflées. — Nodosités douloureuses.

et dures aux gencives.

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Accumulation abondante de salire doucedtre, dans la bouche, avec sécheresse du gosier. — Salivation. — Écume dans la bouche. — Mucosités visqueuses dans la bouche, le matin, au réveil. — Crachement de sang. — Aphthes et ulcères fétides dans la bouche. — Inflammation, gonfiement et pesanteur de la langue. — Langue brune, sèche, avec rhagades. — Langue verte, ou chargée d'un enduit jaune. —

Parole empêchée.

Garge.—Mal de gorge, comme par un gonflement, ou par la présence d'un corps étranger dans le gosier. — Sensation d'une boule qui remonterait dans la gorge. — Sensation d'étranglement dans la gorge. — Paralysie du gosier avec impossibilité d'avaler. — Traction dans la gorge, en mangeant, comme si l'œsophage allait s'arracher. — Sensation comme si un insecte rampait dans l'œsophage. — Inflammation et induration des amygdales.

Appétit.—Goût douceâtre ou amer.—Goût sulfureux, acide, dans le fond de la gorge. — Forte soif d'eau froide. — Absence d'appétit. — Faim violente, même peu de temps après le repas. —

Grand désir de pain et de friture.

Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois à ride, quelquefois très-violents et douloureux. — Renvois douceâtres. — Hoquet. — Régurgitation d'eau douceâtre on aigre. — Dégoût et naudées fréquentes, avec envie de vomir, quelquefois avec vomiturition. — Vomissements continuels et violents des aliments ou de matières rerdâtres et noirâtres, ou jaunâtres, avec douleurs violentes dans l'estomac et le ventre. — Vomissements de bile ou de sang. — Vomissement de matières fécales, avec coliques et constipation. — Douleurs des plus riolentes à l'estomac. — Sensation de pesanteur et pression dans l'estomac, quelquefois après le repas. — Pression sourde et anxieuse dans le scrobicule. — Crampes d'estomac, constrictives. — Élancements depuis le creux de l'estomac jusque dans le dos. — Tranchées et douleur brûlante dans l'estomac. — Infiammation de l'estomac.

Ventre. — Douleur au fuie, avec pression fancinante. — Affections de la rate. — Douleurs abdominales des plus riolentes, avec



retraction de l'ombilie. Ballonnement et durete du ventre. -Coliques endenter, avec douleur constrictive, surtent dans la région ombilicale, avec forte contraction de l'abdomen. 1 minut quelquefors des grosseurs et des enfoncements, aggrances par le moindre contact, et quelquefois portees, la nuit, au degre le plus violent. - (Pincements et tranchees dans le ventre, - Elancements autour de l'ombilie. Sensation dans la partie superieure et les côtes du ventre, comme si quelque chose s'en arra-hait 👼 tombait. - Pulsation dans le ventr' Sensation brulante, ou froid dans le ventre. — (Inflammation des intestins). Nodosités dures dans le centre, comme par des indurations internes. -Douleur de bris ment dans les muscles abdominaux aggravee par le mauvement et le toucher. - Production et incarceration continuelles de flatuosites, avec grondenent et borborggmes dans le rentre. Expulsion abondante de flatuos les tres-fetules et chaudes, Lrulantes. Dans le rectum, besoin tres-pressant d'ex-

pulser des vents, sans aucun résultat.

Selles, *Constipation des plus opiniaires. Envie continuelle et inut le d'aller à la selle. Selles difficiles à évacuer, dures, quelquefois en boulettes, comme des crottes de mouton, et tenaces. Selles dyssenteriques. Diarrhées de longue durés, géneralement d'excrements jaunes, ou bien doaloureuses, et souvent tres fetides. Diarrhées sanguin, lentes. Retraction douvent tres fetides.

loureuse et construction de l'anus. Chute du rectum.

Urines. — Rétention d'arme. - Émission d'urine defficile et goutte à goutte. — Tenesme de la vessie. — Emission d'urine plus fréquente et plus abondante. — Urine aqueuse, ou rougeatre, enflammee, trouble et quelquefois epaisse. — Écoulement de sang

par l'urethre.


Parties génitales. — Gonflement et inflammation des parties genitales (de la verge et du scrotum). — Etranglement et construction dans les testicules, avec tressaillement dans le cerden spermatique — Rétraction des testicules. — Excoriation du scrotum. — Exaltation excessive de l'appétit rénerien, avec érections et pollutions frequentes. — Écoulement de sperme insuffisant, pendant le coît. — (Impaissance?) — Leucerrhee. — Avertement.

Larynx. - Enrouement et aprete dans la gorge. - Aphonie. - Construction de la gorge. - Expecteration aboudante de muco-sités du larynx, visqueus-s, transparentes, ou vert jaunâtre et en globules. - Toux seche, convulsive. - Expectoration de pus par la toux. - Toux avec expectoration de sang.

Poitrine. Respiration difficule, anxieuse, oppressee et haletante.

Haleine courte. Asthme spasmodique. Oppression de poitrine, reparaissant periodiquement. A les de suffication.

Pression a la pritrine, surt ut en respirant profondement et en riant - Elancements dans la poitrine et les côtés, quelquefois avec etouffement de la respiration.— Bouillonnement dans la



PLUMBUM. — PODOPHYLLUM PELTATUM.

poitrine, avec angoisse dans la région du cœur, et palpitations sensibles.

Trone. — Déchirements et élancements aux reins, dans le dos et entre les omoplates. — Déviation de la colonne vertébrale. — Tension dans la nuque et jusque dans l'oreille, en remuant la tête.


Bras. — Mouvements convulsifs des bras et des mains, avec douleurs dans les articulations. — Traction et déchirement dans les bras et les doigts. — Faiblesse et paralysie douloureuse des bras et des mains. — Ganglion sur le dos des mains. — Difficulté de remuer les doigts. — Plaques rouges et gonflées aux doigts.

Jambes. — Traction dans l'articulation coro-fémorale, en étant couché. — Sensation douloureuse de paralysie dans les articulations coxo-fémorales, celles des genoux et des piede, surtout en montant un escalier. — Paralysies des cuisses et des piede. — Engourdissement des jambes et des piede. — Déchirement et élancements dans les cuisses et les genoux. — Sensation de torpeur dans les pieds, avec difficulté de s'appuyer dessus. — Crampes dans la plante des piede. — Gonflement des pieds. — Sueur fétide des piede. — Distousion des orteils.

PODOPHYLLUM PELTATUM.

PODOPH. - Vey. RALE, Remêdes américains.

AVIS CLIMIQUES. --- Ce médicament a été employé avec succès contre : - Atrophie des enfants scrofuleux, avec garderobes fréquentes mais normales, ou avec diarrhée matutinale; Dentition difficile des petits enfants : Gastrite, avec aigreurs, renvois de gas chauds, très-aigres, soif et vomissement de matières bilieuses mélées de sang, avec des contractions de l'estomac tellement de loureuses qu'elles forcent à jeter de hauts cris ; Hépatits chronique et dégénérescence du foie, avec douleur, plénitude et sensation d'ensoriation dans l'hypocondre droit, forçant à frotter constamment cette région avec les mains; Jaunisse, avec des calcula hépatiques, douleurs depuis l'estomac, jusqu'à la région de la résicule bilieuse et nausées violentes; Catarrhe intestinal, avec diarrhée plus forte le matin et changeant constamment de couleur, tantôt verdâtre, tantôt jaunâtre, tantôt blanchâtre. — Colique spasmodique, avec rétraction des muscles abdominant, ou contraction de ces muscles en nœuds; Coliques ches les enfants, par suits d'une indigestion, avec accès tous les instins au point du jour ; Diarrhée guillent le dentition, avec cele, grincoment du denim,



PODOPHYLLUM PELTATUM.

578


agitation de la tête d'un côté à l'autre, et selles verdatres ; Choléra des enfants, avec garde-robes très-fétides, plus fréquentes le matin, avec yeux à demi-fermés et gémissement dans le sommeil: Diarrhée des enfants, avec selles verdatres, aqueuses, et chute du rectum ; Dyssenterie des enfants, avec selles verdatres, muquemes et sanguinolentes, et forte jactation de la tête; Constipation, avec selles difficiles, chute du rectum, urines fréquentes, douleur et faiblesse au dos; Hémorrholdes, avec chute du rectum, et avec diarrhée empirant le matin, ou avec constipation, flatulence et mai de tête; Leucorrhée, avec écoulement d'un mucus épais et transparent, constipation, pression en bas, vers les parties, chute du rectun ou de la matrice; Fausses positions de l'utérus, avec constipation, chute facile du rectum, urines fréquentes, dos faible et douloureur, surtout après avoir lavé : Chute de la matrice, surtout à la suite de l'accouchement, avec chute simultanée de l'anus et plusieurs selles par jour.

SYMPTOMES GENERAUX. — La plupart des symptômes, mais surtout ceux de l'abdomen, s'aggravent le matin et s'améliorent le soir. — Peau moite, avec chaleur anormale; muscles mons, avec faiblesse, chez des enfants; oconleur terreuse de la peau, chez les enfants. - Pendant la flèvre, frissonnement en se remuant et en se couchant, suivi immédiatement de sueur; ofrissonnement, le soir, en se couchant, puis fièvre avec sommeil troublé par des paroles et réveil incomplet; "fièvre avec constipation; ofièvre avec paroles incohérentes; ofièvres tierces, quartes et quotidiennes; ofrisson le matin, à 7 heures, avec douleurs dans les hypocondres, les genoux, les malléoles, les coudes et les poignets; edouleur au dos, avant le frisson; ele grelottement et la sensation de froid persistent encore pendant quelque temps après le début de la chaleur ; «soif plus prononcée pendant la chaleur que pendant les frissons; ependant le frisson, incapacité de parler, faute de trouver les mots qu'on voudrait prononcer; opendant la chaleur, délire et loquacité, sans souvenir de ce qui s'est passé; pendant la fièvre, mal de tête violent avec forte soif; opendant la sueur, sommeil; odans l'apyrexie, manque d'appétit. — Somnolence le jour, surtout dans la matinée, avec borborygmes; envie de dormir de trop bonne heure, le soir, avec sommeil profond, la nuit; malaise le soir, après le premier ommeil; *gémissement la nuit, avec yeux à demi-fermés; le matin, réveil difficile, sommeil non réparateur.

Tôte. — Vertige en restant debout, avec disposition à tomber en avant; vertige, avec sensation de plénitude au-dessus des yeux, ou avec des secousses douloureuses dans le sinciput, qui forcent de fermer les yeux; odélire et loquacité pendant la fièvre. — Douleur dans le sinciput, le matin, en se levant; pression dou-



579



PODOPHYLLUM PELTATUM.


loureuse dans les tempes, dans la matinée, avec tiraillement dans les yeux, comme si l'on devait se mettre à loucher; céphalalgie stupéfiante, traversant les tempes, améliorée par la pression extérieure; mal de tête le matin, avec chaleur au vertex. — «Jactation de la tête, pendant la fièvre de dentition, avec sueur à la tête pendant le sommeil. — Douleur subite dans le sinciput, le soir, avec mal à la gorge. — Mal de tête alternant avec diarrhée. — «Mal de tête le matin, avec face rouge. — Douleur violente dans le sinciput, avec sensation d'excoriation au-dessus de l'endroit affecté. — Pendant les maux de tête, tiraillement et sensation de plénitude dans les yeux. — Douleur dans les tempes et le globe des yeux, avec chaleur et pulsation des artères temporales.

Bouche et Garge. — Les dents sont, le matin, convertes de mucosités desséchées; ogrincement de dents, la nuit, surtout chez les enfants pendant la dentition. — Forte salivation; omanyaise odeur de la houche, dont on s'aperçoit soi-même; ogoît dans la bouche, comme du foie rôti, la nuit; aigreurs dans la bouche; bouche et langue sèches, au réveil, le matin; oenduit blane sur la langue, avec mauvais goût de la bouche. — Gorge sèche; orâle muqueux dans la gorge; omal de gorge qui débute à gauche et passe à droite; mal de gorge du côté gauche, aggravé en

avalant des liquides et le matin. - Goître.

Symptômes gastriques. — Rassassiement par peu d'aliments, puis nausées et vomissement; perte de l'appétit; indifférence pour le manger; boulimie. — Coût putride dans la bouche. — Désir de choses acides. — Soif, vers le soir; peu de soif pendant la fièvre; bimmédiatement après avoir bu et mangé, diarrhée. — Aigreurs de l'estomac; prenvois aigres; prenvois de gaz très aigres; paprès midi, aigreurs, avec sensation d'un malaise très-désagréable dans l'estomac; prégurgitation des aliments; prégurgitation d'eau; pyrosis. — Nausées violentes, durant plusieurs heures; nausées et vomissement, avec plénitude dans la tête; vomissement de mucosités chaudes, écumeuses; promissement des aliments avec odeur et goût putrides; promissement des aliments une heure après le repas, et suivi de boulimie. — Tout ce qu'on mange tourne immédiatement en aigreurs. — Souffrances gastriques, avec moral déprimé.

Estomac et Ventre. — Chalcur dans l'estomac; sensation de vide dans l'épigastre; battement dans l'épigastre, puis diarrhée; éclancements dans l'épigastre, en toussant. — *Plénitude dans l'hypocondre droit, en excensation d'exceriation, en avec flatulence; élancements dans l'hypocondre droit, aggravés en mangeant; douleur tournoyante et chalcur dans l'hypocondre droit; éhépatite chronique avec constipation. — Sensation de lourdeur et d'un tirailllement en bas, dans l'hypocondre ganche; essensation de flatulence dans l'hypocondre ganche. — Colique spoamodique, avec rétruc-



PODOPHYLLUM PELTATUM.

tion des susseles abdominaux, à 8 heures du soir, et à 5 heures du matin ; "douleur dans le colon transverse, à 3 heures du matin, suivie de diarrhée; douleur et borborygmes dans le colon ascesdant. – Mai de ventre au point du jour, spaisé par la chaleur extérieure, et en se pliant en avant, étant couché sur le côté, mais aggravé en se couchant sur le dos. — Les maux de ventre s'accompagnent d'abord de froid, puis survient de la chaleur avec meur : scasation de chaleur dans le ventre, avec envie d'aller à la nelle. — Ventre comme vide, avec sensation de défaillance, après la selle. — «Douleur aiguë au-demus de l'aine gauche, empêchant

le mouvement, pendant la grossesse.


Selles et Urines. — Constipation avec flatulence et mal de tête: eselles dures, sèches et difficiles. — Selles le matin, avec forte pression dans le ventre, chaleur et douleur dans l'anus; *évacustions fréquentes, dans le jour, envec yeux cernés; *Diarrhées, saigues ou chroniques, *s'aggravant le matin ; Diarrhée douloureuse avec cris et grincements de dents, pendant la dentition; -petites selles muqueuses et gélatineuses, avec fiatulence et douleur dans la région sacrale; eselles fréquentes, comme de la chaux, et très-fétides, avec vomiturition et forte soif, chez les enfants; ocholéra des enfants. — Selles: *verdâtres, le matin; ojaunātres; omuqueuses, blanchātres; ojaune fonce, d'une odeur cadavéreuse; ochandes, aqueuses; occumenses; oles aliments sortent sans être digérés. — Chute du rectum, surtout le matin, once les selles diarrhéiques, chez les enfants aussi ; pendant la selle, sensation comme si la matrice allait descendre. — *Incontinence d'urine; pissement au lit; farines diminuées, son même supprimées ; ourines fréquentes, la nuit, pendant la grossesse.

Parties génitales. - Douleur lancinante, le long du cordon spermatique.—•Règles supprimées chez les jeunes filles, avec premion en bas, dans le ventre et la région lombaire. — • Leucorrhée de mucosités épaisses, transparentes, avec constipation et pression en bas.—•Symptômes d'une descents de la matrice, avec flatulence, après l'accouchement. - Douleurs dans les quaires, pendant la grossesse. — Dans les premiers mois de la grossesse, impossibilité de rester couché autrement que sur le ventre. -- «Enfiare des lèvres de la vulve pendant la grossesse. — Tranchées trop

fortes, avec chaleur et flatulence.

Larynx et Poitrins. — Tour pendant la fièvre ; *coqueluche avec constipation et perte d'appétit. - Douleur de poitrine, aggravée par la respiration profonde, qui produit une sensation comme si un fil se cassait dans le poumon. — Besoin de respirer profondément, et soupirs; respiration courte; sensation d'étouffement, le soir, en se couchant. — Sensation dans la poitrine, comme si le cœur remontait jusque dans la gorge; douleur lancinante dans la région du cour. - Palpitations de cœur, après chaque effort ou toute emotion, omrtout chez les individus souffrant de borbo-

280



PODOPHYLLUM PELTATUM. -- PEUNUS SPINOSA. \$81

rygmes, ayant le sommeil profond, non réparatour, avec somnolence dans la matinée; palpitations avec gloussement qui

remonte dans la gorge et coupe la respiration.

Trone et Membres. — Moux de reises, en marchant et en restant debout, avec la sensation comme si le dos se courbait en avant; aggravés par un faux pas ou la marche sur un terrain inégal; douleur dans la région lombaire, avec sensation de froid, pire la muit et pendant le mouvement; douleur entre les épaules, le matin; roideur de la nuque, avec endolorissement des muscles de la nuque et des épaules. — "Rhumatisme dans l'avant-bras ganche et les doigts; faiblesse dans les poignets qui sont douloureux au toucher. — Faiblesse et douleur rhumatismale dans la hanche gauche, aggravée en montant les escaliers; douleur dans les cuisses, les genoux et les jambes, pire en se tenant debout; "fai-blesse paralytique des articulations, curtout du côté ganche, et aux genoux; craquement des genoux, au marchant; lourdeur et roideur des genoux au début de la marche; douleur dans les genoux, les jambes et les pieds, surtout la nuit, — Pieds froids; sueur aux pieds, le soir.


PRUNUS SPINOSA.

PRUN. — Épine noire. — WAMER. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosp., p. 202. — Dese milée : 20. — Durée d'action : Plusieurs se-maines dans quelques cas de maladies chroniques.

CLIMIQUE.—On a jusqu'ici fait usage de ce médicament contre : — Anasarque générale ; Ascile ; Diarrhée, etc., etc.

STAPTONIES CHURRAUX. — Klancements dans les muscles. —
Tremblement dans tout le corps. — Inquiétudes dans le corps,
avec haleine courte et oppression de poitrine. — Sommeil après
le repas. — Sommeil nocturne tardif, et insomnie. — Réveil de
trop bonne heure. — Lassitude le matin, comme après un sommeil non réparateur. — Sommeil plein de rêves et de rêvasseries. — Rêves de furoncles et de choses qui sont sales. — Frissonnement, surtout le soir. — Chaleur sèche de tout le corps, surtout
aux parties génitales. — Sueur seulement au visage, pendant
le sommeil. — Tristesse, indifférence, mauvaise humeur et momettel.

This - Donts. - Pessateur de la tête et vertiges. - Pression.



PRUNUS SPINOSA.

dans la tête, principalement au front, à l'occiput et aux tempes.

— Violentes douleurs nervouses dans la tête qui font perdre les idées et les sens. — La pression de la tête se manifeste le plus sourent du dehors au dedans. — Mal de tête comme par la che-leur du soleil. — Douleurs dans les yeux, comme si les globes étaient arrachés. — Étreintes dans les oreilles. — Éternument fréquent. — Douleurs violentes, névralgiques, ou douleurs de luxation aux dents, ou bien sensation comme si les dents étaient soulevées et arrachées. — Douleurs picotantes aux dents.


Boucho — Solles. — Elancements et douleurs brûlantes à la langue. - Langue chargée de mucosités blanchâtres. - Goût muqueux, păteux, ou amer dans la bouche. — Satiété prompte en mangeant. - Nausées continuelles avec dégoût de tous les aliments, et diarrhée. - Plénitude, ballonnement et oppression dans le creux de l'estomac, avec haleine courte. - Douleurs pressives dans la région hépatique. — Violentes coliques spasmodiques, qui ne permettent de se coucher ni sur le dos ni sur les côtés, ni de marcher, excepté très-lentement; les douleurs dîminuent en penchant le thorax en avant. - Coliques pressives à l'épigastre ou dans le côté droit du ventre, même la mait. - Elancements dans le ventre, qui coupent la respiration. — *Gonflement hydropique du ventre, avec perte d'appétit, urines rares, selles dures et noueuses. — Incarcération de flatuosités, avec coliques spasmodiques et crampes de la vessie. - Élancemente dans la région inguinale, et pression comme si une hernie allait s'établir. - Selles difficiles, dures et noueuses. - *Diarrhée, avec coliques et évacuation abondante de matières fécales. — Douleurs crampoides dans le rectum. — Après la selle, écoulement de sang par l'anus.

Urines — Règles. — Crampes de la ressie, même la nuit. —
Urines rares et brunes, — Jet d'urine filiforme. — Urines chaudes, corrosives. — Urine jaune clair, avec dépôt blanchâtre et parfois couleur bleu de ciel. — Strangurie. — Rétention d'urine spasmodique. — Ténesme de la vessie. — Violentes douleurs brûlantes dans l'urèthre, en s'efforçant d'uriner. — Douleur d'excoriation dans l'urèthre, surtout au toncher. — Flaccidité de la verge et rétraction du prépuce. — Prurit au scrotum, ainsi que dans la région des ovaires. — Écoulement d'un sang aqueux et pâle par la matrice. — Règles trop hâtires et trop abondantes, avec maux de reins. — Flueurs blanches corrosives et qui teignent

le linge en jaune.

Larynx et Poitrine. — Grattement et apreté dans la gorge, avec envie de tousser. — En parlant, douleur dans la poitrine, avec voix faible. — Toux excitée par un chatouillement au larynx. — Toux sibilante. — Respiration oppressire, courte, difficile, anxieuse, haletante. — Sensation de pesanteur et d'oppression dans la poitrine. — La respiration s'arrête constamment au creux

582



PRUNUS SPĪNOSĀ. — PŪLSATILLA.

588

de l'estomac. — Douleurs sous le sternum, et oppression, avec plénitude au scrobicule et ballonnement du ventre.

Tronc et Membres. — Muleur d'ulcération aux reins. — Roideur au dos et aux reins, comme à la suite d'un tour de reins. — Endolorissement des glandes axillaires. - Tension, douleurs de luxation et sensation paralytique dans diverses parties des bras et des mains. — Prurit aux doigts, comme par des engelures. — Douleurs dans les hanches, la nuit, avant minuit. — Douleurs de luxation aux genoux et aux pieds. — Sensation brûlante dans les jambes.


PULSATILLA.

PULS. — Pulantille noire, Anómone des prés. — HARREMARE. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoson., p. 263. — Doses assitées : 42, 30. — Durée d'action : 4 à 5 jours dans des cas aigus, et plusieurs semaines dans des affections chroulques.

ANTIDOTES: Cham. coff. ign. n-vom — La pulsatille est l'antidote de : Agur. ambr. arg. boll. cham. chin. col. for. ign. tyc. merc. plat. ran. sabad. stann. sulf. sulf-ac. tart.


COMPARER AVEC: Agar. ambr. comm. ant. arm. ars. asa. aur. bell. bry. cham. chin. coc. colch. con. cupr. fer. ign. kal. lach. lep. iye. merc. nitr-ac. n-yom. n-mos. petr. plat. rhus. sabad. sep. stann. sulf. sulf-ac., tart. thui. ainc. C'est surtout sprès: Asa ant. aur. chin. lach. lyc. nitre-ac. rhus. sep. sulf. tart. et thui., que la pulsatille est efficace, lorsqu'elle se trouve indiquée Après la pulsatille convisusent quelquefois: Asa. bry nitr-ac. sep. thui.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : ---Affections principalement du seze féminin, on des personnes d'un caractère doux, portées à la plaisanterie et à des rires ou à des 🛒 pleurs faciles, avec une physionomie douce, un tempérament flegmatique, inclinant vers la mélancolie, constitution lympathique, avec teint pále, yeux bleus et cheveux blonds, éphélides, disposition à des rhumes de cerveau ou à d'autres écoulements muqueux, etc.; Suites fâcheuses de l'abus des eaux sulfureuses, du mercure, du quinquina, de la camomille, ou de la graisse de porc, ou même du vin; Souffrances à la suite d'une frayeur ou d'une affliction, ou d'un refroidissement dans l'eau (bains de pieds, pluie, etc., etc.); Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement: Arthrite caque: Rhumatisme articulaire; Affections spasmodiques; Accès d'épilepsie et d'évanouissement, à la suite de la suppression des règles; Congestions passives, avec enflure des veines; Varices; Anévrismes; Ecoulements muqueux; Affections scrofuleuses et rachitiques?; Atrophie des enfants; Ictère; Chièrece; Inflammationa



érysipélatouses; Zona?; Eruptions urticaires?; Morbilles, et suites theheuses do la répercussion de cette maladie; Varicelles emeties? Bruptions causées par la graisse de porc ; Engeluxes ; Elingadus?; Supporations : Ulcères enflammés, ou putrides ; Suites de contusions, do chutes, de coups; Fièvre comateuse; Fièvres inflammatoires, avec affections gastriques, muqueuses, on bilienses; Pièvre typhotés; Fièrres intermittentes, même après l'abus du quinquina ou du sulfate de quinine; Fièvre hectique; Manie, mélancolie, hystéries ot autres affections morales, par suite de la suppression des règles; Congestion cérébrale; Apoplexie?; Céphalalgies, même per suite de l'abus du mercure, ou d'une indigertion ; Migraine; Ophthalmies et blépharophthalmies, avec sécrétion muqueuse abondante; Ophthalmics par suite de la suppression d'une gonorrhée; Orgelet?; Cataracte?; Obscurcissement de la cornée?; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurotique (avec héméralopie?); Otolgie inflammatoire ; Otorrhée purulente ; Dureté de l'oule, même par suite d'un froid, ou après la répercussion des morbilles; Onène?; Hémorrhagie nasale, Coryza aigu ou chronique; Disposition à s'enrhumer facilement; Odontalgie rhumatismale; Angines casarrhales; Affections gastrico-muqueuses, ou bilieuses, avec vomissement ou diarrhée ; Indigestions par l'abus de la graisse de porc ou des pátisseries grasses ; Refroidimement de l'estomac per des glaces, des fruits, des acides, etc.; Dyspepsie, avec romissement des aliments, même pour avoir fait abus de vin ; Hématimèse; Gastralgie; Gastrite?; Affections hépatiques chroniques; Ictère ; Coliques spasmodiques ou venteuses ; Entérite? ; Péritonite?; Diarrhées muqueuses, bilieuses; Dyssenterie; Buites such augus de la suppremion du flux hémorrholdal; Lechurie, dysurie et strangurie; Incontinence d'urine chez les enfants (pissement au lit); Catarris de la vessie; Gonorrhée et suites ficheuses de la suppression de eatte maladie; Hydrocèle, et gonflement inflammatoire des testicules, même par suite d'une suppression ou d'une contusion ; Prestatite; Priapisme; Pollutions fréquentes par suite d'onanisme; Dysménie, aménorrhée et dysménorrhée et besucoup de souffrances par suite de la suppression des règles on de l'irrégularité du fluz menstruel, principalement dans l'áge de la puborié ou du retour; Métrite?; Métrorrhagies, principalement dans l'age critique, Flueurs blanches; Affections morales, edoutalgies, souffrances gastriques, coliques, spasmes, hystériques, dysurie et basucoup d'autres souffrances de femmes enceintes ou en couche; Douleurs d'enfantement spasmodiques, tranchées trop prolongées et trop violentes; Manque de douleurs d'enfantement; Adhérence du placenta; Suppression des lochies?; Péritonite puerpérale; Aga-inctie; Souffrances par suite du sevrage; Excoriations des enfants qui ont fait abus de la camomille ; Ophthalmies des nouveau-nes?; Affections catarrhales avec toux humide; Grippe; Coqueluche ?; Remoptypie; Affections asthmatiques; Pneumonie?; Souffrances

584




585

phthisiques?; Affections organiques du cœur; Cardite?; Déviation rachitique de la colonne vertébrale; Gonflement inflammatoire ou ædémateux des jambes et des piede; Peolte?; Sciatique?; Coxalgie.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — *Douleurs tractives et tressaillantes, dans les muscles, aggravées la suit, ou le soir au lit, ainsi qu'à la chaleur de la chambre, soulagées au grand air, est accompagnées souvent de torpeur avec faiblesse paralytique, ou de gonflement dur des parties affectées. — • Elancements et sensation de froid dans les parties affectées, au changement de temps. --- *Tension dans quelques membres, comme si les tendons étaient trop courts. - * Douleurs erratiques, qui passent rapidement d'un endroit à l'autre, souvent avec gonflement et rougeur dans les articulations. — Soubresaut des tendons. — *Accès de douleurs, avec frissons, gêne de la respiration, pâleur du visage, et tremblement des jambes. — *Plus les douleurs sont violentes, plus les frimons cont forts, — *Douleurs de meurtrissure ou d'ulcération sous-cutonée, en touchant les parties affectées. — *Douleurs et souffrances semi-latérales. —Aggravation et renouvellement des souffrances dans la position assise, après des exercices prolongés; on en se levant, après être resté longtemps assis, almsi que dons le repos, et principalement en étont conché sur le côté, ou sur le dos. — Les souffrances qui ont apparu en étant couché sur le dos s'améliorent en se conchant sur *le côté*, ou en se redressant et vice *versa.* — Le mouvement, la marche, la pression, la châleur extérieure et le grand air améliorent également beaucoup de souffrances, tandis que quelquefois d'autres *s'aggravent* sous ces mêmes conditions. — C'est ordinairement le soir, ou la nuit, avant minuit, quelquefois aussi le matin et après le repas, que l'on est le plus souffrant. -*Aggravation des souffrances, tous les deux jours, le soir. — Agitation et malaise dans tout le corps avec impossibilité de dormir ou de se reposer, et besoin continuel d'étendre les membres. — Pulsations fréquentes et pénibles par tout le corps, plus fortes pendant le mouvement. — *Grande disposition des membres à s'endormir. — Tremblement fréquent des membres, avec anxiété.—Paresse et lourdeur des membres, avec faiblesse paralytique, sensibilité douloureuse des articulations et marche vacillante. — Fatigue matutinale, qui augmente dandla position couchée. -- Accès d'évanouissement, avec pâleur mortelle du visage. — Convulsions épileptiques, avec mouvements violents des membres, et suivies de faiblesse, de rapports et d'envie de vomir (après la suppression des règles). — Grande sensibilité et répugnance pour le grand air. — Grand besoin de rester couché.



586


on assis. -- *Douleur de meurtrissure dans les 0s des extrémités. -- Amaigrissement.

Peau. — Prurit le plus souvent brâlant ou picotant (comme par des piqures de fourmis), principalement le soir et la nuit, à la chaleur du lit, aggravé en se grattant. — *Taches rouges comme des morbilles, ou des urticaires. — Rougeur fréquente, même des parties froides. — °Éruptions semblables aux varicelles conoides, avec prurit violent, au lit. — *Engelures, avec gonfiement rouge bleuûtre, chaleur et douleur brûlante ou pulsative. — °Érysipèle flegmoneux, avec dureté, chaleur brûlante et douleur lancinante en touchant ou en remuant la partie malade. — Furoncles. — Rougeur luisante, dureté et prurit autour des ulcères, arec saignement facile et douleurs lancinantes, brûlantes et rougeantes.

Ulcères enflammés, ou putrides. — Varices.

Sommoil. — *Somnolence continuelle et sommeil comateux, avec agitation et récasseries inquiètes, le jour ou la nuit. — Grands envie de dormir, le jour, principalement le soir, ou après-midi. - Sommeil irrégulier, le soir de trop bonne heure, ou le matin trop tard, et quelquefois avec insomnie nocturne. — *Sommeil tardif, quelquefois pas avant denn heures après minuit, et souvent avec réreil de bonne heure. — *Une grande affluence d'idées empéche de dormir le soir et la nuit. - *Sommeil agité, avec réreil fréquent et état d'engourdissement en s'éveillant. Impossibilité de dormir autrement qu'en étant assis, la tête penchée en avant ou de côté. - Pendant le sommeil, paroles, délires, mouvements convulsifs de la bouche, des yeux et des membres, pleurs, cris et gémissements, cauchemar, sursauts arec effroi, seconsses dans le corps et tressaillement des membres. — *La nuit, grande agitation et jactation, oinquiétude et angoisse de cœur, bouillonnement de sang, chaleur sèche, prurit, divagations et idées fixes. - En dormant, on est couché sur le dos, les genoux levés et les bras posés sur la tête ou croisés sur le ventre.— *Réves fréquents, effroyables, anxieux, -confus, vifs, dégoûtants, voluptueux, de querelles et d'affaires du jour, de spectres et de morts. — Büllements fréquents.

Plèvre. — *Froid, frissons et horripilations, principalement le soir, ou après midi, et quelquesois arce pâleur du risage, vertiges et étourdissement, douleur et pesanteur à la tête, anxiété et oppression de poitrine, vomissement muqueux, besoin de se coucher, et chaleur passagère. — Froid et frissons partiels, principalement au dos, aux bras, aux jambes, aux mains et aux pieds, souvent avec chaleur de la tête ou du visage et rougeur des joues. — Froid semi-latéral, avec torpeur du côté affecté. — *Chaleur sèche, principalement la nuit, le soir au lit, ou le matin, et souvent avec accès d'angoisse, mal à la tête, sace rouge et boussie, ou sueur au cisage, frissons en se décourrant, brûle-lement aux mains avec gonslement des veines, lamentations,




587

sonpira et gémissements, sommeil profond ou agité, respiration anxieuse et précipitée, accès d'évanouissement avec obscurcissement des yeux, envie de vomir et selles diarrhéiques. - *Chaleur partielle, principalement au tisage avec rougeur des joues, aux mains, aux pieda, etc., et souvent seulement d'un côté, avec froid on frissons aux mêmes parties de l'autre côté. — *Accès fébriles, composés de chaleur qui est précédés de frissons avec adipoie et mélée ou *suivie de sueurs;* type quotidien, tierce, ou quarte; exacerbation le soir, ou après midi; rémission le matin, et, dans l'apyrexie, mal à la tête, oppression douloureuse de la poitrine, toux humide, amertume de la bouche, constipation ou diarrhée. — «Symptômes fébriles, avec perte de connaissance, délires, pleurs et désespoir, ou avec symptômes gastrico-muqueux ou bilieux, ou avec sommeil comateux. — Répugnance pour la chaleur extérieure. — *Pouls accéléré et petit, -ou plein et lent, ou faible et presque supprimé. — * Sueurs principalement la nuit, ou vers le matin; sucurs abondantes et fétides; "sucurs semi-latérales, ou partielles (à la tête et au vimge), et sueurs avec crampes aux bras et aux mains, fatigue, sommeil comateux, révasseries et crou-

geur du visage.

Horal. — *Mélancolie, avec tristesse, pleurs, grande inquiétude sur ses affaires, ou sur en santé, ocrainte de la mort, soucis et humeur chagrine. — Rires et pieurs involontaires. — Grande angoisse et inquictude, le plus souvent dans la région précordiale, et quelquesois avec penchant au suicide, "battement de cœur, chaleur et besoin de desserrer les vêtements, tremblement des mains et envie de vomir. — *Accès d'anxiété, avec crainte de mourir ou d'être frappé d'apoplexie, avec bourdonnement d'oreilles, frimona et mouvementa convulsifa dea doigta. — Appréhensions, authropophobie, *peur nocturne ou vespertine de revenants, avec envie de se cacher ou de s'enfuir, méliance et soupçons. -*Folie tacitume, avec air morne, froid et égaré, soupirs et survent position assise, les mains jointes et ne se plaignant de rien. --- «Désespoir de la félicité éternelle, avec prières continuelles. — Découragement, indécision, horreur des affaires et gêne de la respiration. — Caractère envieux, mécontent et avide, de manière à vouloir prendre tout pour soi. — Humeur capricieuse, avec désir tantôt de ceci, tantôt de cela, et refus de ces choses dès qu'on les a obtennes. — *Humeur hypocondriaque et morosité, principalement le soir, souvent avec répugnance pour la conversation, grande susceptibilité de caractère, disposition à se facher, cris et pleurs. — *Mouraise Aumeur, quelquefois avec horreur du travail, et dégout ou mépris de toutes choses. — Inadvertance, précipitation et distraction. - En parlant, difficulté à s'exprimer correctement et omission de plusieurs lettres en écrivant. — "État d'étourdissement ; on ne suit ni où l'on est, ni ce que l'on fait. — Grande affinence d'idées très-mobiles. — "Diva-



gations nocturnes; délires violents et parte de connaissance. — «Vizions effrayantes. — Faibleme de mémoire. — Idées fines. — Stupidité.

Tôto. -- *Fatigue de la tête par les travauz intellectuels. -*Sensation de vide et d'embarras dans la tête, comme après des veilles prolongées ou des débauches, et quelquefois avec indifférence. — *Vertiges tournoyants, comme dans l'ivresse, ou vertiges au point de tomber set chancellement, principalement le sour ou le matin, en se redressant, en se levant après avoir été codché, en étant assis, en se baissant, en se promenant au grand air, ou après le repas, ainsi qu'en levant les yeux, et souvent avec grande pesanteur, et chaleur à la tête, pâleur du vienge, envie de vomir, sommeil, obscurcissement des yeux, et obourdonnement d'oreilles. — La méditation et la conversation augmentent les vertiges. — "Accès d'étourdissement et perte de connaissance, avec rougeur bleuatre et bouffissure du visage, perte du mouvement, battements de cœur violents, pouls presque éteint et respiration ralante. — Douleur de meurtrissure dans le cerosau, comme dans les flèvres typholdes ou par suite d'un enivrement par de l'eau-de-vie. - *Mal de tête, comme par une indigestion par des choses grasses. — Douleur dans la tête comme si le front devait éclater, ou comme si le verveau était tendu, comprimé, on contracté. — *Elancements ou douleurs vives, tractives et tressaillantes, ou fourmillement, pulsation et térébration dans la tête. — *Bruissement, bourdonnement —et pétillement dans la tête. Tou sensation douloureuse comme ei un courant d'air traversait le cerveau. - "Les maux de tête ne sont souvent que semi-latéraux, se propageant jusqu'à l'oreille et aux dents, ou ils occupent le front au-dessus des yeux jusque dans les orbites, on bien ils se font sentir à l'occiput, avec contraction douloureuse dans la nuque. -- *Apparition ou aggravation des maux de tête, le soir après s'être couché, ou la nuit, ou le matin au lit, ainsi qu'en se baissant, -en remuant les yeux ou la tête, en se promenant au grand air, *et pendant un travail de tête; "la compresaion les soulage quelquefois. — "Maux de tête avec nausées et vomissement, *ou avec congestion et chaleur à la tête, ~ou bien avec horripilation et accès d'évanouissement, *vertiges, obecurcissement des yeux et bourdonnement des creilles, photophobie et larmoiement. — Douleur au cuir chevelu en rebrouseant les cheveux. — Démangeaison et prurit à la tête. — Pustules purulentes et petites tumeurs, avec douleur d'ulcération au cuir chevelu.

Yeux. — Douleur aux yeux, comme si on les grattait avec un conteau. — Sensation brûlante, *douleur pressive comme par du sable, ou douleur vive ou lancinante dans les yeux, ou bien térébration et douleur incinive. — Pruvit brûlant aux yeux, principalement le soir. — *Inflammation des yeux et des bords des

588






paupières, avec rougeur de la sciérotique et de la conjonctive, et sécrétion muqueuse abondante. — *Gonflement et rougeur des paupières. — "Trichiase à la paupière. — "Cristallin obscurci, couleur grishtre. — Orgelets "avec inflammation de la sclérotique et douleurs tensives, tractives, en remuant les muscles de la face. — * Sécheresse des yeux et des poupières, surtout lorsqu'on a sommeil. — *Larmoiement abondant, principalement au vent ainsi qu'au grand air, au froid et à la clarté vive du jour,--»Larmes acres et corrosives. — Abcès près de l'angle de l'asil, comme une fistule lacrymale.—Agglutination nocturne des paupières.— Pupilles contractées ou dilatées. — •Regard fixe et stupide. — Obscurcissement des yeux et perte de la vue, quelquefois avec pâleur du visage et envis de vomir. — Vue pâle (aspect blême de tous les objets). — •Perte de la vue au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient couverts d'un bandeau. — *Fue trouble, comme à travers un brouillard, ou comme par quelque chose que l'on pourrait enlever par le frottement, principalement au grand air, le soir, le matin, ou en se réveillant. — Diplopie. — *Cercles lumineux devant les yeux, et diffusion de la lumière des bougies.—Grande sensibilité des yeux à la lumière, qui cause des élancements.

Orelles. — Douleur dans l'oreille, comme si quelque chose allait en sortir. — *Elancements avec pruvit ou douleurs vices, tressaillantes, et étreintes dans les oreilles et aux environs; *les douleurs vicennent quelquefois par accès, envahissent toute la tête, paraissent insupportables et font perdre jusqu'à la raison. — *Gonfiement inflammatoire, chaleur et rougeur érysipélateuse de l'oreille et du conduit auditif, ainsi que des parties externes environnantes. — *Gonfiement douloureux des os derrière les oreilles.— Cérumen dur et noir. — Écoulement de pus, de sang, ou d'une humeur jaunatre, épaisse, par l'oreille. — Gazouillement comme par des ciseaux, murmures pulsatifs, tintement, *bruissement et bourdonnement dans les oreilles, — *Dureté de l'ovie, comme par obturation des oreilles. — Croûtes brûlantes, démangeantes, au tragus (avec gonfiement des glandes du cou). — Elancements dans les parotides.

Non. — Pression et douleur d'abobs à la racine du nez. — *Ulcération des narines et des alles du nez. — *Éconlement d'un pus fétide et verdâtre ou jaunâtre par le nes. — Mouchement de sang et *hémorrhagie nasale, quelquesois avec obturation du nez. — *Obturation du nez, corysa sec, principalement le soir, et à la chaleur de la chambre. — Coryza avec perte du goût et de l'odorat, ou *avec écoulement de mucosités épaisses et fétides. — *Chatouillement au nez, et éternument fréquent, principalement le soir et le matin. — Frissonnement continuel pendant le coryza. — Odeur continuelle devant le nez, comme d'un vieux rhune, ou comme d'un métange de casé et de tabac. — Gantiement du nez.



PULSATILLA.

Visage. — *Visage pâle, et quelquefois avec air souffrant. — *P\$-leur du visage, alternant avec chaleur et rougeur des jouen. — Bueur à la face et au cuir chevelu; horvipilation ou susur semi-latérale à la face. — *Visage boufil et rouge bleuktre. — Mouvements convulsifs et palpitations musculaires au visage. — Tension et sensation de gonflement du visage, ou sensibilité dou-loureuse de la peau, comme si elle était excoriée. — Érysipèle à la face, avec douleur lancinante et desquamation de la peau. — Nodosités rouges dans la région des pommettes. — Gonflement, tension et gerçures aux lèvres, avec exfoliation de la peau. — Douleur vive et contractive aux mâchoires. — Gonflement des

glandes sous-maxillaires et de celles du cou.

590

Dents. — *Douleurs vives, lancinantes dans les dents, ou douleurs tractices, tressaillantes, comme si le nerf était tendu et relaché tout d'un coup, ou douleurs pulsatives, fouillantes et rongeantes, souvent avec picotement dans les gencioss. — *Les maux de denta qui affectent les dents saines comme celles qui sont cariées, ne sont souvent que semi-latéraux, et se propagent fréquemment jusqu'au risage, à la tête, à l'oreille, et à l'œil du cité affecté, étant accompagnés quelquefois de pâleur du visage, frissonnement, et dyspnée. — *Aggravation ou apparition des maux de dents, principalement le soir ou après midi, ou la nuit, ainsi qu'à la chaleur du lit ou de la chambre; renouvellement en mangeant, ainsi qu'en prenant quelque chose de chaud et par le contact du cure-dents; soulagement par l'eau froide, ou à Pair frais.—Quelquefois les manz de dents s'aggravent aussi par l'eau froide, ainsi que par l'air frais ou le vent, mais ces cas sont plus rares. — Sensation brûlante ou de gonflement, douleur d'excoriation et pulsation aux gencives. — Vacillement des dents.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche, "le matin. — Mauvaise odeur, et même fétidité putride de la bouche, principalement le matin, ou la nuit et le soir au lit. — *Écoulement d'une salire douceâtre aquense par la bouche, quelquesois avec envie de vomir. - Sensation comme si la langue était trop large. — Insensibilité de la langue, comme si elle était brûlée. — *Langue chargée d'un enduit épais, de couleur grisatre, blanchâtre, ou jaunaire. — Accumulation de mucosités tenaces dans la bouche et aur la langue; ces parties sont comme revêtues d'une peau blanche. — *Gerçures et vésicules douloureuses à la langue. — Sensation comme si le palais était gonsé ou couvert de mucosités tenaces.

Gorge. — *Douleur d'excoriation dans la gorge, comme si tout y était à vif, avec grattement, sensation brûlante et cuisson. — *Rougeur à la gorge, des tonsilles et de la luette, avec sensation comme si ces parties étaient gonflées, principalement en avalant. — Déglutition difficile, comme par paralysie ou par rétrécissement de la gorge. — *Élancemente dans la gorge, avec premion et tension en avalant à vide. — Inflammation de la gorge avec




591

enflure variqueuse des veines. - Sécheresse dans la gorge, ou accumulation d'un mucus tenace qui revêt les parties affectées. - *Les maux de gorge s'aggravent ordinairement le soir ou

l'apres mili.

Appétit. — *Goût de la bouche faile, muqueux, putride, "empyreumatique, terreux, cu comme du pus. - *Goût douccâtre, acide ou amer, de la bouche et des aliments, principalement de la viande, du pain, du beurre, de la biere et du lait, substances qui souvent aussi paraissent insipides en causent du degoût. - Amertume ou aigreur de la bouche, immédiatement après avoir mange, amsi que le matin et le soir Gout amer du vin, et gout putri le de la viande. - Les aliments paraissent ou trop sales ou insipid s. - *Manque d'appetit et degoût des aliments. - Faim et desir de manger, sans que l'on sache quoi. - Faim canine, avec douleur rongeante a l'estemac. - *Adepsie complète, ou soif excessire avec humidite de la langue, et désir de la bière, ou de boissons spiritueuses, piquantes et acides. -*Sensation d'un dérangement d'estomac, semblable à celui que canserment la runde de pore on des patisseries grasses. -Degrut et repugnance pour la fumee du tabac. - * Apres acoir mange, nausées et rapports, régurgitation et romissement, ballonn ment et pression dans le creux de l'estomac, coliques, et flatuosites, mal a la tete, gêne de la respirat, n. mauvaise humeur et melancol.e, ou rires et peurs involontaires, et beaucoup Cautres souffrances. - oC'est surtout le pain qui pese sur l'este mae.

Estomac. — *Rapports fréquents, quelquefois avortés, ou arcc goût des alements, ou acides, ou amers, et principalement après le repas. Regurgitation des aliments - Ecoulement d'eau de l'estemac, exame des pituites. *Hoquet fréquent, principalement en famant du tabac, apres avoir bu, ou la nuit, set quelquefois avre acces d'étouffement - Nausees et enrie de romir insupportables, quelqu feis jusqu'a la gorge et dans la bouche, avec a sation panible comme at un ver rementait dans l'œsophage - to exderentration et l'etranglement dans l'esophage. *Fomosements quelquefois violents, de matieres verdotres, muquenses ou bilinuses et ameres, ou acides. - *Vomissement des ulements. — Vonnescuent de sang. — *Les nausces et les voinissements ont principalement lieu le soir ou la nuit, ou après arour bu ou mange, ainsi que pendant le repas, et souvent ils se manifestent avec frissonnement, paleur du risage, coliques, douleurs aux oreilles ou au des, sensatien brulante dans la gerge et borborygmes. - * Sensibilité douloureuse de la région stomacale a la moindre pressi n. * Liquieurs pressives, crampoides. contractives et compressives, dans l'estomac et la région précordinle, principalement apres le repas, ou le soir, on le matin, et souvent avec comissement on nausées, et gêne de la respira-



tion. — Fourmillement, ou pulsations dans le creut de Festemac, ou élancements en faisant un faux pas. — Douleur à l'épigastre qui s'aggrave fortement en étant assis (pendant la

grossesse).


592

Ventre. — Tension tractive dans les hypocondres, ou **élancements** pulsatifs, comme dans un abcès. — Ballonnement dur du ventre. principalement à l'épigastre, avec tension et sensation de plénitude. - *Douleurs crampoides et compressives, quelquefois au fond de l'hypogastre, avec pression sur le rectum, ou tranchées. principalement autour du nombril, ou douleurs vives et lancinantes dans le ventre. - *Les coliques sont souvent accompagnées de vomissement ou de diarrhées; elles se manifestent le plus souvent *le soir,* ou *après avoir bu ou mangé,* et quelquefois le serrement du ventre ou le repos les soulagent, tandis que le mouvement les aggrave. — Gonflement annulaire autour du nombril, douloureux en marchant. — Rétraction et endolorimement du ventre, avec grande sensibilité des téguments du ventre, qui paraiment gonfiés, avec douleur de meurtrissure en y touchant, en baillant, en chantant, en toussant, et à tout mouvement des muscles abdominaux. — Coliques flatulentes, principalement le soir, après le repas, ou après minuit, ou le matin, avec douleurs pressives, produites par des flatuosités incarcérées, rumeur, borborygmes et grondement dans le ventre, et sortie de flatuosités fétides. — Pustules purulentes dans les aines.

Selles. — *Constipation et selles difficiles, quelquefois avec pression douloureuse sur le rectum et douleurs au dos. — Envie fréquente d'aller à la selle, même la nuit. — Selles involontaires et inaperçues, pendant le sommeil. — *Selles diarrhéiques même la nuit, et quelquefois avec coliques et tranchées, frimons et horripilations, et douleurs à l'anus. — *Évacuations fréquentes de mucosités blanchâtres, *jaunâtres, sanguinolentes, ou de matières verdâtres, hachées, bilieuses, ou aqueuses, et quelquefois même corrosives. — Avant et après les selles, brûlement, cuisson, et douleur d'excoriation à l'anus et dans le rectum. — Écoulement de sang par l'anus, même hors le temps des selles. — *Hémorrhoides areugles et saignantes, avec prurit, cuisson

et douleur d'excoriation. - Sortie des hémorrholdes.

Urines. — •Rétention d'urine, avec rougeur et chaleur à la région vésicale; anxiété et douleurs pénibles dans le ventre. — *Ténesme de la vessie, et envie fréquente d'uriner, avec pression douloureuse aur la vessie, et douleur tractive dans le ventre. — Émission involontaire de quelques gouttes d'urine, en tousant, en marchant, étant assis, et en expulsant des fiatuosités. — *Pissement au lit. — *Flux abondant d'urines aqueuses, avec faiblesse dans les reins, et diarrhées, ou urines rares, rouges ou brunes, quelquefois avec écume violette. — Urines, avec dépôt rouge, ou couleur de brique ou de violette, ou muqueux, ou gé-



PULSATILLA.

598

latineux. — *Urines sanguinolentes, *avec dépôt purulent, et douleurs dans les reins. — *Ecoulement par l'arèthre, comme dans la gonoviée. — Rétrécissement de l'urèthre, avec jet d'urine très-mince. — Brûlement pendant et après l'émission d'urine. — Tiraillement et premien dans l'urèthre, le col de la vessie et la vessie. — Premien et constriction dans la vessie, avec endolorissement de la région vésicale. — *Gonflement de la région du col de la vessie, avec endolorissement au toucher, jet d'urine intermittent, et douleur crampolde jusque dans le bas-

sin et les cuisses, après avoir uriné.

Parties viriles. — *Prurit et démangeaison au prépuce et au scrotum, principalement le matin et le soir. — *Gonfiement inflammatoire des testicules et du cordon spermatique (quelquefois seulement d'un côté), avec douleurs pressices et tractices jusque dans le ventre *et les reins; rougeur et chaleur du scrotum, nausées et envie de vomir. — *Gonfiement hydropique du scrotum, de couleur blanchêtre. — *Exaltation extraordinaire de l'appétit vénérien, presque comme priapisme, avec érections fréquentes et continues, désir violent du colt, et pollutions fré-

quentes. — Ecoulement de liqueur prostatique.

Bègles.—*Douleurs crampoides dans la matrice, ou tension tractive dans l'utérus, et douleurs comme celles de l'enfantement.
—*Métrorrhagie. — *Sang des règles noir, avec caillots et mucosités, ou sang pâle et séreux. — Règles irrégulières, trop tardires
ou trop hâtives, de trop courte ou de trop longue durée, ou entièrement supprimées, avec coliques, spasmes hystériques abdominaux, douleurs hépatiques, gastralgie, maux de reins, nausées
et romissements, friesons et pâleur du visage, migraine, vertiges, affections morales, ténesmes de l'anus et de la vessie,
points de côté et beaucoup d'autres souffrances, avant, pendant ou après l'époque.—*Flueurs blanches, épaisses comme de
la crême, ou corrosives et brâlantes, principalement à l'époque
des règles (avant, pendant ou après), et quelquefois avec tranchées. — Gonflement des mamelles, avec tension et premion,
comme si elles se remplismient de lait.

Laryux. — *Catarrhe, avec enrouement, apreté, sécherense, grattement et douleur d'excoriation dans le laryux et la poitrine. — *Accès de constriction du laryux, principalement la nuit, en étant couché horizontalement. — *Tous ébranlante, principalement le soir, la nuit, ou le matin, provoquée par une sensation de sécheresse ou un grattement et un chatouillement dans la gorge, aggrarée en étant couché, et souvent accompagnée d'encie de romir arec romiturition et romissement, ou d'étouffement comme par la vapeur du soufre, avec saignement du nex et respiration rélante. — *Toux avec élancements dans la poitrine ou les côtés, et battements de cour. — *Toux homide, avec expectoration de mucocités blanches, touages, ou de matières épaisses,



jaunâtres, d'un goût amer ou putride. — *Expectoration d'un sang nour et de caillots par la toux. — En toussant, élancements

à l'épaule droite ou au dos

594


Poitrine. Respiration accelerée, courte et superficielle (pendant la lièvre), ou ralante et anxieuse. *Gêne de la respiration, haleine courte, ctouffement comme par la vapeur du soufre, et acces de dyspuce et de suffocation, avec anxiete - Constriction crampolde de la pastrine ou du laryne, boquet violent, toux, mal a la tête, et vertiges; principalement le soir, après le repas. ou la nuit, étant couché horizontalement. *Le monvement, la marche accelerae, le grand air et le froid, aggravent les souffrances asthmatiques - *Trasion crampoide et constructive dans la postrene, principalement en respirant, et quelquefois avec chaleur intérieure et bouill unement de sang. - Douleur d'ulcération, ou douleur vive et incisive, dans la pritrine. -*Elancements dans la poutrine et dans les côtés, principalement la puit et en ctant couche, et quelquelois avec gene de la respiration profonde, impossibilite d'être couché sur le côte malade, toux courte et acces d'étouffement. - Congestion de sang à la poitrine et au cœur, surtout la nuit. - *Accès fréquents et violents de battements de cœur, principalement après le diner, on apres des émotions morales, ou prove ques par la conversation, et souvent avec angoisse, obscurcissement de la vue et gêne de la respiration, surtout en étant couché sur le côté gauche. -Anxieté, pesanteur, pression et sensation brûlante au cœur

Tronc. — *Maux de reins et douleurs dans le dos, comme après être resté longtemps courbé, ou avec roideur comme par un bandeau. — *Maux de reins, comme ceux de l'enfuntement. — *Elancements dans le dos, aux reins et entre les omoplates. — Déviation de la colonne vertébrale. — *Douleurs rhumatismales, tensires et tractires, à la nuque et au cou, quelquefois seulement d'un côté, et souvent avec gonflement des parties et douleurs d'ulceration sous-cutanée au toucher — Craquement dans les vertebres du cou et les emoplates, en remuant ces parties, — Boutons pruriants au cou. — Genflement des glandes

du cou

Bras. *Douleurs rives, tressaillantes et tractives dans l'articulation scapulaire, ainsi qu'aux bras, aux mains et aux doigts.

— Douleur paralytique à l'articulation scapulaire, en levant et en remuant le bras. — *Sensation brûlante au bras, le soir ou la nuit, avec sensation de secheresse aux doigts — *Pesanteur pressive dans les bras, avec sensation de torpeur, principalement dans les mains — Sensation de *ganflement, et douleur de luxation aux articulations des condes, des mains et des doigts, avec tension et roideur. — Engourdissement facile des doigts, principalement le matin et la nuit. — Vésicules entre les doigts, avec douleurs picotantes. — Douleur de panaris à l'index.



PULSATILLA. — BANUNCULUS BULBOSUS.

595

Jambos. — Douleur de meurtrissure ou d'ulcération dans le psoas. — Douleur de luxation à l'articulation coxo-fémorale, avec tressaillements douloureux, comme dans une plaie, jusqu'au genou, principalement dans le repos. — *Tiraillement et tension dans les cuisses et les jambes, principalement aux mollets, comme si les tendons étaient trop courts. — Douleur de meurtrissure. avec sensation de faiblesse paralytique dans les os et les muscles des cuisses et des jambes. — Douleur d'ulcération sous-cutanée, dans les jambes et la plante des pieds. — Craquement dans les genoux. — *Gonflement des genoux, equelquefois principalement au-dessus de la rotule, et souvent avec chaleur, inflammation, *et douleurs vives, tractives et lancinantes. — Faiblesse et fléchissement des genoux, avec marche vacillante. — Tiraillement et grande fatigue dans les jambes, et principalement dans les genoux, avec tremblement. — Enflure des veines, et *varices aux jambes. -- Bourdonnement dans les jambes, en restant debout. - Douleur de meurtrissure dans le tibia. - Tension et traction dans les mollets. — *Gonflement chaud des jambes, on seulement du dos ou de la plante des pieds, quelquefois avec douleurs lancinantes au toucher, et pendant le mouvement. --Sensation de torpeur douloureuse dans la plante des pieds et dans le gras des orteils. — *Gonflement ædémateux des pieds, principalement le soir. — Elancements térébrants et douleurs incisives dans les talons. --- Élancements dans la plante des pieds et le bout des orteils.

RANUNCULUS BULBOSUS.

RAN. — Renoncule hulbeuse. — Archives de STAPT. — Hist. mat. et prép. Voy. Pharmac. homosp., p. 265. — Dores usitees : 6, 9. — Durée d'action : plusieurs semaines dans des affections chroniques.

Antidotes : Bry. camph. puls. rhus. — Les boissons alcooliques en aggravent les effets ; il en est de même de staph., de suif. et du vinaigre.

COMPARER AVEC: Bry. carb-v. n-vom. puls. ran-sc. rhus. sassap. sahad. sep. staph.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs de brisement, élancoments ou douleurs déchirantes, rhumatismales et arthritiques, dans les membres et les muscles. — Tressaillement des muscles. — Secousses dans tout le corps. — Attaques d'épilepsie. — (Indurations. — Affections ictériques.) — Douleurs provoquées par le contact, le mouvement, l'extension ou le changement de position, surtout au trone et dans les membres. — Beaucoup de symptômes paraissent aussi au changement de température.



RANUNCULUS BULBOSUS.

par exemple, lorsqu'on passe du froid à la chaleur, et vice verse, comme aussi le matin et le soir, et après le repas. — Lassitude et brisement dans tous les membres. — Tremblement des membres après un accès de colère, même des plus légers. — Faiblesse

subite comme si on allait perdre connaissance.

596

Peau. — Prurit fréquent et fort à diverses parties de la peau. — L'ancinations à la peau qui se changent en prurit. — Éruptions résiculeuses, comme des ampoules de brûlure. — Vésicules bleu foncé, petites, profondes, transparentes, par groupes rapprochés, avec prurit brûlant et croûtes calleuses et dartreuses. — Ulcères rongeants et lisses, avec bords aigns et prurit brûlant et lancinant. — Excroissances calleuses et autres. — Dartres sur tout le corps. — Eruptions bulleuses des nouveau-nés. — Gale pustuleuse.

Semmeil. — Envie de dormir le jour. — Sommeil tardif et insommie nocturne, fréquemment par oppression de poitrine, chaleur et bouillonnement de sang, mais le plus souvent sans cause appréciable. — Réveil fréquent la nuit, et veille prolongée. — Réveil de bou matin. — Impossibilité de rester couché sur le côté. — Réves anxieux, de péril (par l'eau), ou vifs et lascifs.

Fièvre. — Accès de fièvre, consistant principalement en froid, après le repas ou le soir, avec douleurs abdominales et autres incommodités. — Chaleur dans la tête, avec froid aux mains. —

Frissons le soir, avec chaleur de la face.

Moral. — Pusillanimité et inquiétude, surtout le soir. — Peur de revenants, le soir. — Irritabilité colérique et humeur querelleuse, surtout dans la matinée. — Oppression avec pleurs abondants. — Perte des idées. — Difficulté de la méditation. — Esprit obtus.


Tôte. — Faiblesse, étourdissement et embarras de la tête. — Vertige tournoyant, au point de faire tomber, en passant de la chambre au grand air. — Mal de tête avec anxiété et faiblesse, pendant le repas. — Mal de tête semi-latéral, au-dessus de l'œil, avec abattement et envie de pleurer. — Compression et pression espansive dans le sinciput et le vertex. — Sensation de bouffissure de toute la tête. — Déchirement et pression dans les tempes. — Coups dans l'occiput. — Congestion sanguine dans la tête. — La plupart des maux de tête apparaissent en passant d'un endroit chaud au froid, et vice versa. — Fourmillement douloureux ou élancements brûlants au cuir chevelu.

Yeux et Oreilles. — Prurit aux yeux. — Pression dans le globe des yeux. — Douleur d'excoriation dans les angles des yeux, cuisante et brûlante. — Inflammation des yeux et larmoiement. — Elancements dans les oreilles, surtout le soir. — Sensation

crampoide dans les oreilles et aux oreilles.

Nes. — Fourmillement pénible et douloureux dans le nez. — Nes rouge, gonfié et enflammé, avec douleur tensive et croûtes abon-





RANUNCULUS BULBOSUS.

dantes dans l'intérieur. — Obturation du ner, surtout dans l'appartement, avec douleur d'excoriation. — Écoulement abondant de mucosités visqueuses par le nez.

Visage et Dents. — Chalcur de la face, avec rougeur vive des joues. — Fourmillement à la face, principalement au menton et au nex. — Douleurs crampoides et tournoyantes dans la face et les mâchoires. — Crampes dans les lèvres. — Maux de dents, le matin, au réveil. — Douleurs incisives et comme d'arrachement dans les dents molaires.


Bouche et Gurge. — Accumulation abondante d'eau dans la bouche. — Salivation. — Salive blanche, avec goût métallique. — Accumulation de mucosités abondantes dans la gorge. — Sensation spasmodique de quelque chose qui remonterait dans l'œsophage et dans la gorge. — Douleurs inflammatoires, brûlantes dans la gorge et le palais.

Appétit et Estomac. — Goût fade, douceatre ou d'une amertume aigre. — Goût amer, empyreumatique, pendant que l'on mange et après avoir mangé des aliments secs. — Soif augmentée, après midi. — Renvois fréquents. — Hoquet crampoide. — Nausées fréquentes, après midi, ou le soir, quelquefois avec maux de tête. — Douleurs d'estomac. — Pression au scrobicule. — Douleur d'excoriation et sensation brûlante au creux de l'estomac, comme aussi à l'orifice de l'estomac, surtout au toucher. — (Inflammation de l'estomac.)

Ventre. — Douleur de brisement dans les hypocondres, quelquefois au toucher. — Douleur d'excoriation dans l'hypocondre
gauche, principalement en remuant le tronc. — Lancinations
dans la région hépatique. — Pulsations dans l'hypocondre
gauche. — Douleurs sourdes dans le ventre, avec sensibilité des
intestins pendant la marche. — Douleurs abdominales pincantes, avec mouvements de rotation, et sensation, à la pression
extérieure, comme si tout était meurtri et ulcéré dans le ventre.
— Douleur d'excoriation brûlante dans le ventre, comme dans
une inflammation lente. — Expulsion fréquente de vents trèsfétides.

Selles — Règles. — Selles tardives et dures. — Selles fréquentes et abondantes. — Dysurie. — Ulcères de la vessie. — Leucorrhée Lore et rongeante.

Poitrine. — Respiration courte et gênée, avec oppression de poitrine, comme après une mortification ou un chagrin, avec desoin de respirer profondément et de pleurer abondamment. — Pression à la poitrine. — Douleur rhumatismale à la poitrine, ou comme d'ulcération sous-cutanée. — Premion brûlante à la poitrine. — Lancinations dans la poitrine et le côté drôit de la poitrine, souvent profondément jusque vers le foie. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur des parties de la poitrine et de l'épigastre. — Sensibilité douloureuse de toutes les parties ex-



RAN. BULBOSUS. — RAN. SCELERATUS.

ternes de la poitrine, des muscles intercostaux, de la pièvre, etc., se manifestant ou s'aggravant surtout par le mouvement, le contact et en étendant le corps. — Douleur dans la poitrine, comme

par adhérence de la plèvre.

598

Trono et Membres. — Douleur de brisement rhumatismal dans tout le tronc et entre les omoplates. — Douleurs crampoides, déchirantes, lancinantes et tressaillantes dans les bras. — Froid aux mains. — Prurit aux mains et aux doigts. — Dartres à la paume des mains. — Fourmillement dans les doigts. — Dartres, ampoules et ulcères aux doigts. — Douleurs tractives le long des cuisses. — Douleurs crampoides, térébrantes, et prurit dans le milieu des cuisses. — Craquement dans l'articulation du genon. — Douleur de roideur dans les articulations des pieds. — Crampes au cou-de-pied. — Lancinations pulsatives dans les talons. — Douleur d'excoriation et de lancinations dans les orteils.

RANUNCULUS SCELERATUS.

RAN-SC. — Renoncule scélérate. — Archives de STAPF. — Hist. nat et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 266 — Doses natiées : 6? 30? — Durée d'action : 6 à 7 semaines dans des affections chroniques.

Antidote : Camph.

Comparer avec : Puls. ran. sil. veratr.

SYMPTOMES GENERAUX .- (Affections arthritiques.) - Douleurs térébrantes, rongeantes, lancinantes, fourmiliantes, et qui se manifestent ou s'aggravent vers le soir. — Douleurs pressives et tractives. - Affections périodiques. -- Tressaillements convulsifs. — Evanouissements. — Eruptions vésiculaires, avec sécrétion séreuse, acre, jaunâtre. — Ulcères opiniâtres. — Insomnie avec agitation et juctation après minuit, quelquefois avec angoisse et chaleur. — Envie de dormir, le soir, avec humeur maussade et peu de disposition au travail. — Bâillements fréquents, après midi. - Sommeil incomplet après minuit, avec rêves anxieux, effroyables. — Réveil de bonne heure, avec veille prolongée. - Fièrre après minuit, chaleur générale et soif ardente, avec pouls plein, souple, accéléré; suivie de sueur générale, surtout au front. — Frissons pendant le repas. — Pouls plus fréquent, avec sensation comme si l'artère radiale était plus mince. - Horripilation le soir, avec soif et pression au front vers le dehors. — Sensation de froid, le matin après le lever, partant de la nuque et descendant le long du des. - Chaleur le soir, surtout à la figure, et suivie de sueur avec abattement. — Paresse et



RANUNCULUS SCELERATUS.

599

enaptitude au travail, le matin et le soir. - Tristesse, mélancolie, le soir. - Forte distraction et disposition a oublier les choses.

Tête. - Vertige avec perte des idees. - Mal a la tête, comme si elle etait serrée dans un etau. - Pression rongeante, tractive, crampoide, sourde, occupant souvent une place tres-restreinte du vertex. - Pression compressive et expansive, dans les tempes. -Pesanteur et sensation de plénitude dans la tête, qui semble être gonflée et plus volumineuse. - Contraction des téguments

de la tete Cuisson et prurit au cuir chevelu

Yeux et Oreilles. — Douleur dans les yeux en remuant promptement le globe de l'ail. - Pression dans le globe des yeux, fréquemment. — Caisson dans les angles des yeux, de temps en temps. Yeux convulsés. - Larmotement. - Blanc des yeux d'un jaune clair, avec veines injectees et agglutination des paupieres. Otalgie, avec pression dans la tête et traction dans les dents. - Tractions, élancements et térébration à l'exterieur du conduit auditif.

Face et Dents. - Cuisson et fourmillement dans le nez - Picotement au bout du nez - Eternument frequent. - Mucosites séreuses, abondantes dans le nez. - Face e name recouverte de toiles d'araignee. - Tractions dans la face, avec sensation de froid.—Tressaillement dans la face.—Souvent chaleur jugace à la face. Tache rouge a côté de l'aile de ite du nez sur laquelle se forme une petite vesicule avec deuleur d'excornation. Sensation de tremblement autour des commissures des lèvres, et de la levre inferieure - Maux de dents avec doul urs lancinantes et émoussement des dents. - Tractions tressadiantes et lancinantes dans les dents. Gonflement rouge et Luloureux et suignement facile des geneives Fourmillement dans quelques racines, comme si elles étaient poussées au dehors.

Bouche et Gorge. - Secheresse de la bouche. - Salivation seumeuse. - Langue chargee d'un enduit blane - Inflammation de la langue, avec sensation brulante et rougeur. - Desquamation et rhagades a la langue. - Contraction avec étranglement dans la gorge, aggraves en mangeant du pain - Sensation brûlante et grattement dans la gorge - Conflement des amygdales, avec lancinations. - Cuisson et clancements dans le gosier. -Mucosites épaisses dans la gorge, difficiles à detacher par le

renaclement. - Besoin frequent d'avaler à vide.

Estomac — Gout douceatre, le matin, avec langue blanche, chargée. Sensation de faim, sans appetit, parfois avec renvois. -Absence d'appetit. Après le repas, emission de vents, ou selles liquides - Renvois avec goat des iliments apres le repas. -Rencois a ride, fréquents, surtout apres avoir mange des beurrece. Renvois aigres, rances, le soir - Nausées, surtout après minuit, on le matin, avec envie de vomir. - Douleurs d'estoinac des plus violentes, avec inquiétude. - Sensation de plénitude,



RANUNCULUS SCELERATUS.

de pression et de tension à l'épigastre, aggravée par la pression extérieure, avec exacerbation le matin. — Douleurs constrictives à l'estomac. — Lancinations à l'épigastre. — Douleur d'excoriation et sensation brûlante à l'épigastre. — (Inflammation de

l'estomac.)

600


Ventre. — Pression sourde dans la région hépatique, aggravée en respirant profondément. — Lancinations dans la région hépatique. — Élancements dans la région de la rate, aggravés en respirant profondément. — Élancements, secousses et pression, dans la région lombaire. — Douleurs abdominales, avec accès d'évanouissement. — Pression sourde comme une cheville, ou sensation de tortillement derrière l'ombilic, la nuit ou le matin. — Douleurs abdominales crampoides. — Pincements et tranchées dans le ventre. — Tressaillement au ventre.

Selles — Parties génitales. — Selles retardées. — Envie pressante et fréquente d'aller à la selle, avec selle molle. — Besoin fréquent, sans qu'il sorte autre chose que des vents. — Prurit à l'anus, comme par des hémorrholdes, avec sensation comme si l'anus était poussé au dehors. — Suintement à l'anus. — Diarrhée séreuse, fétide. — Besoin fréquent d'uriner, avec émission peu abondante d'urines claires. — Brûlement dans l'urèthre après avoir uriné. — Émission de quelques gouttes après avoir uriné. — Tiraillements dans la verge. — Lancinations dans le gland. —

Cuisson au scrotum. — Pollutions.

Poitrine. — Petite toux sèche, rare et sans efforts. — Respiration gênée et profonde. — Soupirs involontaires. — Douleur de brisement dans la poitrine, avec sensation de fatigue dans cette partie, surtout le soir. — Pression oppressante à la poitrine. — Pincements et élancements dans la poitrine et la région du cœur, quelquefois avec suspension de la respiration, surtout le soir ou la nuit. — Rongement derrière le sternum, qui suspend la respiration. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la poitrine, surtout du sternum. — Battements de œur plus fréquents. — Pression comme par une cheville dans la région du cœur.

Tronc et Membres. — Douleur de brisement et de paralysie aux reins. — Picotement et fourmillement dans le dos et sur la poitrine. — Excoriation de la peau sous l'aisselle dreite. — Elancements térébrants à l'avant-bras, et jusque dans les doigts. — Térébration dans les os des mains. — Rongement dans la paume des mains. — Rongement, térébration et tressaillement lancinant dans les os des doigts. — Gonfiement des doigts. — Rongement et térébration dans toutes les parties des jambes et des pieds, surtout dans les orteils. — Élancements tressaillants et fourmillement dans les groe orteils. — Lancinations et douleurs brûlantes dans les cors aux pieds.



RAPHANUS SATIVUS.

601


RAPMANUS SATIVOS.

RAPHAN, — Rave. — Dr Hunsen, — Hist. net. et prép. Voy. Phormec. homoop., p. 205, — Burde d'action : 1 à 15 jours. Authorit?

SYMPTOMAS GRHARAUX. — Grande lassitude et accablement. quelquefois avec brisement dans tous les membres; l'enfant se couche le jour, parce qu'il se sent malade ; amaigrissement visible. - Peau, généralement moite; brûlement passager çà et là; odour de raifort de tout le corps. — Envie de dormir ; somnolence presque tout le jeur, avec paroles grondeuses, en rêve; sommeil agité, avec réveil fréquent, céphalalgie, namées et pincements dans la région ombilicale; sommeil avec révasseries; insomnie dopuis 11 houres du soir jusqu'à 2 houres du matin, puis sommeil agité, avec embarras de la tête, froid sux genoux et aux pieds; sommeil seulement jusqu'à 8 heures et avec réves inquiets ; réveil à 3 houres du matin, avec horripilation visiente au don et aux bum; pendant le sommeil, sueur abondante, on bien murmure liger, comme s'il s'entretenait avec ses amis.— Horripilation, mertout le long du dos, et à la partie postérieurs des bras, surtout après avoir bu de l'eau froide ; fréquents, avec chalous intérieure à la tôte et générale à la peau; "après l'horrigitation, chaleur intérieurs, Tou bien anni alternation d'horripliation et de chaleur; froid le soir au lit, avec faibleme dans les articulations, surtout celles du coude, et suivi de sueur très-abondanis; froid intériour, avec peau chaude et moite; ou se plaint coutinuellement du froid, tandis que la peau est constamment brulante au toucher; sueur de l'odeur du médicament (de méme que l'haleine); meur abondante pendant le sommell, surtout van la matin. — Pouls: petit et un peu dur; un peu fréquent et dur; relenti. — Moral : forte angoisse, avec peur de la mort; on la croit si prochaine que l'on demande les secutiv 4e la suligion.

Toto — Donie. — Tête entreprise, le matin au réveil, avec denleur source dans le front; vertige avec trouble de la vue; douleur violente dans le front; pression dans le front, qualquatrie surtout la nuit, ou avec embarras de la tête; pression au-densis des yeux, avec vue obscurcie, se dissipant après aveir vuent; pression au-densus de la racine du nes; élansements au verten; summe à la tête, après le lever. — Your enfoncés fillapour des yeux; addince de la pargière inférieure; populies un pou dilatére; vue plus forte, plus langue, ches un myope. — Dans l'eveille quadre,

Jam. — Drálka, Sv part., & 🍂



RAPHANUS SATIVUS.


déchirements et élancements qui semblent être dans l'os; élancements dans l'oreille droite; prurit à la conque de l'oreille gauche qui est douloureuse au toucher. — *Nes obstrué. — Odeur de raisort: éternument fréquent, ou tout au moins, besoin fréquent d'eternuer. — Visage: rouge, sombré; désiguré, avec nes pointu et jones jaunes, ou bien avec yeux creux et teint livide, a tel point qu'on se fait peur à soi-même; pâle avec traits anxieux et qui dénotent une grande faiblesse et beaucoup de souf-frances; teint jaune, surtout le matin, après le lever; déchirement dans la pommette droite; glande à la mâchoire insérieure, dure et gonflée. — Odontalgie lancinante, dans les molaires

gauche.

602

Bouche - Vomissements. - Langue: blanche; *chargée d'un épais enduit blanc; pale et rouge bleuatre, avec sillon profond et points rouge pale dans le milieu (au début de l'amélioration). - Dans la gorge, chaleur et brûlement, quelquesois surtout dans les amygdales et avec élancements; gonflement, rougeur et douleur des amygdales, comme si elles étaient à vif : mucosités abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe bronchique; expectoration abondante de mucosités blanches et très-visquenses, se détachant du gosier et de l'œsophage, le matin, à la suite d'un sommeil lourd et avec douleur d'excoriation dans la gorge. -Goût : de raifort ; *insipide ; *amer ; -très-mauvais ; de poivre. *Anorexie; ¬répugnance pour les aliments; répugnance pour le tabac à priser (chez un priseur); dans l'anorenie, grand désir de lait bouilli. — *Forte soif, continuelle. — Rencois fréquents d'air venant de l'estomac, avec goût putride. — Nausée, comme si on allait s'évanouir, par accès, en sorte que nonobstant une faiblesse extrême, elle est forcée de s'asseoir et ne peut rester couchée ; relachement d'estomac. — *Enrie de vomir ; *fréquente. quelquefois à tout moment; -avec perte de la vue et de l'ouje, quelquefois presque à chaque instant; avec obscurcissement de la vue et de l'ouïe ; avec régurgitation d'eau et de mucosités, qui quelquefois, sont striées de sang; en toussant, avec pression sur la poitrine et régurgitation de mucosités acides et sans conleur. - *Vomissements : violents des aliments; des aliments et de mucosités blanches, quelquefois avec haut-le-cœur violents, forte pression sur la poitrine et froid; «de mucoeités et de bile; d'abord d'un liquide vert et très-amer, puis d'eau claire; chaque fois, avant de vomir, horripilation sur le dos et les bras ; ° comissement moir (morbus piger); oromissements de matières stercorales (Miserere?).

Estemac — Parties génitales. — "Maux d'estomac qui forcent à manger constamment; forte pression à l'estomac, de même que dans le creux; d'ancement et picotements dans l'estomac et le creux de l'estomac. — Dans la région hépatique, élancements on bien aussi pression avec douleur d'executation. — Pincements




RAPHANUS SATIVUS.

608

dans le rentre, surtout à la région ombilicale, quelquefois avec élancements et pression à droite de l'ombilic ; tranchées violentes et élancements à la région ombilicale, surtout à droite, après le déjeuner; sensation de chaleur dans le ventre, aurtout dans la région ombilicale; brûlement au-dessus du nombril; ballonnement et plénitude du ventre, suivis de pincements, comme avant la sellé; borborygmes dans le rentre, surtout la nuit, ou bien chaque fois avant de vomir: émission de vents par le haut et le bas, avec odeur du médicament, surtout après avoir bu de l'eau; *aucune émission de vents-pendant longtemps, ni par le haut ni par le bas (caractéristique). — Besoin d'aller à la selle, trèsfréquent, surtout à midi; *fréquentes selles, liquides et abondantes, quelquefois portant violemment, brun jaunktre, on bien brunes et écumeuses (caractéristique); odiarrhées chroniques, rertes, liquides, mêlées de mucosités et de sang : selles diarrhéiques non digérées.— Urine peu abondante, ou bien aussi *plus abondante que la boisson ingérée; besoin, avec émission peu abondante; il faut attendre longtemps avant que l'urine arrive; urine pale; jaune sale, avec sédiment comme du levain de bière; *urine trouble; en urinant, ardeur dans l'urèthre. - Dans le testicule droit, tiraillements et déchirements, plus tard aussi dans la plante du pied droit.

Larynz, Poitrine, Extrémités. — Toux, avec mucosités abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe bronchique. -Haleine de l'odeur du médicament. — Douleurs à la poitrine : surtout en mangeant et en toussant, moins en buvant; pressives et lancinantes, depuis le creux de l'estomac jusqu'à la fossette du cou, et quelquefois aussi jusque dans le dos; chalcur extérieure au sein droit; palpitations de cœur rapides et violentes. -- 🗛 🐇 dos, brûlement pruriant; déchirement dans les lombes, en se baissant; picotement dans le creux de l'aisselle gauche. -- Tremblement des membres. — Au bras, élancements dans l'articulation du coude gauche, comme dans l'os; faiblesse, déchirements et picotements, immédiatement au-dessus du poignet droit. — A la jambe gauche, sensation de paralysie, en étant couché; froid aux genoux et aux pieds, avec envie de dormir, tête entreprise, douleur sourde dans le front et envie de vomir; crampe au mollet, la nuit, au lit; déchirements dans le côté du pied droit; clancements et fourmillement à la plante du pied droit; rougeur et gonflement du talon droit, avec pincements violents en appuyant le pied et en marchant, plus tard il s'y forme une ampoule pleine d'eau claire et un peu rougeatre, qui disparait après le lever.



RHABARBARUM (RHEUM).

604

RHABARBARUM (RHEUM).

RHAB. — Rhuberbe. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Vey. Pharmac. homosp., p. 267. — Doses neitées : 9, 50. — Durée d'action : 2, 2 jours dans des maladies aiguës.

ANTIDOTES : Camph. cham. n-vom.

COMPARER AVEC : Ars. bry. carb-v. cham. n-com. puls. rhus. samb. tart.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre : — Diarrhées des enfants ou des femmes en couche; Aigreurs, colique, insomnie et cris des enfants.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Endolorissement des articulations, pendant le mouvement. — Douleurs pulsatives. — Palpitations dans les muscles, surtout autour des articulations. — Engourdissement des membres sur lesquels on est couché. —

Lassitude et *pesanteur dans tout le corps*.

Semmeil. — Sommeil et bâillements. — Sommeil de nuit agité, avec jactation, cris, gémissements et ronflement, ou avec tressaillement convulsif des paupières, des muscles de la face et des doigts, surtout ches les enfants. — Mains passées au-dessus de la tête, en s'endormant et pendant le sommeil. — Divagations nocturnes, et ambulation dans le lit, bien qu'on ait les yeux fermés. — Après le sommeil, maux de tête, et étourdissement, ou muco-sités fétides, odeur et goût putride dans la bouche. — Rêves anxieux, tristes, vifs.


Flèvre. — Horripilation, sans froid extérieur. — Frissons et chaleur alternatifs, avec anxiété et répugnance pour toute chose. — Chaleur aux mains et aux pieds, avec visage frais. — Sucur facilement excitée par le moindre exercice, surtout au front et au

cuir chevelu.

Heral. — Indifférence. — Paresse et éloignement pour la conversation. — Humeur chagrine, avec pleurs. — Désir impétueux de tel ou tel objet. — Engourdissement des sens, comme dans un

demi-sommeil. — Divagations.

Tête. — Obnubilation stupéfiante de la tête, comme après l'ivresse, avec yeux proéminents. — Vertige à faire tomber de côté, en étant debout. — Mal de tête, comme un étourdissement, avec anxiété. — Maux de tête pressifs, surtout dans le sinciput, les tempes et le vertex. — Pesanteur de la tête, avec chaleur et déchirements. — Tension sourde et crampoide dans la tête. — Best-



RHABARBARUM (RHEUM).

605

tement dans la tête, quelquefois remontant du ventre. — Mouvements du cerveau, en se baissant.

Yeux. — Yeux faibles et abattus, avec douleur pressive, surtout en fixant un objet avec persévérance. — Pression et tiraillements dans les paupières. — Cuisson dans les yeux, comme par l'effet de la poussière. — Battement douloureux dans les yeux. — Tressaillement convulsif des paupières. — Larmoiement, surtout en plein air. — Pupilles contractées.

Oreilles et Mes. — Otalgie, avec prurit dans l'oreille. — Pression et battement dans les oreilles. — Émoussement de l'ouie, comme par laxité du tympan, avec grondement dans les oreilles. — Traction étourdissante à la racine du nez, et jusqu'au bout du nez, avec fourmillement dans cette partie. — Sensation de chaleur du nez.


Face et Dents. — Tension de la peau du visage. — Froncement et contraction des muscles du front. — Sueur fraiche à la face, surtout à la bouche et au nez. — Tressaillement des commissures des lèvres. — Douleurs fouillantes dans les dents cariées. — Sensation douloureuse de froid dans les dents. - Sensation de torpeur, et insensibilité de la langue. — Contraction du gosier.

Estomac. — Perte du goût. — Goût fade, pâleux ou aigre. — Amertume des aliments. — Appétence pour diverses choses, qui répugnent cependant à la première bouchée. — Dégoût pour les aliments gras ou sans saveur. — Répugnance pour le casé (non sucré). — Faim, sans appétit. — Nausées, comme venant du ventre, avec coliques. — Plénitude d'estomac, avec pression comme par surcharge. - Contractions dans l'estomac. — Élancements et battements dans le creux de l'estomac.

Ventre. — Ballonnement du ventre, avec tension. — Pression dans la région ombilicale. — Tranchées dans le rentre, qui forcent à se replier sur soi-même, souvent peu après le repas, aggravées en étant debout. — Incarcération de flatuosités, avec pression et tension à la poitrine. — Palpitation et tressaillement dans les muscles abdominaux.

Sollos. — Envie pressante et fréquente d'aller à la selle, non suivie de résultat, aggravée par le mouvement et la marche. — *Selles diarrhéiques, généralement d'odeur aigre, liquides, ou de la consistance de la bouillie, précédées et suivies de ténesme, avec pincement constrictif dans le ventre, et horripilation pendant l'évacuation. — Diarrhées grisâtres ou brunes, mélées de mucosités. — Diarrhée abondante, avec vomissements et grande faiblesse.

Urines. — Sécrétion plus abondante d'urine. — Urine rouge ou jaune verdâtre. — Faiblesse de la vessie; l'urine ne peut être évacuée sans effort. — Sensation brûlante dans la vessie. — Urines brûlantes.



606 RHABARBARUM (RHEUM). — RHODODENDROM.

Poitrine. — Dyspuée en respirant profondément, comme par un fardeau sur la poitrine. — Lancinations dans la poitrine. — Palpitation des muscles de la poitrine. — Douleurs et lancina-

tions dans les mamelons. — Lait amer et jaune.

Tronc et Membres. — Roideur aux reins et dans les hanches, qui ne permet pas de se tenir droit. — Lancinations dans les bras. — Déchirement dans les bras, les avant-bras et les articulations des doigts. — Tressaillements dans les bras et les mains. — Palpitations musculaires dans les articulations du coude. — Veines gonflées et chaleur aux mains. — Sueur, quelquefois froide, dans la paume des mains. — Tressaillement des doigts. — Grande lassitude dans les cuisses. — Tressaillements dans les muscles des cuisses. — Engourdissement des jambes lorsqu'elles sont croisées. — Palpitations musculaires dans les jarrets, les jambes et les orteils. — Roideur du jarret, avec douleur pendant le mouvement. — Elancements dans les genoux et les jambes.

RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

RHOD. — Rosage à fleurs jaunes; Rose de Sibérie. — Archives de STAPS. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 268. — Doses asitées: 12, 18, 30. — Durée d'action: 4 à 6 semaines dans des affections chroniques.


ANTIDOTES : Camph. clem. rhus.

Comparen avec : Calc. canth. carb-an. carb-v. clem. lyc. n-vom. rhus. sep. sil. sulf.

CLINIQUE. — Jusqu'ici ce médicament n'a encore été employé que contre des Affections arthritiques, une espèce d'Hydrocèle et une Induration des testicules.

SYMPTOMES GENERAUX. — *Traction rhumatismale et arthritique et déchirements, comme sur le périoste, dans les membres, provoqués par un temps apre et aggravés dans le repos. — Douleurs de luxation et tractions fouillantes dans les articulations, avec rougeur et gonflement. — *Nodosités arthritiques. — Inquiétudes, fourmillement, faiblesse, et sensation d'enroidissement paralytique dans quelques membres. — Grand abattement et courbature après le plus léger exercice. — Gonflements hydropiques. — Rémittence fréquents des souffrances et apparition généralement le matin. — *Les souffrances sont procoquées ou aggravées par un froid humide, ou à l'approche d'un orage, comme aussi dans le repos.





RECODODENDEON CHRYSANTHUM.

Semmell. — Forte envie de dormir le jour, avec sensation brûlante dans les youx. — Sommeil profond avant minuit, après s'être endormi de bonne heure, le soir. — Insomnie après mimuit. — Sommeil du matin troublé par une agitation dans le corps et des douleurs.

Fièvre. — Frimone, alternant avec chaleur. — Chaleur augmentée, surtout dans les mains. — Fièvre le soir, avec chaleur à la tête, froid aux pieds, sensation brûlante dans les yeux et le nex, courbature et absence de soif, suivie de chaleur noctume et d'insomnie. — Sueur avec prurit et fourmillement à la peau. — Sueur d'odeur

aromatique.

Moral. — Humeur sombre, morose. — Indifférence excessive, avec crainte de tout travail, de toute occupation. — Oubli exces-

sif. - Perte subite des idées.

Tôte. — Tôte entreprise le matin, après le lever, avec sommeil. — Ivresse. — Vertige, avec angoisse. — Vertige tournoyant, an lit, comme si la tôte allait se renverser en arrière. — Mouz de tôte provoqués ou aggravés par le vis ou par un froid humide. — Tension dans le front. — Pression tractive dans le sinciput et les côtés de la tôte. — Déchirement dans les os de la tête. — Battement dans la tôte. — Bensibilité douloureuse de l'extérieur de la tôte, comme par ulcération sous-cutanée. — Douleur comme par contusion ou des coups, à l'occiput. — Prurit rongeant ou cuir chevelu, surtout le soir.

Youx. — Élancements pressifs dans les bords de l'orbite, avec contraction spasmodique des paupières. — Pression dans les yeux venant d'un côté de la face. — Sensation de sécheresse et brûlement dans les yeux, de temps à autre, surtout à la clarté vive du jour et en regardant fixement un objet. — Agglutination des paupières. — Tressaillement frémissant des paupières. — Contraction d'une pupille, tandis que l'autre est dilatée. — Trouble de

la vue, en lisant et en écrivant.

Orellies. — Otalgie, avec déchirements tressaillants. — Déchirement et térébration dans les oreilles et près des oreilles. — Sensation comme s'il y avait un ver dans l'oreille. — Bourdonnement


sourd, continuel, dans les oreilles, augmenté en avalant.

Non. — Épistaxis. — Odorat diminué.—Obturation semi-latérale du ses, à la racine, surtout le matin. — Corysa fluent, avec obturation d'une narine et perte de l'odorat et du goût.—Sécrétion plus abondante de mucosités navales, au grand air.

Visage. — Horripilation parcourant le visage. — Lèvres sèches, brûlantes. — Vésicules aux lèvres, avec douleur d'excoriation en

mangeant,

Dentu. — "Odontalgie, avec déchirement tractif, dans les deuts malaires, par un froid humide ou un tempe d'orage, aggravée par le contact. — Odontalgie moctures, avec otalgie. — Praxit



RHODODENDEON CHRYSANTHUM.

608

anx gencives. — Gonfiement et douleur d'excoriation entre les gencives inférieures et la joue. — Odontalgie arthritique, aggrarée par les boissons froides et chaudes, améliorée par la chaleur extérieure. — Térébration dans une dent, avec élancement jusque dans l'oreille, renouvellement des douleurs par un rent d'est apre, au printemps et en automne, aggravation la nuit.

Bouche, avec sécheresse du gosier, et vésicules cuisantes sons la langue. — Grattement dans la gorge, comme par des mucosités.

Constriction et sensation brûlante dans la gorge.

Betomac. — Émoussement du goût. — Les aliments n'ont point de saveur. — Soif augmentée. — Satiété prompte, avec bon appétit, suivie de malaise. — Nausées, avec envie de vomir, pression à l'estomac, et écoulement d'enu par la bouche, comme des pituites, soulagée par des renvois. — Pression à l'estomac, la nuit, ou après avoir bu de l'eau froide. — Pression contractive au scrobicule, arec géne de la respiration. — Élancements pres-

sifs dans le creux de l'estomac et les hypocondres.

Ventre. — Douleurs crampoldes dans les hypocondres. — Tension dans la région de la rate, après s'être baissé. — Élancements dans la rate, en marchant vite. — Ballonnement du ventre, surtout de la partie supérieure, avec sensation de plénitude qui gêne la respiration, le matin et le soir. — Incarcération douloureuse de flatuosités dans les hypocondres et les reins. — Grondement et borborygmes dans le ventre, avec renvois et expulsion de vents fétides.


Belles.—Envie pressante d'aller à la selle, avec retard de la selle. — Évacuation difficile de la selle, même lorsqu'elle est molle. — — Selles de la consistance de la bouillie. — Évacuations muqueuses. — Diarrhée après avoir mangé des fruits, ou par un froid humide. — Battement à l'anus. — Traction depuis le rec-

tum jusque dans les parties génitales.

Urines. — Envie plus fréquente d'uriner, avec traction dans la région de la vessie et les aines. — Urine plus abondante et fétide. Parties génitales. — Sensation d'excoriation entre les parties génitales et les cuisses. — Battement et élancements sous le gland. — Traction et douleur de meurtrissure dans les testicules et jusque dans le ventre et les cuisses. — Testicules gonfiés et rétractés. — Prurit, sueur et racornissement du scrotum. — Gonflement transparent du scrotum, comme par hydrocèle. — oInduration des testicules. — Suppression des règles. — Règles trop hâtives et trop abondantes.

Larynx. — Catarrhe et enrouement de la trachée-artère. — Touz sèche, ébraniante, avec oppression de poitzine et âpreté de la gorge, surtout la nuit et le matin. — Toux grattante, avec expec-

toration peu abondante de maconitée.



RHODODERDROR. -- RHUS TOXICODENDROR.

609

Pettrino. —Pression à la poitrine, avec gine de la respirațion.— Constriction opprentive de la poitrine. —Ondulation chaude dans la poitrine et su cœur. — Congestion sanguine à la poitrine. — Douleur de brisement à l'extérieur de la poitrine.

Trunc. — Douleurs dans le dos, aux reins, comme de luxation ou de brisement. — Traction rhumatismals et déchirement dans le dos et les épaules. — Roideur de la nuque. — Tension et traction rhumatismale, dans les muscles de la suque et du cou.

Bras. — Douleurs tractices dans les bras, par un temps apre. -Sensation comme si le sang ne circulait pas dans les bras. --Faiblesse, avec fourmillement et pesanteur dans les bras, jusque dans le bout des doigts, pendant le repos. — Tirmillement et déchirement dans les avant-bras et les mains, comme dans le périoste, **aggravés pandant le repos.** — Douleur de luxation dans les articulations de la main. — Chaleur des mains augmentée.

Jambos. — Douleur de luxation dans l'articulation com-fémorale et celle des genoux. -- Sensation de froid et racornissement de la peau à quelques parties des jambes. — Sueur aux jambes. — Gonflement des jambes et des piede. — Traction et déchirement dans les jambés et les pieds, comme dans le périoste, surtout dans le repos. — Froid excessif aux pieds. — Com aux pieds, avec douleur lancinante.

REUS TOXICODESDEOF.


BHUS. — Arbre à poison, Sumac vénément. — HAMPENAME. — Hist. met. et prép. Vey. Pharmet. homosop., p. 250. — Dose usitée : 30. — Burde d'action : 3 à 6 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Bry. camph. coff. sulf. — On l'emploie comme l'antidote de :

Bry. chod. test.

Bry . rhod . tart. Comparen Avec : Alum, amm, ant. arn. ars. ass. bell. bry. calc. caus. chan. chin. clem. cocc. coff. con. cupr. dulc. graph. byos. ign, iod. kal. lach. laur. led. tyc. magn. merc. mur-ac. natr. mir-ac. n-vom. phos. phos-ac. phat-ac. phat. puls. rhed. rut. samb. sahad. sep. sit. sulf. verair.—C'est surtout après: Arn. bry. calo-phos. cham. lack. phos. a. phos-ac. sulf. que le rhus est efficace, ioraqu'il est indiqué. — Après le rhus. conviennent quelquefois : Amm. ars. bry. calc. con. phos. phos-ac. puls. sulf.

CLIMIQUE. — Se laimant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre :-Affections, surtout des tendons, des ligaments et des membranes synovicles; Manque de plasticité dans le song, avec tendance à la cessation de l'activité organique jusqu'à la paralysie; Affections rhumatismales avec gonflement; Inflammations locales avec affections cérébrales ; Affections rachitiques et scrofuleuses ; Engorgement, et.



RHUS TOXICODENDRON.


induration des glandes; Convulsions et autres souffrances par suite d'un bain froid; Paralysies; Gonflements ædémateux et inflammatoires; Atrophie; Exostoses; carie et autres affections des os?; Dartres humides, ou sèches, ou lichénoïdes; Pemphigus; Inflammations érysipélateuses, surtout l'érysipèle résiculeux; Zona, Pétéchies, Ulcères; Verrues; Scarlatine et morbilles, et affections à la suite de ces maladies; Prodromes de la petite vérole; Suites fácheuses d'un tour de reins, d'une luxation, d'une commotion et d'autres lésions mécaniques, surtout avec souffrances des articulations et des membranes synoriales, ou avec sugillation et extravasation de sang: Fièrres intermittentes, rhumatismales, gastriques et typhoïdes; Hypocondrie; Mélancolie; Céphalalgies nerveuses, hystériques et autres; Migraine; Hydrocéphale aiguë (deuxième période); Teigne; Ophthalmies scrofuleuses (et arthritiques?); Photophobie scrofuleuse; Amblyopie amaurotique: Parotite, même à la suite de la scarlatine; Hemorrhagie nasale, Erysipèle à la face, surtout érysipèle vésiculeux ; Croûte de lait ; Odontalgie arthritique?; Angines; Affections gastriques; Dispepsie, même avec vomissement des aliments; Rétrécissement de la gorge et de l'asophage ; Coliques inflammatoires ; Entérite : Ictère : Diarrhées et dyssenteries; Incontinence d'urine; Fièvre puerpérale; Tumeur blanche et lochies maladives chez les femmes en couche; Incommodités par suite de sevrage, ou par la suppression du lait; Grippe; Pneumonie avec symptômes typhoïdes et soil nocturne (après l'usage d'acon. et de bryon.); Hémoptysie; Maladies de cœur ; Maux de reins rhumatismaux ou par suite d'un refroidissement; Coralgie et luration spontanée; Inflammation érysipélateuse des pieds ; Gonflement cedémateux des pieds, même à la suite de dartres répercutées, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

610

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions, tension et déchirements rhumatismaux et arthritiques, dans les membres, portés au plus haut degré pendant le repos, cainsi que dans la manvaise saison, la nuit, et à la chaleur du lit, souvent avec sensation de torpeur et engourdissement de la partie affectée, après l'avoir remuée. — Crampe et tension à diverses parties, comme par raccourcissement des tendons. — Contraction de quelques membres. — *Élancements tensifs et roideur dans les articulations, aggravés en se levant de son siège et en plein air. — *Roideur paralytique dans les membres, surtout en commençant à remuer la partie après le repos. — *Engourdissement facile des parties sur lesquelles on repose. — *Torpeur de quelques parties, avec fourmillement et insensibilité. — *Fourmillement dans les parties affectées. — *Douleur de luxation facile des membres. — *Paralysies, quelquelola mani-latérales. — *Gonfiements






RHUS TOXICODENDRON.

rouges et luisants, avec douleur lancinante d'excoriation au toucher. — *Pouleurs de brisament, ou bien sensation comme si la chair était détachée des os, à quelques parties. — Tractions pressives sur le périoste, comme si on raclait les os. — Sensation comme si quelque chose était arraché dans les organes internes. — Gonflement et induration des glandes. — Ictère. — Tressaillement des muscles et des membres. — Mouvements convulsifs et autres souffrances, après avoir pris un bain froid. — Affections semi-latérales. — *Exacerbation et apparition des douleurs et des symptômes, pendant le repos, ou la nuit, comme aussi en entrant dans l'appartement après avoir été au grand sir; amélioration par le mouvement et la marche. -Reproduction ou aggravation de beaucoup de souffrances, dans la mauvaise saison. — Surexcitabilité générale du système perveux, augmentée pour peu qu'on se fache. — Tiraillement dans tous les membres en étant couché. — Tremblement des membres, après la plus légère fatigue. — Marche mal assurée. — *Grande lassitude et faibleme, avec besein de se coucher. — Accès d'évanonimement. — *Impossibilité de supporter le grand air, chand ou froid; il impressionne douloureusement la peau.

Poan. — Prurit sur tout le corpe, principalement aux parties velues. — Inflammations érysipélateuses. — Éruptions urticaires. — *Éruptions généralement vésiculeuses, croûteuses, avec prurit brûlant, apparaissant surtout au printemps et en automne. — *Éruptions de petites pustules, sur un fond rouge, comme le zona. — *Ulcères gangréneux, résultant de petits vésicules, avec fièvre violente. — *Pétéchies avec grande faiblesse allant jusqu'à la prostation de toutes les forces. — Pustules noires. — *Eruptions dartreuses, quelquefois alternant avec souffrances asthmatiques et selles dyssentériques. — *Verrues, principalement aux mains et aux doigts. — Rhagades aux mains. — Panaris. — Fourmillement ou élancements, ou bien cuisson brûlante dans les ulcères, surtout la nuit. — Engelures. — Cors aux pieds, avec sepsation brûlante et douleur d'excoriation. — *Anasarque générale après

Sommeil. — Báillements fréquents, violents, crampoides. — Forte envie de dormir le jour, et même le matin, au lit. — *Sommolence pleine de révasseries pénibles et interrompues. — Insomnie, surtout arant minuit, et généralement causée par une senation de chaleur, un bouillonnement de sang, et une inquiétude qui ne permettent pas de rester couché. — *Sommeil agité, avec réves auxieux et effrayants. — *Coma somnolent, avec ronflement, murmures et carphologie. — Sommeil empêché par des idées tristes. — Réveil causé par amertume et sensation de aéchereme dans la bouche. — Sommeil de nuit, empêché par une pression à l'estomac, pincements femillents dans le sentre, et namées avec envie de vomir. — Impossibilité de rester couché sur la côté.




RHUS TOXICODENDRON.

612

la nuit. — Survante avec effroi et tressaillement du corps, peadant le sommeil. — Sommeil incomplet et agité, avec jactation et affinence d'idées pénibles. — Rêves vifs des affaires du jour, avec paroles pendant le sommeil. — Pleurs en dormant. — Réves d'incendie. — Sommeil avec bouche ouverte et respiration courte. Flèvre. - Frissous et froid, généralement le soir, et accompagués d'accès de douleurs et autres symptômes accessoires. — Frisson grelottant au grand air, evec forte soif. — Frissons passagers, continuels, comme si on était inondé d'eau froide. — Sensation de froid, pour peu que l'on bouge. — Froid et pâleur du visage, alternant avec chaleur et rougeur. — Frissons et chaleur entremèlés, soit généraux et simultanés (frissons intérieurs, avec chaleur extérieure, et vice versu), soit à des parties différentes. — *Fièvre le soir, d'abord frisson, pais chaleur et soif (et saeur), accompagnée ou suivie de tranchées et de diarrhée. - *Fières tierces on quotidiennes. — *Fièvre nerce double, d'abord friesce avec soif, puis chaleur générale, avec frisson, au moindre mouvement, enfin sueur. — *Pendant le frissen, douleur dans les membres, manx de tête, vertige, manx de dents pulsatifs, avec accumulation de salive dans la bouche, et envie de vomir. — Pendant la chaleur nocturne, tiraillements dans tous les membres. Chaleur fuguce, avec sueur partant de la région ombilicale et alternant brusquement avec frimons. — Pendant et après la fièvre, tressaillements, tintement d'oreilles, surdité, coryza soc' insomnie, avec jactation inquiète, jaunisse et éruption urticaire, pression dans le creux de l'estomac, battement de cœur avec anxiété, coliques, diarrhée et autres affections gastriques et soif nocturns. — • Frèvres malignes, avec délire loquace, douleurs violentes dans tous les membres, faiblesse excessive, langue sèche ou noire, lèvres sèches, brunatres ou noiratres, chaleur et rougeur des joues, corphologie, pouls accéléré et petit, coma somnolent avec ronflement et gémissements. --- Susur pendant ist douleurs. — Sueuren étant assis, souvent avec tremblement vislent. — Sueur nocturne, quelquefois avec éruption miliaire et prarianto. — Sueurs matutinales, quelquelois d'odeur acida. — Sueur continuelle.

Meral. — Tristesse anxiouse et angoisse mortelle, surtout le seir et la muit, avec désir de la solitude et besoin de pleurer. — Agitation qui ne permet pas de rester assis. — "Angoisse avec crainte de la mort et soupire. — Peur d'être empoisonné. — Manie du suicide. — Irritabilité et mauvaise humeur, avec répugnance pour un travail quelconque. — "Abattement moral, avec anthropophobie. — "Inquiétude sur ses enfants, sur ses affaires et sur l'avenir, avec manque de confiance en soi-même. — Faibleme de la mémoire et oubli. — Absence d'idées et d'esprit. — Lenteur de la marche des idées et esprit obtus. — Erreure de l'imagination et visions. — "Delives.



REUS TAXICODENDECH.


613

Thin. — This autreprise, compas dans l'ivresse. — Stupeur de la tote. - *Vertige et chancellement, comme et l'on allait tomber. - Surfect on so levant du lit. - Vertige le soir, en se couchant, avec crainte de mourir. — Maux de tête, immédiatement après le repas, ou après avoir bu de la bière, comme aussi en remuant **les bras. — "Accès de maux de tête, avec besoin de se coucher;** toute contrariété et tout exercice en plein air renouvellent les accès. — "Maux de tête périodiques. — "Douleur dans la tête, comme si le cerveau était meurtri, aurtout le matin, aggravée en remuant et en levant les yeur. — Pesanteur et plénitude presaire de la tâte, avec sensation en se dansant, comme si le cerveuu allait delater. — Sensation de compression ou d'expansion dans la têta. — Tractions et déchirements dans la tête et surtont dans les tempes, principalement le soir et la nuit. -- • Maux de tête iencinente jour et nuit, jusque dans les oreilles, la racine du nes et les pommettes, avec dents agracées. - Battement et pulsations dans la tôte, surtout à l'occiput. — Douleura, sur- : tout dans les bosses occipitales. — Congestion sanguins à la tôte. -- Senestion brûlante, surtout dans le front et l'occiput. – *Fourmillement douloureux dans la tête. — Bourdonnement et bruimement dans la tête. — Ballonnement et sensation de fluctuation dans la tôte, à chaque pas, comme si le cerveau racillait. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête, comme par ulcération sous-cutanée, surtout en rebroussant les cheveux et au toucher. -- Contraction du cuir chevelu, comme si on arrachait les cheveux. - Traction et déchirement au cuir chevelu. — Gonstement de la tête. — Fourmillement rongeant au cuir chevelu. — Dartres sèches au cuir chevelu. — "Teigne périodique réapparaissant tous les ans. Teigne à croûtes épaisnes, qui détruisent les chéveuz, arec pus verdátre, et peurit violent la nuit. — Petites tubérosités molles au cuir chevelu.

Your. — *Douleurs dans les yeux, en remunt le globe de l'ail.

— Pression et sonsation brûlante dans les yeux. — *Your fixes, ternes et abettus. — Cuimon dans les yeux et les paupières. — *Implemention des yeux et des paupières, avec rougeur et agglutination nocturne. — Larmoiement abondant, avec goufiement adémateux autour des yeux. — *Photophobie. — Gonfiement des paupières. — Gonfiement de l'ail tout entier et des parties environnantes. — Orgelet aux paupières. — Roideur paralytique des paupières. — Tressaillement et frémissement des yeux et des paupières. — Voile devant les yeux et faibleure de la vue; tous les objets paraissent piles. — *Amblyopis gards la suppression d'une transpiration habituelle des pieds, des censation des paux et les paux et les paux et les parties des pieds, des censation des paux et les paux et des paux et les paux et les paux et des paux et les paux et des paux et les paux et les paux et des paux et les paux et des paux et les paux et les paux et des paux et les pau

d'un voile devant les your. Crailles. — Otalgie. — Battement deuleureux dans l'ereille, la mait. — Goufement des ereilles. — «Éspalement da yes wagen-



614 RHUS TOXICODENDRON.

nolent par les oreilles, avec surdité. — *Gonflement et inflummation des parotides, avec tièvre.

Nes. — Rougeur du haut du nez, avec douleur d'excoriation au toucher. — Gonflement du nez. — Sécheresse du nez. — Écoulement de pus verdâtre, fétide, par le nez. — *Épistaxis, même ta nuit et en se baissant ou en renaclant. — Éternuments frequents, violents, presque crampoides. — Écoulements abondants

de mucosités nasales, sans coryza.


Visage. - *Face pále, maladive, have, avec yeur bordés d'un cercle bleu et nez effilé. - *Visage défiguré, convulsé. - *Face rouge avec chalcur brûlante. — *Inflammation érysipélateuse et gonflement de la face, avec élancements pressifs et tensifs et fourmillement brûlant. --- *Erympèle résiculeux, avec sérosité jaune dans les vésicules. - · Er aptions humides et croûtes épaisses au rieage, avec suintement de serosités fétides et sanguinolentes. -- *Eruption au visage, comme la couperose. -- Eruption dartreuse, croûteuse, autour de la bouche et du nez, avec tressaillement pruriant et sensation brûlante. - - Desquamation de la peau et au visage. — Contractions incisives et douleurs crampoldes brûlantes dans les joues (avec chaleur et rudesse de ces dernières). - «Sueur froide au visage. — Eruptions de boutons brûlant». autour des lèvres et du menton. -- Douleur crampoïde dans l'articulation des machoires, avec craquement au moindre mouvement. — *«Crampes de la máchoire.* — Gonfiement dur et doulorreux des glandes sous-maxillaires. — *Lèvres sèches, brunâtres.

Dents. — *Odontalgie, comme par exceriation ou avec déchirements, élancements, tressaillements, creusement et fourmillement, frequemment la nuit, ou aggravée en plein air et soulagée par la chaleur extérieure, quelquefois aussi à la suite d'un refroidissement. Vacillement des deuts. — Exhalaison fétide par les dents cariées. — Douleur d'exceriation brûlante aux gencives, même la nuit.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche, avec forte soif. - Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Il coule de la bouche, la nuit, une salive jaune, et quelquéfois même sanguinolente. — Accumulation abondante de mucosités visqueuses dans la bouche, avec crachement fréquent. - *Langue sèche, crouge ou brunâtre. — Sensation comme si la langue était recou-

verte d'une peau.

Gorge. — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur, aver douleur de meurtrissure, même en parlant, et avec pression et élancements pendant la déglutition. — Sensation dans la gorge, comme si quelque chose en était arraché. — *Difficulté d'avaler et douleur en ingérant des aliments solides, comme par rétrécissement de la gorge et de l'assophage. — L'eau-de-vie cause une sensation extraordinairement brûlante dans la gorge. — Accumulation abondante de mucosités dans la gorge, avec renâcle-



RHUS TOXICODENDRON.

615

ment fréquent, le matin. - Douleur pulsative au fond du cosier.

Appétit. — Goût putride, surtout le matin et après le repas. — Goût fade, pâteur ou âcre, d'une aigreur amère ou métallique. — Goût douceâtre dans la bouche. — Goût amer des aliments, surtout du pain, qui paraît âpre et sec. —*Absence totale d'appétit, arec répugnance pour tous les aliments, surtout le pain, lu riande, le café et le vin. — Sensation de plénitude et de satiété dans l'estomac, qui ôte tout appétit. — Après le repas, forte envie de dormir, pression et plénitude dans l'estomac et le ventre, na ées avec envie de vomir, lassitude, vertige et horripilation. — Le pain pèse sur l'estomac. — Douleur et chaleur dans la tête après avoir bu de la bière. — *Soif, le plus souvent par une sensation de sécheresse dans la bouche, même la nuit, ou le matin, avec désir principalement d'eau et de lait froid. — Grand désir de friandises.

Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois à vide. après le repas ou après avoir bu. - Violents renrois arec fourmillement dans l'estomac, soulagés en étant couché, renouveles chaque fois qu'on se redresse. — Pituites de l'estomac. — Nausécs et envie de romir ; principalement après le repas et après avoir bu, comme aussi la nuit ou le matin, après le lever, soulagées en se conchant. - Vomissement immédiatement après avoir mangé. — "Vomissement fréquent, dans le choléra, avec froid général et circulation du sang diminuée.—*Douleurs dans l'estomac, comme s'il contenait des pierres, surtout après le repas. *Pression dans l'estomac et le scrobicule, souvent avec gêne de la respiration. — *Battement et élancements dans la région épigastrique. -- Serrement, sensation de gonflement et douleur d'ulcération au creux de l'estomac. — Sensation de froid dans l'estomac. -- Sensation dans le creux de l'estomac, comme si quelque chose en était arraché, surtout en se baissant ou en faisant


Ventre. — *Ballonnement du ventre, surtout après le repas.

Pesanteur pressive dans le ventre, comme par un fardeau. —

Crampes abdominales contractives, qui forcent à se tenir courbe — Contraction dure et visible du ventre à travers l'ombilic. —

Tournoiement fouillant dans le ventre comme par un ver. —

Déchirements incisifs, tressaillements et pincements dans le ventre, dans le ventre. — Sensation brûlante dans le ventre. — Laxité dans le ventre, avec ébranlement intérieur à chaque pas que l'on fait. — *Coliques violentes, souvent la nuit, ou aggravées par des aliments ou des boissons quelconques, parfois avec selles sanguinolentes. Sensation dans le ventre, comme si quelque chose en était arraché. — *Rougeur écarlate du bas-ventre. — Tégumente du ventre douloureux, comme s'ils étaient ulcérés, surtout le matin en d'é-lirant. — Pression vers le dehogs dans les aines, comme s' une



BHUS TOXICODENDRON.

6lü

hernie allait s'établir. - Flatuosités abondantes, avec grondement. fermentation et monvements pinçants dans le ventre. - Flatusites tres-fetides.

Selles. -- *Constipation, quelquefois alternant avec diarrhées. — Selles dures et tardives. — *Ténesme, quelquefois avec nausées et dechirements ou pincements dans le ventre. — *Selles diarrhéeques sanguinolentes, "sérenses ou muquenses, écumenses, gélatineuses, rouges ou striées de blanc et de jaune. — *Diarrhées opiniatres ou dyssentériques, aussi par suite de l'affection des glandes du mésentère. — Selles et apletement blanches. — "Diarrhées nocturnes, avec coliques violentes, mal à la tête et douleurs dans tous les membres. — Selles involontaires, en dermant, la nuit. — Pendant la selle, haleine courte. — Fourmillement et prurit à l'anus et au rectum. — Après une selle molle, sortie des boutons hémorrhoïdaux de l'anus, avec douleur d'exceriation.


Urines. — Retention d'urine. — *Encie pressante et fréquente d'uriner, jour et nuit, avec écoulement plus abondant. — Incontinence d'urine, surtout pendant le repos. — Émission goutte à goutte d'une urine rouge de sang, avec ténesme. — Emission d'urine diminuée, quoique l'on boive beaucoup. — Urine foncée, se troublant promptement. — Urine d'un blanc trouble. — Urine claire comme de l'eau, avec sédiment blanc de neige. — Enflure de l'urêthre. — Jet d'urine double.

Parties viriles. — Forte éruption aux parties génitales. — Inflammation du gland. — Vésicules suintantes sur le gland. — Gonflement du gland et du prépuce. — Paraphimosis du prépuce. — Tache rouge à l'intérieur du prépuce. — Genflement et épaississement du scrotum. — Éruption humide au scrotum. — Erections fréquentes la nuit, avec envie d'uriner. — Forte propension à l'éjaculation, le matin.

Règies. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Règles de trop longue durée. — Ecoulement de sang pendant la grossesse. — Douleur d'excoriation et élancements dans le vagin. — Écoulement de sang et de caillots par la matrice, avec douleurs d'enfantement. — Diminution de la sécrétion du lait.

Larynx. — Enrouement et apreté de la gorge, avec sensation dans la poitrine, comme si elle était à vif. — Sensation de froid dans la gorge, en respirant. — Engouement facile. — Exhalaison brûlante par le larynx. — Sensation de constriction dans la fossette du con, après une courte promenade. — Toux proroquée par un chatuuillement dans les roies aériennes, généralement courte et sèche, avec angoisse et haleine courte, et principalement le soir avant minuit. — Toux, avec vomissement des aliments, surtout le soir, et en étant couché sur le dos. — Toux le matin, après le réveil. — Toux courte, avec amertume de la bouche, le soir, après s'être couché, et le matin après le réveil. — Toux





RHUS TO ENTRE THE PLANT

avec douleur d'estorato ou 17 se simulement fans la somme 🥕 👵 tête. — "Tour acec expectoration d'un nong touge et, et sensition de fadeur lans la priteire — "Tous le proge a sur et et réceillant, avec expensions manuaire definée e main grande faiblesse, forte angrasse resontation profonde, inquerious corporelles avec beson constant le manger le position operage

à la suite d'un froid humale.

Poitrine. — Respiration infletle, agree une matche moderne. — Орргения активия 2е даме не пеше и пал. — Запредски gènes par une presso a es la serrement la rieta de l'est maie. Haleine courte le seiz, 47 et tenaton out la potente — Besona fréquent de respirer prof edement. — Flusiesse, le primise, qui rend la parele difficile, agres une promenade en pieto als 🧸 Scusation de constriction de la proponer - *Elamonnement de concinations dans la postrone et les vites de la goste ne sour ut en étant assis courbe, en garlant, en respirant per l'indement, mirement en marchant ou en fassant le firta mour emoure. - Froismillement dans la postrine, avec tension, lans l'a mascles, le la politice, aggravée par le repos. - Congestion suagrame i la potrine. - "Faitlesse et sensation le tremblement en urier -Batt-ment de cear v. lent, en evant sede tracent e - *Ela... cements dans la region du patronner sensats en i ul urets de paralysis of torpers duck as with $x_0 + F$ such passages to the x

Trong. — "Louleur de bromment dus re un surver un bit bit de ci pendant le reges. - Relieur i un ureuse aux relox de Existendouloureuse au sucrum. -- De nat, a le la colemne come case - *Douleurs and reine, dans le dos et la naque, com le comme Wellast donne un hour de ce re : - Trutt a et elsa eta ato male doe, surtout en letant assis et len 🧓 balssont. 🕒 Dis nichment rhugustlemal entre les la planes azznavé par le fruit. e tlaze par la chale in . - Remorte describe dos -- Rode in tall'attiinale de la maque en la len une nome note de la la les de posibilità. mouvement. — 6 affethent I al ut at les glan les sammes :

Bras. - D'Arragent et somer'an bestante d'une l'aprele, aveparalyse du bris. Let up a lant le mansière sels un dura le repos et à la balent du lie - Fre de paralyse est incens le let. du brus. - Ex et ser au brus, avec sensation britante et ul eres suintant un pue sani un - Africa de ment écysipélaleme et pustules . avec prurit brillant, once beas, and mains of any long of see -- I lones rouges sur les bras. Tressalllen ents, élancements et déchires ment dans les brass - « Dochirem out tressaillant dans les confes. les polgnets, et les agriculations des doigns, «« Foullement dans les os de l'avant-bras ... Faiblesse et roideur des avant-bras et des doigts pendant le mouvement, et tremblement de ces parties après le moindre effort. - Gonflement chaud des mains, le -oir. - Éruption résiculaire, en forme de grappe, au voignet.

Cuisson au dos des mains. - Verrues aux mains et aux dougte



618 RHUS TOXICODENDRON. -- RUMEX CRISPUS.


Gonfiement des doigts.
 Tressaillement des pouces.
 Contraction des doigts.

• Elancements et déchirements dans l'articulation coxofémorale, jusque dans le jarret, surtout en appuyant sur le pied, ou avec tiraillements sourds et sensation brûlante dans le repos, et sensibilité douloureuse des articulations en se levant de son siège, et en montant un escalier. — Tension et roideur dans **les** muscles et les articulations des hanches, des cuisses, des jambes, des genoux et des pieds. -- *Paralysie des extrémités inférieures. Crampes dans les fesses, les cuisses et les mollets, surtout la nuit, au lit, ou en étant assis, après avoir marché. 🕒 Tension dans le genou, comme si les tendons étaient trop courts. -- Traction et déchirement tressaillant dans les cuisses et les jambes. Lancinations dans les cuisses, les jambes, les genoux, les pieds et les orteils. -- Lourdeur des jambes, surtout dans les jarrets et les mollets. — *Paralysic des jambes et des pieds. — Elancementa et douleur de luxation dans les malléoles, en appuyant le pied. *Gonflement inflammatoire du cou-de-pied, equelquefois avec pustules et boutons miliaires à la partie affectée. *Gonflement érysipélateux des pieds.
 Gonflement des pieds, le soir. — Torpeur et patissement des pieds (pieds morts). — Distorsion des orteils. — Cors aux pieds, avec sensation brûlante et douleur d'excoriation.

RUMEX CRISPUS.

RUM-CR. - Patience crépue. - Voy. Héning, Études pathogénétiques américames, au médicament ci-après.

AVIS CLIMIQUES. — Ce médicament, encore peu connu dans ses effets physiologiques, a été employé avec succès contre : — Gastrite, avec douleurs lancinantes, passant, comme des coups, dans différentes directions vers la poitrine, avec douleur dans le creux de l'estomac, douleur et élancements dans la partie supérieure de la poitrine ; sensation et plénitude dans l'épigastre jusqu'à la fossette du cou, redescendant vers l'estomac, pour un moment, en avalant à vide; flatulence, renvois et ballonnement pressif de l'estomac, après le repas. — Catarrhe intestinal, avec diarrhée matutinale, et toux excitée par un chatouillement dans la fossette du cou. — Catarrhe du larynx et de la trachée, avec quintes de toux sèche, provoquées par des inspirations profondes, ou accélérées, ainsi que par la parole, l'air froid, ou par une pression exercée sur la fossette du cou. — Bronchite, avec de longs accès



RUMEX CRISPUS. -- RUMEX PATIENTIA.

619

d'une toux sèche, provoquée par les mêmes causes que ci-dessus, avec aggravation la nuit après s'être couché, et forçant de tirer la couverture sur la tête, parce que le moindre air froid excite un chatouil-lement pénible dans la fossette du cou. — Péricardite rhumatismale, avec douleur lancinante dans la région du cœur, en respirant profondément la nuit, au lit. — Eruptions scabéiformes; Gale des troupiers, n'affectant que la nuque, le dos, les épaules et la face dorsale des membres, et s'améliorant à la chaleur du lit. — Syphilis secondaire avec ulcères à la gorge?; Cacherie mercurielle?; Tumeurs et ulcérations cancéreuses?; Scrofules?; Carie et nécrose?; Scorbut?.


N. B. — Pour ceux qui nous ent demandé le Rumex crispux, pour avoir la Patience officinelle, nous leur dirons que le seul Rumex dont nous possédions une pathogénésie acceptable, est celui qui se trouve ci-après, sous le titre Rumex patientia, et qui, du reste, est la céritable Patience officinelle. — L'usage purement empirique qu'on a fait jusqu'ici du R. crispus pourra, du reste, être applique à la Patience, attendu que celui-ci est, par les anciens auteurs, déjà recommandé contre les mêmes mans que nous avons énumérés ci-dessus.

RUMEX PATIENTIA.

C.M. — Patience officinelle. — HERING. Études pathogénetique de l'Amerique du Nord. — Hist. nat. et prép. Voy. Phaemac. hommop. Companex: Ox-ac. rhab.

CLINIQUE. — En examinant les symptomes caractéristiques de médicament, on verra les cas où on pourra le consulter, surtout contre les affections suivantes : Éruptions croûteuses; Affections cancéreuses; Ulcères aux jambes; Dyspepsies; Gastrites; Cancer de l'estomac; Diarrhées; Catarrhes bronchiques: Douleurs de poitrine, etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande l'assitude, faiblesse et fatigue corporelle et intellectuelle. — Dans la position couchée : douleur à la machoire inférieure; toux. — Pendant le mourement : douleur dans la tête, le cartilage typhoïde, l'épigastre, la poitrine et l'épaule. — Pendant la marche : toux; douleurs dans les oreilles, le côté droit du ventre, l'anus, l'hypocondre droit, la cuisse et le genou. — Au grand air : abattement, toux, caducité; douleur de poitrine; douleur dans l'os frontal, avec flatuosités; sensibilité au grand air : l'air froid donne la toux et des douleurs.



620

RUMEX PATIENTIA.

de poitrine. — La plupart des souffrances paraissent se manifester le soir et la nuit.

Peau. — Prurit à divers endroits. — *Etuptions; vésicules au nez et au cou. — «Ulcères aux jambes. — Erysipèle avec chaleur

fugace.

Sommeil. — Baillements fréquents; avec mouvements de flatuosités et douleur dans la région ombilicale. — Grande envie de dormir. — Sommeil agité, avec des rêves de toutes sortes, dans lesquels les petits objets paraissent constamment grandir ; rêves de dangers, d'inondations, de querelles, de soucis, de malhours, etc.

Pièvres. — Frissennement et horripilations, surtout au dos. — Sensation de chaleur générale, mais principalement aux joues. — Sueur en se réveillant d'un bon sommeil. — Pouls fréquents,

enrtout après avoir monté les escaliers.

Moral et Intellect. — Abattement moral, comme l'appréhension d'un grand malheur; air très-sérieur, ainsi que la parole. — Caractère irascible, irritable. — Les petits objets paraissent grandir, pendant un sommeil agité. — Arrêt des pensées et grande indifférence, avec abattement corporel; répugnance pour la méditation, dans la matinée.

Tôte.— l'éte entreprise pendant la tour. — Sensation de plénitude, pression, pesanteur et douleur sourde dans la tête. — Douleur aigué dans l'os frontal, au grand air, avec flatuosités; douleur sourde au front, plus forte pendant le mouvement. — La nuit, pression dans la tempe et le côte droit de l'occiput; douleur dans

Pocciput, la nuit, en se réveillant.
 Yeux. — Douleurs (brûlantes, lancinantes) dans la région des sourcils. — Yeux douloureux comme si les paupières étaient sèches et enflammées, surtout le soir, sans altération visible. — Picote-

ments dans l'œil droit.

Oreilles. — Prurit au fond du conduit auditif; dans le conduit gauche, suivi de baillement. — Douleurs pressives dans l'oreille.

Hes. -Rougeur, vésicule et croûtes à la cloison du nez; brûlement au côté droit du nez et à la joue. — Saignement de nez. — Obturation de la narine droite, la nuit. — Éternument violent, la nuit. — Coryza: avec voix voilée; avec expectoration jaunâtre provenant des fosses nasales. — *Coryza fluent; *avec éternument; avec douleur dans la narine droite, et aggravation, le soir; oplus fort la nuit; très-violent, avec toux.


oplus fort la nuit; très-violent, avec toux.

Face et Dents. — Chal:ur à la face, surtout aux joues et particulièrement le soir. — Grande pâleur le matin. — Prurit a la face et à la lèvre supérieure. — Élancements à la machoire inférieure

et à la racine d'une dent canine, après s'être couché.

Bouche. — Salive augmentée, le soir. — Langue sèche et chaude, à sa partie antérieure, le soir; écorchure des bords, le soir; blanche; chargée d'un enduit jaune; d'un brun rougelire, avec un enduit sec qui s'enlève facilement.





RUMEX PATIENTIA.

621

Gorge. — *Accumulation abondante de mucosités dans les fosses nasales et la gorge. — Sensation emome si les parties étaient à cif, dans la gorge et au voile du palais; écorchure dans la gorge;

sensation comme s'il y avait un morceau dedans.


Goût et Appétit. — Mauvais goût de la bouche; goût amer; surtout le matin. — Appétit diminué; fortement augmenté, avec faim après avoir mangé. — Forte soif, le soir. — Après le repas (de midi): renvois, douleur dans l'hypocondre droit et l'oreille; douleur dans l'hypocondre gauche en marchant vite; tour dès qu'on se couche; étancements violents dans la poitrine; colique venteuse. — Après le déjeuner : plénitude dans l'estomac; sensation comme si la digestion était arrêtée; coryza fluent. — Arant le déjeuner : toux.

Symptômes gastriques. — Renvois à vide, après le repas, avec douleur dans l'hypocondre droit. — Dégoût avec élancements dans la poitrine. — Nausées : en se réveillant à minuit, avec le goût des aliments ingérés, plénitude dans le ventre et douleur dans l'occiput; avec renvois, élancement au-dessus du sourcil et douleur dans la région ombilicale; le soir, améliorée aprèsavoir émis des renvois, et avec sensation comme avant la diarrhée; avec douleur dans l'estomac et le ventre; le matin, en s'habillant.

Estomac. — Douleurs sourdes dans l'estomac; douleur dans l'estomac en toussant, et chatouillement dans cet organe, qui provoque la toux. — Sensation dans l'estomac, comme si cet organe avait disparu; plénitude dans l'estomac, apres le déjeuner. — Douleur lancinante dans le cartilage xyphoïde et les parties voisines de l'épigastre et la poitrine. — Cancer de l'estomac? — Gastrite?

Ventre. — Douleur dans l'hypocondre droit. — Douleurs dans l'hypocondre gauche : la nuit, en étant couché sur le côté gauche, forçant à changer de position, ce qui soulage; en marchant vite. après le repas de midi. — Douleur dans l'épigastre, le ventre et l'hypogastre, le soir, avec nausées; dans la region du colon ascendant, en marchant. - Douleurs dans la région ombilicale : avec nausees, rapports et élancements au-dessus du sourcil droit; subites, étant au lit, d'abord en baillant, puis en respirant profondément : le soir, avec nausées, des deux côtés du nombril. -Coliques renteuses: autour du nombril, le matin; commençant pendant le repas, après midi, et soulagées par l'émission des vents; sensation de vents qui se promènent dans les intestins et le rectum, le soir, précédée de baillements et suivie de douleur dans la région polvienne ; plénitude dans le ventre, la nuit, en se réveillant; ballonnement et dureté du ventre; flatuosités avec douleur dans l'os frontal. - Douleurs de ventre qui changent de place. - Mal de ventre avec dégoût, élancements dans la poitrine et frissonnement. - Prurit au ventre. - Douleur dans l'aine, partant comme un coup, du rectum.

Arms et Belles. — *Constipution avec accumulation d'exerciments



RUMEX PATIENTIA.

durs et tenaces; garde-robes insuffisantes. — Selles liquides, diarrhéiques, le matin : brunûtres, et aqueuses, ou en forme de bouillie; avec ténesme; précédées de coliques. — Dans le rectum, sensation comme si l'on y enfonçait un bâton; prurit, irritation et chaleur autour de l'anus, surtout en marchant; apparition d'un petit bouton hémorrhoïdal.

Urines. — Envie pressante d'uriner. — Urines très-pâles. — Urines plus rares, rouges, troubles, avec sédiment floconneux et surface

graisseuse. - Sédiment couleur de brique.

Parties viriles. — Douleur dans la région pelvienne. — Prurit au

prépuce; rougeur et écorchure au bord.

622

Larynx et Toux. — Voix d'un timbre plus élevé; voilée, comme pendant un coryza; nasillarde. — Enrouement, surtout le soir: osensation comme si le larynx était à vif, en toussant; *chatouil-lement dans la fossette du cou, provoquant la toux; ola pression sur la fossette du cou fait tousser. — Renâclement de mucosités du larynx et de la gorge.—*Toux, provoquée par un chatouillement dans la gorge : les bronches, la poitrine et l'estomac; *surtout le soir ou la nuit; dès qu'on se conche, la nuit et le jour. — En toussant : douleur aiguê dans la poitrine; élancements dans le poumon gauche, en respirant l'air froid; ébranlement douloureux de l'estomac, avec douleur au-dessus du sourcil droit; osensation comme si la poitrine était à vif.

Poitrine et respiration. — *En respirant, douleur d'écorchure dans la poitrine; en inspirant l'air froid, toux et élancements dans le poumon gauche. — *Douleurs de poitrine comme si les poumons étaient à rif; douleur sons le sternum; *douleur invétérée dans le poumon gauche; *douleurs en toussant. — *Elancements; *surtout à gauche; par l'air froid, dans la position couchée ou en se couchant. *Douleur de luxation près du sternum. — Douleurs dans la région du cœur : à gauche, la nuit, en se réveillant; brûlantes, le soir et au commencement de la nuit. —

Prurit au sternum, la nuit.


Tronc. — Mal aux reins, le matin. - Douleurs (pressives, aiguës) dans la colonne vertébrale et à côté; sensation de chaleur dans le dos et à la face, le soir; prurit an dos et entre les omoplates. - Douleur crampoïde dans la nuque, à gauche; vésicules au côté

droit du cou, près de la mâchoire.

Membres thoraciques. Douleurs dans les épaules et autour des clavicules. — Douleur dans le brus ganche, le soir, comme après un effort. — Douleur dans les articulations des mains; engourdissement de la main droite, le soir. — Doigts froids, pendant la toux.

Membres pelviens. — Douleurs rhumatismales dans les cuisses et les jumbes; sensation de fatigue dans les os. — «Ulcères aux jumbes. — Sensibilité douloureuse des pieds, surtout dans les

cors, avec douleurs lancinantes.



RUTA GRAVEOLENS

623

RUTA GRAVEOLENS.

RUTA. — Rue fétide ; rue des jardins. — HAMMEMANN. — Hist, nat et prép. Voy. Pharmac, homosop., p. 272. — Doses neitées : 12, 30. — Durée d'action : 8 à 15 jours.

ANTIDOTE : Camph.

COMPARER AVEC: Acon. amm. arm. ars. ass. bell. bry. con. hyon. ign a vom. op. plumb. puls. rhus. stram. veratr. — C'est quelquefois ign. qu'on peut administrer alternativement avec ruta.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Souffrances par suite de lésions mécaniques (contusion, chute, luxation, lésions des os ou du périoste); Carie?; Douleurs estéccopes?; Paralysie par suite de lésions extérieures; Souffrances par suite d'un temps pluvieux et froid; Affections rhumatismales, principalement aux articulations des mains et des pieds; Amblyopie amaurotique, surtout par suite de travaux fins, de la lecture, etc.; (l'ouperose; Affections vermineuses des enfants, surtout avec vomissement; Dyspepsie, surtout par suite de vomissements fréquents; ('oliques vermineuses; Pneumonie chronique avec suppuration, par suite de lésions mécaniques de la poitrine; Paralysie desarticulations des mains et des pieds, soit par suite d'affections rhumatismales, soit par suite de luxation, etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — *Douleurs de brisement ou comme à la suite d'une contusion, d'une chute ou d'une meurtrissure, dans les membres, les articulations et les os, surtout au toucher.—*Douleurs dans le périoste des membres, brûlantes ou rongeantes.—Déchirements et tractions pressives, crampoldes, dans les membres. — Sensation de plénitude dans tout le corps, avec gène de la respiration. — Lassitude, faiblesse et pesanteur dans tous les membres, surtout en étant assis, avec grandes inquiétudes dans les jambes. —Marche chancelante, mal assurér, par faiblesse des cuisses. — En étant assis, après de petites promenades, sensation d'un grand brisement dans tous les membres, avec sensibilité douloureuse du sacrum et des lombes.

Peau. — Prurit rongeant à la peau. - Inflammations érysipélateuses. — Excoriation facile, chez les enfants ou bien en marchant et en montant a cheval. — l'Iceres enflammés. — Anastrque. —

Verrues.



RUTA GRAVEOLENS.

Semmeil. — Baillements fréquents et pandiculations. — Forte encue de dormir, le soir et après le repas, avec réveil en sursaut et cris perçants au plus léger attouchement. — Agitation la nuit, avec jactation et réveil fréquent.

Fièvre. — Horripilation, froid et frisson, même auprès du feu. — Froid aux mains et aux pieds, avec chaleur à la face, embarras dans la tête et soif. — Chaleur générale avec agitation et inquiétude mortelle, étouffement de la respiration et mal de tête pressif.

- Chaleur passagère, fréquente.

624

Moral — Anxieté, comme trouble de conscience. — Disposition à la querelle et à la contradiction. — Inaptitude au travail. — On est mécontent de soi et des autres et disposé à pleurer. — Mélancolie et abattement moral. — Lenteur de la marche des idées.

Fréquente absence d'esprit.

Tête. — Tête entreprise, comme si l'on n'avait pas assez dormi. — Vertige tournoyant, au point de tomber, le matin en se levant, comme aussi en étant assis et en se promenant en plein air. — Maux de tête, comme par une pression étourdissante sur tout le cerveau, avec grande inquiétude. — Douleur battante ou déchirante dans le front avec embarras de la tête, le soir, avant de se coucher, et le matin au réveil. — Chalcur dans la tête. — Douleurs de traction tensive ou lancinante, à l'extérieur de la tête, comme après un coup ou une contusion, surtout dans le périoste. — Prurit rongeant au cuir cherelu. — Nodosités et bosses au cuir chevelu, avec douleur d'excoriation au toucher, se formant après avoir éprouvé un déchirement à la partie qu'elles occupent. — Petits ulcères et croûtes suintantes au cuir chevelu.

Youx.—*Douleurs dans les yeux en regardant fixement un objet.

— Cuisson pruriante dans l'angle des yeux. — Pression sur les yeux.—Sensation brûlante dans les yeux, en lisant aux lumières.

— Larmoiement au grand air. — Tache sur la cornée. — *Au-réole rouge autour de la lumière, le soir. — Frémissement et tressaillement des muscles des sourcils. Spasmes des paupières.

— Propension à la fixité du regard. — *Vue trouble, comme à travers un brouillard et obscurité complète dans le lointain. — Points voltigeant devant les yeux. — Myopie.

Oreilles et Nes. — Otalgie avec pression grattante. — Lancinations pruriantes dans l'oreille. — Douleur de meurtrissure dans le cartilage de l'oreille et sous l'apophyse mastolde. — Pression aigue et dure a la racine du nez. — Sueur sur le dos du nez. —

F pistaxis avec pression à la racine du nez.

Visage et Dents. — Douleurs de la face, comme par suite de contusions ou de coups, dans le périoste. — Déchirement crampolde dans l'os de la pommette. — Prurit et rongement à la face et sur les joues. — Érysipèle au front, avec gonfiement. — Éruption de boutons aux lèvres. — Couperose. — Odontalgie avec



douleur fouillante. - Sensibilité douloureuse et saignement facile des gencives.

Bouche et Gorge. — Bouche sèche, gluante. — Crampe de la langue, avec parole embarrassée. — Mal de gorge, comme par une tubérosité au fond du gosier, en avalant a vide. - Sensation d'ex-

coriation et pression au voile du palais, en avalant.

Appétit. — Goût des aliments fade et sec, comme du bois. — Forte soif d'eau froide, après midi. — Dégoût dès la première bouchée, avec sensation de plénitude et de satiété dans le ventre, d'ailleurs avec bon appétit. — *En mangeant, nausées subites, avec comussement des aliments. — Après avoir mangé du pain, ou bien des crudités et des aliments indigestes, douleurs à l'estomac.

Estomac. — Renvois à vide, ou avec goût des aliments. — Hoquet en fumant. — Renvois putrides, apres avoir mangé de la viande. — Renvois comme chez les femmes hysteriques. — *Nausées dans le creux de l'estomac. — Vomissement, même des aliments. — Douleurs d'estomac après avoir mangé des crudités ou des aliments indigestes. — Pincements dans l'estomac après avoir mangé du pain. — Douleurs d'estomac, rongeantes, brûlantes ou pres-


sives. - Elancements dechirants dans l'epigastre.

Ventre. — Pression rongeante dans la région hépatique. — Gonflement douloureux de la rate. Pulsation et picotement dans
l'hypocondre gauche. — Gonflement douloureux de la rate. —
Douleur de meurtrissure dans le rentre, avec fouillement dans
la région lombaire. — Pincements pressifs dans le bas-ventre. —
Pincements incisifs dans les côtes du ventre. — Élancements qui
remontent dans le ventre, en s'asseyant. — Sensation de froid,
ou chaleur, et sensation brûlante dans le ventre. — *Rongement
dans le rentre. — Coliques, comme par des cers. — Lancinations
dans les muscles abdominaux qui forcent à rentrer le ventre.

Selles. Selles difficules, evacuees sculement par de violents efforts, comme par inactivité du rectum. -- Selles rares, dures, noucuses, comme des crottes de monton. — *Diarrhée muqueuse alternant arec constipation. — *Encie fréquente d'alter à la selle, arec éracuntions peu abondantes, mais molles. — Envie inutile d'alter à la selle, avec chute du rectum. — *Chute du rectum à chaque selle. — Ecoulement de sang pendant la selle. —

Dechirements et clancements dans le rectum.

Urines et Parties viriles. — *Encie d'ariner, quelquefois trèspressante, avec pression sur la vessie, et émission d'une urine
pen abondante et verte. — Pression sur la ressie, quelquefois
même après et hors le temps de l'emission des urines. — Emission d'urine frequente et abondante, même la nult. — *Encie
continuelle d'uriner, même immédiatement après l'émission. —
Rétention d'urine.—*Émission d'urine involontaire la nuit, au
lit, et le jour, pendant le mouvement. — *Urine chargée de grarelle. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Pollutions.



RUTA GRAVEOLENS.

Règles. — Stérilité. — *Règles très-irrégulières, trop fortes et trop hâtires. — *Règles de trop courte durée, précédées et suivieu de flueurs blanches. — *Flueurs blanches, corrosires, après la cessation des règles.

Larynx. — Douleur de contusion au larynx. — Toux, le soir, après s'être couché, avec expectoration abondante de mucosités visquentes, et soulèvement de cœur, comme pour vomir. — Toux croassante, la nuit, avec grattement dans la poitrine. — Toux avec expectoration abondante de matières purulentes. —* Expectoration de mucosités épaisses, jaunâtres, presque sans toux,

mais arec sensation de fatigue dans la poitrine.

Poitrine. — Haleine très-courte avec dyspnée. — Pression à la poitrine, avec sensation de plénitude. — Compression nocturne de la partie inférieure de la poitrine. — Lancinations dans la poitrine, souvent avec suspension de la respiration, principalement en montant un escalier. — Sensation de froid, ou chalour dans la poitrine. — Sensation de rongement dans la poitrine. — *Au sternum, place douloureuse au toucher. — *Battement de cœur avec anxiété.


Tronc. — Douleurs de brisement dans le dos et aux reins, souvent avec étouffement de la respiration. — Traction dans la nuque et les omoplates. — Douleur de contusion aux reins et dans le sacram. *Elancements dans les reins, en marchant et en se

baussant, ou seulement en étant assis.

Bras. Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, surtout en laissant pendre les bras ou en les appuyant. — Secousses dans les bras, comme si c'était dans les os. — Déchirements sourds dans les os du bras et les articulations du coude. — Douleur de contusion dans l'articulation du coude. — Douleur de brisement dans les avant-bras, ainsi que dans les os et les articulations des mains. — Tractions pressives et crampoldes, et déchirement dans les avant-bras, les mains et les doigts. — *Roideur paralytique du poignet. — *Douleur de luxation ou élancements dans les poignets. — *Douleur dans le poignet, en soulevant un fardeau. — *Torpeur et fourmillement dans les mains, après des efforts. — Contraction crampolde des doigts. — Veines gonfiées aux mains.

Jambes. — Traction crampolde dans les cuisses, jusque dans l'articulation coxo-fémorale et le sacrum. — Douleur de brisement dans l'articulation coxo-fémorale et les os des jambes, comme par une contusion, surtout au toucher et en les étendant. — Faiblesse dans les os des cuisses, en se levant de son siége, comme s'ils étaient brisés. — Faiblesse, tremblement, et pesanteur paralytique des genoux et des jambes, qui ne permet pas de se tenir solidement debout. — Fatigue et lourdeur des jambes, après la marche. — *Sensation de raccourcissement des tendons du genon, — *Ulcères fistuleux aux jambes. — Fléchissement

426



RUTA GRAVEOLENS. — SABADILLA.

627

cles genoux, surtout en descendant un escalier. — Douleur brûlante, rongeante, dans les os des pieds, qui ne permet pas de les appuyer. — *Roideur paralytique du con-de-pied, comme par luxation.

SABADILLA.

SABAD. — Gévadille. — Archives de STAPT. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. hommop. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 2 à 3 semaines.

ANTIBOTES : Camph. puls.

Companen avec : Aut. are. cape. cham. chin. com. ign. natr-m. n-vom. plat. plumb. puts. rhus. sep. verstr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Fièvres intermittentes, surtout au printemps; Angines chroniques, opiniâtres; Affections vermineuses, surtout souffrances par le ténia : Œsophagite?; Gastrite; Grippe, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Tractions doulourouses dans les membres, comme dans la moelle des os, avec disposition à détirer les membres, soulagées pendant le repos. — Raclement et douleurs incisires dans les os, comme par des conteaux, surtout dans les articulations, aggravés au toucher, soulagés en remuant promptement la partie. — Lancinations picotantes, pressives et sourdes à diverses parties. — Fourmillement dans les membres, -- Convulsions. -- Lourdeur de la marche et des mouvements. --*Sensation douloureuse de paralysie dans les membres, et surtout dans les genoux. — *Lassitude et pesanteur dans tous les membres, aggravée le soir, ou vers midi, temps pendant lequel les douleurs dans les membres s'aggravent aussi. — En étant couché, on se trouve mieux qu'en marchant ou en se tenant debout. Plusieurs symptômes paraissent d'abord au côté droit, puis au côté gauche. - *Grande sensibilité au froid, qui aggrave le malaise et les douleurs.

Peau. — Élancements fourmillants et brûlants sous la peau. — Bandes, taches et points rouges à différentes parties de la peau, apparaissant plus sortement au froid. —•Couleur sale, grisâtre de la peau.

Sommell. - Forte enrie de dormir le jour. - avec baillements con-



SABADILLA.

tinuels et pandiculations. - Sommeil tardif par afficience dées. — Sommeil incomplet le soir, avec esprit fatigué par pensées étranges. -*Sommeil de nuit agité, non réparateur, au rêves anxieux.

Pièvre. — Fièvre sans soif, consistant seulement en froid et accès de chaleur isolés, qui sont plus sensibles à la face et au mains qu'aux autres parties du corps. — Frisson ou froid ext rieur arec tremblement des membres, sans frisson, et arec so peu forte ou complètement nulle; puis chaleur, avec soif mod rée, accompagnée ou suivie de sueur. — Pendant le frisson, dou leurs dans les côtes supérieures, toux sèche, crampoide et déchi rements dans tous les membres et les os. — Pendant la chaleur délire, baillements et pandiculations. — Sommeil pendant le sueur. — Fièrre quotidienne, tierce, quarte, apparaissant i heures fixes, avec absence d'appétit, ballonnement pressif de l'estomac, douleurs de poitrine, toux, frissonnement, faiblesse et soif entre les frissons et la chaleur. — Dans l'apyrexie, courbature des membres, sans autres souffrances.

Moral. *Inquiétude et angoisse, avec grande agitation.—Disposition à s'effrayer. — Mauvaise humeur et colère. — Éloignement pour le travail. — Fureur. — Exaltation de l'esprit, avec caractère froid, et vice versa. Difficulté de penser. - Evreurs de l'imagination par rapport à soi-même; il semble que le corps soit défait et comme un cadavre, que l'estomac soit

rongé, etc.

628

Tôte. — Vertige avec nausées, soulagé en appuyant la tête. — Vertige avec perte de connaissance et obscurcissement des yeux, en se levant de son siège. — Mal de tête, avec douleur tensive, surtout pendant une fatigue intellectuelle. — *Mal de tête pressif et étourdissant, dans le front et les tempes. Pesanteur douloureuse de la tête. — Douleurs térébrantes dans la tête toutes les fois qu'on s'est promené. - Battement pulsatif et douloureux dans la tête. — Fourmillement brûlant et picotement dans le front et au cuir chevelu.


Youx. — Cuisson brûlante dans les yeux. — *Pression sur le globe des yeux, surtout en regardant en l'air. — *Rongeur du bord des paupieres. — *Larmoiement, "surtout pendant la promenade au grand air, en regardant la clarté, en toussant, en bâillant, et à la plus légère douleur à d'autres parties. — Faiblesse de la vue.

Oreilles. — Otalgie, avec pression pénible. —Chatouillement dans les oreilles. —Prurit brûlant et élancements aux lobes de l'oreille. — Surdité comme s'il y avait un bandeau sur les oreilles. — Bourdonnement, grondement et détonation dans les oreilles. — Térébration dans les parotides.

Nes. — Fourmillement pruriant dans le nez, et cuisson contractive. — Épistaxis. — Grande sensibilité à l'odeur de l'ail. — Éternument ébranlant. — Obturation tantôt de l'une, tantôt de



629



SABADILLA.

l'autre narine. — *Coryza fluent, avec visage altéré et tête entreprise. — Mouchement de grosses masses de mucosités blanches

et transparentes, sans coryza.

Visago. — Chaleur de la face avec rougeur ardente, surtout après avoir bu du vin. -- Cercles bleus autour des yeur. -- Peau marbrée, dartreuse, à la face. — Sensation brûlante, douleur d'excoriation, picotement et fourmillement pruriant, aux lèvres. — Térébration dans la machoire inférieure et les glandes sous-marillaires.

Douts. — Odontalgie, avec douleur tractive et pulsative. — Douleur lancinante dans les dents molaires. — Carie des dents. — Gencives blenatres. - Picotement dans les gencives. - *Douleur dans

les dents inférieures du côté gauche.

Bouche. — Sensation dans la bouche et sur la langue, comme si elles étaient brûlées et excoriées. — Picotement au bout de la langue. — Bout de la langue bleuâtre. - *Langue chargée d'un enduit épais, jaunâtre. — *Sécheresse de la bouche, sans soif. - Accumulation abondante de salire (douceatre) dans la bouche.


Gorgo. — Mal de gorge, comme par une cheville, on un gonsement intérieur, pendant et hors le temps de la déglutition. - Sensation de constriction dans la gorge. — Pression et sensation brúlante dans la gorge, pendant et hors le temps de la déglutition. — Sécheresse de la gorge. — Apreté et grattement dans la gorge, avec besoin continuel d'avaler ou de renâcler. — Inflammation de la luette.

Appétit. — Goût amer ou (d'une douceur répugnante). — Forte soif d'eau froide, de lait et de bière, même le matin. — Faim avec répugnance pour tous les aliments, surtout la viande (le café, le vin et les acides). Boulimie, surtout le matin et le

soir (et principalement pour le miel et les farineux).

Estomac. - Renvois généralement à vide, et quelquefois avec horripilation. — Renvois douloureux et incomplets. — Pyrosis. - Nausées arec envie de tomir, "souvent avec horripilation, soulagées en mangeant. Vomissement de lombrics. — Mollesse, malaise et froid dans l'estomac. — Fouillement dans la région épigastrique, avec douleur d'excoriation en pressant dessus. — Fréquemment, sensation subite de gêne de la respiration dans le scrobicule, avec anxiété. — Sensation de chaleur au scrobicule et **b**rûlement à l'estomac.

entre. — Raclement pressif dans la région hépatique. — Traction fouillante dans le foie, avec douleur d'excoriation en pressant dessus. — Sensation de chaleur dans la région hépatique. — Mal de rentre, comme par des vers. — Constriction dans le ventre. — (Tranchées, comme par des couteaux). — Elancements violents dans les côtés du ventre qui obligent à se courber. -- Térébration, fouillement et rotation dans le ventre. - Sen-



SABADILLA

n 10

sation de froid, ou brûlement dans le rentre. — Contraction crampoïde des muscles du ventre. — Taches et points rouges sur le ventre.

Selles. — Constipation. — Selle interrompue, dure, insuffisante. — Forte envie d'aller à la selle, avec évacuation peu abondante. — Selles diarrhéiques brunes ou fermentées, mêlées de mucositée ét de sang. — Pincements, déchirement et fourmillement dans le rectum. — *Souffrances par le ver solitaire.

Urines. — Envie pressante d'uriner, surtout le soir, avec ténesme et émission peu abondante. — Sécrétion d'urine plus abondante. — Urine trouble, épaisse, bourbeuse. — Sensation brûlante en urinant.

Parties génitales. Douleur fouillante et pressive dans les testicules. — Appétit vénérien diminué. — Érections tensives et douloureuses, sans désir du coît. - Pollutions avec flaccidité de la verge. (Règles en retard, mais plus abondantes et de plus longue durée).


Larynx. Voix rauque, enrouée. — *Aphonie complète. — Renàclement d'un sang rouge vif, venant des fosses nasales. — Toux courte, sèche, même la nuit, par un grattement dans la gorge. — *Toux, avec romissement, élancements au rertex et douleur à l'estomac. — *Toux sourde, quelquefois avec crachement de sang. — *Toux dès que l'on se couche. — Toux avec expectoration et lancinations dans la poitrine.

Poitrine. — Respiration génée, comme s'il y avait une pierre sur la poitrine. — Respiration courte, difficile. — Respiration siffiante. — Pression à la poitrine. — Sensation brûlante dans la poitrine. — Elancemente dans les côtés de la poitrine, surtout en respirant et en toussant, qui troublent le sommeil de nuit et ne permettent pas de se coucher sur le côté. — (Inflammation de la plèvre). — Battement de cœur, avec pulsation dans tout le corps. — Taches et points rouges sur la poitrine.

Tronc. - Douleur de brisement dans le dos et aux reins, surtout en étant assis. - Sensation de constriction depuis les omoplates jusque dans la poitrine, avec sensation comme si le sang n'y circulait pas, aggravée au froid.

Bras. — Mouvements convulsifs des bras. — Tremblements des bras et des mains. — Taches, bandes et points rouges aux bras et aux mains. — Lancinations picotantes dans les avant-brus. — Sécheresse de la peau des mains. — Distorsion des doigts. — Taches jaunes aux doigts. — Desquamation de la peau autour des ongles.

Jambes. — Élancements dans les cuisses et les genoux. — Faiblesse et fléchissement des genoux. — Déchirement et tension dans les mollets, même la nuit. — Pesanteur des pieds. — Gonflement des pieds, avec sensibilité douloureuse de la plante des pieds. — Sueur abondante à la plante des pieds.



SABINA.

631

Sabina.

SABIN. - Sabine. - Archives de STAPF. - Hust nat, et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 274. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 3 à 4 se-maines, dans des affections chroniques.

мтівоте : Camph. COMPARER AVEC : Acon. ars. bell. cham. cocc. graph. ipec. puls. thut, veratr.

CLIBIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : --Affections arthritiques aigues et chroniques; Maladics des oc?; Odontalgie rhumatismale; Aménorrhée; Flueura blanches; Métrorrhagies actives, surtout par suite de pléthore, et chez des femmes qui ont été réglées de bonne heure et très-abondamment : Métrorrhagies à la suite de l'accouchement, ou par suite d'un avortement; Disposition à l'avortement, surtout dans le troisième mois de la grossesse (en l'alternant avec lyc..) Hydropisie de l'ordire; Podagra, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GRARRAUX. — Douleurs arthritiques, lancinantes et déchirantes, surtout dans les articulations, cet quelquelois avec gonflement rouge et luisant des parties affectées. — Nodosités goutteuses. — Traction lancinante dans les os cyline. driques. — Sensation brûlante, pressive, dans le périoste qui est gonflé.—Hémorrhagies. - Battement tressaillant dans toutes les artères. - Malaise général, comme après avoir beaucoup veillé. *Affections du périoste.


Peau. -Prurit à la peau, avec excoriation et ulcération ou plaques croûteuses, applique voir gratté. - Sensation brûlante au toucher, dans les parties de la peau qui sont affectées.

Sommeil. - Sommeil agité, avec réveil fréquent, bouillonnement de sang, chaleur et a seur. -- Rêves anxieux. -- Rêves continuels, pleins d'imaginations et d'efforts intellectuels. - Paroles et ronilement bruyant pendant le sommeil.— Disposition à être couché sur le côté gauche, en dormant.

Fièvre. — Horripilation et frisson, avec chair de poule et obscurcissement de la via. - Chaleur brûlante sur tout le corps, avec grande agitation. - Chaleur de la face, avec froideur glaciale des pieds et des mains. - Fièvre le soir ; d'abord frisson, pais chaleur,

et enfin sueur. - Sueur nocturne.

Moral. — Abattement, découragement et tristesse. - - Morasité, avec



SABINA

632

cloignement pour la conversation, surtout en se promenant au grand air. — Disposition à se fâcher, avec pleurs et sanglots. —

Indifférence. — Faiblesse de la mémoire.

Tôte. — Vertige étourdissant, à faire tomber, avec obscurcimement de la vue. — Acces de migraine. — Pesanteur et pression pénible dans la tête, souvent depuis le sinciput jusque dans la nuque. — Sensation d'écartement dans le front et les tempes. — Douleurs tractives dans la tête, surtout dans le front et les tempes. — Douleurs de tête lancinantes, avec cuisson ou pression, souvent dans tout le cerveau. — Fourmillement et térébration dans la tête. — Maux de tête pulsatifs, avec pesanteur et étourdissement. — Les maux de tête paraissent souvent subitement, diminuent lentement, et se renouvellent fréquemment.

Your et oroilles. - Douleurs tensives dans les yeur, comme si les muscles étaient trop courts. — Yeur ternes, abattus. — Chaleur des yeur. - Larmes cuisantes. — Tressaillement frémissant des paupieres. — Nuages devant les yeur. — Pincements dans les

oreilles. - Dureté de l'oule.

Visage. — Face p\u00e1le, avec cercles bleus autour des yeur. — Pores noirs aur les joues et autour du nes. — Douleur paralytique et pression \u00e0 l'os de la pommette. — Lancinations depuis la m\u00e1choire

inferieure jusque dans l'os de la pommette.

Dents. — Odontalgic pendant et après le repas et la mastication. —

Pression et battement dans les dents, surtout le soir et la nuit, avec sensation comme si la dent alluit être arrachée, aggravée en buvant, en fumant, et à la chaleur du lit, améliorée après le lever. — Traction dans les dents, en buvant, en mangeant, et par le contact de l'air. — Sensibilité douloureuse et gonfiement blanc des gencives, autour d'une dent cariée. — Ulcère des gencives. — *Pression comme si la dent allait éclater.

Bouche. — Exhalaison putride par la bouche. — Salive rougeatre ou blanche, qui devient écumeuse en parlant. — Crachement de


sung. - Langue chargée d'un enduit blanc ou brunatre.

Gorge. — Mal de gorge, pendant la dégligition, comme par un corps étranger ou un gonflement intérieur dans le gosier, avec pression et étranglement. — Lancinations sources dans la

gorge.

Appetit. — Goût dans la bouche et la gorge, comme d'un vieux rhume. — Goût fade, gras, ou comme de sang, dans la bouche. — Goût amer de la bouche, et amertume des aliments, surtout du l'ut et du café. — Appétence pour les acides, surtout pour la limonale. — Après le repai, aigreur dans l'estomac.

Estomac. — Renvois à ride. — Nausées avec plénitude d'estomac. — Vomissement de bile, *ou des aliments. — Plénitude et ballonnement de la région de l'estomac. — Pression à l'estomac. — Lancinations depuis le creux de l'estomac jusqu'à travers le dos. Ventre. — Pression dans la région hépatique. — Ballonnement du



SARDIA.

688

ventre. — Douleurs contractives dans le ventre. — Pincements pressifs dans le ventre, comme par un refroidissement ou par une diarrhée. — Inflammation des intestins. — Douleur de meurtris-

sure dans les muscles abdominaux, le soir, au lit.

Selles. — Évacuations alvines, d'abord molles, puis dures. — *Selles diarrhéques, molles, -avec bruit et expulsion abondante de vents. — Écoulement de mucosités sanguinolentes par l'anus. — Écoulement de sang par l'anus, après une selle dure. — Boutons hémorrholdaux de l'anus, douloureux. — Fourmillement à l'anus.

Urines. — Rétention d'urine, avec émission goutte à goutte, et sensation brûlante. — Forte envie d'uriner, avec écoulement peu abondant. — Émission d'urine abondante, même la nuit. — Inflammation douloureuse de l'urèthre, avec écoulement de pus,

comme par une gonorrhée.

Parties viriles. — Tumeur dure sur le dos de la verge. — Elancements dans le giand. — Rougeur foncée du gland. — Sensibilité douloureuse du prépuce, avec difficulté de le retirer. — Frein gonfié et tendu. — Douleur d'exceriation aux condylomes. — Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections violentes et pro-

longées.


Règles. — Forte exaltation de l'appétit vénérien chez la femme. —
Douleur contractive dans la région de la matrice. — Congestion sanguine à l'utérus. — *Métrorrhagies, avec écoulement d'un sang caillé ou d'un rouge vif, et douleurs comme pour l'enfantement aux reins et dans les aines. — *Règles trop abondantes. — *Suppression des règles avec flueurs banches. — *Avortement. — Gontlement sensible des seins. — Fourmillement dans les seins. — *Leucorrhée pruriante, jaunâtre, fetide, épaisse comme de l'amidon. — *Hydropisie de l'oraire.

Larynx et Paitrine. — Toux sèche, proroquée par un chaiouillement, ou suivie plus tard d'expectoration de mucosités striées de sang. — Pression à la poitrine. — Tension pressive, crampoide dans la poitrine, principalement au milien du sternum. — Élancement et douleur d'excoriation dans le cartilage xyphoïde. avec aggravation en respirant profondément et par le toucher. — Tremblement dans les poumons, avec miement sourd et pétillement. — Battements de cœur, augmentés et tendus. — Lancinations à l'extérieur de la poitrine et dans la clavicule.

Tronc. — Traction pressive aux reins, jusque dans la région de l'aine. — Déchirements pressifs et elancements dans l'épine dorsale. — Douleur de brisement dans les muscles et les vertèbres

du con.

Bras. — Douleur de luxation dans les articulations de l'épaule et des mains. — Déchirements pressifs et élancements dans les bras et les doigts. — Roideur arthritique et gonflement de l'articulation du poignet; avec déchirement et élancements. — Traction.



SANGUINARIA CANADENSIS.

Pendant le mal de tête: chatouillement dans la gorge; frissons, parfois avec nausées suivies de chaleur fugace depuis la tête jusqu'à l'estomac; vertiges et douleur à l'oreille. — Les maux de tête s'aggravent particulièrement par le mourement et en se baissant, et viennent parfois par accès. • blal de tête arec douleur d'excoriation, surtout aux tempes. — • Mal de tête remontant de la nuque comme un rayonnement. — Sensation comme si quelque chose tirait la tête en avant. — Douleur d'excoriation aux téguments de la tête, en y touchant. — Sensation comme si la peau de la tête était détachée du côté droit, avec tiraillement en levant les yeux. -* Enflure des veines à la tête, particulièrement aux tempes.

Your. - Yeur larmoyants, avec brûlement, ou bien avec douleur au toucher, suivie de coryza. — Sensation comme si des vapeurs acides étaient entrées dans l'œil. — Your troubles, avec sensation comme s'il y avait des cheveur dedans. — Scintillement devant les yeur. — Obscurcissement fréquent de la vae. — Pupilles

dilatées.

638

Oreilles. — Battement au-dessous des oreilles. — Douleur d'ereille, avec mal à la tête. — Chaleur brûlante aux oreilles, arec joues rouges. — Elancement dans l'oreille gauche. — Bruissement et tintement dans les oreilles. — Oule très-sensible, chaque coup de marteau (d'une forge) est ressenti douloureusement.


Nos. — Sensation de chaleur dans le nez. — Perte de l'odorat. — Odeur devant le nez, comme des oignons rôtis. — Répugnance pour l'odeur de la mélasse. — Éternument fréquent. — Coryza fuent, corrosif, avec excoriation des narmes, ou bien avec larmoiement violent de l'œil droit et selles diarrhéiques. — Alternation de coryza fluent et d'obturation du nez. — Coryza avec

gorge enrouée, douleur de poitrine, toux et diarrhée.

Pace. — Sensation de plénitude à la face. — Bouffissure du visage, avec rougeur foncée et sensation de roideur. — Rougeur de la face, parfois avec chaleur et brûlement. — Rougeur de l'une des joues. — Rougeur circonscrite de la face. — Face pâle pendant l'envie de dormir. — Couleur livide des joues et des mans, dans les pneumonies typhoïdes. — Tressaillement aux pommettes. — Roideur des mâchoires. — Sensation de sécheresse aux lèvres.

Dents. — Douleurs dans les dents cariées, surtout au contact des aliments, ou en y portant le cure-dents. — Rongement dans une molaire. — Mulaux dents, au réreil, avec mal de tête du même côté (droit), aggravation du mal de dents par l'eau froide et amélioration par des boissons chaudes. — Branlement des dents, au point qu'on croit les pouvoir ôter toutes.

Benche. — Salivation, avec branlement des dents. — Fourmillement et picotement à la langue, surtout au boût de la langue. —





SANGUINARIA CANADENSIS.

689

Sensation d'excoriation et de sécheresse à la langue, comme après avoir mangé des choses âcres, le matin, au réveil. — Langue au vif, avec douleur d'ulcération. — Élancement au côté gauche de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Perte du

goût.


Gorge. — Sensation de sécheresse dans la gorge, sans soulagement par la boisson. — Chaleur dans la gorge, soulagée par l'inspiration de l'air frais. — Sensation d'âcreté, comme après avoir mangé quelque chose d'àcre. — Brûlement dans le gosser, surtout après avoir mangé des choses sucrées. — Sensation de gonflement : comme si la gorge était fermée, et que la tumeur allait l'étouffer, avec aphonie; ou bien le soir, le plus fort pendant la déglutition, et surtout du côté droit. — ° l'icération à la gorge.

Appétit et Goût. — *Manque d'appétit, avec langue chargée d'un enduit blanc. — Le sucre paraît amer et cause un brûlement au gosier. — Goût gras ou muqueux à la bouche. — Répugnance pour le beurre, qui a un arrière-goût douceâtre. — Désir de choses non définies, avec manque d'appétit. — Désir de choses piquantes. — *Grande faiblesse de digestion. — Après le repas,

sensation de vacuité dans l'estomac.

Estomac. — Renrois: spasmodiques et à vide; d'une odeur désagréable; avec envie de vomir et face pâle; avec soulagement des étourdissements. — Pyrosis et dégoût. — Hoquet en fumant du tabac. — Pituites avec envie de dormir. — "Nausées: après le repas; périodiques, avec manque d'appétit; en se baissant; arec besoin de cracher beaucoup; avec salvation et sensation comme si on allait mourir; arec frissons et chaleur, pendant le mal de tête aussi; "avant l'éruption urticaire, "ou avant le mal à la tête. — Vomissements: précédés de grande angoisse, d'envie inutile d'aller à la selle, ou de beaucoup d'autres souffrances; avec désir de manger, pour apaiser le mal de cœur; avec diarrhée; avec grande faiblesse; comissements amers. — Sensation de chaleur, d'ardeur et brûlement dans l'estomac. — Mouvements dans l'estomac, comme si quelque chose de vivant y sautillait — Inflammation de l'estomac?

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres, avec vertiges continus et lassitude. — Douleur dans l'hypocondre gauche, plus forte en toussant, moindre en pressent dessus et en se pliant à gauche. — Torpeur et atonie du foic. — *Sensation d'un courant chaud passant de la poitrine au ventre, esuivie de diarrhée. — Battement dans le ventre. — Crampe dans le ventre, passant d'une place à l'autre. — Dallonnement du ventre, le soir, arec émission de rents par le Gagin. — Émission de vents par le haut et le bas, en se redressant à cause de la toux, qui disparaît ensuite. Les maux de ventre viennent par accès. — Tranchées tractives. — Douleur fouillante dans le ventre, la nuit, avec maux de



SANGUINARIA CANADENSIS.

reins. — Élancements violents dans le ventre, comme par de coutenux, suivis de diarrhée aqueuse. — Le matin, collique, suiv. de diarrhée. — Sortie fréquente de vents fétides.

Anns et Selles. — Envie inutile d'aller à la selle, avec sensation d'un gros tampon dans l'anus, ou bien suivie de vomissement, or encore avec émission de vents. — Diarrhée: avec émission fré quente de vents; précédée de tranchées, de coliques, de douleur violentes. — Après les selles diarrhéiques, cemation du corvia, de la toux, des douleurs de poitrine. — Selles avec évacuation des aliments non digérés. — Selles molles, plus fréquentes, les premiers jours.

Urines. - Pissement fréquent, surtout la nuit aussi, avec émission

fréquente d'urines claires, aqueuses.

Parties viriles. - Pollutions, deux nuits de suite.

Règles. — Souvent mal au rentre, comme si les règles allaient venir. — Règles trop hâtives de 8 jours, avec sang noir. — Règles plus fortes, avec mal à la tête aurtout du côté droit, comme si les yeux allaient sortir de la tête. — Métrorrhagies. — Avortement. — «Émission de rents par le ragin, avec orifice ouvert de la matrice. — Élancements dans les mamelles. — Douleur d'excoriation au-dessus du mamelon droit, plus sensible au toucher. — Encoriation et sensibilité douloureuse des mamelons.

Larynx. — Toussottement fréquent, surtout en mangeant; ou bien arec chatouillement à la gorge, le soir, parfois surtout après s'être couché, ou avec mal à la tête. — Tour sèche pendant le sommeil, et réveillant, ne cessant que par l'émission des vents par le haut et le bas après s'être réveillé sur son séant. — *Toux, ouvec ou *sans expectoration, oparfois violente, continuelle, avec rougeur circonscrite des joues, et douleur de poltrine. — Faci-

lite l'expectoration.


640

Poitrine. — Douleurs de poitrine, avec toux périodique, avec ou sans expectoration. — Respiration difficile, avec couleur livide des joues et des mains, et pouls vibrant et facile à comprimer (dans une pneumonie typhoide). — Pression et ardeur à la poitrine, suivies de chaleur dans le ventre et diarrhée. — Oppression et sensation de faiblesse dans la poitrine. — Sensation d'un courant ardent dans le côté droit de la poitrine, partant de la clavicule et de l'aisselle droites, et descendant jusqu'à la région du foie. — Élancements, dans la poitrine, à droite et à gauche. — Pression dans la poitrine, le dos et la région du cœur. — Battement de cœur avec grande faiblesse.

Tronc. — Maux de reins à la suite d'un tour de reins. — Douleurs au dos. — Mal aux reins, soulagé en se courbant en avant. — Douleurs rhumatismales à la nuque, sux épaules et aux bras, parsois le plus fort la nuit, au lit, et surtout en se retournant. — Douleur d'excoriation à la nuque. — Douleur au cou, comme à la

suite d'un tour de reins.

ļ



SARRACENIA PURPUBEA. — SASSAPARILI

Extrémités supérieures. — Douleurs rhumatismales bras et la paume des mains. - Douleur d'ulcération dans des mains. — Brûlement à la paume des mains, pai rougeur. — Couleur livide des mains. — Roideur des tions des doigts. — Douleur d'ulcération au-dessous de l

po**uce.** — Panaris à tous les doigts.

Extrémitée inférieures. — *Douleurs rhumatismales et trissure dans la hanche gauche, cainsi qu'un côté inf la cuisse droite, con bien alternant avec brûlement et dans la poitrine. — Roideur et tension dans les ja Crampe et traction dans les mollets. -- Elancements de culation du pied et les malléoles. — Pieds froids, aprè-*Brûlement à la plante des pieds et à la paume des mo fort la nuit, au lit. - Douleurs aux cors. - Grande faib les jambes.

<u>SARRACENIA PURPUREA</u>


SARRAC. — Voy. HALE, remèdes américains.

Ce médicament, dont nous ne possédons encore aucune nésie sérieuse, doit sa grande réputation uniquement à la c avec laquelle certains empiriques l'ont prôné comme un s absolu contre la petite vérole, prétendant qu'il neutralisai dans le sang, de la manière la plus radicale. Depuis lors, c stance a été, tant en Amérique, qu'en Angleterre, en Fra Belgique, employée bien souvent contre la petite vérole; m: que ses prôneurs ne peuvent dire assez des succès su: qu'ils en ont obtenus, il en est d'autres qui lui contestent cacité contre cette maladie. Quant à nous-même, nous en l'un et l'autre : les cas des plus graves où sarrac, produisi racles, et d'autres où il restait absolument sans nul effe nous manque, ce sont les indications caractéristiques pour ploi dans chaque cas individuel.

Bassaparilla.

SASS — Salsepareille. — RANNEMANN. — Hist. nat. et prép. homocop., p. 277. — Dose unitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à l dans des affoctions chroniques. ANTIDOTES *

Comparer avec : Amm. cham. clem. ence. meye. puls. ran. sep.



SASSAPARILLA.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques, surtout à la suite d'un refroidissement dans l'eau ou après la suppression d'une gonorrhée; Ulcères et autres souffrances par l'abus du mercure ; Dartres, Chiculs urinaires et rénaux ; Constipation, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX.—Douleurs lancinantes, déchirantes, pressives.—Déchirement paralytique dans toutes les articulations et les membres, souvent accompagné de tremblement des mains et des pieds, déchirements douloureux dans la tête, et pincements dans le ventre. — Douleurs arthritiques, avec diminution de la secretion des urines. — Roideur et immobilité des membres. —Gonflements chauds et épais. — Grande lassitude, surtout dans les membres inférieurs. — Lassitude dans les mains et les pieds. —Amaigrissement. —Les douleurs attaquent le moralet abattent l'esprit.

Peau. — Prurit, quelquesois sur tout le corps, surtout le soir au lit, et le matin, en se levant. — Boutons rouges et secs, qui ne démangent qu'à la chaleur. — Eruption miliaire, au contact de l'air frais, en sortant d'un appartement chaud. — Éruptions urticaires. — Vésicules purulentes. — Dartres, presque à toutes les parties du corps. — Verrues. — Peau ridée. — Rhagades proson-

des, brûlantes, douloureuses (aux doigts).

Sommeil. — Sommeil de bonne heure, le soir. — Insomnie nocturne et réveil fréquent. — Rêves effrayants, avec sursants fréquents.


Flèvre. — Frissons nuit et jour. — Froid, même auprès du feu, par tout le corps, excepté au visage et à la poitrine, mais principalement aux pieds. — Chalcur le soir, avec bouillonnement de sang, battement de œur et sueur au front.

Moral. — Auxiété, avec tremblement dans les pieds. - Morosité et mauvaise humeur, avec aptitude au travail. — Irascibilité et sus-

ceptibilité. Humeur changeante.

Tôte. — Vertige, en firant longtemps les yeux sur un objet. — Vertiges, avec nausées et renvois aigres. — Maux de tête, avec nausées et vomissements aigres. — Maux de tête lancinants ou pressifs, ou bien pressifs et lancinants à la fois. — Douleurs de tête crampoides, semi-latérales, comme si la tête était serrée dans un étau, avec obscurcissement des yeux, besoin de se coucher et résonnement dans le cerveau à chaque parole qu'on prononce. — Douleurs battantes dans la tête. — Bruit et bourdonnement dans la tête. — A l'extérieur de la tête, douleurs pressives et incisives, ou lancinantes pressives, tractives et déchirantes, aggravées par

642



SASSAPARILLA.

648

le contact et la marche. -- Sensibilité du cuir chevelu. -- Chute des cheveux.

Youx. — Douleurs dans les yeux, par la clarté du jour. — Pression dans les yeux, surtout le soir, en lisant aux lumières. — Élancements dans les yeux. — Sensation brûlante dans les yeux et les paupières. — Agglutination des paupières, le matin. — Angles internes des yeux, bleus et gonflés. — Obscurité devant les yeux, comme un brouillard. — Reflet rouge du papier blanc, le soir.

Oreilles et Nes. — Élancements dans les oreilles. — Contraction et pression dans les oreilles. — Croûtes brûlantes, pruriantes, aux lobes des oreilles. — Tintement et sonnerie dans les oreilles. — Epistaxis. — Éruption croûteuse, aux, sous et dans le nez. — Coryza sec et obturation du nez. — Mucosités nasales trèsépaisses.

Visage. — Éruption faciale. — Éruption pruriante sur le front, avec sensation brûlante et suintement après avoir gratté. - Taches rudes, rouge pâle sur le front. — *Croûtes épaisses au visage. — Roideur et tension dans les masséters et les articulations de la mâchoire. — Dartre sur la lèvre supérieure. — Vésicules purulentes et pruriantes au menton.


Dents. — Odontalgie, avec déchirements tractifs, par un courant d'air froid ou par des boissons froides. — Agacement des dents supérieures. Déchirement dans les gencives. — Gencives gonflées, avec douleur d'excoriation.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche. — Aphthes sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, en avalant. Pression crampoide dans la gorge, comme un étranglement, avec gêne de la respiration. — Sécheresse et apreté dans la gorge, surtout le matin. — Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge.

Appétit. — Goût amer, ou acide et pâteux, ou bien douceâtre, métallique et herbacé. — Amertume du pain. — Insipidité des aliments. — Après le repas, sensation de vide dans l'estomac, comme si on était à jeun, ou bien dégoût seulement en pensant a ce que l'on a mangé. — Soif d'eau surtout, même le matin.

Estomac. -- Rencois et régurgitations, surtout pendant et après le repais, généralement amers on aigres. -- *Nausées fréquentes ou continuelles, avec envie inutile de vomir. -- Vomissements aigres. -- Douleurs constrictives dans l'estomac. -- Pression dans le creux de l'estomac. -- Chaleur et sensation brûlante dans l'estomac, surtout après avoir mangé du pain.

Ventre - Douleur de brisement dans l'hypocondre gauche. -Elancements dans l'hypocondre gauche. Grande sensibilité du ventre à la pression extéricure. — Douleurs intestinales, constrictives et crampoides. — Tranchées, surtout dans la région ombilicale. - Élancements dans les côtés du rentre, surtout



SASSAPARILLA.

644

dans le côté gauche. Sensation de froid, ou chaleur et sensition brulante dans le ventre. Sensation de vacuite et borborygmes dans le ventre. Expulsion abondante de vents fétides. — Incrtie des intestins

Selles. - Selles dures, retardees et rares, souvent avec besoin pressant - Evacuations alvines, doulouveuses, difficiles, avec douleurs contractives dans le ventre et forte pression vers le bas. - Constipation opiniatre, avec envie fréquente d'unner. - Selle gluante, tenace. Selles diarrhéiques, àcres, corrosives, avec maux de ventre. - Pendant la selle, acces d'evanouissement. -

Doubner d'excornation et prurit brulant a l'anus


Urines. Ténesme resical, avec pression sur la vessie et écoulement d'une matière blanche et trouble, mêlee de mucosités. — Envie fréquente d'uriner, sans resultat, ou avec émission peu abondante. Émission frequente et abondante d'une urine pâle, jour et nuit, souvent sans sensation dans les voies urinaires. — Urine trouble, bourbeuse. — Urine enflammee, rare, rouge. — Flocons filiformes dans les urines. — Sang dans les urines, vers la fin de l'emission. — Ourines chargées de gravelle et de petits calculs. — Sensations brûlantes en urinant. — Crampe de la vessie, avec douleur contractive. — Écoulement de pus par l'urêthre, comme une gonorrhée.

Parties génitales. — Éxhalaison fétide des parties génitales. — Inflammation et rougeur du gland. — Dartres sur le prepuce. — Desir du cost, avec pollutions fréquentes et douloureuses. — Regles en retard, peu abondantes et acres. — Pendant les règles, envie d'uriner, excoriation entre les cuisses, pincements dans le ventre et serrement comme par une griffe aux reins, et dans le

creux de l'estomac. - Leucorrhee muqueuse.

Larynx. — Toux violente, avec sensation d'ulceration chatouillante dans le gosier, ou par une âprete dans la gorge — Respiration courte et génée. — Forte dyspnée et étouffement, par une sensation de constriction dans la gorge, qui obligo a se débarrasser de tous les vetements qui couvrent le cou et la poitrine — Oppression crampoide de la poitrine — Respiration profonde, frequemment. — En respirant profondement, sensation comme s'il y avait an corps qui se fût arrêté dans le dos. — Haleine fétude — Pression à la poitrine, souvent avec haleine courte — Élancements dans les cotés de la poitrine, qui forcent souvent à se replier sur soi-même. — Battements de cœur. — Douleur tensive à l'exterieur de la poitrine, comme par raccourcissement, en se redressant. — Mamelons flétris, insensibles.

Trono. Douleur de brisement aux reins, surtout pendant qu'on se baisse et après — Fourpullement aux reins. Douleur tensive de puis les reins jusque sur les hanches, au moindre mouvement. Pression douloureuse et tension dans le dos et la nuque, avec l'une mation on moundre mouvement du trone on de la tête.





SASSAPARILLA. - SECALE CORNUTUM.

645

Lancinations entre les omoplates et dans les muscles du cou. — Gonflement d'un côté, douloureux au toucher.

Bras. — Déchirements et élancements pressifs dans les bras, les avant-bras et les articulations des mains et des doigts. — Sueur aux mains. — Dartres aux mains. — Engourdissement des doigts. — Douleur au bout des doigts, comme par ulcération souscutanée. — Vésicules purulentes aux doigts. — Rhagades pro-

fondes à la peau des doigts.

Jambes. — Déchirements pressifs et éluncements dans les cuisses. les genoux et les jambes. — Lassitude dans les cuisses et les articulations des genoux. — Gonflement et roideur des genoux, avec élancements. — Taches dartretutes rouges, aux mollets. — Roideur des jambes, comme par contraction. — Crampes dans les jambes et les mollets. — Sensibilité douloureuse de la plante des pieds. — Tension et gonflement des pieds, avec chaleur et rougeur. — *Froid aux pieds, aurtout avant de se coucher.


SECALE CORNUTUE.

SEC. Seigle ergoté, Ergot de seigle. — HARTLAGS et TRINES. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosp., p. 279. — Doses asistes : 3,30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines dans les affections chroniques.

Antibores : lamp. (solan-nigr.)
Compares avec : Ars. camph. ign. laur. verste.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Hémorrhagies, surtout chez les sujets faibles, cachectiques; Spasmes hystériques, chez des femmes d'une constitution faible; Convulsions par suite d'une frayeur; Gangrène sénile??; Amblyopie amaurotique; Hémorrhagie nasale; Souffrances des enfants, par suite de la dentition; Affections gastriques et bilieuses; Coliques; Gastrite??; Entérite??; Choléra asiatique et sporadique; Cholérine; Diarrhées, surtout chez les vieillards; Métrorrhagies des femmes faibles et cachectiques; Prodromes de l'avortement, surtout dans le troisième mois; Absence de douleurs d'enfantement; Douleurs d'enfantement spasmodiques; Adhérence du placenta; Lochies de trop longue durée; Métrite par suppression des lochies; Affections histériques, par manque de vitalité dans l'utérus?; Affection gangréneuse de la matrice, etc., etc.

Voy. la note, page 18.



SECALE CORNUTUM

ta | h

mellement dans les membres et les articulations. — Doulen crampoïdes, violentes et erratiques. — Sensation brûlante dat toutes les parties du corpa, comme par des étincelles. — Distonsion des membres. — Spasmes toxiques. — Tressaillements e moncements conculsifs dans les membres, se manifestant surton la nest, souvent aussi périodiquement, et soulagés en étirant vio lemment les parties. — Tétanos. — Attaques d'épilepsie. — Atrophie générale et amaigrissement. — Marche mal assurée. — Éva nouissements. — Grando lassitude et paresse. — Tremblement des membres. — Faiblesse, pesanteur et torpeur des membres. — Paralysies. — Mort de quelques parties par sphacèle.

Peau. — Peau blafarde, plombia, flétrie et ridée. — Peau rude, sèche. — Torpeur et insensibilité de la peau. — Eruption miliaire, surtout à la poitrine et à la nuque. — Fourmillement sous-cutané. — Desquamation générale de l'épiderme. — Pétéchies. — Furoncles. — Pustules noires, gangréneuses. — Vésicules san-

guinole**ntes, et qui pass**ent à la gangrène, aux membres.

Sommeil. — Forts envie de dormir et somnolence. — Sommeil profond, comateux. — l'Insomnie avec agitation et chaleur sèche. — Somnolence avec délire, sursauts et effroi.

Fièvre. — Frisson violent, suivi de chaleur brûlante, avec forte soif. — *Froid excessif dans le dos, le ventre et les membres. — •Chaleur sèche, avec pouls accéléré, agitation et insomnie. — •Pouls petit, supprimé. — *Sueurs froides.

Moral. — Découragement et caractère peureux. — *Tristesse et mélancolie. — *Forte angoisse. — Démence furieuse, avec désir de s'élancer dans l'eau. — Fureur et envie de mordre. — *Crainte de la mort. — Manie. — Faiblesse des facultés intellectuelles. — Aliénation mentale. — *Délires. — Perte de connaissance.

Tôte. — Tête embarrassée, étourdie. — Ivresse. — *Accès de vertiges de diverses natures, même opinitires. — Mai de tête, avec embarras sourd et douloureux, surtout à l'occiput. — Douleur de tête semi-latérale. — Chute des cheveux.


Yeux. — *Globe des yeux enfoncé. — Pupilles contractées spanmodiquement, ou bien dilatées. — Yeux convulsés. — Regard fixe, égaré. — Diplopie. — Brouillard, taches et voile devant la vue. — Faiblesse de la vue. — Scintillement devant les yeux et obscurcissement de la vue.

Oreilles et Meg. — Bourdonnement d'oreilles et dureté de l'ouie. — Surdité passagère. — *Épistaxis.

Face et Bents. — *Visage décoloré, pâle, jaune, have, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu. — Distorsion des traits du visage. — Taches livides à la face. — Fourmillement dans le visage. — Lèvres et bouche douloureusement contractées. — Trismus. — Grincement des dents. — Vacillement et chuis des dents.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche, avec soif. — Crachement de sang. — Écume à la bouche, sanguinolente ou vert





SECALE CORNUTUM.

jaunatre. — Langue décolorée, brune on noire, sou bien chargee d'un enduit épais. — Fourmillement douloureux dans la langue. — Gonfiement de la langue. — Parole bégayante, embarrassée, indistincte, faible. — Sécheresse de la langue. — Sensation brûlante, ou fourmillement pénible de la gorge. — (Inflammation

de l'œsophage.)

Estomac. — Goût émoussé. — *Soif ardente, inextinguible. — Faim insatiable, surtout pour les acides. — •Renvois fréquents. *Dégoût et nausées. — *Vomiturition et comissement de matières bilieuses, crues. — Vomissement facile. — •Vomissement des aliments, avec grande débilité. — Vomissement de lombrics. — Vomissement de mucosités. — Vomissement de bile noire. — Pression à Festomac. — Crampes d'estomac. — Sensibilité dou-loureuse excessive, oppression pénible et angoisse dans le creux de l'estomac, avec envie inutile de vomir. — Sensation brûlante dans le scrobicule et l'estomac. — Inflammation et cancer de l'estomac.

Ventre. — *Ventre excessivement ballonné et tendu. — *Tranchées et douleurs déchirantes dans le ventre. — *Douleurs fixes, brûlantes dans les régions splénique et lombaire. — *Coliques, avec maux de reins, douleurs dans les cuisses, rapports fréquents et vomissements. — *Coliques douloureuses, *arec conculsions. — Sensation d'un froid excessif dans le ventre et le dos. — *Sensation brûlante dans le ventre. — *Borborygmes.

Belles. — Constipation, avec besoin continuel et inutile d'aller à la selle. — Selles diarrhéiques, fréquentes, acec évacuations séreuses, muqueuses, ou bien décolorées, ou bleuâtres. — Diarrhée d'odeur putride. — *Diarrhées, avec *prostration subite des

forces. - Selles involontaires. - Expulsion de vers.


Urines. — Suppression de la sécrétion des urines. — Orines rares, chaudes, brûlantes. — Urine émise goutte à goutte; difficile, rare, avec besoin continuel. — Urine claire comme de l'eau, blanche. — Sécrétion d'urine augmentée. — Hémorrhagie

par l'urethre,

Règles. — *Règles trop abondantes et de trop longue durée, quelquesois avec spasmes violents.— *Métrorrhagies — d'un sang noir, liquide, coulant surtout pendant un mouvement un peu sort, quelquesois avec sourmillement dans les jambes et grande débilité. — *Arortement. — "Après l'avortement, manque de contraction de l'utérus. — "Gonssement et verrues au col de la matrice qui est béant. — *Congestion sanguine à l'utérus. — Lochies rares, sétides ou de trop longue durée et sanguinolentes. — *.tbaissement de la matrice. — *Instammation de la matrice.

Poitrine. — Voix ranque, creuse. — Respiration anxieuse et génée. avec soupirs et sanglots. — Dyspnée et oppression de poitrine. - Oppression de poitrine suffocante, avec crampe dans le diaphragme. — Battements de cœur spasmodiques, violents.





SECALE CORNUTUM. -- SELENIUM.

Trong. - Fourmillement et insensibilité dans le dos. - Boideur de la nuque. - Sensation de froid au dos. - Forte éruption

miliaire à la nuque *et à la poitrine.

648

Bras. — Courbure spasmodique du bras, avec tiraillement dans la partie. — Sensation brûlante dans les mains. — Gonflement des mains, avec pustules noires. — Gonflement cedémateux à l'articulation de la main. — Distorsion des mains. — Fourmillement dans le bout des doigts, avec torpeur et insensibilité de ces parties. — Contraction, distorsion et renversement des doigts. — Sphacèle des doigts.

Jambes. — Lassitude et endolorissement dans les jambes. — Contraction des jambes et des orteils. — *Crampes pénibles dans les mollets et la plante des pieds, surtout la nuit. — Sensation brúlante dans les pieds. — Distorsion des pieds. — Gonfiement des pieds, avec pustules noires. — Sphacèle des orteils. — Fourmil-

lement dans les orteils.

SELENIUM.

SEL. — Selenium. — Réausg. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop. — Dose unitée : 30. — Durée d'action : 5 à 6 semaines dans les affections chroniques


ARTIDOTES: Igu. puls. — Le vin. et le chin. apgravent les souffrances.
COMPARER AVEC: Carb. cinnab. graph. ign. lath. merc. nitr-ac. puls. rhus.
sulf. thui — C'est surtout après cinnab., que selen. est efficace, lorsqu'il
est d'ailleurs indiqué.

CTMPTOMES GENERAUX. — Douleurs dans tous les membres, comme par un refroidissement. — Amaigrissement excessif, surtout du visage, des mains et des jambes. — Le china produit des souffrances extraordinaires et aggrave celles déjà existantes d'une manière insupportable. — Grand désir d'être couché est e dormir, surtout pendant la chaleur du jour. — Aggravation des symptômes après avoir dormi. — Impossibilité de supporter le courant d'air. — Accès de vertige avec défaillance, sueur anxieuse, face pâle et décomposée, nausées et romissement, surtout après le déjeuner et le repas fait à midi, avec grande faiblesse, selles bilieuses, élancements dans la poitrine comme par des flatuosités incarcérées, tête douloureusement entreprise, hoquets et rapports fréquents.

Peau. — Fourmillement fréquent à des parties circonscrites de la peau, avec forte envie de gratter. — Éruptions miliaires. — Suintement prolongé des parties que l'on a grattées. — Ulcères

lisses. — • Eruption galeuse, à la suite de la rougeole.

Sommeil. — Envie de dormir; le soir, de bonne heure, avec som-



SELENIUM.

649

meil incomplet la nuit et réveil fréquent. — Sommeil tardif, le soir. — Tressaillement du corps en s'endormant. — Sommeil léger la nuit, avec réveil au moindre bruit. — Réveil de bon matin et toujours à la même heure. — Rèves de querelles et de eruautés contre nature. — Sommeil plein de rêves avec des comptes et des calculs. — Rêves de voyages.

Fièvre. — Ardeur brâlante à quelques parties assez étendues de la peau (de la poitrine, du ventre, des lombes et des côtés). — Chalcur et froid alternant constamment. — Tendance par trop excessive à transpirer, pendant la marche et la sieste. — Sueur qui fait des taches blanches dans le linge et le roidit (sur la poi-

trine et sous les aisselles).

Moral. — Révasseries religieuses et mélancoliques. — Grande loguacité. — Oubli excessif, surtout dans les affaires. — Incapa-

cité absolue d'exécuter un travail quelconque.

Tôte. — Fatigue de la tête, par un travail intellectuel. — Vertige à faire tomber, le soir, en allant en voiture. — Vertige en se levant. — Mal de tête toutes les après-midi. — *Maux de tête après* aroir bu de la limonade, du vin ou du thé. - Violente accès de maux de tête lancinants, au-dessus de l'œil, avec besoin de se concher, sensibilité de l'extérieur de la tête, émission d'urine abondante, absence d'appétit et mélancolie, provoqués par la marche et les odeurs fortes. — Chute des cheveux en se peignant. —Douleur au cuir chevelu, comme si on arrachait les cheveux. — Elançements au front, aux tempes et aux yeux, en passant de l'air froid à la chaleur de la chambre.

Yenz — Nes. — Douleurs dans la profondeur des orbites. — Vésicules pruriantes dans les sourcils et sur le bord des paupières. — Chute des sourcils. — Sécrétion plus abondante d'un cérumen qui se durcit dans l'oreille de laquelle on est sourd. — Prurit au nez, dans les narines et sur le bord des ailes du nez. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — Obturation du nez. — Coryza fluent le soir. -- Mucosités nasales, jaunes, épaisses, géla-

tineuses.

Pace — Gorgo. — Peau huileuse à la face, — Tressaillement des muscles d**u visage. — Lèv**re supérieure gercée. — Odon**talgie** qui force à se servir du cure-dents jusqu'à ce que le sang vienne. -Douleur dans une dent cariée, avec sensation de froid jusque dans la joue, s'aggravant le soir au lit, soulagée par l'air libre, l'eau froide, le boire, le manger et la fumée de tabac. — Térébration dans les dents molaires. — Les dents deviennent dures, lisses, et crient quand on les frotte. — Sécheresse de la gorge. — Espèce de bégayement, qui fait qu'on confond et qu'on déplace les syllabes des mots. — Douleur sous la racine de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc, épais, le matin. — Grande sécheresse de la gorge, surtout le soir.

Appétit. -- Goût douceatre, désgréable, après avoir funci. --য়া



SELENIUM.

Absence d'appétit, le matin. Faim la nuit. - Répugnance pour les choses salées. - Désir fréquent d'eau-de-vie. - Hoquet et renvois après avoir fumé. - Après le repas, battement des artères dans tout le corps, surtout dans le rentre. - Beaucoup de soif, le soir.

Ventre et Selles. - Douleur au foie, surtout en inspirant, s'étendant jusqu'à la région des reins, avec sensibilité à la pression extérieure. — Miliaire rouge, pruriante, à la région hépatique.

 Elancements violents dans la rate en marchant. — Constipation.—Selles dures, suivies d'éconlement de mucosités ou de sang.

Selles moitié liquides, avec ténesme. — Filaments, comme

des cheveux, dans la selle.

650


Urines. - Urine rare et de couleur foncée, ou d'odeur de violette. Urine rouge, le soir. - Émission involontaire de quelques gouttes, en marchant. Sédiment rouge, comme de l'argile, ou comme du gros sable, dans les urines. — Pissement fréquent, la

nuit. -- · Gonorrhée chronique.

Parties génitales. — Chatouillement et prurit aux parties génitales, surtout au scrotum. — Impuissance, avec idées lascives. - Pollutions, avec flaccidité de la verge. - Ecoulement de sperme goutte à goutte, pendant le sommeil. — Ecoulement de liqueur prostatique pendant et hors le temps des selles. -- Sperme séreux et sans odeur. — Pendant le coît, érection faible, lente, et éjaculation trop prompte. — Après le coît, faiblesse et mauvaise. humeur.

Larynn. — Enrouement, en commençant à chanter. — Renaclement de mucosités et de petits globules de sang. Toux matutinale qui fatigue toute la poitrine, avec expectoration de sang et de petits globules de mucosités. — Gêne de la respiration pendant la marche au grand air. — Besoin fréquent de respirer profondément, comme des soupirs. -- Etouffement de la respiration, la nuit, en étant couché, par des douleurs à la poitrine, dans le côté

et aux reins. Tronc et Extrémités. - Sensation de paralysie dans les reins. -Roideur des muscles du cou et de la nuque, qui ne permet pas de tourner la tête. Miliaire à l'avant-bras. — Déchirement nocturne dans les mains. — Prurit au poignet, dans la paume des mains, ainsi que sur et entre les doigts. — Boutons gâleux à la main. - Amaigrissement des mains. Boutons pruriants aux fesses et aux cuisses, près du scrotum. — Amaigrissement des jambes. --- Craquement des genoux en les pliant. -- Ulcères lisses aux jambes. - Prurit aux pieds, le soir, surtout autour des malléoles.



SENECIO AUREUS

651

SEEECTO AUREUS.

SENEC. - Voy. HALE, Remodes eméricains.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament a été employé, jusqu'ici. avec succès contre : Ascite, avec forte tension du ventre, douleur dans les régions des lombes et des ovaires, cedème des membres inférieurs, et urines rares et foncées, alternant quelquefois avec urines abondantes et aqueuses. — Dysménorrhée, avec règles trop hâtives ou trop abondantes, douleurs incisives dans les régions sacrale, hypogastrique et inguinale, face pale, état nerveux et toux nocturne. Suppression des règles, avec irritabilité nerveuse, insomnie, perte d'appétit, langue chargée, constipation, lassitude continuelle, horreur de tout mouvement et douleurs errantes dans le dos et les épaules. — Hémoptysie, à la suite d'un arrêt des règles, ainsi qu'après des évacuations sanguines. — Aménorrhées ; Dysménorrhée; Ménorrhagies; Leucorrhée; Chlorose; Lochies trop prolougées et trop abondantes. — Affections catarrhales de la tête, des yeux, du nez, des oreilles. — Insomnie chronique. — Hydro $oldsymbol{pisies}$; Urines supprimées ; grande irritabilité de la vessie ; $oldsymbol{D} y$ suriedes femmes et des enfants; Hématurie.

SYMPTOMES PRINCIPAUX. — Réves vifs, d'un caractère intellectuel; sommeil agité; réveil fréquent, la nuit; réveil tellement inaperçu qu'on ne sait pas si l'on vient de dormir ou non. — Chaleur dans le sinciput; mal de tête sourd, stupéfiant; plénitude désagréable dans la tête; élancements aigus, passant du dedans de la tête au dehors. — Vertige, plusieurs fois par jour, passant comme une vague de l'occiput vers le sinciput. — Elancements aigus dans les yeux, du dedans au dehors. — Sensation de plénitude dans les narines, sans sécrétion muqueuse; éternument, avec sensation de plénitude dans le nex, soulagé par un flux muqueux abondant. — Larmoiement au grand air. — Urines augmentées, aqueuses; urines fréquentes et abondantes; sécrétion de l'urine diminuée; urines rares et foncées; pissement de sang; ténesme de la vessie.



SENEGA.

บอัช

SENEGA.

SENEG. — Polygane de Virgime. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép Voy. Pharmac. homosop., p 281. — Dose usitée : 20. — Durée d'action : 5 semaines dans des affections chroniques.


Antidotes Arn. bell. bry. camph.
Comparen avec : Arn. ars. bar bell. bry. canth. euph. squill. stann. solf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Souffrances des membranes muqueuses; Affections des personnes pléthoriques avec laxite des fibres; Anasarque et hydropisie des organes internes?; Inflammations internes; Plaies par la morsure d'animaux vénimeux; Angines catarrhales et muqueuses?; Grippe; Laryngite chronique?; Phthisie laryngee?; Blennorrhee des poumons; Phthisie muqueuse?; Pneumonie?; Hydrothorax, etc. Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Sensation d'une grande lassitude générale, avec tremblement, surtout dans les membres inférieurs. Grand accablement moral et physique, avec pandiculation des membres, lourdeur, vacuité et battement dans la tête. --Grande faiblesse qui semble provenir de la poitrine. — Evanouie-*cment, en se promenant au grand air. — Plusieurs souffrances, surtout celles de la poitrine, s'aggravent par le repos et s'ameliorent par la marche au grand air. - - Forte envie de dormir le soir et sommeil profond, engourdissant, pen après qu'on s'est couche. - Sommeil agité par des affections de poitrine ou bien des crampes d'estomac vers le matin. — Frisson fréquent, provenant de lassitude dans les jambes. — Horripilation au dos, avec chaleur a la face, sensation brûlante dans les yeux, dyspnée, élancements dans la poitrine et battements dans la tête. --- Mélancolie hypocondriaque, avec grande susceptibilité aux offences.--.. Angousse excessire, souvent avec respiration accélérés et précipitée. — Gaieté *avec irritabilité et disposition à s'abandonner 🛦 des accès de colère et de fureur.

Tête. Tête entreprise, avec étourdissement. — Embarras et racuité dans la tête, avec pression dans les yeux. — Vertige, avec bruit dans les oreilles. — Maux de tête qui affectent en même temps, s'aggravent à la chaleur de l'appartement et sont soulagés au grand air ou au froid. — Céphalulgies pressires, dans le front et les orbites. - Traction dans le sinciput et les tempes,





SENEGA.

653

jusque dans la face. — Congestion de sang à la tête et aux yeux, en se baissant. — Céphalalgie pulsative, avec pression dans les yeux. — Horripilation au cuir chevelu et prurit. — Éruption à la tête.

Youx. - Douleur dans les yeux, comme s'ils se dilataient et qu'ils fussent poussés au dehors des orbites. - Pression dans les yeux, le soir, surtout aux lumières et en se baissant. - Congestion de sang aux yeux en se baissant. - Sensation brûlante dans les yeux, en lisant et en écrivant (le soir). - Gonflement des paupières, avec pression brûlante et fourmillement. - Sécheresse des yeux. - Larmoiement au grand air et en regardant fixement un objet. - Le matin, accumulation de chassie sèche aux paupières. - Tressaillement et traction spasmodique dans les paupières. - Paupières inférieures contractées convulsivement. - Fixité du regard. - Opacité de la cornée. - Amblyopie, avec lueurs devant les yeux, augmentée en les frottant. - Confusion des caractères et éblouissement, en lisant. - Tous les objets paraissent être dans l'ombre. - Taches brillantes devant la vue. - Photophobie.

Oreilles et Nes. — Pression dans les oreilles, pendant la mastication. — Sensibilité douloureuse de l'onie. — Prurit à l'intérieur du nez. — Odeur de pus dans le nez. — Éternument, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Sécheresse pénible du nez.


Pace et Dents. – Sensation de paralysie des muscles de la face. — Vésicules brûlantes aux commissures des lèrres et sur la lèvre supérieure. Dents agacées. — Fouillement dans les dents, en inspirant (l'air humide et froid).

Bouche. — Sécheresse de la bouche, surtout le matin. — Sécrétion de salire plus abondante. — Haleine putride. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Sensation brûlante sur la langue et au salais.

Gorge. — Mal à la gorge, comme si elle était excoriée et à vif. — Grattement, sensation brûlante et sécheresse dans la gorge, avec irritation qui provoque la toux et parole embarrassée. — Sensation de constriction du gosier. — Gonflement inflammatoire du palais et de la luette. — Accumulation abondante de mucosités risqueuses dans la gorge et au palais, se détachant en petits globules.

Appétit. — Goût moins sapide des aliments. — Goût métallique dans la bouche, ou comme celui de l'urine. — Goût pâteux dans la bouche. — Absence totale d'appétit, surtout le matin. — Faim rongeante, avec sensation de vacuite dans l'estomac. — Soit ardente.

Estomac. -- Renvois. — Dégoût et nausées, avec envie de vomir. qui semble proreuir de l'estomac, avec vomiturition. -- Vomissements, avec diarrhée et forte angoisse. — Crampe d'estomac, avec douleur pressive, même la unit. -- Sensation brûlante dans l'estomac. -- Sensation de vacuité dans l'estomac.



SENEGA.

տնվ

Ventre. — Maux de rentre arec douleurs térébrantes et fouillantes, surtout dans la partie supérieure du ventre et les hypocondres. — Rongement dans le bas-ventre. — Ardeur et serrement dans la partie supérieure du ventre, en inspirant. — Traction entre les téguments du rentre, comme par un corps étranger. — Affections flatulentes, avec sensation, comme si tout se portait vers le bas-ventre.

Selles. — Selles lentes, dures et rares, avec efforts, et suivies de pression à l'anus et au rectum. — Selles diarrhéiques, fréquentes et de la consistance de la bouillie.

Urines. - Sécrétion d'urine diminuée. — Sécrétion plus abondante d'urine. — Pissement au lit, la nuit. Urine écumeuse ou mêlée de filaments muqueux, et devenant trouble et nuageuse en se refroidissant. -- Sédiment rougeâtre dans les urines, avec floconmuqueux. — Sensation en urinant, comme si l'urèthre était obstruée. — Élancement et sensation brûlante dans l'urèthre après et pendant l'émission des urines.


Parties génitales. — Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections douloureuses. — Leucorrhée muqueuse.

Larynx. — Grande sécheresse du larynx, surtout le matin et avant midi. — Enrouement et apreté dans la gorge. — Chatouillement et sensation brûlante dans le larynx, surtout en étant couché, avec péril de suffocation. — Accumulation abondante de muco-sités dans le larynx et la trachée-artère, avec haleine courte. — Toux sèche et étambante, provoquée par un chatouillement dans le larynx, plus forte au grand air. — Expectoration de mucosités transparentes et jaunes, en toussant. — Toux arec expec-

toration abondante de mucosités visqueuses.

Poitrine. Dyspuée, avec sensation de stagnation dans les poumons. - Haleine courte, en marchant vite et en montant un escalier. — Oppression de poitrine, pénible, surtout au grand air, et en se baissant, comme si le thorax était trop étroit. Pression à la postrine, dans le repos surtout, et le matin ou 🖪 nuit, en se réveillant. — Grande sensibilité des parois internes de la poitrine, au toucher. - Serrement et douleurs crampoides dans la poitrine, avec agitation et anxiété, surtout quand on est couché sur le côté. — Elancements dans la poitrine, surtout en toussant et en inspirant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine, aggravée par la pression extérieure, le mouvement, en toussant et en éternuant. — Traction et sensation brûlante dans la postrine. - Fourmillement dans la poitrine. - Forte congestion de sang à la postrine, avec pulsation et bouillonnement an point de s'évanouir. — Battement de cœur violent, ébranlant. — Pression et térébration dans la région du cœur. — La plupart des souffrances de la poitrine sont plus fortes dans le repos, et ne génent pas la respiration.

Tronc et Extrémitée. — Pression et traction dans le dos et les



SENEGA. — SEPIA.

655

omoplates, ainsi qu'entre et sous les omoplates. — Sensation brûlante, et prurit sous-cutané dans tout le dos, - Traction paralytique dans les avant-bras, jusque dans les doigts. - Douleur de luxation dans l'articulation de la main. — Sensation de lassitude dans les jambes, avec sensation de paralysie dons les articulations. — Douleurs de luxation dans l'articulation coxo-fémorale. — Tremblement dans les jambes.

SEPIA.


SEP. — Le suc de sèche ordinaire ou sépia, eners de sèche. — HARMEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop. — Dose nsitée: 30. — Durée d'action : 7 à 8 semaines, dans des affections chroniques.

Autibores : Acetum, acon, nitr-sp. tart. - On l'emploie comme antidote de :

ANTIDOTES: Acesum. acon. unr-sp. tart. — the semplose comme antidote de: Cale-ph. chiu. merc. saesap.? sulf.

Compania avec : Acon. ambr. ant. ers. ber. bell. carb-v. caus. chim. chiu. coll. con. fer. graph. ign. led. tye- merc. juir. natr-m. nutr-ac. n-mos n-vem. petr. phos. phos ac. plumb. puls. Wood. rhus. sabad. sass. sil. sulf. tars. verstr. zinc. — C'out surtout après : Caus. led. merc. puls. sil. et sulf., que la sépia est effence, lorsqu'alle est d'ailleurs indiquée. — Après la sépia, convicament quelquefois : Carb-v. caus. puls.

CLITIQUE. — Se laimant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections du sexe féminin, et surtout des semmes d'une constitution faible, ayant la peau délicate et sensible; Affections des vaisseaux capillaires et du système nerveux; Affections à la suite d'une contrariété; Faiblesse physique et nerveuse par suite d'onsnisme; Affections scrofuleuses (et rachitiques?); Engorgement et infiammations des glandes; Tumeurs lymphatiques, inflammatoires; Affections rhumatismales, surtout chez les personnes d'une taille élancée; Extension des ligaments (après rhus); Eruptions et dartres chroniques; Gale; Taches livides des femmes enceintes ou nerveuses; Indurations squirrheuses; Verrues; Fièvres intermittentes; Manie; Hystérie; Céphalalgies nerveuses et hystériques; Migraine; Teigne; Ophthalmies scrofuleuses et autres; Amblyopie amaurotique; Hémorrhagie nasale; Croûte de lait; Stomacace et affection scorbutique des gencives?; Odontalgies, surtout chez les femmes hystériques ou enceintes; Disposition chronique aux angines; Dyspepsie. aigreurs, gastralgie et autres affections gastriques; Grosseur du rentre chez les femmes agées; Ascite; Diarrhées, aussi chez les sujets scrofuleux; Blennorthée du rectum?; Constipution chronique; Gonorrhée chronique; Pollutions par suite d'onanisme; Dysménie des jeunes filles ; Dyaménorrhée ; Métrorrhagie; Aménorrhée; Chlorose?; Fluenra blanches; Odontalgie, constipation on diarrhée, affections




gastriques, avec vomissement, taches jaunâtres à la peau, et autres souffrances des femmes enceintes; Disposition à l'avortement; Excoriation des mamelles; Écorchure des enfants; Toux de différentes espèces; Coqueluche?; Pneumonie?; Hémoptysie; Souffances phthisiques; Panaris, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Elancements et douleurs picotantes dans les membres et autres parties du corps. — *Douleurs brûlantes à diverses parties du corps. — *Tension dans les membres, comme s'ils étaient trop courts. — Traction et déchirement dans les membres et les articulations. — Douleurs qui sont soulagées par la chaleur extérieure. — Douleurs par accès, avec horripilation. — *Douleur de luxation, surtout par un effort de la partie affectée, ainsi que la nuit, à la chaleur du lit. --- *Douleurs rhumatismales, avec gonflement des parties affectées, sueur facilement excitée, frissonment ou frissons alternant avec chaleur. — *Fortes incommodités à la suite de contrariétés.—*Engourdissement facile des membres (bras et jambes), surtout après un travail manuel. — *Roideur et manque de flexibilité des articu-Luxations et entorses faciles, aux membres. — *Dispositions à se donner un tour de reins. — *Commotions et tressaillement dans les membres, nuit et jour. *Tressaillement dans les muscles. — Accès de malaise et spasmes hystériques. — Gonflement et suppuration des glandes.—Exacerbation et renouvellement de plusieurs souffrances, pendant et immédiatement Les symptômes se dissipent pendant tout après le repas. exercice violent, excepté celui du cheval, et sont aggravés pendant le repos, comme aussi *le soir*, la nuit, à la chaleur du lit (et avant midi). — Sensibilité douloureuse de tout le corps. — Traction dans tous les membres. — *Pandiculations fréquentes. — * *Inquiétudes et battement dans tous les membres, avec agitation qui ne permet de rester nulle part. — *Fort bouillonnement de sang même la nuit, avec pulsation dans tout le corps. — Gonfiement général du corps, avec haleine courte, sans soif.—Lourdeur et paresse physique. — Manque de solidité dans les membres.— *Accès de faiblesse et de défaillance hystériques ou autres. — Evanouissements. — *Lassitude avec tremblement.— *Manque de rigueur, quelquefois seulement au réveil. - *Prompte fatigue en se promenant au grand air. - Forte disposition à prendre des refroidissements, et sensibilité à l'air froid, surtout au vent du nord. — Après avoir été mouillé, frisson fébrile, accès d'évanouissement, et enauite coryza.

Peau. — Sensibilité excessive de la peau. — Prurit à diverses parties, qui se change en sensation brûlante. — Prurit et éruption boutonneuse dans les articulations. — *Exceriation surtout dans






les articulations. — *Éruptions comme la gale, sèches et pruriantes. — *Tuches brunes on vineuses, on bien rougeâtres et
dartreuses, à la peau. — *Banquamation en forme d'anneau
(dartres annulaires). — *Dartres humides, croûteuses, avec prurit
et sensation brûlante. — Furoncles. — *Glandes engorgées. —
*Indurations squirrheuses. — *Éruptions de vésicules, semblables
au pemphigus. — Ulcères pruriants, lancinants, brûlants, ou
quelquefois indolents. — Cors aux pieds, avec douleur lancinante.
— Difformité des ongles. — *Taches hépatiques. — *Hydropisse

des irrognes.

Semmeil. — *Forte envie de dormir le jour et le soir de trop bonne heure. — Accès de somnolence, réapparaissant en type tierce. — Semmeil tardif le soir. — Insomnie par surexcitation. — Réveil de trop bonne heure et veille prolongée. — *Réveil fréquent, sans cause appréciable. — *Sommeil agité avec fort bouillonnement de sang, jactation continuelle, réres fantastiques, anxieux, effrayants, et sursauts fréquents, avec effroi. — En dormant, on croit s'entendre appeler. — *Sommeil non réparateur; on n'a pas assez dormi le matin. — Rêves lascifs. — En dormant, paroles, cris et tressaillement des membres. — La nuit, divagations, angoisse, chaleur fébrile et agitation dans le corps, maux de dents, coliques, toux et beaucoup d'autres souf-frances.

Pièvre. Horripilations pendant les douleurs. — *Manque de chaleur vitale. — Frissonnement fréquent, surtout le soir, au grand air. — *Accès de chaleur (fugace), surtout en étant assis et en se promenant au grand air, comme aussi lorsqu'on se fache ou pendant une conversation importante. — Accès de chaleur (et de frissons) avec soif. — Chaleur continue, avec rougeur de la face et forte soif. — *Fièvre arec soif pendant les frissons, douleurs dans les membres, froid glacial des mains et des pieds, et doigts morts. — *Sucur pendant qu'on est assis. — *Sucur abondante au plus léger mourement. — *Sucurs nocturnes, quelquefois froides. — Sucurs matutinales, quelquefois d'odeur acide.

Moral. — *Tristesse et abattement avec pleurs. — *Mélancolie et morosité. — *Angoisse et inquiétude, quelquefois avec chaleur fugace, généralement le soir, et quelquefois au lit. — Grande inquiétude sur son état de santé. "Caractère rèveur. — *Forte disposition à s'effrayer. — *Découragement souvent au point d'être dégoûté de la vie. — *Indifférence pour touts chose et même pour les siens. — *Répugnance à s'occuper de ses affaires. — Caractère eusceptible, acariâtre, avec forte disposition à la colère et à l'emportement. — Humeur querelleuse et caustique. — *Faiblesse de la mémoire. Distraction. — Disposition à se tromper en parlant et en écrivant. — *Inaptitude aux travaux intellectuels. — Lenteur de la marche des idées.




658

Tôte. -- *Tête entreprise. - Accès de vertige, surtout en se promenant au grand air ou en écrivant, ou bien au moindre mouvement des bras. - Vertige, comme si tous les objets remnaient. on comme si quelque chose roulait dans la tête. — Vertige, le matin, en se levant, ou l'après-midi. — *Accès de maux de tête, arec nausées, romissement, et douleurs lancinantes ou térébrantes qui forcent à crier. — *Maux de tins, tous les matins. — *Maux de tête, qui ne permettent pas d'ouvrir les yeux. — Maux de tête, avec désir excessif du coît. - Céphalalgie en secouant ou en remuant la tête, comme aussi à chaque pas que l'on fait, comme si le cerveau était ébranlé. - Douleurs de tête semi-latérales, quelquefois le soir, après le coucher, précédées de pesanteur de la tête. — *Pesanteur de la tête. — *Céphalalgie pressive audessus des yeux, à la clarté du jour. - *Pression empansire dans la tête, quelquefois en se baissant, comme si elle allait éclater. - Contraction dans la tête. - *Traction et déchirement dans la tête et à la tête, quelquefois d'un seul côté. — Céphalalgie lancimante, souvent semi-latérale ou frontale. - *Tressaillement et seconsses dans la tête. — *Céphalalgie battante, surtout dans l'occiput. -- *Forte congention de sang à la tête, avec chaleur, surtout en se baissant. — Froid à l'extérieur de la tête. — *Tremblement involontaire, et secousse de la tête. — Mobilité du cuir chevelu. — *Prurit à la tête. — *Croûtes humides à la tête. — Chute des cheveux. — Gonflement de la tête, surtout du front.

Tenz. - Pesanteur et affaissement de la paupière supérieure. -*Pression sur le globe des yeux. - Prurit et cuisson dans les yeux et les paupières. — Picotement dans les yeux, le soir, aux lumières. — Sensation brûlante dans les yeux, surtout le matin. Inflammation des yeux, avec rougeur de la sclérotique et élancements. — Inflammation, rougeur et gonflement des paupières, avec orgelets. — Pustules à la cornée. - *Gonflement des yeur, surtout le matin, au réveil. - Croûtes dans les sourcils. — Yeux vitreux, noyés, le soir. — Fongus hématoïde à la cornée. — Croûtes sèches aux paupières, surtout le matin au réveil. - Couleur jaune de la sclérotique. - Larmoiement, surtout le matin, ou *agglutination nocturne des paupières. — Frémissement et tressaillement des paupières. --- Paralysie des paupières et *impossibilité de les ouvrir, surtout la nuit. -Vue trouble, en lisant et en écrivant. — Presbyopie. — Paiblesse de la vue, comme par amaurose, avec pupilles contractées. Voile, *taches noires, points et traces lumineuses devant la vue. - Reflet vert autour de la lumière, le soir. - Grande susceptibilité des yeux à la clarté du jour.

Oreilles. — Otalgie. Elancement dans les oreilles. — Douleur d'excoriation dans l'oreille. — Gonflement et éruption purulente à l'oreille extérieure. — Dartres au lobe de l'oreille. — *Écoule-



SEPIA.

659

ment d'un pus liquide par l'oreille, avec prurit. — "Sensibilité excessire de l'ouïe à la musique. — "Dureté de l'ouïe. — Surdité subite, comme par un tampon dans les oreilles. — Bruissement et bourdonnement derant les oreilles. — "Dartres derrière les

oreilles et à la nuque.

Men. — *Gonflement et inflammation du nez, surtout du bout. —


— Croûte sur le bout du nez. — Narines croûteuses, ulcérées. .

Mucosités durcies dans le nez. — Épistaxis, et mouchement fréquent de sang, *même après lespius léger échanflement, ou la plus légère contusion au nez. — *Absence d'odorat. — *Odeur fétide dans le nez. — *Obturation ou sécheresse pénible du nez. — Coryza sec. — Mucosités sèches qui obstruent le nez. — Violent coryza fluent, avec éternument, douleur dans l'occiput et traction dans les membres.

Pace. -- Pâleur de la face, avec cercles bleus autour des yeux, qui sont rouges et ternes. — *Couleur jaune de la face. - Face amaigrie. — *Trace jaune à cheval sur le nes et les joues. — - Forte chalcur à la face. - Bouffissure pâle de la face. - o'Inflammation érysipélateuse et gonflement d'un côté de la face (proven**ant d'une dent cariée**). — Gonflement inflammatoire de la face, avec boutons rapprochés à croûte jaune. -- *Dartres et croûtes à la face, - «Verrues à la face. — Pores noirs à la face. — Prurit et éruption à la face et sur le front; quelquefois comme rougeur et rudesse de la peau. - Tumeurs au front. - Douleurs faciales, tractives. - Douleur crampoïde et déchirement dans les os de la face. — *Prosopalgie dans la région sus-orbitaire, comme des coups électriques, plus forte dans la forte chaleur de l'été. — Sécheresse et exfoliation des lèvres. — Tension de la lèvre inférieure. — *Couleur jaune et éruption dartreuse autour de la bouche. — Eruptions humides et croûteuses sur la partie rouge des lèvres et au menton. — Ulcère douloureux à la face interne des lèvres. — Engorgement et sensibilité douloureuse des glandes sons-maxillaires.

Dents. — Odontalgie en serrant les dents ou en y touchant, et en parlant, comme aussi par le plus léger courant d'air froid. — Odontalgie nocturne, avec forte surexcitation. — *Odontalgie pulsative on lancinante, ou bien tractire, s'étendant quelquesois jusque dans l'oreille, ou dans les bras et les doigts. — •Manx de dents avec géne de la respiration, fluxion à la joue, engorgement des glandes sous-maxillaires, et toux, ou bien tvec fort bouillonnement de sang et pulsation dans tout le corps. — Seconsses déchirantes dans les dents. — Émoussement, vacillement, saignement facile et carie de dents. — *Gonflement, excoriation, ulcération et saignement facile des gencives.

Bouche. — Haleine fétide. — Gonflement de l'intérieur de la bouche. — *Sécheresse de la bouche et de la langue. — Salivation salée. — Douleur de la langue et du palais, comme s'ils étaient.



660

brûlés. — Excoriation de la langue. — Vésicules sur la langue. - *Langue chargée d'un enduit blanc.

Gorge. - Mal de gorge avec gonfiement des glandes du cou. -Sensation pressive, comme s'il y avait un tampon dans la gorge,
ou *douleur d'excoriation et éluncements pendant la déglutition. -*Tressaillement dans la gorge. - Gonfiement et inflammation du
gosier. - Inflammation, gonfiement et suppuration des amygdales. - Sécheresse dans la gorge, avec tension et grattement. -oGorge commo pâteuse. - Accumulation de mucosités dans la
gorge et au voile du palais. -- *Renáclement des mucosités, surtout le matin. - Expulsion de mucosités sanguinolentes, en
renâclant.

Appétit. — Goût putride ou aigre. Goût trop salé des aliments.

*Adipsie, ou soif excessive, surtout le matin et le soir, quelquefois avec anorexie. *Grande voracité. — *Boulimie, avec sensation de vacuité dans l'estomac. — Désir ardent de vin. — *Répugnance et dégoût pour les aliments, surtout pour la viande et ele lait, qui donne la diarrhée. — La fumée de tabac ne convient pas.— Après des aliments gras, renvois désagréables avec nausées. — *Faiblesse de la digestion. — *Après le repas, aigreurs dans la bouche, renvois fréquents, grattement et sensation brûlante dans la gorge, pulsation dans le scrobicule, hoquet, ballonnement du rentre, sueur, chaleur fébrile, battement de cœur, céphalalgie, nausées, vomissements, douleurs

d'estomae, etc. Estomac. *Renvois fréquents, généralement aigres ou amers ou bien comme des œufs pourris, ou avec le goût des aliments. - Renrois douloureux, pendant lesquels il vient du sang dans la bouche. — Aigreurs avec dégoût de la vie. — Nausées, quelquefois le matin à jeun, soulagées en mangeant quelques bouchées. — Nausées, avec goût amer et renvois. — Nausées par le mouvement de la voiture. - Nausées et vomissement après le repas. - *Vomissement de bile et d'aliments. - *Maux d'estomac après le repas, quelquefois le soir. — Douleur violente au cardia, en ingérant des aliments. — Douleur dans le scrobicule en marchant. - *Pression dans l'estomac, comme par une pierre. surtout pendant ou après le repas, ou bien la nuit. — Crampe d'estomac contractive. * Pituites de l'estomac, esurtout après avoir bu, ou précédées d'une sensation de tournoiement dans Tomissement de sérosités laiteuses (chez les femmes Festomac. — 1 enceintes). - Vonsissement nocturne avec mal à la tête. -Crampes d'estomac et de poitrine. — Térébration déchirante dans la région stomacale, jusque dans les reins. — *Elancements pressifs dans le scrobicule et la région de l'estomac. - * Sensation brûftinte dans l'estomac et le scrobicule. — Battement dans le creux de l'estomac. — Sensation de vacuité douloureuse dans Pestomac.



Ventre. - Douleurs au foie, en etant en voiture. - Pression, battement et élancements dans la région hepatique. Térébration, ou elancements tensifs dans les hypocondres, surtout pendant le mouvement. Elancement lans l'hyperondre gauche. - Maux de ventre, le matin, au lit *Pression et pesanteur dans le rentre, avec sensation d'expansion, comme -'il allait eclater. Fort ballonnement du ventre. Pesanteur et *dureté dans le bas-ventre. Cirosseur du centre (chez les femmes qui ont en des enfants) - *(fonflement hydropique du ventre. Crampes abdominales, avec douleur de griffement, comme si les intestins etaient tordus. - *Colques meisires surtout apres un everence corporel, ou la nuit, avec envie d'aller a la selle. *Fouillement, tranche-s et pression dans le bas-centre. -* Donleur de meurtrissure dans les intestins, - Froid dans le ventre. *Sensation brulante et élancements dans le ventre, surtout du

cote gauche et quelquefeis jusqu'à la cuisse. Sensation de vacuite dans le ventre. Laucinations dans les aines - Taches brunatres au ventre. - * Mouvements et borborggmes dans le rentre, surtout apres le repas. Production abondante et incarceration de flatuosites,

Bollos. * *Enrie sans resultat d'aller à la selle, ou sculement avec évacuation de mucosites et de vents - *Evacuations inauffisantes, lentes et comme d'« crottes de mouton. Evacuations pen abondantes, avec efforts et tenesmes. - *Selles trop molles. Selles gelatineuses, avec tran hées. * Diarrhees debilitantes.

-* Duarrhees rerdatres, souvent avec oil ur patride ou sigre, on surtout chez les enfants *Pendant la selle, ecoulement de sang.

Douleur contractive et tension, prurit, feurmillement, sensation brûlante et él incements à l'anus et dans le rectum - Saintement par le rectum. Ecoulement muqueux par le rectum, avec douleurs lancinantes et dechirantes. *Chute du rectum, surtout pendant la selle. Congestion de sang a l'anus *Sortiedes la utous hemorrhoidaux du rectum Hemorrhoides fluentes - Excornation entre les fesses. - Douleur contractive au pé-

Ti Bess


Urinea Besoin fréquent et impossibilité d'uriner. *Pression sur la ressie *Emissi in d'urine la nuit. *Pessement au let, dans le premier sommell - *Urme foncee, d'un rouge de sang.

*Urme trouble, avec selament rouge, sablonneux ou briqueté, Urine fetisle, avec sediment blanc, abondant. - Urine qui depose du sang. Crampe de la vessie - Sensation brulante dans la vessie et l'urethre *Cuisson dans l'urethre, surtout en urinant Douleurs incisives et elancements dans l'urethre.

"Ecoulement muqueux par l'urethre, comme une genorrhée

chronique,

Parties genitales. "Sueur abondante des parties génitales et surtout des testicules *Prunt autour des parties cenitales. -



362


Éruption pruriante au gland et au prépuce. — *Gonorrhée bâtarde, d'odeur acide, salée. — Ulcères au gland et au prépuce.— *Douleurs dans les testicules.— Gonflement du scrotum. — *Faihlesse des parties génitales. — Exaltation de l'appétit rénérien. avec érections fréquentes. — *Pollutions fréquentes. — Écoulelement de liqueur prostatique après avoir uriné et pendant une selle difficile. — Après le coît et les pollutions, fatigue intellec-

tuelle, morale et physique.

Région. — *Excorration à la vulve et entre les enisses, quelquefois avant les règles.—•Chaleur intérieure et extérieure aux parties génitales. — Douleur contractive dans le vagin. — *Gonflement et éruption pruriante, humide, aux petites lèvres. — Pression
vers le bas, dans la matrice, gênant la respiration. — •Chute de
la matrice. —•Métrorrhagies. —•Règles trop abondantes. —•Induration du col de la matrice. •Règles supprimées. •on trop
faibles, *on trop hâtives. — Avant les règles coliques. — Pendant
les règles, mélancolie, odontalgie, céphalalgie, *et conrbature
dans les membres, on coliques spasmodiques et pression vers les
parties. — Stérilité. — *Leucorrhée d'une can jaune on ronge
verdâtre, *on purulante, fétide, *quelquefois avec ballonnement
du ventre, on élancements dans le vagin. — *Leucorrhée pruriante, corrosive. — Élancements dans les mamelles. — •Excoriation des mamelons. — *Écorchure des enfants.

Laryax. — Enrouement avec coryza. — Sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — Toux proroquée par un chatouillement dans le larynx ou la poitrine. — * Toux sèche, qui semble venir de l'estomac, surtout le soir, au lit, et souvent avec nansées et comissement omer. — Toux grasse, après un refroidissement. — Toux des femmes enceintes.—*Toux, avec expectoration abondante de mucosités généralement putrides, ou de goût salé, souvent seulement le matin ou le soir, et fréquemment accompagnée de bruit, de faiblesse, et de douleur d'excoriation dans la poitrine, comme si elle était à vif. - *Toux nocturne, avec cris, suffocation et vomiturition. — "Toux semblable à la coqueluche. — "Toux provoquée par un chatouillement, et accompagnée de constipation. - *Expectoration qui se détache difficilement. - Expectoration jaune, verdatre, purulente, en toussant. - Expectoration en toussant, le matin et le soir, avec expectoration de mucosités le jour. — Pendant la toux, lancinations dans la poitrine ou le dos.

Poitrine. — *Dyspnée, oppression de poitrine, et haleine courte en marchant et en montant, ainsi qu'en étant couché au lit, le soir et la nuit. — *En respirant et en toussant, douleur dans les côtés de la poitrine. — *Oppression de poitrine, produite par accumulation de mucosités, ou par une expectoration trop abondante. — *Douleur de poitrine par le mouvement. — *Pression dans la poitrine, surtout le soir, au lit. — Pesanteur. plénitude



et tension dans la poitrine. - Douleur d'exerciation dans la poitrine. - Crampes de poitrine "Eloucements et picotements dans la postrine et les cutes de la postrine, en respirant et en toussant, ainsi que par un travail de tête, *Bondlonnement de sang duns la poutrine et battements de cœur riolents . Intermittence des battements du cour. *Taches brunâtres sur la

poitrine.

*Douleurs aux reins et dans le dos, avec déchirement brulant. Battement aux reins. - Faiblesse aux teins, en marchant. *Douleurs incisives, pression, fourmillement et dechercments erampoides dans le don *Hoideur du dos et de la nuque. - Frissonnement dans le dos - Taches brunâtres sur le dos. -Taches rougeatres, dartreuses, au-dessus de la banche et aux deux côtés du cou. - Emption pruriante au dos Dartres à la nuque et derrière les oreilles. Taches vineuses au cou et sous le menton. Furoncle au cou. *Sueur sous les ausselles, d'une forte odeur. Gonflement et suppuration des glandes axillaires.

- Dartre humide sous l'aisselle.

*Pouleur de luxation dans l'articulation de l'epaule, surtout en soulevant ou en tenant un objet. - Lassitude dans le bras. - Sensation de roideur et de froid dans le bras, comme s'il etait paralyse - *Douleur de traction paralutique dans le bras et l'articulation de l'épaule, jusque dans les doigts Eluncement dans les bras et l'articulation de la main, en fitigant ou en remuant ces parties. *Tens on douloureuse dans les bras, et les articulations du coude et des doigts, comme par raccourcisse-Gonflement inflammaterre rouge fence, dur, marbre, nu milieu du bras. Pustules aux bras, avec prunt violent. *Roideur des articulations du conde et des mains. Taches branatres, peau dartreuse et croûtes pruruntes au coude. *Vesicules purulentes sur le dos de la main et au bout des dorgts. - Dartres sur le dos des mains, refronflement de la main avec éruption de vésicules, semblable au pemphigus. — «Elancement» dans le poignet en remuant la main. "Thaleur ardente dans la paume des mains Sueur froide aux mains - office maligne et croûtes aux mains - Traction arthritique et eluncements dans les articulations des doigts. Distorsion des doigts. of learns indolores dans les acticulations et au bout des dorgts. Verrues aux mains. - Envies aux doigts — Ongles difformes. *Panaris avec douleurs pulsatives et lancinantes.

Jambes. *I) uleurs dans les hanches, avec élancements déchirants. Douleur dans l'es fesses et les cuisses après avoir éte assis. · · · Faiblesse paralytique des jumbes surtout après s'être mis en colere - Rondeur des jumbes, jusque dans l'articulation cox-fémorale, après avoir été asus un peu de temps, - *Froid aux jambes et aux pieds. Gonflement des jambes et des pieds. - Crampos dans les cuisses, en marchant. - Lancinations



SEPIA. - SILICEA

tal) 🖁 🖷

déchirantes ou saccadées dans les cuisses et le tibia, au point de faire erier. — Furoncles a la cuisse et dans les jarrets. — Traction et élancements déchirants dans les genoux, les jambes et les talons. Gonflement douloureux du genou. — Roideur des articulations du genou et du pied. — *Crampes aux mollets, quelquefois la nuit. — Inquiétudes dans les jambes, le soir. — Boutons pruriants sur les jambes et le cou-de-pied. - Douleur tractive dans les jambes et les gros orteils. - Elancements au tibia et au cou-de-pied. Sensation dans les jambes, comme si une souris y courait. — *Tressaillement des pieds en dormant. — Ulcères sur le cou-de-pied. — Roideur dans les talons et les articulations du pied, comme par raccourcissement. — *Picotement et sensation brûlante dans les pieds. - Fourmillement et engourdissement de la plante des pieds. — Obieur aux pieds. abondante et fétide, ou bien supprimée. - OUlcères au talon, provenant de vesicules rongeantes. — "Ulcères indolents, aux articulations et au bout des orieile. - *Cors anz pieds, avec douleur lancinante.-— «Difformité des ongles des orteils.


SILICEA,

SIL. — Silice. — HARNEMANN. Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p 448. — Dose unitée : 30. — Durée d'action : 7 à 8 semaines, dans des affections chroniques.

Antidotes . Campli, hep. - On l'emploie comme antidote de : Merc. suff.

(psorinum.)
COMPARER AVEC: Alum. smm bar c. bell calc, carb-an. carb-v. chin, cin. cycl. graph. kep. kal. lach. lyc. magn. merc natr. petrol. phos. puls. ran. rhod rhus sass. sep. spig. sulf. veratr. — C'est surtout après : Calc. kep. lyc. sulf que silic est efficace, lor:qu'il est d'ailleura indiqué. — Après silic. conviennent quelquefois : Hep. lach. lyc. sep.

CLINIQUE. — Se laiseant guider par l'ensemble des symptômes on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Souffrances hystériques; Faiblesse physique chez les enfants, avec difficulté d'apprendre à marcher; Paralysies; Épilepsie; Surexcitation nerveuse avec insomnie; Affections rhumatismales et arthritiques, chroniques; Inflammations flegmoneuses; Tumeurs lymphatiques; Affections scrofuleuses et rachitiques, même avec tête grosse, et fontanelles tardives à s'ossifier; Engorgement, inflammation, induration et ulcération des glandes; Inflammation, ramollissement, ulcérations et autres maladies des os; Abcès; Indurations aquirrheuses; Ulcères presque de toutes natures, surtout ches les personnes malpropres, cachectiques et adonnées aux boissons spiritueuses; Ulcères



665


acrofuleux, mercuriels et scorbutiques; Ulcères curcinomateux; Hydrarthre?; Hystérie; Vertiges; Migraine; Teigne; Chute des cheveux à la suite de fortes maladies aiguês; Fongus hématode dans l'œil; Maères de la cornée; Cataracte; Amblyopie amaurotique; Dureté de l'oule; Cancer aux lèvres; Fièvre de dentition; Boulimie, pituites de l'estomac, gastralgie, dyspepsie et autres affections gastriques; Abcès hépatiques; Affections vermineuses, surtout chez les sujets acrofuleux; Gonorrhée chronique; Hydrocèle, surtout chez les sujets acrofuleux; Excoriation des mamelons; Ulcération et même affection carcinomateuse des mamelles; Coryza chronique et disposition opinidire à des rhumes de cerveau; Souffrances phthisiques, surtout chez les sculpteurs; Gonfiement inflammatoire du genou; Panaris; Paralysie des mains, aussi chez les lépreux, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - *Traction, dechirement et élancement dans les membres (bras et jambes). — • Elancements nocturnes dans toutes les articulations. — *Disposition des membres à s'engourdir. — *Douleur de brisement et faibleme paralytique dans les membres, surtout_le soir. — *Disposition à se donner des tours de reins. — *Crampes dans les bras et les jambes. — *Gonflement et induration des glandes, généralement sans douleur, seulement quelquefois avec prurit pénible. — *Tressaillement des membres, jour et nuit. — Craquement douloureux ou pétillement des tendons ches les ouvriers equipés de travaux lourds et fatigants. - *Attaques d'épilepsis. - Pluneum affections et douleurs s'aggravent on se manifestent la nuit et le soir, comme sumi pendant le mouvement. — *Aggraration des symptômes à la nouvelle ou 🔌 la pleine lune. -- Douleurs aux changements de temps. — Inquiétudes dans tout le corps, aprèt avoir été longtemps assis. — Bouillonnement de sang et soif après avoir bu peu de vin. — Amaigrissement excessif. — Enfants tardife à marcher. — Marche nonchalante, maladroite. — Faiblesse des articulations; elles fléchissent. — •Lassitude et tremblement dans les membres, surtout le matin. — *Inertie générale et grande faiblesse nerreuse. — Evanouissement en se couchant sur le côté. — Grande fatigue, lassitude et envie de dormir, à l'approche d'un orage. - *Grande disposition à prendre des refroidissements, même seulement en se découvrant les pieds.

Pean. — Sensibilité douloureuse de la peau. — *Prarit sur topt le

Pean. — Sensibilité douloureuse de la peau. — *Prurit sur tout le corps, souvent formicant ou lancinant. — Éruption comme des varicelles sur tout le corps. — Taches tubéreuses, rosées, à la peau. — *Tumeurs et abcès lymphatiques, même avec ulcères fistuleux. — Engorgement et induration des glandes. — Inflammation, ramollissement et ulcération des on. — Indurations squirrheuses. — *Ulcères fistuleux, putrides, phagédéniques, fou-



SILECEA.

table

gueux, etc., avec végétations ou sanie fetide et rongeante. Suppurations bénignes et malignes, surtout dans les parties membraneuses. -- Peau maladive; toute lésion tend à s'ulcérer. -- *('ancer de la peau. -- *Pression, prurit, cuisson, et élancements térébrants dans les ulcères. -- Furoncles. -- *Charbons de nature maligne. -- *Ganglions. -- Verrues. -- *Panaris. -- *Loupes suppurantes.

Sommeil. - *Sommeil excessif, sans que l'on puisse s'endormir.

- *Baillements frequents. — Sommeil le soir, de bonne heure.


- *Sommeil tardif. — *Sommeil trop léger la nuit, comme si ou n'était qu'assonpi. - *Insommie, causée surtout par bouillonnement de sang, chuleur à la tête, et grande affluence d'idées. - *Visions effrayantes, la nuit, et affluence de rêces anxieux et fantastiques, avec pleurs, paroles, cris et *réveils fréquents en sursaut. - *Tressaillement du corps, pendant le sommeil. - Rêves laseifs. — *Ronflement en dormant. -- Cauchemar. Somnambulisme. - Rêves de brigands, d'assassins, de chiens, de voyages, de spectres, etc. - *La nuit, congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives et battement au cerveau, douleur d'estomac, nausées et vomissement ou élancements dans toutes les articulations, sécheresse du nez, et beaucoup d'autres souf-frances.

Fièvre. — *Forte disposition frileuse et horripilation avec frissons fréquents, même au plus léger mouvement. — Chaleur fréquente, quelquefois fugace. — Fièrre arec forte chaleur, généralement sans frisson et avec sueur peu abondante, ordinairement depuis 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. — *Sueur pendant une marche modérée. — *Sueur abondante la nuit, equelquefois

d'odeur acide. - Sueur débilitante le matin.

Moral. — Humeur mélancolique et envie de pleurer. — Nostalgie. — *Anxiété et agitation. — Humeur taciturne : on est concentré en soi-même. — *Inquiétude et mauvaise humeur pour la moindre chose, oprovenant de grande faiblesse nerveuse. — Scrupules de conscience. — *Cirande disposition à s'effrayer, surtout au bruit. — *Découragement. *Morosité, mauvaise humeur, et désespoir avec dégoût profond de la vie. — *Disposition à se fâcher, opiniâtreté et grande irritabilité. — oRépugnance pour le travail. — oApathie et absence d'intérêt. — *Faiblesse de la mémoire. — *Incapacité de réfléchir. — Grande distraction. — Disposition à se tromper en parlant. — •Idées fixes; on ne songe qu'à des épingles, on les craint, les cherche, et les compte partout.

Tôte. — *Obnubilation. — *Fatigue de la tête par un travail intellectuel (lire, écrire ou réfléchir).—*Étourdissement, surtout le soir, comme si on était ivre. — *Vertiges de diverses natures, surtout le matin, et principalement en levant les yeur, ou en étant en voiture, ainsi qu'en se baissant ou après des émotions morales. — Vertiges avec nausées et vomiturition, ou bien qui



4411

montent du dos dans la nuque et à la tete. *Vertise a tomber à la renverse - * Douleur qui remonte depuis la angue jusque dans le vertex, queiquefois empéchant de dorrair la soit ... °Céphalalgie en s'echauffant - Cephalalgie avec frison, lassitude et besoin de se coucher. - *Maux de tête tous les matens -Pression dans la tête, avec mauvaise humeur, et pesanteur dans tous les membres, quelquefois le matm. - *Pesanteur de la tête : il semble que le front va eclater, quelquefois tous les jours. depuis le matin jusqu'au soir *Tension et pression dans la tête, comme si elle allait selater — Tiraill ments dans la tête, qui semblent sortir par le front. *Douleurs dechirantes dans la tête, escuvent semi-lateral s, avec clancements qui semblent sortir par les yeux et s'étendent jusque dans les es de la face, aux dents, cu qui se manifestent tens les matins avec *choleer à la tête, principalement dans le front. L'anconations dans la tête, surfaut dans les tempes. *Cephalulgie battante, generalment par congestion de song a la tête. Sociasses doulous uses dans la tôte. Mouvements et tournoiement dans la tôte, comme si tout y etait vivant - Ebraulement et re-nuement dans le cerveau, a chaque pas que l'in fait ... Les maux de tête sont aggravés principalement par le travail intellectuel, par la parole et en re bassant. — Après les douleurs de tete, obsenreissement de la vue. Sensibilité douloureuse de l'exterieur le la tête au moindre contact. Sueur à la tête le soir. - Elevations tubereuses au cuir chevelu. Fort prurit au cuir chevelu. Teigne humide. *pruriteuse. - Chute des cheveux.

Yenx. Douleurs dans les yeux, le matin, comme provenant d'une trep grande sécheresse ou de sable qui s'y serait introduit. Pression et cuissen dans les yenx et les paupières. - Elancements qui semblent sortir par les yeux. *Prurit, cuisson et ardeur dans les yeur *Hougeur des yeur, avec douleur cuisante dans les angles - *Inflammation des veux - Gonflement de la glande lacromale Pistule lacrymale, Larmonement, surtout en plem air. * Agglutination des paupieres, la unit. * Fongus, hématode et ulcères de la cornec. Taches et cicatrices sur la cornec Fremissement des yeux. Occlusion spasmodique des paupieres, Presbyopie *Les caractères se confondent, en lisant. – Les objets semblent être pâles, en lisant – *Vue trouble comme à travers un voile grisatre. **Acces momentané de cécité subite. — Obscurcissement du cristallin — Obscurcissement de la vue, comme par une amaurose - Etincelleet *tacher norres derant la rue - *Photophobie et éblouisse-

ments à la clarte du jour.

Oreilles. Otalgie, avec d'uleur tractive. Térébration et *battément dans les oreilles. *Elancements qui semblent sortir par les oreilles. Prunt aux oreilles. - Inflammation et suintement du bord des oreilles. Croûtes derrière les oreilles. Gonfle-



ment de l'extérieur de l'oroille, avec écoulement par l'oreille, accompagné d'une sorte de sifflement. — Accumulation abondante d'un cérumen humide. — Sensibilité excessive de l'oreille, au bruit. — *Obturation des oreilles, equi se dissipe quelquefois en se mouchant ou bien arec une détonation. — *Dureté de l'ouie, quelquefois sans bruit dans les oreilles, ou bien exclusivement pour la voix humaine. — Dureté de l'ouie, augmentée à la pleine lune. — Tintement, gloussement et bruit, comme si un oiseau battait des ailes dans les oreilles. — Carie de l'apophyse mastoide. — *Gonflement et induration des parotides.

Hes. — Os du nez, douloureux au toucher. — Douleurs rongeantes dans le hant du nez, avec pesanteur en se baissant et sensibilité excessive à la pression. — Douleur pulsative d'ulcération, dans le nez et jusque dans la tête. — *Inflammation dans les narines. — *Prurit et rougeur du nez (au bout), qui est couvert de vésicules croûteuses. — Furoncles au nez. — *Croûtes, boutons et ulcères dans le nez. — *Épistaxis. — oAbsence d'odorat. — oÉternuments avortés, interrompus. — *Éternument par trop fréquent, immodéré. — *Obturation du nez, opiniatre, oquelquefois par des mucosités.—oSécheresse pénible du nez, quelquefois la nuit. — *Coryza sec. — *Coryza continuel. — *Coryza fluent, fréquemment, oou qui enlève une obturation opiniatre du nez. — Mucosités nasales, acres et corrosives.

Pace — Face pâle, terreuse. — Taches blanches sur les joues, de temps à autre. — Taches rouges, brûlantes, sur les joues et le nez, surtout après le repas. — Chaleur à la face. — Elancements dans les os de la face. — Prurit dans les favoris. — Furoncle sur la joue. — Gerçures et rhagades à la peau du visage. — Induration squirrheuse au visage et à la lèvre supérieure. — Gonfiement des lèvres. — Ulcération des commissures des lèvres. — Éruptions croûteuses aux lèvres, avec douleur cuimante. — *Ulcères sur la partie rouge de la lèvre inférieure. — Cancer des lèvres. — Furoncles au menton. — *Dartres au menton. — °Crampe dans l'articulation de la mâchoire. — °Elancements et tractions nocturnes dans la mâchoire inférieure. — °Gonfiement et cario des os de la mâchoire inférieure. — °Gonfiement des glandes sous-maxillaires, avec douleur au toucher ou même avec induration.

Dents. — *Odontalgie par des aliments chauds ou l'introduction de l'air froid dans la bouche. — *Traction, tressaillement et déchirements dans les dents et la joue, aggravés la nuit, ou bien seulement en mangeant. — *Odontalgie généralement l'ancimante, la nuit, qui trouble le sommeil, aggravée par les choses froides ou chaudes. — •Maux de dents avec gonfiement de l'os ou du périoste de la mâchoire et chaleur nocturne, universelle, qui empêche de dormir. — •Fouillement et térébration dans les deuts.

668



669

— Dents émoussées. — Inflammation douloureuse, gonflement, exceriation et *maignement facile des geneives.

Bunche. — Sécheresse de la bouche. — Haleine fétide, surtout le matin. — Stomacace. — Mucosités continuelles dans la bouche. — Sensation comme s'il y avait un cheveu sur la langue. — *Exceriation de la langue. — Gonflement d'un seul côté de la langue.

— Ulcère au palais. — Langue chargée de mucosités brunktres.
Garge. — Mal de gorge avec accumulation de mucosités dans la gorge. — Douleur d'excoriation et *picotement comme par des épingles, dans la gorge, pendant la déglutition. — Gonflement de la luette. — Déglutition difficile, comme par paralysie du gosier. — Tendance des aliments à remonter dans les fosses nasales,

pendant la déglutition.

Applitit. — *Perte du goût. — *Amertume dans la bouche, même le matin. — Goût aigre, putride, ou comme si l'on avait du sang ou des mucosités dans la bouche. — *Forte soif, quelquefois avec absence d'appétit. — *Répugnance pour tous les aliments, surtout les aliments cuite et chauds, avec appétence soulement pour les choses froides. — *Dégoût pour la viande; elle est indigeste. — *Répugnance de l'enfant pour le sein de la mère, avec voulssement après avoir teté. — *Après le repas, forte envie de dormir, pyrosis, aigreurs dans la bouche, renvois aigres, plénitude dans l'estomac et le ventre, ou bien (souvent consécutivement), pression à l'estomac, écoulement d'esu par la bouche, comme des pituites, voussement, frissons fébriles, congestion à la tête, chaleur aux joues.

Estemas. — "Rencois, avec godt des aliments, quelquefois après chaque repas. — "Rencois aigres. — Pyrosis. — Hoquet quelquefois le soir, au lit. — "Nausées tous les matins, avec douleur dans la tête et les yeux, en tournant les yeux, ou bien suivies de vomissement d'eau amère. — "Nausées continuelles, et appaissement, même la nuit. — "Reoulement d'eau par la boucht pomme des pituites, quelquefois avec horripilation. — "Vomissement toutes les fois que l'on boit. — "Vomissement des aliments, même la nuit. — "Pression à l'estomac, quelquefois après chaque repas, ou en buyant vite. — "Sensibilité douloureuse du serobicule, en pressant dessus. — Pesanteur dans l'estomac. — "Servement dans le scrobicule, comme par une griffe, quelquefois après le repas. — "Sensation brûlante dans le creux de l'estomac.

Ventre. — Gonflement et induration de la région hépatique. — Douleur d'ulcération à la région hépatique, avec battement; les douleurs s'aggravent au toucher et en marchant. — Élancements dans les hypogondres, surtout à gauche. — Coliques pendant lesquelles les mains jaunissent et les ongles deviennent bleus. — Pression dans le ventre, surtout après le repas. — *Ventre dur, tendu, chand (même chez les cufants), et quelquefois douloureux au toucher. — *Grosseur du ventre. — *Coliques par constipu-



jaune, sablonneux dans les urmes.

tion *Iranche sent pencement dans le centre, avec ou sans deurchee. *Somsation brulante dans le ventre. -- Les maux de ventre sont soulages par l'application de lingeschauds. *Herme injumale, douloureuse. Inflammation et gondement des glan les de l'aine. -- *Incarceration de flatuosités. Gargouillement et borborygmes dans le ventre, surtout en remnant le corps.

*Expulsion difficile des flatuosites. — Flatuosites tres-fetides. Sellos. — *Constipation et selles lentes, dures, difficiles, noueuses.

*Durete des selles, avec tenesme frequent. *Selles de la concetance de la beurlie, plusieurs fois par jour. — Diarrhee avec coliques - Seiles rougeatres, ou avec mucosités sanguinolentes.

Ecoulement frequent de serosites fetides, d'une odeur cadavéreuse — Elancements et *prard à l'anus, et au rectum, même pendant la « ll».

Urines. - Ténesme urmaire. Besoin continuel d'uriner, avec coulement peu abondant. - Emission fréquente d'urine, meme la nuit. Pissement au lit. Sable rougeâtre et sediment

Parties génitales. — Prunt et taches rouges sur le gland. —

*Excoriation, prunt et rougeur au prepuce. — Gonflement du
prepuce qui est couvert de boutons prunants et humides, —

*Gonflement hydropique du scrotum, surtout chez les individus
scrofuleux. Sueur et prurit au scrotum. — *Tache pruriante et
humide au scrotum — *Absence d'appetit venerien, avec faiblesse des fonctions genitales, ou bien exultation immoderee de
l'appétit venérien, avec affluence d'idecs lascives, et crections
fortes et frequentes — Écoulement de liqueur prostatique pendant les selies — Après le coit, courbature dans les membres, ou
sensation de paralysie dans un côte de la fete.

Régles. Regles trop hatires et trop faibles, ou bien trop abondantes. Suppression des regles. Métrorrhagie. — "Avant
les regles, diarrhée. — "Pendant les règles, douleurs dans le
ventre, ou vue pale, ou sonsation brûlante et excornation a la
vulve. — "Prarit à la vulve. — "Ecoulement de sang par la
matrice pendant l'allaitement. — Avortement — "Leucorrhée
qui coule en urmant, ou après les règles. — "Leucorrhée comme
du fait, coulant par intervalles, et precèdee de tranchées dans la
région ombilicale. Leucorrhée acre, corrosive. — "Inflammation des mamelons. — "Abees au sem, même avec ulceres fistu-

leux. — Indurations au sein.

Larynx. — *Enrouement, avec apreté et exceriation dans le larynx.

Toux par les hoissons froides, ou pour peu qu'on ait parle.

Toux ebranlante provoquée par un clastouillement sufficant dans la fossette du cou — *Toux fatigante, jour et nuit, aggrave ;
par le mouvement, avec expectoration muqueuse peu als udante.

*Toux nocturne, suffocante. Toux spismodique. - Toux scele, avec donleur d'executation dans la potreine. - Toux avec



*Expectoration abondante de mucovonciasement de mucosités. sités transparentes, en toussant. - *Expectoration de pus, en toussant. Expectoration de sang, avec toux creuse, profonde. Poitrine. - * Étouffement de la respiration, ven étant couché sur le doe, ou bien en se baissant, en courant ou en tonsiant. --Respiration profonde, suspirieuse. - Haleine courte, pendant un travail manuel peu fatigant, ou bien en marchant vite, quelquefois avec dyspnée pendant le repos. • Respiration haletante en Géne de la poitrine, comme par constriction marchant vite. de la gorge. - *Pression à la postrine, quelquefois seulement en toussant ou en éternuant. *Elancements et picotements dans la postrine et le côté, quelquefois jusqu'au travers du dos. -- Battement dans le sternum. — Douleur de brisement dans la poitrine, en respirant et en toussant.


Trenc. *Douleur aux rems, an toucher, et sans qu'on y touche.

— Traction crampoide aux reins, qui ne permet pas de se redresser, et force à rester couché. — Abcès inflammatoire dans la région lombaire. *Faiblesse et roideur paralytique dans le dos, aux reins et à la nuque. — *Déchirements et élancements dans le dos. —Elancements dans les lombes, en étant assis ou couché.

*Gonstement et déciation de la colonne vertébrale. — Douleur de brisement entre les omoplates. — Tractions tensives, dechirements et lancinations dans et entre les omoplates. — *Ulcere purulent à la nuque. Boutons et suroncles à la nuque. —*Gonstement des glandes à la nuque, au cou et sons les aisselles, quelquesois avec induration. — *Suppuration des glandes axiltaires. — *Carie de la clavicule.

Bras. *Tractions et déchirements dans les bras, les mains et les doigts. – *Pesanteur et lassitude paralytique des bras, qui tremblent au moindre travail. *Engourdissement des brus lorsqu'on est conché dessus, ou en s'accoudant sur une table. — Battement et tressaillement des muscles du bras. - Peau gercee, aux bras et aux mains. Furoncles et verrues aux brus. — *Faiblesse paralytique de l'arant-bras ; on laisse tout tomber des mains. - Induration du tissu cellulaire de l'avant-bras. -Elancements nocturnes dans l'articulation de la main, jusqu'au haut du bras. Douleur crampoïde dans les mains et les doigts. Engourdissement des mains la nuit. - Faiblesse paralytique des mams. Ganglion sur le dos de la main. -- *Ulcère sur le dus de la main. — Fourmillement dans les doigts. — Sensation brûlante dans le bout des doigts. Douleur dans les articulations des doigts, en pressant dessus. — *Faiblesse, roideur et manque de flexibilité des doigts. -- Vésicules rongeantes, purulentes, avec brûlement aux doigts. — *Panaris, surtout avec végétatione, cris et douleurs insupportables jour et muit.

Jambes. — Tractions, déchirements et tensions dans les jumbes. — Engourdimement facile des jambes, surtont en étant anna. -



SILICEA. - SPIGELIA.

672

Faiblesse paralytique des jambes. — *Pression, déchirement et élancement dans les muscles des cuisses. — «Ulcères pruriants aux cuisses et aux malléoles. — *Furoncles aux cuisses et aux mollets. - Ramollissement et ulcération du fémur. - *Déchirements dans le genou. — "Gonflement inflammatoire du genou. --- Fongus au genou. — Douleur tractive dans les jambes. --Froid aux jambes. — Gonflement des jambes jusqu'aux pieds. - Ulcères aux jambes, souvent avec teint maladif.—Tache rouge. cuisante, sur le tibia. — Carie du tibia. Tension des mollets. comme par raccourcissement. - *Crampes aux mollets, surtout le soir, après un travail corporel. -- Torpeur des mollets. - Miliaire pruriante aux mollets. - Déchirement et élancements dans les mollets, les talons et les orteils. — Lancination dans la malléole, en appuyant le pied. Engourdissement des pieds, le soir. ---*Froul aux pieds,°quelquefols après une suppression de la transpiration des pieds. - Sensation brûlante dans les pieds et la plante des pieds, surtout le soir et la nuit. — *Gonflement des pieds, généralement le matin. - *Odeur fétide des pieds. --*Sueur aux pieds, avec excoriation entre les orteils. aux pieds supprimée. Durillons durs et douloureux à la plante des pieds. — Chatouillement voluptueux à la plante des pieds, au point de rendre fou après s'être gratté tant soit peu. — Crampe à la plante des pieds. - Vésicules rongeantes au talon. - Roideur des orteils. - *Ulcération du gros orteil, avec douleur lancinante. — *Cors aux pieds avec douleurs lancinantes.


SPIGELLA.

SPIG. — Spigélie authelminthique. — HARNEMANN. — Ilist. nat et prép. Voy. Pharmac. hommop., p. 288. — Dose usitée: 30. — Durce d'action: 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

Antidote. Camph — On l'emploie comme antidote de : Merc. Companer avec : Acon. aur. chin. dig euphr. laur merc. natr-m. sil. spong. tar. veratr.

Charque. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Convulsions; Icrognerie; Fièvres muqueuses et vermineuses?; Fièvres intermittentes larvées?; Céphalalgies, prosopalgies et odontalgies intermittentes, nerveuses et rhumatismales, surtout chez les femmes d'une constitution nerveuse; Ophthalmies rhumatismales et arthritiques; Douleurs névralgiques aux yeux, surtout après s'être fatigue la vue; Affections vermineuses; Grippe; Fièvres catarrhales; Hydrothorax; Maladies du caur, etc., etc.

Voy. la note, page 15.



SPIGELIA.

673

STEPTOMES GÉBÉRAUX. - Douleurs arthritiques, lancinantes ou déchirantes dans les membres. - Déchirement autour
des articulations, comme si on en ratissait les os. - Sensations
de pesanteur et de brisement dans les membres. - • Convulsions.

— Lassitude, surtout après un léger exercice et au grand air.

- • Acces d'évaneuissement, surtout en faisant des efforts pour
aller à la selle, ou dans un appartement chaud. - Grande sensibilite a l'air froid, avec scuffrances par la marche au grand air.

* Connide fa vilité a prondre un refruidissement.

- *Grande fa ilité a prendre un refroidissement.

Pean. Sensibilité doutoureuse de toute la pean du corps, an toucher. — Boutons rouges, avec douleur d'excoriation au toucher. Sommeil. Forte encre de dormer, le jour, et même dès le matin, ou le soir; on ne s'endort, cependant, que longtemps après qu'on s'est conché. Sommeil de nuit non reparateur, agité, avec inquietudes dans les membres — Sommeil lourd, engourdissant.

Fièvre. Friesons fréquents, surtout le maten ou pendant un léger exercice. — Chaleur frequente, quelquefois fagace. — Pendant la

chaleur, soif de biere.

n.

No.

B

- 一をお前かり

Moral. - Tristesse et decouragement. Agitation et anxiété, acce soucis inquiets sur l'acenir. Caractère peureux. - Morosités jusqu'à la manie du suicide. Faiblesse de la mémoire. - Absence d'ideas. - Inaptitude aux travaux intellectuels.

Sée. Tête embarrassee, comme par l'ivresse ou un étourdissement. Vertiges, au point de tomber, en marchant, en étant debout, et en regardant eu bas. — Vertige avec nausées. Maux de tête, en branlant la tête, avec vertige et sensation de pesanteur.

*Douleurs de tête, aggravees par le plus lèger mourement, un bruit un peu fort, et en ouvrant la bouche. Semibilité douloureuse de l'occiput, avec sensation d'engourdissement et de roideur dans la naque — *Maus de tête périodiques.— Pression dans la tête, compressive et expansive, aggravée en se baissant. *Douleur comme si la tête allait eclater, en toussant et en parlant fort. Maux de tête dechirants, fuillants ou térébrants, surtout pendant le mouvement. — Lancinations pulsatives et étendues dans le front, avec bruit de coups de marte au devant les oreilles.


Commotions et coups dans la tête, peu lant la marche au grand air. Ébranlement dans le cerveau, a chaque pas et à chaque mouvement de la tête. *Douleur brûlante à l'extérieur du front et des tempes, jusque dans les yeux. — Tension du cuir chevelu. Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, au toucher.

Your.—*Douleurs dans les yeux, profondément dans les orbites.

— *Pression sur le globe des yeux, surtout en les tournant. —
*Douleurs dans les yeux, pendant le mouvement comme si le globe des yeux était trop rolumineux. — *Fouillement, térébration et élancements dans les yeux, et jusque dans la tète, quelquefois avec douleurs qui portent au désempoir. — *Le mouvement des yeux et des muscles de la face apgrave les douleurs

Jánn. - 8- édit., Impert., t. Il.

204



SPIGELIA.

— Fourwillement dans les yeux. — Chaleur sèche et sensation brûlante dans les yeux qui oblige a les fermer. — *Rougeur de la sclérotique, avec injection des vaisseaux sanguins.— *Inflammation des yeux et de la cornée. — *Inflammation et ulcération des paupières, avec douleur cuisante d'excoriation. — *Yeux troubles, ternes. — Larmoiement abondant. — Larmes âcres, cuisantes. — Grande sensibilité des yeux à la lumière. — *Chute des paupières, comme par paralysie. — oTendance à clignoter. — Difficulté de soulever les paupières, avec sensation de roideur douloureuse. — Contraction et mouvements involontaires des yeux. — Pupilles dilatées. — Perte (suspension momentanée) de

la vue. — Presbyopie. — *Rayons lumineux devant la vue.

Oreilles. — Otalgie, arec douleur pressive, pénible, comme s'il y avait une cheville dans l'oreille. — Déchirement tressaillant dans les oreilles. — Étreinte, prurit et sensation brûlante à l'oreille exterieure. — Obturation des oreilles, avec ou sans dureté de l'ouie. *Surdué périodique. — Mugissement, bourdonnement et pulsation dans les oreilles. — Bruit de coups de marteau devant

les oreilles.

dissement.

674


Nes. Prurit au nez, avec chatouillement. — Fourmillement, élancements, térébration, cuisson et démangeaison dans le nez. — Éruption dartreuse au nez, avec douleur d'excoriation. — Obturation et secheresse du nez, avec écoulement abondant de mucosités blanchâtres et jaunâtres, par les fosses nasales. — «Coryza fluent, fréquemment, surtout après le plus léger refroi-

Visage. *Visage pâle, défait, avec cercles jaunes autour des yeux. — Joues et lèvres tantôt rouge foncé, tantôt pâles. — *Bouffissure de la face, surtout après avoir dormi.— *Déchirements tressaillants, sensation brûlante et pression dans la région des os zygomatiques, on soluteurs violentes, qui ne supportent ni le plus léger contact, ni le moindre mouvement, avec gontlement luisant du côté affecté.— Douleurs semi-latérales à la face, avec angoisse de cœur et grande agitation. — Exostose au côte de l'orbite qui est près de la tempe. — Lèvres tendues et brulantes. — Petits boutons noirâtres sur la lèvre supérieure. — Douleur pressure dans l'angle de la mâchoire inférieure, comme dans la mâchoire ou dans les dents, provenant de l'oreille.

Dents. — Odontalgie après avoir fumé. — Douleur de pression écartante aux dents, immédiatement après le repas, ou la nuit, ne permettant pas de rester couché. — *Maux de dents tressaillants, ou avec déchirements pulsatifs, surtout dans les dents cariées, aggrarés par l'eau froide, ou par le contact du grand air. — •Maux de dents, avec prosopalgie, face pâle et boufile, cercles jaunâtres autour des yeux, battement de cœur, frissonne-

ment et agitation.

Beuche - Gorge. - Exhalaison fétide par la bouche. - Séche-



SPIGELIA.

675

resse lancinante dans la bouche, le matin, au réveil. — Accumulation abondante de salive blanche, écumeuse, dans la bouche. — Mucosités blanches ou jaunes dans la bouche et le palais. — Langue fendillée. — Vésicules, avec douleur brûlante sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec lancinations et gonflement au palais.

Appétit. — Goût putride, fétide. — Absence d'appétit, avec forte soif. — Répugnance pour le tabac à fumer et à priser. — Répugnance pour le café. — Boulimie, quelquefois avec nausées et soif.

Estomac. — Renvois après tous les aliments. — Renvois aigres.

*Nausées à jeun, avec sensation comme si quelque chose remontait de l'estomac dans la gorge. Accumulation de mucosités dans l'estomac. — Pression dans l'estomac et dans le scrobicule, comme par un corps pesant. — Lancinations dans le creux de l'estomac et le diaphragme, quelquefois avec étouffement de la respiration. — «Impossibilité de supporter des vêtements serrés autour du scrobicule; le moindre contact donne des angoisses, avec rougeur et chaleur du visage, et sensation comme si quelque chose se déchirait dans la poitrine.

Ventre. — Ventre dur et douloureusement tendu. — Pression dans la région ombilicale, comme par un corps dur. — Colique, avec des douleurs pinçantes, tranchées dans la région ombilicale avec frisson, diarrhée et sécrétion abondante d'urine. Lancinations dans le ventre. — Douleur tensive dans les aines, au toucher. — Grondement et borborygmes dans le ventre. — Expulsion de vents

fétides.

Selles. — Envie fréquente d'aller à la selle, sans résultat. — Selles molles, liquides. — Selles dures avec efforts et mucosités abondantes. — Écoulement de mucosités par l'anus, sans selles. — Diarrhées liquides, de matières fécales et de mucosités. — Diarrhée, avec pincements dans le ventre et froid au corps. — Lombrics et ascarides du rectum. — Prurit et sensation comme si quelque chose rampait dans le rectum et l'anus.


Urines. — Urine, avec sédiment blanchâtre. Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante, même la nuit — Suintement involontaire des urines, avec sensation brûlante dans la partie

antérieure de l'urêthre.

Parties génitales. — Fourmillement autour du gland. — Gonflement semi-latéral du gland. — Érections, avec idées lascives. sans excitation voluptueuse. — (Écoulement de liqueur prosta-

tique.)

Larynx. — Catarrhe, avec enrouement, écoulement continuel de mucosités nasales, chaleur sèche, sans soif, yeux proeminents, mal de tête pénible et envie de pleurer. — Catarrhe nocturne, avec toux. — Toux, au grand air, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Toux sèche, violente, creuse, arec confiement de la respiration jusqu'à suffoquer.



676 SPIGELIA.— SPONGIA MARITIMA TOSTA.

Poitrine. — Pression à la poitrine, avec oppression douloureuse. — "Haleine courte, surtout en parlant, avec anxiété et rougeur des joues et des lèvres. — Péril de suffocation au moindre mouvement et surtout en levant les bras. Forte gêne de la respiration, en se remuant au lit, avec impossibilité de rester couché autrement que sur le côté droit et presque assis. -- Accès subits de suffocation, avec battement de cœur et angoisse. — Contraction de la poitrine, arec angoisse et respiration gênée. — Bruit dans la poltrine, comme le ronron d'un chat, surtout dans la région du cour. - Pression, sensation brûlante ou incisive, douleur d'ulcération et déchirement dans la poitrine, surtout en levant les bras. — Sensation d'un tremblement dans le thorax, aggravée par le mouvement des bras. — Sensation crampolde dans la poitrine, partant du creux de l'estomac et produisant des étouffements. - Lancinations tensives dans la poitrine, surtout en respirant. — Battements de cœur violents, sensibles à la vue et à l'ouic, souvent avec oppression anxicuse de la poitrine, aggravés en courbant la poitrine et en s'asseyant. — *Lancinations dans la région du cœur. — Sensation de tremblement au cœur. -Les battements du cœur ne répondent pas à ceux du pouls. — Mouvement du cœur, comme une ondulation.

Tronc. Douleur de brisement dans le dos, même pendant le mouvement. - Lancinations dans le dos, quelquefois en respirant. - Boutons rouges au cou, avec douleur d'excoriation au toucher. - Gonflement dur et douloureux des glandes du cou.


Bras. — Pesanteur et tremblement des bras. — Engourdissement facile des bras et des mains. — Tressaillement des muscles des bras et des avant-bras. — Lancinations violentes et saccadées, dans le pli du coude et les articulations des mains et des doigts. — Tractions et déchirements crampoides dans les os des mains. — Nodosités dures dans la paume des mains, avec prurit brûlant. — Mains jaune pâle. — Contraction des doigts. — Boutons puru-

lents aux doigts.

Jambes. — Douleur de brisement, tension et élancements dans les cuisses, presque exclusivement en marchant et pendant les mouvements prompts. — Lancinations violentes dans le genou, en le pliant. — Roideur douloureuse de l'articulation du genou. — Secousses lancinantes dans les articulations des picds. — Excroissances, comme des verrues, aux orteils.

SPONGIA MARPITMA TOSTA.

SPONG. — Éponge maritime brûlée. — HAHMERANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. hommop. — Doses usitées: 2, 8, 30. — Durée d'action : 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.



SPONGIA MARITIMA TOSTA.

4177

ANTIDOTE : Campb. Comparsa avec : Acon. ars. cupr. dros. hep. iod. merc. phos. spig. --- C es surtout après acon, que spong. est efficace dans le croup), lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. --- Après spong., convient souvent 'dans le croup', hep.


CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques ; Croup (avant d'employer hep., ou alternant avec celui-ci); Laryngite chronique; (Phthisie laryngée); Bronchite; Souffrances asthmatiques; Maladies du cœur; Tubercules aux poumons; etc., etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - *Gonflement et induration des glandes. -- Courbature des bras et des jambes. -- Sensation de torpeur dans la partie inférieure du corps. Leurdeur du corps. - Abattement excessif, moral et physique. - En étant couché tranquillement, on se trouve mieux que dans toute autre position. -- Elancements pruriants à la peau, surtout en se réchauffant au lit. — Sensation de quelque chose qui ramperait sur la peau, avec rougeur et chaleur de la partie, après s'être gratté. — Tache rouge, pruriante à la peau. — Eruptions pruriantes. — Eruptions miliaires. Dartres. — Insomnie, arec réveries fantastiques et délire en s'endormant. — Rêves tristes, anxieux, effrayants. Frissons fréquents par tout le corps, surtout au dos. - Accès de chaleur fugace. — Chaleur febrile, avec peau sèche et chaude. soif continuelle, mal à la tête et délire. - Pouls dur, accéléré. Sueurs nocturnes. — Accès d'angoisse, avec douleur dans la région du cœur. — Humeur inconsolable et pleurs. — Caractère eraintif et frayeur facile. - Humeur récalcitrante et bravades. Gaieté immodérée et malicieuse. Grande envie de chanter. - Esprit obtus, avec incapacité complète de se livrer a un travail de tête.

Tôte. — Vertige, avec étourdissement au point de tomber, quelquefois le soir, on bien avec sensation comme si la tête allait ficchir de côté. - Vertige avec nausées, la nuit, en se réveillant. Pesanteur et plénitude de la tête. Mal de tête sourd, semilatéral, en entrant dans un appartement chaud, lorsqu'on vient du grand air. - Mal de tête avec larmoiement, en fixant les yeux *Maux de tête pressifs, quelquefois avec comzur un objet. pression. - Douleurs dans la tête, comme si elle allait éclater. surtout dans le front. -- *Battement et pulsation dans la tête. --Congestion de sang à la tête. - Sensibilité désagréable de l'extérieur de la tête. - Prurit pénible au cuir chevelu.

Year. — Year ternes et troubles, avec bouffissure des paupières.



SPONGIA MARITIMA TOSTA.

678

- Pression et élancements dans les yeux. — *Yeux brûlants, rouges et larmoyants. — Agglutination des paupières. — Éruption de croûtes jaunes, dans les sourcils. — Pesanteur pressive des paupières. — Contraction des paupières le matin. — Myopie.

Oreilles et Nez. — Otalgie, avec douleur contractive. - Pression dans les oreilles. — Ulcération de l'oreille extérieure. — Dureté de l'oure. — Épistaxis, surtout après s'être mouché. — Éruption au bout du nez.

Visage. — Visage pale, avec yeux abattus. — Visage bouff, ronge ou bleudtre, avec physionomie anxieuse. — Gonflement des joues. — Prurit et élancements dans les joues. — Éruptions aux lèrres. — Douleurs crampoides dans les articulations de la machoire. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur tensive.

Dents. — Sensation d'émoussement et de vacillement des dents, pendant la mastication. — Prurit et élancements aux dents. — Gonflement des gencives, avec douleurs pendant la mastication.

Bouche. — Bouche et langue convertes de vésicules, avec douleur brûlante et lancinante. — Salication. — l'arole faible. — Langue sèche, brunâtre. — Sensation brûlante et élancements dans la gorge.

Appétit. — Diminution du sens du goût. — *Goût amer, quelquefois seulement dans la gorge. — Goût douceâtre dans la bouche.
— Appétit modéré et satiété prompte. — Faim violente, insatiable. — *Soif, equelquefois inextinguible. — La fumée du tabac
ne convient pas. — Après le repas, plénitude et souffrance dans

l'abdomen, comme par difficulté de la digestion.

Batomac. — *Renvois, *quelquefois avec tranchées et déchirements dans l'estomac. — Renvois amers. — Régurgitations aigres. — Hoquets fréquents. — Nausées, avec fortes aigreurs dans la bouche. — Vomissement après avoir pris du lait. *Laxité de l'estomac, avec sensation comme s'il était ouvert. — l'ression dans l'estomac et le scrobicule. — Pression des vétements sur l'estomac. — Douleurs contractives à l'estomac.

Ventre. — Ventre dur et tendu. — Crampes abdominales. — Fouillement et étranglement dans le ventre. — Tranchées dans le ventre, après le repas. — Grondement dans le ventre, surtout le soir, et le matin, en étant couché. — Douleur comme par une hernie dans l'anneau inguinal. — Gonflement des glandes de l'aine.

Selles. - *Selles dures et retardées. — Selles diarrhéiques, blanchâtres. - Avant la selle, élancements à l'anus et grondement dans le ventre. — Pendant la selle, ténesme à l'anus. Prurit, corrosion, et douleur d'excoriation à l'anus. — Ascarides du rectum et fourmillement au rectum.

Urines. — Sécrétion d'urine plus abondante. — Envie fréquente d'uriner, avec émission peu abondante. — Incontinence d'urine.





– Jet d'urine mince. — Urine écumeuse. — Sédiment épais, blanchâtre, grisâtre ou jaune, dans les urines.

Parties génitales. — Etranglement crampoide dans les testicules. - Gonflement dur des testicules et du cordon spermatique, avec douleur pressive. — Appétit vénérien peu prononcé. — Absence d'érections. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Avant les règles, battement de cœur et douleur dans le dos. — Pendant

les règles, traction dans les cuisses.


Larynx. - *Enrouement, quelquefois avec toux et coryza. - Voix faible, peu nette, et qui manque pendant le chant et la conversation. - *Douleur dans le larynx, au toucher et en tournant lu tête. — Pression dans le larynx, en chantant.—*Sensation d'obturation du larynx, avec respiration empêchée. — *Apreté et sécheresse dans la gorge. - *Douleur brûlante dans le larynx et la trachée-artère. — Toux venant du fond de la poitrine, avec douleur d'excoriation et sensation brûlante. — *Toux, avec expectoration jaunâtre et enrouement. — *Toux creuse, sèche, onboyante ou sibilante, jour et unit, augmentée vers le soir, et quelquefois avec douleur dans le larynx. — *Toux avec expectoration de mu-Toux seche, provoquée par un chatouilleerrités orisqueuses. ment brûlant dans le larynx.

Poitrine. — Respiration lente et profonde, comme par faiblesse. — *Asthme et dyspnée par une gêne dans le larynx.—•Inspiration sifflante. -- Accès de râle muqueux, dans la trachée-artère. Respiration accelérée, anxieuse et difficile, quelquefois avec excès de suffocation et râle muqueux dans la poitrine. - Douleur fixe, lancinante et pressive dans la région des bronches. — Douleur s crampoïdes, constrictives, dans toute la poitrine. — Douleur de poitrine, avec dyspnée. - Plénitude et géne dans la poitrine. -Elancements dans la poitrine. - Sensation brâlante qui remonte dans la poitrine. — Bouillonnement de sang dans la poitrine, après le plus léger effort et le moindre mouvement, avec etouffement de la respiration, angoisse, nausées, et faiblesse au point de s'évanouir. — Douleurs et anxiéte dans la region du cœur.

Trono. — Sensation de torpeur aux reins et dans les fesses. — Maux de reins avec douleurs tractives, dechirantes et pressives. - Tension douloursuse et roideur des museles du cou et de la nuque. — Gonflements goitren.c. volumineur et durs, avec pression, fourmillement et élancements. -- Crampes dans les muscles

du cou,

Bras. - Tressaillement des muscles, dans les articulations scapulaires. — Pesanteur et tremblement des avant-bras et des mains. -Tiraillements dans les avant-bras et les articulations des mains. - Grosses ampoules sur l'avant-bras. - Gonflement des mains avec roideur des doigts. - Rougeur et gonflement des articulations des doigts, avec tension en les faisant jouer. -- Torpeur du bout des doigts.



680 SPONGIA MARITIMA TOSTA. - SQILLA MARITIMA.

Jambes. — Tressaillement des muscles aux fesses. — Traction spasmodique des jambes en avant et en arrière. — Roideur des jambes. — Traction et déchirement dans les jambes et les pieds, quelquefois la nuit seulement.

SQUILLA MARITIMA.

SQUIL. — Scille maritime. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 289. — Dose unitée : 30. — Durée d'action : 2 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

Antipote : Camph.

COMPARER AVEC: Bry. magn. mur-ac. n-vom. puls. rhab. rhus. seneg. spong.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament coutre : — Affections hydropiques ?; Gastrite ?; Entérite ?; Ascite ?; Affections catarrhales; Grippe; Pneumonie; Pleurésie, et souffrances à la suite de ces maladies, lorsqu'elles ont été traitées par des évacuations sanguines; Hydrothorax?; etc., etc.


Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. --- Douleurs sources, rhumatismales dans tout le corps, aggravées par le mouvement, et soulagées par le repos. - Palpitations musculaires. - Conrulsions et accès de crampes. — Induration des glandes. — Pesanteur, fatique et tiraillement dans les membres. — Inquiétudes dans les membres. — Établicon brûlante et pruriante à la peau. — Érup-**S**on brùlante et pruriante à la peau. — Erupmembres. — 🖼 tion comme une gale pustuleuse, avec prurit brûlant. — Exceriation dans le pli des membres. — Sphacèle. — Sommeil inquiet, avec rêves fréquents et jactation. — Insomnie. — Disposition frileuse. — Froid glacial des pieds et des mains, avec chaleur du corps. — *Chaleur sèche, brûlante, oavec frissonnement et douleur pour peu qu'on se découvre. — Après la chaleur, pâleur du visage sans frisson. — Angoisse, avec peur de la mort. — Gemissements. — Irritabilité chagrine. — Eloignement pour le travail intellectuel ou corporel.

Tête. — Vertige avec nausées. — Vertige le matin, à faire tomber de côté. — Mal de tête, le matin, après le réveil, comme une pesanteur pressive et douloureuse. — Sensibilité douloureuse du vertex, tous les matins. — Douleur serrante dans les côtés de la tête. — Contraction dans les tempes. — Maux de tête tractifs,

lancinants. - Battement dans la tête, en se levant.





SQUILLA MARITIMA.

Yeux. — Douleur dans les yeux, avec sensation de contraction. Déchirement dans les yeux, comme derrière les globes. — Sensation brûlante dans les angles extérieurs des yeux. — Gonflement
des paupières supérieures. — Yeux grandement ouverts. — Regard fixe. — Pupilles contractées, ou fortement dilatées. — Tournoiement et obscurcissement devant les yeux.

Oreilles et Nes. — Déchirement dans les oreilles, — Narines douloureuses, comme si elles étaient excoriées. — Éruption suin-

tante sous le nez, avec prurit lancinant. — Coryza fluent, avec narines ulcérées et éternument frequent. — Mucosités nasales, àcres, corrosives.

Visage. — Visage tantôt très-altéré, tantôt physionomie animée. — Chaleur à la face, aisément excitée par le plus léger mouvement ou la parole. — Traits du visage tirés, contractés, surtout pendant la chaleur fébrile; après la chaleur, pâleur. — «Lèvres et dents noires. — «Lèrres gercées, avec croûtes brunâtres. — *Face rouge foncé.

Bouche et Gorge. — Bouche pâteuse et pleine de mucosités. —
"Bouche sèche et ouverte. — Vésicules sur la langue. — Apreté et grattement dans la gorge. • Sensation brûlante dans le palais

et la gorge. - Sécheresse dans la gorge.

Appétit. — Insipidité des aliments. — Goût empyreumatique dans le gosier, en mangeant. — Goût douceâtre, ou *amer des aliments, surtout de la viande et de la soupe. — *Dégoût des aliments. — Désir des acides. — *Perte de l'appétit. — *Forte soif, surtout d'eau fraiche. — *Malgré lu soif, on ne peut boire que goutte à goutte, à cause d'une gens de la respiration. — Voracité et boulimie. — *Faiblesse de la digestion.

Estomac. — Nausées, quelquefois avec envie de vomir. — Nausées continuelles le matin, pendant la toux. — Nausées avec envie de vomir, alternant constamment avec mouvements comme pour la diarrhée. - Vomiturition violente. • Renvois amers. - Pression


sur l'estomac, comme par une pierre.

Ventre. — *Sensibilité douloureuse du ventre, avec ballonnement sans dureté. — Traction et déchirement à travers le ventre. — Pincements, grondement et borborygmes dans le ventre. — Ex-

pulsion fréquente de vents. - Ascite.

Selles. — Constipation. — Selle dure, insuffisante. — Diarrhée de mucosités brunâtres, avec expulsion abondante de vents. — Selles diarrhéiques, noires. — Ascarides et filaments blancs, abondants avec la selle. — Selles fétides non digérées. — Selles sanguinolentes.

Urines. — Diminution de la sécrétion des urines. — Forte encre d'uriner, avec émission abondante d'une urine aqueuse. - Flux d'urine. - *Émission fréquente d'urines, la nuit. - *Pression continuelle sur la ressie, qui est très-semible. — *Urines rouges.



SQUILLA MARITIMA. STANNUM.

chandes, foncées, avec sédiment rouge. - Pissement de sang-— Après l'émission des urines, ténesme.

Parties génitales. — Douleur dans les testicules, avec sensation

compressive. - Métrorrhagies.

682

Larynx. -- Toux provoquée par un chatouillement au-dessous du cartilage xiphoide, ou en respirant profondément. - Toux, jusqu'à provoquer des vomituritions. -- Toux violente, arec lancinations dans les côtés de la poitrine. - Toux, avec ébranlement douloureux dans le ventre. — *Toux courte, sèche, chaque fois que l'on respire, œurtout le soir et la nuit. — *Toux après avoir bu froid. - Rale muqueux avant la toux. *Toux, avec expectoration de mucosités etchaleine courte. — "Toux, arec crachement de sang. - *Expectoration de mucosités rougeâtres. - *Mal à la tête et suffocation en toussant, on pression sur la vessie, et émission d'urine involontaire. — *Toux, avec courte haleine.

Poitrine. — Respiration accélérée et anxieuse, avec dyspnée et besoin d'être couché la tête et la poitrine hautes. — Respiration gémissante, avec bouche ouverte. Pression des deux côtés de la poitrine, surtout én inspirant. — *Lancinations étendues, pressives ou tressaillantes, dans la poitrine et les côtés de la poitrine, en respirant et en toussant. -- *Sensation de pesanteur dans la poitrine. — *Congestion de sang it la poitrine. — Dou-

leurs de poitrine, aggravées le matin.

Trong et Membres. — Eruption pruriante au dos. — Roideur de la nuque et du cou. — Traction rhymatismale et serrement dans les muscles du cou. — Boutons au cou, douloureux seulement en les grattant. - Sueur sous les aisselles. - Tressaillement convulsif des bras. — Elancements dans les articulations des mains. — Tressaillement convulsif dans les jambes. — Tractions rhumatismales dans les cuisses et les jambes. — Sensation brûlante au gras du pied, comme s'il avait été gelé. — Sueur aux orteils. Sueur froide aux piede.

STANNUM.


STAN. — Étam. — HABREMANN. — Hist. nat. et prép Voy. Pharmac. homosp., p. 143. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 6 à 7 semaines, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Puls,

Comparer avec. Ars. bell. cann. cans. cham. chim. hell. ign. puls seneg., stram. valer. verb. — C'est aurtout après caus, que stann. est officace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des sympiones, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : - -





STANNUM.

Paralysies; Épilepsie, surtout pendant la dentition; Fièvres lentes?; Prosopalgie; Gastralgie et coliques spasmodiques, surtout chez des femmes hystériques ou chez des personnes hypocondriaques; Ténia?; Flueurs blanches; Catarrhe des bronches; Grippe; Phthisie pituiteuse; Phthisie laryngée; Hydrothorax; etc., etc.

Voy. la note, page 15.

syntout dans les membres, s'aggravant insensiblement jusqu'à ce qu'elles deviennent très-violentes, et décroissant de même. —
*Attaques d'épilepsie, °avec rétraction des pouces et jactation, ou bien avec renversement de la tête, pâleur du visage, mouvements convulsifs des mains et des yeux, et perte de connaissance; les accès viennent quelquefois le soir. —*Anaigrissement excessif. — •Paralysies. — Grande lourdeur et paresse. — *Abattament excessif, et accablement physique et moral, avec tremblement, surtout en faisant un exercice doux, °et avec disposition à transpirer facilement. — •Surexcitation nerveuse. — •Inquiétudes insupportables dans le corps. —•Fatigue excessive par la parole. — Les souffrances semblent disparaître pendant la marche, à l'exception de l'abattement, qui est excessif alors; elles reparaissent dès qu'on est tranquille.

Pean. — Elancements pruriants (brûlants) sur toute la peau du

corps. - Engelures. - Envies aux ongles.

Sommeil. — Envie de dormir, le jour. — Bâillement fréquent avec oppression de la poitrine, comme si elle était entourée d'un cercle. — Sommeil tardif. — *Insomme nerveuse, ou continuelle. — Le matin, on n'a pas assez dormi. — Sommeil profond. — *Agitation nocturne et affluence de rêces cifs, anxieux ou lascifs. — Gémissements, pleurs et lamentations plaintives, en dormant.

Pièvre. — Frissons et horripilation, le matin, avec froid aux mains et torpeur du bout des doigts. — Frissonnement qui parcourt le dos, ou sculement a la tête, le soir avec soif. — Chaleur brûlante dans les membres, surtout aux mains. — Sensation de chaleur anxieuse au moindre mouvement. — Pouls petit accéléré. — *Sueurs nocturnes très-débilitantes. — *Sueurs matutinales, abondantes.

Moral. Humeur sombre, hypocondriaque. —*Grande agitation et angoisse, melancolie et disposition a pleurer. — On est trèsaffairé, sans venir a bout de rien faire. *Découragement. — *Mauvaise humeur, avec taciturnité et eloignement pour la societe et la conversation. - Emportement colerique subit. *Surexcitation nerveuse.

Tête. — Vertige, comme »i tous les objets étaient trop eloignés. — Vertige en s'asseyant, avec Perte des idées. — Mai de tête, avec



nausées et vomiturition quelquefois avec sensation brulante dans le sinciput, les yeux et le noz, ou bien le matin, avec mauvaise humeur. *Pesanteur et pr saion étourdessante dans la tête, parcourant surtout le front. *Douleurs lancinantes dans la tête, surtout au front, et éprincipalement après une quinte de toux. — Douleurs crampoides dans la tête, comme par une tension ou un serrement — Traction pressive et dechirement dans la tête. —Douleurs terebrantes dans la tête —Douleurs

leurs battantes dans les tempes. Secousses douloureuses a tra-

vers la tête.

Youx. Yeux deuleureux, et comme execties par le frottement.

— Pression dans les paupières et dans leurs angles. Lancinations brulantes dans les paupières. Prurit, uisson et sensation brulante dans les yeux. Orgelets. Agglut nation nocturne des paupières. Ulcere à l'angle laterne de l'eil, comme une fistule lacrymale. Yeux ternes, troubles. Tressaillement et fremissement des yeux. Yeux convulses ou proéminents. — Auréole irisée de la lumière.

Oreilles et Nez. — Otalgie, avec d'chirem nts tractifs. Ulecration du trou perce pour les boucles dereilles. Tintement d'oreilles. Cris d'uns les creilles, en someuel ant Pesanteur et sensation d'obturat, n' dans la partie superleure du nez. — Inflammation de l'interieur du nez. — Sensat, n' brulante dans le nez. — Cory za sec d'un seul cote, avec gonfiement et r'ingeur de

la narine.


Visage, — *Visage pâle, hêce, ave yeu, cares, *Douleu, s de la face, avec traction pressive, surtout aux pommettes et dans les orbites. — Douleur brulante, laneurinte dans les muscles de la face. Gonflement des joues et de la mâche le, superie ure — Crampe de la mâchoire. — Genflement deuloureux des glandes sous-maxillaires.

Dents. Odontalgie apr. s le repas, avec douleur tressaillante et chalear du visage. *Sensation d'allongement et de recellement des dents. Ulcere aux geneives, avec gouffment des jues

Bonche et Gorge. Exhalasson fetide par la lenche. Ecoulement de salive acide. Parole embarrassée, abattur, par faiblesse. Langue rouge. Mal de gorge, cen me par genfement intérieur, avec traction et tension. Sensat ou de se heresse dans la gorge, avec lan limité es. Aprete et grattem ut dans la gorge, surtout le soir. Accumulation de macose es dans la gorge et la bouche, avec besoin de renâel r, saivi de sensation d'excoriation.

Appétit. Goût amer et aigre. G ût amer de tous les aliments. G ut amer, herbace, de la biere. Faim auguente, avec impossibilité de se russasie. Soif auguente : Apre 1: repas, nausces et volaissement. Phiblisse e consière de la di-

gestion



STANNUM.

655

Estomat. — Renvois, avec goût d'œufs pourris, ou amers. — 'Renrois aigres, avec grattement dans la gorge. — Hoquet frequent.
— "Nansées, surtout après le repas, suivies de comissement
amer et aqueux. — "Vomiturition riolente, suivie de vomissement des aliments. — "Pression à l'estomac, quelquefois tresviolente. — Pression tensive au scrobicule, qui est douloureux au
toucher, comme par une ulcération sous-cutanee. — "Crampes
d'estomac, equelquefois avec renvois amers, sensation de faim et
diarrhée, ou bien avec nausées et teint pâle et maladif. — Serrment, comme par une griffe dans l'estomac et la region ombilicale, avec nausées.

Ventre. — Coups obtus à travers les hypocondres. — Crampes dans la région du diaphragme. — *Pression et sensation brûlante dans la région hépatique. — *Pression, douleur crampoïde et élancement dans l'hypocondre gauche. — Ventre doulourensement ballonné et sensible au toucher. — Crampes abdominales, avec douleurs au-dessus et au-dessous de l'ombilie — Fouillement, pincement et tranchées dans le ventre. — Sensation brulante et élancements dans l'abdomen. — Sensation d'executation dans le ventre, aggravée au toucher. — Serrement comme par une griffe dans la région ombilicale, suivi de nausces. — Sensation de vacuité dans l'abdomen. — Incorcération de flutuosites


Selles. — Constipation. *Enrie d'altre à la selle, inutile et fre quente. — Selles dures, seches, noncuses, ou peu abondantes et verdatres. — Selles muqueuses. — *Forte diarrhée.
 Urines. — Retention d'urine. — Emission d'une urine rare

Urines. — Retention d'urine. — Emission d'une urine rare *Enrie fréquente d'uriner, quelquefois avec emission peu abondante. — Absence du besoiu d'urmer, comme par insensibilité d' la vessie.

Parties génitales. - Evaluation de l'appetit rénerien. — Exertation violente et voluptueuse à l'ejaculation. -- *Pollutions frequentes.

Règies. Menstruation plus abondante. Avant les regles, anxiete et melancolie. Pendant les regles, coliques. Crampes de la matrice. *Leucorrhee de mucosdes transparentes ou jaunâtres, acce chate consulerable des forces. Le nouvrissen quitte le sein de sa mère et ne veut plus teter.

Larynx. *Euronement et aprete dans la gorge, avec chatouille ment qui provoque la toux — «Caturche avec voix ranque, sen sation de fatigue dans la poutrine, gene de la respiration et tous avec expectoration. — " termindation abond inte de mineosites dans la truchée-artere, se detachant facilement par une toux legère. — Voix plus haute pour le chant apres avoir renàcle des mucosites. — «Toux provoque par le cire, la parole et le chind, "on par un chatouillement dans la poitrine. *Toux siehe, violente, &branlante, au lit, le soir, jusqu'a minuit, ou plus violente le matin. — «Toux exceter en se conchant du côté droit. — «Toux



STANNEY STAPHYSAGRIA.

expectoration et vomissement des aliments. «Toux acre expectoration fréquente de mucosités. — *Expectoration, en toussant, rerdâtre, douceûtre, ou jaune, salée, con bien visqueuse et en morceaux, ou bien encore séreuse et de macosités liquides, ou d'odeur putride. — *Pendant et après la toux, don-

leur d'excoriation et élangements dans la portrine.

Poitrine. — *Étouffement de la respiration, la nuit, surtout en étant couché, ou le jour au moindre mouvement. — *Dyspuéc. Is soir surtout, avec sensation de vacuité dans le scrobicule et angoisse qui force à desserrer les vétements. — *Oppression de poitrine, en marchant et en montant. — *Râle maqueux et sifflement d'uns la poitrine. — En respirant profondément, sensation agréable de légèreté. — Douleur de brisement dans la poitrine. — *Pression profonde dans la poitrine comme par un tarde en. *Tension de la poitrine. — *Constriction de poitrine. quelquefois le soir, avec angoisse. — *Lancinations du côté quuche de la poitrine, en respirant, et en étant couché du côte droit. — *Douleur d'excoriution dans la poitrine. — *Sensation de faiblesse dans la poitrine, comme ni elle était ride, surtout après avoir parlé ou expectoré.

Tronc. — Renversement du dos, en arrière. — Laucinations dans les omoplates et la nuque. — Faiblesse des muscles de la nuque

et craquement des vertèbres du cou, en secouant 🖿 tête.


Bras. — Douleur paralytique dans l'articulation de l'épaule. —
Pesanteur paralytique dans les bras. — Déchirements pressifs
dans les muscles et les articulations des bras, des mains et des
doigts. — Faiblesse et tremblement des mains. — *Gonflement
des mains, aurtout le soir. — Tressaillement des mains. — Violente sensation brûlante dans les mains. — Petites taches rouges
sur le dos des mains. — Engelures aux mains. — Contraction
des doigts. — Retraction des pouces. — Élancements dans le
lout des doigts. — Envies douloureuses aux ongles.

Jambes. -- Tractions et déchirements pressifs dans les hanches, jusqu'au-dessus du sacrum, comme aussi dans les jambes et les genoux. — Lussitude paralytique et pesanteur des jambes. -- Flechissement des genoux en marchant. -- Roideur et tension dans le jarret. -- Sensation de chaleur et sensation brûlunte dans les pieds. -- Secousses déchirantes dans les malléoles. s'étendant jusqu'aux orteils. -- *Gonflement des pieds, surtout

le seit. - Gontlement magentre des pieds.

STAPHTSAGRIA.

STAI B. — Staphysnigre — HABNEMANN. — Hist. not. et prép. Voy-Pharmac, hommop, p. 290. — Done unitée : 30. — Durée d'action : 3 à 4 semantes dans des affections chroniques.



687

ANYMOTES: Camph. — On l'emploie comme antidute de : Thui.


COMPANER AVEC: Amb. ara. colne. con. ign. lvc. merc. mosch. magu-m.
phos-ac. puls. sabin. thui. — C'est sur out après thui, que staph. fait du
bien, lorsqu'il est d'ailieurs indiqué.

CLIMIQUE. — Se laiseant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Suites fâcheuses d'une contrariété, avec dépit et indignation, ou d'un chagrin avec inquiétude; Faiblesse nerveuse par suite d'onanisme; Souffrances par abus du mercure; Affections scrofuleuses et scorbutiques; Blessures par des instruments tranchants; Affections carcinomateuses?; Inflammation, ramollissement, ulcération et autres affections des os; Éruptions croûteuses; Fièvres intermittentes, avec affections scorbutiques; Hystérie; Hypocondrie; Teigne; Prosopulgie; Blépharophthalmie; Polypes au nez et aux oreilles; Stomacace et affections scorbutiques des gencives; Odontalgie; Affections gastriques et bilieuses; Gastralgie; Dyssenterie. Dysurie; Cancer de la matrice?; Goître?; Sciatique?; C'oxalgie, avec tendance à la suppuration?, etc., etc.

Poy. la note, page 15.

STRIPTORIES GERÉRAUX. — *Traction paralytique dans les articulations, surtout pendant le mouvement ou une fausse position de la partie. — Déchirements tractifs dans les muscles, surtout en étant assis. — Lancinations aigués, pénétrantes, profondes, à différentes parties. — Crampes dans les membres. — *Inflammations douloureuses des os. — *Gonflement des os. *Paralysie semi-latérale, après s'être mis en colère. — Acces d'évanouissement. — Sensibilité douloureuse de tous les muscles, au toucher, et des articulations en les faisant jouer. — Courbetture et lassitude excessire, surtout pendant le mouvement, améliorées en étant assis ou couché. — Besoin continuel de rester couché. — Grande fatigue le matin, de bonne heure, avec roideur de toutes les articulations. — Après la sieste, obnubilation. et pesanteur dans les membres.

Pean. — Fourmillement, comme par des insectes, par tout le corps. surtout le matin. — *Eruptions miliaires, chroniques, quelquefois avec tressaillements convulsifs la nuit. — Eruptions de nodosités pruriantes, suintantes, avec douleur brûlante. — Eruptions dartreuses, avec prurit, le soir, et sensation brûlante après
s'être gratté. — *Dartres sèches, croûteuses, aux articulations.
- *Engorgement et induration des glandes. — *Pean maladive.
suppurant facilement. — *Furoncles fréquents. — Ulceres avec
élancements déchirants ou cuisson pruriante. — Tressoille-



ment et déchirement autour des ulcères, surtout le soir et le matin.

Bommeil. Forte envie de dormir le jour. — Pandiculations et bûillements violents, qui font venir les larmes aux yeux. — *Sommeil tardif par affluence d'idées, ou à cause d'un prurit et d'une sensation brûlante dans les dartres et les ulcères, ou de douleurs violentes dans les mollets — Tressaillement des membres, en dormant. — Sommeil agité, avec rêves inquiets et

réveil fréquent en sursaut. — *Rêves lascifs.

Pièvre. Frissons fréquents et horripilation, meme la nuit.
Fièvre le soir, consistant seulement en froid. — Fièvre tierce
avec goût amer, gencives saignantes, anorexie et constipation. —
Chaleur brûlante extérieure, avec bouillonnement de sang et soif.

La nuit, chaleur ardente dans les pieds et les mains, qui force
à les découvrir. — Forte disposition à transpirer le jour, même
en étant tranquillement assis, ou bien impossibilité de transpirer,
avec pâleur du visage et mal a la tête. — *Sueurs nocturnes
abondantes, quelquefois arec odeur putride. — Sueur froide au
front et aux pieds.


Horal. Humeur hypocondriaque, avec indifference pour toute chose. - Tristesse avec crainte sur l'avenir. *Pleurs et chagrin sur son état. - *Caractère susceptible. Désir de la mort.

*Mauvase humeur, irascilalité et dépit excessif, au point de jeter violemment tout ce qu'on a sous la main. — Eloignement pour la conversation, la méditation et pour tout travail intellectuel et sérieux. — Fachlesse de la mémoire. — Instabilité des idées. — Esprit excessivement obtus, avec impossibilité de se livrer à un travail quelconque. — Erreurs de l'imagination par des événements du passe. — Illusion, comme si tous les objets qui environnent étaient bas, et que l'on fût beaucoup plus grand.

Tôte. - Tête confuse et embarrassee. - Verliges tournoyants. quelquefois le soir, au lit, ou le jour en étant assis on couche. soulagés en se promenant. — Maux de tête, le matin, au réveil. comme si le cerveau était meurtri. - Douleur étourdissante dans la lite, alternant quelquefois avec terébration. — Pesanteur de la tete, surtout dans le front au-dessus de la racine du nez. - -Pression dans la tete, tractive, dechirante ou lancinante.- Maux de tête comme si le tront allait eclater, en se baissant et en se remuant. — Douleurs de léte compressives ou expansives. Douleur de tête, semi-laterale, comme par un clou enfoncé dans Maux de tête lancinants. - Sensation de vacillement du cerveau. -- Douleurs rhumatismales et tractives a l'extericur de la tete. Prurit fourmillant, quelquefois aussi rongeant, an cuir chevelu, avec douleur d'excoriation. - Production abondante de furfures arec prurit au cuir chevelu. - * Teigno humale, fétide, avec prarit ciolent. - *Chute des cheveux.

658





Year. — Year, comme quand on a sommeil. — Pression dans les yeux, les paupières et les angles. - l'rurit aux bords des panpières. - Prurit et cuisson mordicante dans les angles internes des yeux. — Cuisson et sensation brûlante dans les yeur, en écrivant. -- Lancinations violentes dans les yeux, en les fatiguant. - *Inflammation des yeur, qui sont entoures de boutons. -- *Inflammation du bord des paupières, -- *Nodosités dans le bord des paupières. — Grande sécheresse des yeux. - Mucosités abondantes, purulentes, sèches, dans les angles des yeux. — *Agglutination nocturne des yeur. - - Occlusion spasmodique des paupières. - Diminution de la vue. Fue trouble, comme si on avait de l'eau dans les yeux. Reflets noirs comme des éclairs, et scintillement lumineux devant les yeux. — Étincelles devant les yeux, dans l'obscurité. — Auréole autour de la lumière. le soir.

Oroilles et Nos. — Élancements dans les oreilles. — Éruption derrière les oreilles. - Dureté de l'auïe par un développement plus grand des amygdales, principalement après avoir fait abus du mercure. — Tintement des oreilles. — Nez ulcéré, avec croûtes profondément dans l'interieur. — Fort coryza fluent avec obturation d'un côté du nez, éternument fréquent et larmoiement. — *Coryza avec narines ulcérées. — Obturation des

fosses nasales, avec voix nasillarde.

Vinage. -- *Visage have, pointu, arec year cares, bordés d'un cercle bleu. -- *Visage bleuâtre et brunâtre, en se mettant en colère. -- *Douleur faciale pénible, pressive et buttante, depuis les dents jusque dans l'œil. -- Inflammation des on de la face, avec élancements brûlants, ou tractions incisives et déchirements pressifs. -- Éruption faciale, avec prurit et élancements. -- Lèrres courertes d'ulcères et de croûtes, avec douleur brûlante.

*Gonflement des lèvres. - Luxation facile de l'articulation de la machoire. *Gonflement douloureux et induration des

glandes sous-maxillaires.

Donts. — *Odontalgie, avec gonflement des jones et des glandes sous-maxillaires. — *Odontalgie, unmédiatement après le repas et la mastication, comme aussi après les boissons prondes et l'introduction de l'air froid dans la bouche, la nuit ou le matin. principalement. — *Déchirements et tractions pressives dans les dents cariées, ou dans les racines de celles qui sont saines ainsi que dans les geneives — *Douleur rongeante dans les dents cariées. — Noireeur, ebrechement et carie des dents. — Sensibilité douloureuse, gonflement et saignement facile des geneires — *Nodosités et exernissances douloureuses aux geneires. — Geneives pâles, blanches, ulcerces.

Bouche. — Bouche et langue couvertes de vésicules. - "Excroissances doulourcuses à l'intérieur de la joue. — Ulcères dans la bouche. — Salivation. - Salive sanguinolente. Gonflement



des glandes sous la langue.—Élancements sur la langue, comme par des échardes. — Parole abattue par faiblesse des organes de la parole.

Gorge. — Apreté dans la gorge et grattement, avec sensation d'excoriation, en avalant et en parlant. — Déglutition continuelle, en parlant. — Sécheresse et élancements dans le palais et la gorge. — Gonflement des amygdales. — Tiraillement douloureuz de-

puis l'arceau hyoide jusque dans la gorge.

690

Appétit. — Goût fade et aqueux, avec goût normal des aliments. — Goût amer de tous les aliments. — Goût aigre du pain. — Appétit avec insipidité des aliments. — *Faim vorace. — *Boulimie, même après le repas, quelquefois avec pituites de l'estomac. — *Grand désir de lait. — Le tabac a un goût piquant, et donne des pyrosis. — *Appétence seulement pour les aliments

liquides. - *Désir excessif du vin et du tabac.

Estomac. — *Renvois, généralement à ride ou grattants. — *Renvois amers, après des aliments acides. — *Renvois salés et amers, après avoir mangé de la riande. — *Renvois sanglotants. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. — Nausées avec envie de vomir, tous les matins. — *Nausées fréquentes. — *Pression à l'estomac, comme par un fardeau, le matin, au lit. — *Tension et pression dans l'estomac, aggravées ou soulagées en mangeant, surtout du pain. — Plénitude, pression et élancements dans le scrobicule. — Douleur fouillante à l'estomac. — Tension anxieuse à travers les hypocondres, le matin, avec gêne de la respiration.

Ventre. — Pression tensive dans le ventre. — «Ventre gros, chez les enfants. — Traction au travers du ventre. — Sensation de faiblesse dans le ventre, comme s'il allait tomber — Tranchées après tous les aliments ou toutes les boissons. Tranchées crampoïdes, avec envie d'aller à la selle. — Production abondante et incarcération de flatuosités. — Expulsion fréquente de vents chauds ou fétides. — *Gonflement des glandes inguinales. —


*Hernie inguinale, vaussi à la suite d'un effort.

Selles. — *Constipation. Dureté des selles. — Envie fréquente d'aller à la selle, avec évacuations peu abondantes, dures, ou bien selles molles. — Selles tardives sans être dures. — Évacuation difficile. — *Selles dyssentériques, précédées, accompagnées et survies de ténesme et de tranchées. — *Selles diarrhéiques, avec expulsion fréquente de vents fétides. — Évacuation involontaire d'une selle liquide. — Pendant la selle, tranchées brûlant s. pression et constriction à l'annes.

Urines. - *Besoin très-fréquent d'uriner, avec émission goutte à goutle, ou en un jet mince, d'une urine foncée. — Émission d'urine excessivement douloureuse. — Émission fréquente d'une urine claire, aqueuse. — Émission fréquente d'une urine ronge.

Emission d'urine involontaire, en toussant. Après avoir





uriné, nouvelle envie comme si la vessie était encore pleine. **Sensation brûlante dans l'urèthre,** surtout en urinant.

Parties viriles. — Excreissances molles, humides sur et derriere le gland. — Inflammation des testicules, avec élancements brulants on traction premive et déchirements. -- Exaltation prononcée de l'appétit rénérien, avec érections fréquentes surtout la nuit. - Prurit voluptueux au scrotum, qui provoque l'éjaculation. - Pollutions fréquentes, même pendant la sieute. - Après le cott, dyspuée. - Reculement de liqueur prostatique, pendant une selle dure.

Règles. — Sensibilité douloureuse des parties génitales. — Cuisson

et prurit lancinant à la vulve. Règles trop hâtives.

Larynx. -- *Enrouement. - avec accumulation de mucosités adherentes dans le larynx et sur la poitrine.— Sensation de pression et contraction dans la forsette du con, après s'être mis en colère, aggravée par la déglutition. -- · Apreté dans le larynx, après aroir beaucoup parlé. - *Toux sèche, creuse, provoquée par au chatonillement dans le larynn, -- Tima riolente, avec expertoration de mucosités visquenses, le soir, après s'être couche. -*Toux. arec expectoration purulente, jaune, surtout la muit. Expectoration de sang, en toussant. - Pendant la toux, douleur


dans la poitrine, comme par ulcération.

Pelitrine. — *Premion à la poitrine, avec pesanteur dans cette partie, en étant assis, soulagée en marchant. — *Oppression contractive et grande agitation dans la postrine. - Lancinations dans la poitrine. -- Douleur d'excoriation et d'ulcération dans la goitrine. -- Crampe dans le diaphragme, après s'être mis en colère. — Battement de cœur tremblotant, au plus léger mourement, et à la moindre fatigue intellectuelle, comme aussi en écontant de la musique, et apres la sieste. - - Éruption miliaire sur la poitrine, avec rougeur et prurit à la chaleur. - Eruption

dartreuse sur les dernières côtes, avec prurit brûlant.

Trans. — Douleur de brisement aux reins, ou sensation comme se Pon s'était donné un tour de reins, surtout dans le repos, et prin*ripalement la nuit et le matin. --* Douleurs aux reins en se Jevant de son siège, ou en se retournant dans son lit. - Lancinations violentes qui remontent le dos. - "Abcès dans le muscle loubaire. - Pression tractice, thumstismale, et tension dans la *nuque, arec roideur. —* Faiblesse des muss les de la nuque et du con. Eruption de boutons pruriants à la nuque. #Gonflement des glandes au cou, à la nuque, et sous les aisselles. - Lancination юпи les aisselles.

Bras. — Pression sur les epaules. — Roideur de l'articulation de l'épaule, le matin. - Douleur ortéocope dans les bras, pendant le monvement. - Traction pressive, paralytique, et déchirements lancinante dans les bras et les avant-bras, les épaules, les mainet les doigts. -- Pression douloureuse dans l'os du bras. - Dartres



STICTA PULMONARIA STRAMONIUM.

sur les mains. — Torpeur du bout des doigts. — Déchirement, tressaillement dans les doigts, surtout dans les bouts. — Nodo-sités arthritiques aux articulations des doigts. — Crampes dans les doites de la difference de la la la difference de la la

les doigts. - Monvements convulsifs des doigts.

692

Jambes. — Roideur de l'articulation coxo-fémorale, le matin. — Faiblesse douloureuse des cuisses et des jambes, et surtout de l'articulation du genou. — Douleur de brisement dans les cuisses, en marchant. — Dartres pruriantes aux cuisses et aux jambes. — Élancements tractifs dans les genoux et leurs articulations. — Tractions et déchirements pressifs sur le tibia et dans les os des pieds. — Crampes nocturnes dans les mollets et la plante des pieds. — Gonfiement du cou-de-pied. — Gonfiement des os du métatarse. — Prurit brûlant aux orteils, comme s'ils avaient été gelés

STICTA PULMONARIA.

STICT. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Co médicament, dont nous ne possédons également, jusqu'ici, que des pathogénésies par trop fragmentaires pour être rapportées, a été pourtant, quoique empiriquement, employé avec beaucoup de succès contre des Catarrhes bronchiques, des Grippes et des Toux catarrhales, surtout lorsque ces affections se distinguaient par les caractères suivants : séchereses excessive des muqueuses du nex, de la gorge, du pharynx et de la poitrine, augmentant principalement le soir. — Chez les phthisiques, ce médicament paraît, mieux qu'aucun autre, apaiser la toux fatigante.


STRAMONIUM.

STRAM. — Pomme épineuse. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmoc. homosop, p. 281. — Dose unitée : 80. — Durée d'action : 24 heures.

ANTIDOTES : Accium, citr ac. n-vom, tabac acides végétaux. - On l'emploie comme antidote de 2 Merc. plumb.

COMPARER AVEC. Acon asar bell, bry, camph, canth, carb-v. cham. cooc. hell, hep. hyos. merc. mosch n-rom, op. plamb. puls. rut. stann. versir. sinc.

CLINIQUE .- Se laissant guider par l'ensemble des symptômes.



STRAMONIUM.

693

en verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: Convulsions, accès d'épilepsie, danse de Saint-Guy, catalepsie et autres affections spasmodiques, surtout à la suite d'une frayeur, ou de la respiration de la vapeur du mercure; Affections à la suite des morbilles; Fièvres typhoides; Imbécillité; Delireum tremens, surtout par l'abus de la bière; Manie; Hydrophobie; Nymphomanie des femmes en couches; Encéphalite; Hydrocéphale; Hoquet convulsif; Crampe de poitrine, etc. petc.


Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GERERAUX. — Douleurs crampoldes, tractives. paralytiques dans les muscles et les articulations des muscles. — Sensation comme si les membres étaient séparés du corps. 🧸 Crampes contractives dans les membres. — Fourmillement dans les membres. — Contraction et extension lente des membres. -*Accès de crampes de diverses natures. Tétanos. — Renversement du corps. — Crampes et autres souffrances hystériques. — Roideur et contractions de quelques membres. — *Accès de roideur cataleptique du corps, avec perte de connaissance, précédées de maux de tête, avec vertige. - Mouvements faciles *des membres*, ou grande pesanteur de ces parties. — *Convulsions qui rememblent à la danse de Saint-Guy. — *Tressaillement convulsif des membres, avec pleurs. - *Moncements convulsifs et tressuillements, surtout au toucher ou en fixant les yeux sur des objets brillants (une lumière, un miroir ou de l'eau), ou bien apparaissant périodiquement. — • Conrulsions, comme dans l'épilepsie, mais sans perte de connaissance. — Accès d'évanouissement, avec ronflement. -- Tremblement des membres. -- Chancellement des membres en marchant et en se tenant debout. -Paralysies, quelquefois après une attaque d'apoplexie. blesse, avec besoin d'être couché. — Suppression de toutes les Bécrétions et corrétions.

Semmeil. — Forte envie de dormir, le jour. *Sommeil profond, arec ronflement, cris et hurlement. Somnolence comaleuse, avec physionomie ridiculement solennelle, au réveil. — Sommeil agité, avec rèves vifs. *Position agenouillée dans le lit, et sursauts au moindre attouchement, avec cris et gestes d'un fou.

Fièvre. - Froid de tout le corps, surtout des membres, avec frisson grelottant et tressaillement général. Froid aux mains et aux pieds, avec rougeur de la face. Chaleur arec anciété et rougeur des joues, ou bien avec soif et vomissements. — Chaleur à la tête d'abord, puis froid général, suivi de chaleur et de soif. — Pouls petit, accéléré. - Sueurs fréquentes, abondantes, même la nuit.

Moral. — Melancolie. — Tristeme, avec angoisse mortello et pleurs abondants, surtout le soir, au lit. — Angoisse de conscience.



STRAMONIUM.

Humeur inconsolable et irritation facile pour des cétilles. – Grande activité et promptitude des mouvements. — Opiniatrete et entétement. — *Rire aux éclats, alternant avec emportements colériques, ou avec gémissements. — Hurlements et gémissements. - Murmures ou cris continuels. - Fureur indomptable, envie de mordre, de donner des coups et de tuer. - Tantôt grande indifférence pour les affaires, tantôt crainte d'être inca-pable de s'en acquitter. — *Envie de s'enfuir. — *Désir de société, de lumière et de la clarté du soleil, parce que l'obscurité et la solitude aggravent l'état moral. — *Après l'équinoxe d'automne, l'etat moral est aggravé. -- Perte de la mémoire. ment de tous les sens, et insensibilité aux influences extérieures. *Etourdissement, avec agitation intérieure. - *Délires, généralement effrayants, acec rision de fantômes qui font peur. Perte de connaissance, au point de ne plus reconnaître les siens. Idée fixe; il semble que le corps soit coupé par moitié. — Erreurs de l'imagination, comme si tout ce qui entoure était très-petit, et que l'on fût très-grand et très-élevé. - *Dicagotions, avec idées extraordinaires. — *Aliénation mentale, avec prières et gestes pieux (prières, chants, air dévot, etc.).—*Manie, généralement avec fictions inépuisables de l'imagination. loquacité lascive, entretien avec les esprits, importance affectée. danses, rire, -et coups ou bouffonneries ridicules, alternant constamment avec gestes tristes et sérieux. Aliénation mentale et délire furibond à la suite d'un érysipèle à la face.

Tête. — Ivresse et étourdissement.—Vertige, avec étourdissement ot chancellement, ou avec obscurcissement des yeur et mal de tête.—Mal de tête, arec obscurcissement des yeux et dureté de l'oute. — Sensation pénible de légèreté et de faiblesse dans la tête. — *Douleurs de tête pulsatives, au vertex, avec accès d'évanouissement. — Congestion de sang à la tête, avec chaleur. — *Renversement et mouvements convulsifs de la tête. – On sou-

lève souvent la tête en étant couché.


Yeux. — Yeux rouges et gonflés. — Pression et tension dans les yeux et les paupières. Inflammation du bord des paupières. — Paupières ulcérées. — Yeux larmoyants. — Agglutination nocturne des yeux. - *Yeux fixes, étincelants. - Regard vague, triste. Paralysie et occlusion spasmodique des paupières. -- Year convulsés.-*Pupilles dilatées et insensibles. Obscurcissement de la rue. - Cécité passagère. - Myopie. - Diplopie. - Vue indistiucte, embrouillée. - Amblyopie. - Confusion des caractères en lisant. - Erreurs de la vue ; les objets semblent être de travers ou colorés. — Illusions de la rue.

Oreilles et Nes. - Il s'échappe du vent par les oreilles. - Surdité. - *Obturation du nez. - Eternument spasmodique.

Face et Dents. - Air d'hébétude et d'égarement, avec gestes craintifs. - Distorsion douloureuse des traits du risage - Vi-

694





STRAMONIUM.

sage sillonné de rides profondes. — *Fuce bouffie, gorgée de sang, quelquefois avec physionomie d'un niais. — *Rougeur circonscrite des joues. — *Face rouge foncée, "ou très-pâle. — Érysipèle d'un seul côté de la face et du nez. — Lèvres sèches et collant ensemble. — Raie jaune sur la partie rouge des lèvres. — Frémissement des lèvres. — Distorsion de la bouche. — Grincement des dents. — Odontalgie pulsative, comme si les deuts allaient tomber.

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Salivation abondante. Écume sanguinolente à la bouche. — Crachement de sang. — *Langue gonfiée, paralysée.—*Bredouillement et bégayement. — Murmures continuels. — *Perte complète de la parole.

Gerge. — *Constriction spasmodique de la gorge. — *Déglutition génée, — avec élancements dans la gorge, ou avec pression dans les glandes sous-maxillaires. — *Déglutition empéchée, quelquefois par séchereme dans la gorge.

Appétit. — Perte du sens du goût. — Les aliments n'ont qu'un goût de sable ou de paille. — Amertume continuelle dans la bouche, avec goût amer des aliments. — Soif ardente, généralement avec horreur de l'eau et de tous les liquides.


Brieman. — Renvois avec goût aigre. — Vomissement aqueux, avec coliques et diarrhée. — Vomissement de mucosités verdâtres ou d'odeur aigre. — Vomissement de bile verte, après un léger exercice. — "Hoquet convulsif. — Douleur d'estomac, avec sensation cuisante ou pressive. — Grande anxiété dans le creu.c de Pestomac, avec gêne de la respiration. — (Inflammation de l'estomac.)

Ventre. - Ventre douloureux au toucher. - Ventre ballonné, dur, tendu. — Douleur de brisement dans le ventre pendant le mouvement. — Déchirements violents dans le ventre, comme si ou arrachait l'ombilie. — Crampes abdominales, hysteriques. Gonfrement des glandes de l'aine. -- Borborygmes et fermentation dans le ventre. — Expulsion abondante de flatuosités.

Selles et Urines. — *Constipation. — Ténesme. — Selles fetides. d'odeur cadavéreuse. — Diarrhée avec douleurs et borborygmes dans le ventre. — Écoulement de sang coagulé par l'anus. - *Suppression de la sécrétion des urines. — Émission d'urine goutte à goutte, avec besoin fréquent. — Émission involontaire des urines. — (Flux d'urines.)

Parties génitales. — Lascivité. — Impaissance. — Pollutions sanguinolentes. — Règles plus abondantes, avec écoulement d'un sang noir, en grosses masses coagulées. — Métrorrhugies. — Pendant les règles, fétidité lascive du corps, grande loquacite tiraillements dans le ventre et les cuisses. — Après les règles, sanglots et gémissements.

Poitrine. — Voix haute, criarde. — Manque d'haleine. — Respiration difficile, suspirieuse. — Étouffement suffocant de la res-



696 STRAMONIUM. STRONTIANA CARBONICA.

piration. -Oppression constrictive de la poitrine. -Pression dans la poitrine provoquée par la parole. - Sensation comme si quel-

que chose se retournait dans la poitrine.

Trono et Membres. — Douleur de brisement dans le dos, pendant le mouvement. — Traction et déchirement dans le dos et aux reins. — *Renversement du dos. — *Mouvements convulsifs des bras, par-dessus la tête. — Douleur contractive dans le bras, avec lancinations aiguës dans l'avant-bras. — *Distorsion des mains. — *Poings fermés — Crampes dans les mains. — *Tremblement des mains. — Engourdissement des doigts. — Tressail-lement dans les jambes, comme par une secousse, avec rétraction de ces parties. — Tractions dans les cuisses. — Fléchissement des jambes en marchant. — *Tremblement des pieds. — Crampes contractives dans les pieds.

STRONTIANA CARBONICA.


NTRONT. — Carbonate de Stroutiane. — HARTLAUB et TRIMES. — Hist. nat. et prép. Voy Pharmac. homosop., p. 144. — Dose nvitée : 30 — linree d'action : 40 jours environ dans des affections chroniques Antidote : Camph. Comparen avec : Merc. plat.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre un cas de Gastralgie,

symptomes généraux. Déchirement dans les membres et surtout dans les articulations, plus violent le soir et la nuit, au lit. — Immobilité des membres, d'un seul côté, comme par paralysie, le soir. — Amaigrissement excessif. Tremblement des membres. La plupart des douleurs, dont il est difficile de déterminer le siège, semblent être dans la moelle des os (?). — Les affections augmentent insensiblement jusqu'à une certaine intensité et diminuent de la même manière. — Prédominance des symptômes d'un seul côté du corps. Au grand air, principalement à la chaleur du soleil, comme à la chaleur en général, on se trouve mieux. — Grande lassitude et abattement, le matin et le soir.

Peau. -- Tension de la peau à diverses parties, le soir, en étant au lit. -- Éruption de petits boutons à diverses parties, avec prurit brûlant, surtout après avoir gratté.

Sommeil. Sommeil tardif. Tressaillement dans le corps et sursauts en s'endormant. - Réveil fréquent la nuit. surtout à



STRONTIANA CARBONICA.

697

cause d'une toux sèche. — Sommeil avec affinence de réves fantastiques.

Fièvre. — Frissons, le matin et le soir. — Chalcur qui vient du nez et de la bouche, avec soif. — Chalcur sèche, la nuit. — Sueur abondante la muit, et en découvrant un membre, douleur immédiate à cette partie! — Sueur des parties affectées.

Maral. — Inquiétude et angoisse. — Humeur chagrine, avec disposition à s'emporter et à se mettre en colère. — Oubli excessif.

Tôte. — Mal de tête avec nausées et vertige. — Pression pénible dans le front. — Céphalalgie tensire, comme si la peau était tirée vers le vertex, ou comme si tout se poussait vers le dehors. — Mal de tête lancinant. — Résonnement dans les tempes, le soir. — Sensation de chaleur ardente dans la tête et à la face, l'aprèsmidi, en marchant, avec rougeur de la face, angoisse et envie de dermir.

Yeur. — Sensation brûlante dans les yeur. — Pression sur la partie supérieure du globe de l'œil. — Fort tressaillement et frémissement des paupières. — Cercles rouges et bleus devant les yeur. après les avoir frottés, avec pression comme par du sable. — Scintillement devant les yeur. — Taches vertes devant les yeur. dans l'obscurité.

Oreilles, Nez et Face. — Déchirements dans les oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles. — Frémissement d'un seul côté du nez. — Monchement de croûtes sanguinolentes. — Rougeur de la face, avec chaleur brûlante. — Prurit à la face. — Tressaillement, déchirement et térébration dans les pommettes.

Dents. - Odontalgie, avec douleur tressaillante. — Déchirement dans la racine des dents. — Arrachement dans les dents, précédé d'une accumulation abondante de salive. - Gencives gonflères.

douloureuses au toucher.

Benche et Gerge. — Sensation de torpeur et sécheresse de la bouche, le matin, sans absence de salive. — Apreté et sécheresse de la gorge. Inflammation du palais, avec douleur pendant la déglutition.

Appétit. — Goût de terre dans la bouche. — Forte soif surtout de bière. — Appétence seulement pour le pain bis. — Faim après le diner.

Estemac. - Nausées, avec chaleur brûlante de la face. - Hoquet violent. - *Pression à l'estomac, avec sensation de plénitude dans le ventre, surtout après le repas.

Ventre. — Ventre tendu et douloureusement ballonné. — Colique dans la région ombilicale. — Tranchées, avec diarrhée et frissons. — Lancinations dans les flancs. — Grondement dans le ventre, avec expulsion abondante de vents très-fétides.

Solles. - Selles tardires, dures, noncuses, s'évacuant seulement avec des efforts et de grandes douleurs. - Diarrhée d'une cau jaune, avec tranchées et pincoments dans le ventre. -- Sensation



STRONTIANA CARBONICA. SULFUR.

694

brulante a l'anus, pendant et apres la selle — Douleurs des boutons hémorrhoïdaux du rectum.

Urines - Règles Secretion d'urme dimunuée. Secrétion plus abondante d'une urme jaune fonce. - Emission d'urine, la nuit - Urine pale, avec forte odeur d'ammoniaque - Règles en retard, d'abord sereuses, puis en cuillots.

Poltrine. - Enrouement et aprete dans la gorge, qui provoquent la toux. Toux seche provoquee par une irritation dans la trachée-artère, aggraves la nuit. Dyspace en marchant, avec ardeur au visage. - Pression a la poitrine - Douleurs tractivés dans les muscles de la poitrme. — Battement de cœur.


Trono et Membres. — Douleur de brisement aux rems et dans le dos. Douleur tractive dans le dos et la region lombaire - Déchirements dans les bras, les mains et les doigts, surtout dans les articulations Torpeur presque paralytique des avant-bras et des mains. - Traction paralytique dans les jambes. Tressaillement des jambes. Tressaillemenes et dechirements dans les jambes, les pieds et les orteils, surtont dans les articulations. - Gonflement des pieds

SULPUR.

SULF. - Soufre - HANNEMANN - Hist nut et prep Voy Pharmac. homozop., p. 148. - Dozes unitees 0, 30 - Darce duction 38 a 40 Jours dans les maladres chroniques, et meme plus longtomps
ARTHOTES Acon camph cham chin orer, n vom, puis, sep. — On l'em
plute comme autolote de : Chin 10d merc, attr ac ritus, sep


COMPAREN AVE. Acon some ant are bar bett bev cate can't can't caus, them this coff con enpr date graph ign not spec but the magn magn magn mere has widen, no no neon phos ac puts thus suns seneg, sep all sulf as versit — Lest surfoit a res. I on all cupr. med mir ac. n com puls, et chus que e saufre est efficie co squ' l'est d'ailleurs indiqué. - Après le soufre convicament quelq refins dem bett cate cupr. mere utr-ue n-rom puls rhis see ad

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ex médicament contre 💝 Affections principalement des personnes d'une constitution lymphatique, disposées à des éruptions, des dortres, des glandes engargées, etc., etc., ou bien de constitution bilieuse, avec d'aposition aux hémorrhoides, à l'hypocondrie et à la mélancolie ; on bien encore de constitution faible et leucephlegmatique, ou épuisée, avec teint maladif, disposition aux blennorrhagies, a des refroidissements, des sueurs faciles et abondantes, des rhumes de cerveau et des diarrhées avec coliques; Souffrances par l'abus du



499

cine on du mercure et d'autres poisons winéraux ; Souffrances par suite d'un refroidissement au rent (courant d'air), ou dans l'eau : Souffrances périodiques et intermittentes : Arthrite et rhumatisme» aigus et chroniques, avec ou sans gondement; Arthrite vague; Arthrocace; Hydrarthre; Rhumatisme articulaire; Inflammations locales chroniques ; Accès de spasmes et de convulsions, même pendant la dentition; Epilepoie; Faiblesse nerreuse par suite d'onanisme, ou d'autres pertes débilitantes, ainsi que par l'excès de l'étude et des reilles prolongées; Faiblesse musculaire, avec marche mal assurée, corps courbé, ou difficulté (pour les enfants) d'apprendre à marcher ; Tremblement des membres, même chez les ivrognes; Paralysie, principalement par faiblesse; Atrophie des enfante scrofuleux et des personnes épuisées; Affections à la suite d'un tour de reins, ou d'autres lésions mécaniques; Ictère; Chlorose ; Cachezie par l'abus du quinquina ; Affections hydropiques : Supparations; Inflammation, engorgement et supparation des glandes, et autres souffrances scrofuleuses et rachitiques; Gon-Sement, inflammation et autres maladies des os; Dartres milinires et croûtenses; Eruptions chroniques, éruptions après la vaccination; Gale, et suites facheuses d'une gale ou de dartres réperentées; Taches hépatiques; Sugillations et autres souffrances à la suite d'une contusion : Taches de naissance : Anévrismes : Verrues; Engelures; Morbilles et affections à la suite de cette maladie; Scarlatine (maligne) et affection provenant de la répercussion de l'éraption; Petite vérole (période d'éraption); Inflammations erysipélateuses; Excoriations; Rhagades; Ulcères (même ceux par l'abus du mercure); Ulcères fistuleux; Tumeurs enkystees. Abeès; Somnambulisme nocturne; Fièvres inflammatoires, avec affections gastriques et nerveuses; Fièvres typhoides; Fièvres iutermittentes; Fièvres hectiques; Melancolie; Exaltation religiouse et philosophique; Manie; Fatigue de la tête, ou meme alienation mentale, par excès d'étude; Hypocondrie; Hysterie; Imbécillité: Congestion cérébrale, Céphalalgies rhumatismales, catarrhales, nerveuses, etc.; Migraine; Céphalalgies des onvriers en métaux; Encéphalite?: Teigne: Chuté des chereux, même après de graves maladies aigués, chez les femmes en couche, par suite de frequentes migraines, etc.; Ophthalmies scrofulenses, traumatiques, catarrhales, etc.; Obscurcissement et ulcères de la cornéc; Bléphorophthalmie; Amblyopie amaurotique; Myopie; Presbyopie; Cataracte; Dureté de l'onte; Otorrhée purulente; Inflammation flegmoneuse du nez; Coryza sec on fluent, aigu ou chronique; Hémorrhagie nasale; Érysipèle à la face; Croûte de lait et autredartres faciales: Ephélides?; Cancer des lèvres?; Inflammation des geneives; Odontalgies rhumatismales ou congestives; Dentition difficile, avec disposition any convulsions; Aphthes dans la bouche: Salivation par suite de l'abos du mercure: Angines catarrhales, chroniques; Souffrances gastriques; Dyspepsie avec




700

augreurs, pyrosis et vomissement des aliments; Blennorthée gastrique; Anorexie opiniatre; Gastrulgies; Penchant à l'irrognerie; Affections hépatiques chroniques; Gonflement et induration du foie; Ictère: Carreau; Coliques spasmodiques, flatulentes et hémorrholdales: Ascite; Entérite?; Peritonite?; Hernies qui sortent facilement; Hernies incurcérées (après l'usage de l'aconit); Bubons scrofuleux et mercuriels; Constipation opiniatre ou disposition à la diarrhée; Diarrhées muqueuses; Dyssenteries; Lientéries?: Chute du rectum; Affections vermineuses; Hémorrhoides arengles on saignantes; Suites facheuses de la suppression du flux hémorthoida); Ischurie; Dysurie; Diabete?; Hématurie?; Incontinence d'urine chez les enfants (pissement au lit); Uréthrite?; Gonorrhée secondaire; Blennorrhée de la vessie?; Fistule urinaire: Rétrécissement de l'urèthre?; Inflammation et phimosis du prépuce, Gonorrhée bâtarde: Induration des testicules?; Hydrocèle?: Impuissance ; Faiblesse des parties génitales par suite d'onanisme : Ménostase, Dysménorrhée; Coliques menstruelles; Métrorrhagie?: Sterilite?; Abortus?; Flueurs blanches; Chlorose; Excoriation. inflammation et ulceration des mamelles; Induration (et cancer?) des mamelles: Exceriation, constipation, aphthes, et ophthalmie des nouveau-nés; Catarrhe pulmonaire, avec enrouement, même à la suite des morbilles; Catarrhes invétérés; Blennorrhée des poumons chez les vicillards; Grippe: Aphonie; Toux catarrhale. spannodique, nerveuse, etc.; Coqueluche?; Hémoptysie; Souffrances asthmatiques; Pueumonie chronique; Phthisie; Mal de poitrine à la suite d'efforts ou d'un tour de reins; Affections du cœur; Maux de reius; Distorsion rachitique de la colonne vertebrale: Tremblement des mains, même chez les ivrognes; Rhagades aux mains; Panaris; Coxarthrocace?; Coxalgie; Luxation spontanée; Gonite arthritique ou rhumatismale; Tumeur blanche?: Goutte aux mains et aux pieds; Ulcères aux jambes; Inflammation érysipélateuse des pieds on des jambes, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs vives ou tractives *ou élancements dans les membres, principalement aux articulations, et quelquesois avec manque de force, roideur et sonsation de torpeur dans les parties affectées. — *Douleurs de luxation, tension comme par raccourcissement des tendons, crampes et contraction dans plusieurs parties. — *Craquement dans les articulations, principalement du coude et du genou. — Gonstement instammatoure des articulations, avec chaleur et rougeur. — *Fourmillement dans les membres, principalement dans les mollets et les bras. — *Disposition des membres à s'endormir facilement. — *Palpitations musculaires. — *Tressaillements et secousses dans certaines parties ou dans tout le corps, principa-




20.1

lement étant assis, ou couché. . * Arcès de apasses. .. * Conrulsions épileptiques, "provoquees par quelque frayeur ou en courant. Fet quelquelois avec cris, enroidissement des membres, serrement des dents et sensation comme si une souris, parcourait le des on les bras. — * Acrès d'économissement, veu de malaise hystérique ou hypocondriaque, quelquefois avec vertiges, vomissement et sueur. - *Tremblement des membres, principalement des mains. — Sensation de tremblement dans l'interieur du corps. - Accès d'inquiétudes dans tout le corps, qui ne permettent pas de rester assis, avec b-soin d'étendre et de contracter alternativement les membres. — Fort bouillonnement de song, quelquefois avec chaleur brûlante aux mains. - Grand épuisement, avec *grande fatigue après la moindre conversation et la promenade la plus courte, besoin de rester toujours assis, et sucurabondantes, même en étant assis, en lisant, en mangeant, en étant couché et en se promenant. - La sensation de fatigue se dissipe quelquefois par la marche. - Faiblesse musculaire, principalement dans les genoux et les bras, ainsi que dans les jambes. avec marche mal assurée. — *Murche courbé. — Amaigrassement extraordinaire, quelquefois avec faiblesse, fatigue et sensation brûlante aux mains et aux pieds. *Grande sensibilite au grand air et au rent, avec douleurs dans les membres aux changements de temps, disposition à so refroidir facilement, et beaucoup de souffrances par l'effet du grand air. - Ce sont principalement les affections de la tête et de l'estomac qui s'aggravent au grand air. — La plupart des affections s'oppracent ou apparaissent la nuit ou le seir, ainsi que dans le repos, cu restunt debout, et en s'expisant ou froid; elles disparaissent en marchant et en remuant la partie malade, ainsi qu'à la chaleur de la chambre; mais la chalcur du lit rend les douleurs auxturnes insupportables. - *Plusieurs souffrances apparaissent

périodiquement, ou par intermittence. Peau. - *Prurit à la peau, même de tout le corps. plus vielent la nuct, on le matin, au lit, et souvent avec douleur d'execriation. chaleur, démangenison, ou saignement de la partie que l'en a grattés. - *Eruptions comme celles qui suivent quelquefois la vaccine. - *Eruption* et dartres cronteuses, de confeur jame verdâtre, provenant de petites phlyctènes pruritenses à auréole rouge. — Taches dartreuses, rouges, irregulieres, furfuracées. ou convertes de petites phlyctènes suintant une lymphe sérense.

- *Éruptions galcuses. *Écuptions miliaires, principalement aux extremités. — *Urticaire *Prurit brûlant des éraptions -- *Taches hépatiques, de couleur jaune ou brunâtre. "Inflowmations érysipélaleuses, avec douleurs pulsatives et l'ancinantes - Sugillations, même par la plus legère contusion. - ellougeur vive écarlate sur tout le corps. *Engelures ronges, gontiées et ulcérées, avec prurit à la chaleur de la chambre.



calleuses, principalement autour des doigts. *la peau se gerce facilement, surtout au grand air; gerçures avec douleur d'exciration. — *Desquamation et excoriation de la peau à plusieurs endroits. — Peau maladive; les moindres lésions s'enfiamment et s'ulcèrent. — *Ulcères avec bords élevés, boutons pruriteux aux environs, auréole rouge ou bleuâtre, douleurs vives, lancinantes et tensives, saignement facile et sécrétion d'un pus fétide et sanieux ou jaune et épais. — *Chairs luxuriantes dans les ulcères. — Ulcères fistuleux. — Furoncles. — Tumeurs enkystées; ou etumeurs pâles, tendues et chaudes; abcès inflammatoires *Inflammation, gonflement et induration ou suppuration des glandes. — *Nodosités sur la peau de tout le corps, par gonflement des glandes sous-cutanées, principalement au sein. *Inflammation, gonflement et sensibilité douloureuse des os. *Re-

pugnance pour les lotions.

Sommeil. — *Envie de dormir insurmontable, principalement après midi et le soir, aux lumières.— *Bàillement fréquent.

Sommeil nocturne tardif, *ou insomnie, quelquefois à cause d'une grande affluence d'idées, ou comme par surexcitation.—Sommeil trop léger, *ou agité, avec réreil fréquent, souvent en sursant et avec effroi. —Réveil de trop bonne heure et impossibilité de se rendormir. *Sommeil du matin trop prolongé, ~quelquefois profond et comateux, avec difficulté de se lever le matin.

*Sommeil qui ne délasse point. —*La nuit, douleurs, inquietudes et fourmillement dans les membres, anxiété et chaleur.

coliques, "gustralgie, vertiges, mal à la tête, visions et illusion» des sens, battement de cœur, souffrances asthmatiques, *soif et

faim. — Impossibilité de dormir autrement qu'étant conché sur le dos, la tête haute. — En dormant, agitation et jactation, encousses dans le corps et tressaillement des membres, sursants et effroi, paroles, cris, murmures, divagations, délires, lamentations et gémissements, ronflements, yeux à demi ouverts, coucher sur le dos, les bras sur la tête, cauchemar et somnambulisme.
*En s'éveillant, illusion des sens. "visions effrayantes et peur des revenants. — *Rêces fréquents, fantastiques, anxieux, effrayants et horribles, fâcheux, dégoûtants et agités; rêves de feu, de chiens qui mordent, de beaux habits que l'on possède, de chutes, de périls, de morts; rèves avec pressentiment de ce qui aura lieu le lendemain.

Pièvre. — *Frissonnement, froid, frisson et horripilations, principalement le soir, ou la nuit, au lit, ainsi qu'après midi, et en se promenant au grand air. — Frissons partiels, principalement au dos, à la poitrine, aux bras; *froid aux mains, aux pieds et au nez. — Pendant les frissons, pâleur ou chaleur de la face, mal a la tête, et quelquefois chaleur passagère. — *Accès fréquents de chaleur fugace. — *Chaleur, principalement la nuit ou le soir, ou le matin, ainsi qu'après midi, et souvent arec rongeur (circou-

702




703

aux pieds, Trissons partiels, *sueurs partielles, principalement a la tête, au visage et aux mains : fatque et courbature dans les membres, enrouement et toux, anxiete, etc. *Accès fébriles, tant avant qu'après midi, ou le soir, consistant en chaleur qui est précédée de frissons et suivie ou mêlée de sueurs, ou bien en chaleur au risage, suivie de frissons. — *Pendant la fièrre, battement de cœur, délires, faiblesse, obturation et croûtes au nez, et forte soif, même avant les frissons. — Pouls dur, acceleré et plein. — *Sueurs fréquentes et abondantes, le jour et la nuit, le soir et le matin au lit : *sueur facile en travaillant ; sueurs partielles, principalement à la tête, à la nuque, aux mains, etc. : *sueurs acides.

Moral. — *Mélancolie et tristesse, avec idees chagrines, inquiétude sur son sort et sur ses affaires, au point de se trouver excessivement malheureux, de se dégoûter de la vie et de désespérer même de son salut éternel. — *Grande disposition à pleurer, et pleurs fréquents, alternant quelquefois avec rires involontaires. --- *Humeur inconsolable et scrupules de conscience, même pour les actions les plus innocentes. -- *.1cces d'ungoisse, principalement le soir; *caractère peureux et grande disposition à s'effrayer. - Précipitation, inquiétude et impatience. - *Mauvaise humeur, morosité, humeur qu'relleuse, envie de critiquer et répugnance pour la conversation. — "Irritabilité, humeur colère, disposition à se fâcher et à s'emporter. - Grande paresse et-répugnance pour tout travail de corps et d'esprit. - Indécession. maladresse, inadvertance, anthropophobie et ctat d'étourdissement. — Stupidité et imbécillité, avec difficulte de comprendre et de répondre juste. — *Grande faiblesse de mémoire, principalement pour les noms propres. On oublie jusqu'à ce qu'on allait dire. - Grande affluence d'idées, pour la plupart tristes et pénibles; mais quelquefois aussi gaies et méleos d'airs de musique. →*Grande disposition à des réveries religiouses. «1 philosophiques, *avec idées fixes - Divagations. - Manie. avec idée fixe d'avoir toutes choses en abondance, de posséder de beaux effets, etc. — *Delires avec carphologie. Erreurs sur les objets: on prend un chapeau pour un bonnet, un chiffou pour une belle robe, etc.


Tôto. - *Finburras de la tête arce méditation d'ffiede, ou faiblesse et *élourdissement et stupeur, quelquefois avec besoin de se coucher, et principalement le matin, ou le soir, ou en se promenant au grand air, ou en montant. *Vertiges et chancellment, principalement en étant assis, ou après le repas, ou en se promenant au grand air, en se baissant, en marchant, en montant, en se levant de son siège, en étant couché sur le dos, en passant au-dessus d'une cau courante, ainsi que le matin. le soir ou la nuit, et souvent arce nanséen, evanouissement, faiblesse et



764

saignement du nez. --- Mal à la tôte comme par des flatuosités incarcérées, par enchifrènement, ou comme par suite de débauches. — *Sensibilité douloureuse de la tête, et principalement du verter, au moindre mouvement, avec douleur à chaque pas, en toussant, en se mouchant et en mâchant. — *Plénitude, pression et pesanteur à la tête, principalement au front ou à l'occiput. -Tension et contraction douloureuse dans le cerveau, quelquefoiavec sensation comme si la tête était serrée par un bandeau. — *Pression expansive, comme si la tête allait éclater, principalement aux tempes. - Douleurs rives et tressaillantes, ou *tiraillements et élancements dans la tête. — Sensation douloureuse, comme si le cerveau était blessé ou meurtri. - En remuant la tête, le cerveau frappe contre le crâne. — *Congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatures, gloussantes et sensation de chaleur au cerreau. - *Fourmillement, bourdonnement, bruissement et résonnement dans la tête. — *Les maux de tête ne sont souvent que semi-latéraux, ou ils occupent le vertex, ou l'occiput, ou le front au-dessus des yeux, avec besoin de froncer les sourcils, ou de fermer les yeux, trouble de la vue, *inaptitude à la méditation, bourdonnement des oreilles, et nausées avec envie de vomir. — *Maux de tête quotidiens, périodiques et intermittents, apparaissant principalement la nuit, ou le soir au lit, ou le matin, ou après le repas. *Le mouvement, la marche, le grand air et la méditation provoquent ou aggravent souvent les maux de tête - Prurit et boutons à la tête, principalement au *Croûtes au cuir chevelu, sèches, ou épaisses, jaunâtres. avec secrétion d'un pus épais et fétide, mais toujours arec fort prurit - *Froid à la tête, quelquefois seulement à des parties circonscrites. — Sensibilité douloureuse de la racine des chereux et du cuir chevelu, au toucher. — Mobilité du cuir chevelu. -*Chute des cheveux. - Tête penchée, en marchant. - Prurit à la tête, avec impatience.

Youx. -- Pesanteur *et pression dans les yeux et les paupières. avec sensation d'un frottement comme par du sable. — Prurit. *démangeaison et sensation brûlante dans les **yeux, les angles** et les paupières, Douleurs de meurtrissure ou de plaie, et cuisson dans les yeux et les paupières. - *Les douleurs aux yeux répondent souveut jusque dans la tête, et s'aggravent par le mouvement des yeux, ainsi que par la lumière du soleil, qui les augmente quelquefois jusqu'à les rendre insupportables. flammation, rougeur et gonflement de la sclérotique, de la conjonctive et des paupières. -- *Ulcération du bord des paupières. - Pustules et ulcères autour des orbites, jusqu'aux joues. -Rongeur inflammatoire de l'iris. - *('ornée trouble, comme converte de poussière, ou obscurcie, avec dépôt d'une lymphe gristire entre les lamelles. — Taches, *vésicules et oulcères à la cornée. - - Injection des vaisseaux de la conjonctive. - Pupille inégale.



705

ou dilatée et immobile. — Obscurcissement du cristallin. — Nedonité à la paupière, comme un orgelet. —*Larmoisment abondant, surtout au grand air; ou grande sécheresse des yeur. principalement dans l'appartement. — Larmes huileuses. —

*Sécrétion abondante de mucosités aux yeux, le jour et la nuit - Agglutination nocturne des paupieres. — Palpitation et fremissement des paupières. — *Contraction matutinale des paupières. — Tremblement des veux. - *Trouble de la rue, comme par un brouillard, du duvet ou un roile derant les yeux.

*Presbyopie. — Myopie. — Obscurcissement de la vue en lisant. — Eblouissement des yeux, par la lumière du jour. — Scintillement et taches blanches, ou mouches volantes, points et tachemeirs devant les yeux. — Couleur jaune des objets. — *Grande sensibilité des yeux à la lumière, principalement du soleil, et pendant un temps chaud et étouffant. — *Couleur jaunâtre de la *clérotique.

Oreilles. — Prurit aux oreilles. *Douleurs vives ou tractives. ou élancements dans les oreilles, quelquefois jusque dans la tête ou dans la gorge. — Chaleur brûlante, qui sort par les oreilles. — Gargouillement dans les oreilles, comme s'il y avait de l'eau dedans. — *Écoulement de pus par les oreilles. — Furoncle au tragus. — Sensibilité excessive de l'ouie; le moindre bruit est insupportable, et en touchant le piano, on éprouve même des nausées. — *Dureté de l'onie, principalement pour la voux humaine. — *Obturation et sensation d'occlusions des oreilles, d'un seul côté, et souvent en mangeant et en se mouchant. — Tintement, *bourdonnement et bruissement dans les oreilles. quelquefois avec congestion de sang a la tête. — Craquement dans l'oreille, comme si une vessie pleine d'eau eclatait. — *Écorchure derrière les oreilles.

Non. --- Térébration à la racine du nez. Brulement dans les norines. -- *Gonflement inflammatoire du nez, principalement au Inflammation, alcération et croûtes aubout, Tou aux ailes. narines. — Craquement dans le nez, comme si une vessie pleine d'air éclatait. - Ephelides et pores noirs sur le nez. - *Obturation du nez, quelquefois d'un seul côte. -- *Grande sécheresse du nez. - *Corgza sec, ou *coryza fluent, acec sécrétion abondante de mucovites. - - Ecoulement de mucosites brulantes, ou *sécrétion d'un mucus épuis, jaunaitre et prariforme, par les naines. — *Mouchement de sang on de macosités sanguinolentes. - *Saignement de nez, principalement le matin, et quelque bas avec vertiges. — Eternument frequent, même spasmodique, et précédé quelquefois de nauxées. — Odorat exalté ou diminué, et même entièrement perdu. - Odeur d'un vienx coryza, de come brûlée ou de fumée, dans le nez.

Visage. - *Face pâle ou jaunâtre, avec teint muludif, "et veux enfoncés, cernés de bleu. - "Chaleur et sensation brâlante av



SULFER


706

risage avec rangem france de l'intr la face, es rangem circonscrite des jones, ou bien taches rouges, même au cou. * Enflure pale on rouge du visage - tionflement des jeues, avec donleur lancinante. Tirmilement, douleur vive, sensation de meurtrissure, pression et sinsation brulante aux pommettes. "Erysipele flegmeneux a la face, principalement aux paupières, au nez et a l'oreille (gauche). — Ru lesse et reugeur de la peau du visage * Exuptions boutonneuses au risage et au front. Dartre pruriante et hun ide sur tout le visage, principalement an dessus du nez, auteur des y ox et aux paupieres, petites vesicules blanches en groupes, et formant des croutes - * phélides et pores noirs au visage, principalement au nez, aux levres et au menton. - Livres seches tules et gercess - S I sation bralante et chalem continuelle des lecres, - Taches hepatiques a la levre supericure. — Tremblem int et tressaillement des levres. *Gonflement des lerres - Ulceres crouteux sur la partie rouge de la levre - Eruption dartrease au coin de la beach -Eruption doulourcuse autour du menton — Dealeurs vives, l'incinantes et tractives, et *gonflement douloureux aux machoires. - Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec doulour au toucher et clancements.

Dents. - Grande sensibilité des dents : Tressaillement, secourses, *douleurs viers on tractives, chancements, *douleurs pulsations, terebration et sensation brulante, tant dans les dents carrees que dans celles qui sont sames. - *Les maux de dents s'eten lent souvent jusqu'anx preilles ou jusque dans la tete, et sont quelquefors accompagnes de congestion de sang a la teteavec trissons et envie de dormir, or de gonfl ment de la jone. *Apparition ou aggravation des maux de dents, principalement le soir. Ta muit, cu un grand aer ainsi que par un ecurant d'air. pur l'eun fronde, en mangeant on en machant, *et quelquefeis aussi en prenant quelque dose de leuid. Mae sates brunatres aux dents. * taciliement d abus in all-agement, agaica, at et saignement facile des dents. — Seignement, *sensation de decollement et gonflement des generes, quel juctors avec doudrars pulsatives - Timenr du arronder aux grie iv save coulement de pais et de sang

Bouche. — Secheresse, chalt unet sensition brulante dans la bouche, quelquetois le neatin avec bangue lumoide — terminalation de salire dans la bouche : salire sangue notente, ou salire, ou acide, ou an ere. - Odeur fetale quelqueteis acide, de la bouche, principalement le matine ou le soir, en après le repus. — Vescules, ampoules et *aphithes deus le bouche et sur la lampae, quelquefois avec brulement ou avec doaleur d'exertiation en mangeant.

Exfoliation de la peau dans la bouche. Sonsation bralante et demangeaison sur la langue sollangue solle, rude et gercée, scouleur rouge de cinabre: ca charger d'un enduit blanc, ou



SULFUR.

707

converte de mucosités brunâtres, épaisses et visqueuses. — Bredouillement en parlant. — Accumulation de mucosités d'un


goût mié, dans la bouche.

Gerge. — Grattement, apreté et sécheresse dans la gorge. — *Pression comme par un tampon on par une tumeur dans la gorge, quelquesois avec difficulté d'avaler. — Sensation dans la gorge, comme si une boule y remontait. — *Contraction et sensation douloureuse de rétrécissement de la gorge, en avalant. — Douleur d'excoriation, sensation brûlante et élancements dans la gorge, principalement en avalant à vide, comme si l'on avait un cheven dans la gorge, avec goût empyreumatique. — Mal à la

gorge, avec gonfiement des glandes du cou.

Appétit. — *Manvais goût de la bouche, le plus souvent acide, amer on patride et douceâtre, ou fade, principalement le matin, en s'eveillant. — *Goût amer ou trop salé, ou insipidité des aliments. — *Absence complète d'appétit, et dégoût des aliments, principalement *de la ciande, du pain de seigle,* de la graime et du lait. ---*Répugnance pour les choses sucrées ou acides, ou grand désir de res choses, avec manque d'appétit. - *Soif continuelle, même la nuit, souvent avec désir de bière. — «Désir (chez les ivrognes) de mire du vin.—*Appétit excessif et accès de boulemie, quelquefois avec mal à la tête, lassitude et besoin de se coucher. — Grande faiblesse de la digestion, principalement pour la viande, la graisse. le lait, les acides et les farineux, aliments qui quelquesois sont beaucoup souffrir. — «Les aliments sucrés aggravent les douleur» de l'estourac et du ventre. — Le lait produit des renvois aigres, un goût acide dans la bouche et même des vomissements. — La bière a un arrière-goût très-prolongé et fait bouillonner le sang. Après le repas, oppression de poitrine, nausées, pression et crampes dans l'estomac, coliques, ballonnement du ventre et flatuosités, romissement, grande fatigue, frissonnement, embarras et mal à la tête, chaleur du visage, agasation brûlante dans 🌬 mains, écoulement d'eau par la bouche et beaucoup d'autres

Betomae. — *Rapports continuels. principalement à cide, ou avec goût des aliments, *ou acides et brûlants, ou amers, ou fétides, avec goût d'œus pourris, *principalement après le repas, ou la nuit. — *Renvois avortés. — *Régurgitation des aliments et des boissons, souvent avec goût acide. — *Pyrosis, souvent avec brûlement et fourmillement dans la poitrine. — *Hoquet. - *Nausées. —quelquefois jusqu'à la défaillance, avec tremblement, faiblesse et rapports fréquents, principalement *après le repas. —le matien, la nuit, ou *en allant en voiture. — *Econlement d'eau par la bouche, comme des pituites, principalement le matin on après le rep us, *quelquefois avec pression et fouillement dans le ventre. — *Vomiturition et comissements, tant des aliments que de matières acides ou amères, —on noirêtres.



*ou sanguinolentes, etc., "principalement le matin, le sor,
*après le repas, "ou la nuit, et quelquesois avec nausées, douleurs a l'estomac et sueur froide au visage. — Pesanteur et plénitude, ou pression et compression, ou bien douleurs contractives
et crampoïdes, ou fouillement et élancements dans l'estomac et
la région précordiale, *principalement après le repas, la nuit,
ou le matin, *souvent avec nausées et vomissement, anxiété et
ballonnement du ventre. -- Sensation de froid, ou chaleur et
sensation brûlante dans l'estomac. — Grande sensibilité de la
région de l'estomac, au toucher. — Gonslement de la région precordiale. - Pulsation dans le creux de l'estomac. — Gonslement
du creux de l'estomac.

Ventre. — Sensibilité douloureuse des hypocondres, comme s'il y avait une plaie intérieure. -- Tiraillement, *pression, tension et élancements dans la région du foie et de la rate, *gonflement et dureté de la région du foie vet de celle de la rate. - Plenitude, *pesanteur, tension et pression comme par une pierre dan» le rentre, et principalement à l'épigastre et aux hypocondres. Grosseur et durete du ventre. - Tranchées, ou *sensation de déchirement, on douleurs contractices et crampoides dans le centre. - *Elancements dans le centre, principalement du côté ganche, en marchant ou en respirant profondement. •Les maux de ventre affectent en genéral le côté gauche de proférence, où ils s'étendent jusqu'à l'estomac et jusqu'à la poitrine. et le dos, avec géne de la respiration, nausces, anxiété et humeur hypocondriaque. -- *Maux de rentre, principalement la nuit. ou a*près avoir du ou mangé*, con bien periodiques, aggravation par des aliments sucrés ; *nonlagement en se tenant courbé. -Mouvement et fouillement dans le ventre, ou sensation comme si quelque chose poussait en dehors. - Douleurs de contusion et de meurtrissure dans les teguments du ventre. -*Sensibilité douloureuse du ventre au toucher, comme si en dedans tout ctait à vif ou en une large plaie, - *Ballonnement du ventre avec douleurs pressives par des flatuosités incarcérées, principalement du côté gauche. - *Borboryg nes et grondement Sortie frequente de vents d'une odeur trèsdans le ventre, 'fetide. — *Gonflement douloureux et même suppuration des glandes inguinales. - *Sortie violente des hernies, "avvo mearcération.


8elles. — Constrpation et selles dures, "noueuses et insuffisantes.

*Encre fréquente et souvent inutile, d'aller à la selle, principalement la nuit, et quelquefois avec pression sur le rectum et la vessie, et douleur à l'anus. — Envie urgente d'aller à la selle.

*Diarrhées avec éracuations fréquentes, principalement la nuit, souvent avec colique, ténesme, "ballonnement du ventre, dyspuec, frissonnement et faiblesse au point de s'évanouir. —

*Éracuations muqueuses ou aqueuses, ou écumeuses, ou acides.

708



509

châtres, terdâtres, décolorées, ou d'un rouge brunâtre.—Selles inrelontaires. — *Selles avec mucosités, sang. et matières purulentes. — Sortie de mucosités, même avec des selles dures. — Sortie de lombrics, d'ascarides, et même de morceaux de ténia, du rectum.—*Chute du rectum, principalement pendant des selles. — Douleurs vives et pressives, prurit, élancement et brûlement a l'anus et dans le rectum, même hors le temps des selles. — *Hemorrholdes qui sortent, *suintent et saignent. — Écorchure et


gunflement de l'anus.

Urines. -- *Urines supprimées ou très-rares. -- *Enric d'uriner fréquente et quelquelois très-argente. - Urines fréquentes abondantes et aqueuses, partant quelquefois avec beaucoup 🕩 force, même la muit. — Emission involontaire des urines, principalement en toussant ou en expulsant des vents. - *Pissement un bit.—•Urines rouges avec sediment, ou bien blanchatres, on troubles, ou foncées.—Pellicule huileuse sur les urines. — Urines fetides. — Sédiment farineux, blanchatre, ou épais, ou rougeatre. dans les urines. — • Ecocuation douloureuse de quelques gouttes d'uring sanguinolente avec beaucoup d'efforts.—*Sortie de sang et de mucosités avec les urines. - Prurit, douleurs vives, *élanes : ments et sensation brûlante dans l'arèthre, principalement 🕕 urinant. — Rougeur et inflammation de l'orifice de l'urêthre, et douleur comme au début d'une gonorrhée. - *Ecoulement de mucosités par l'uréthre. - Elaucements dans la vessic. — Jet d'urme mince et intermittent. Douleurs crampoides aux reins et jusque *Gonorrhée invélérée, uvec odeur comme du dans les aines. fromage fort.

Parties viriles. - "Sucture fétides aux parties. - Ecorchere entre les cuisses et aux aines, principalement en marchant. Elancements dans la verge et le gland. Prépuce roide, dur comme du cuir, avec sécrétion abondante d'un smegma fetide Inflammation, gonflement et phimosòs du prépuce, avec eve-Tasses profondes, brûlement et rougeur. - Cleère profond au Pression, tension et gland et au prépuce avec bords éleves. **élancements dans les testicules et les cordons spermatiques.** Gouffement et épaississement de l'épididyme. - "Excoriation et suintement du scrotum. 🕒 Exaltation de l'appetit venerien. 🖭 irritation voluptueuse des parties, souvent sans érection. *Faiblesse des fonctions génitales, souvent avec froid glacial couleur bleuatre du gland, du prepuce et de la verge, et retra-*Impuissance. - Testicules relaches et tion du prépuce. descendus. — Pollutions fréquentes, même pendant la meridienne

Sperme aquent. — *Sortie de liqueur prostatique, principalement en urinant et pendant les selles. — «Induration du testicule).

Région. -- Pression sur les parties. - "Exceristion, prurit et l'Ann. -- Brédit., les part., t. II.




710

*Règles trop hatires et trop abondantes eu *trop faibles, ou enterement supprement at e coloques spasmes abdominaux, mul a la tête maner de re us presson à l'estomac, congesti a a la tête et bémorthagi les de, igitati net mune acces depilépsie *Arant les regles mul a la tête prarit aux parties, co-tiques spasmodiques reguetale, toux, mal aux dents, pyrosis, épistaxis fluenes blanches et souffrances asthmatiques. Après les règles, prurit au ner *Sang des règles trep pale ou d'une odeur acide *Fluenes blanches, quelque feis corrosires, rongeautes et jaunctres procedes le coliques *Exercation et prurit un name lons. Corences mais manuelons, itse sensation brolante saign i ent tacile et ulcer etc. Claudes mai maires engres et entran mees. It flan mation erysipelateus, au sein.

Laryux. Citarele avec coryza fluent foux d ulcur dans la poi trim on an stelle start a vif. et friss a nem ut "Enronement aprete et grattement dans la gorge, avec ac umulation de muc is tes dans la poitrine - Doub ur d'excoriation et fournullement un chatamillement au largue, avec besont de toisser. *Voix rangue et sourde - a entre renealt élecute, principalement par un temps froid et l'unaide **Sensation comme si le laryna était gonfie en qu'il y ent prebane cerps (tranger - * Tou : seche, quelquelos fatigante et ebranlinte, acec conaturation vomissement et constriction crampoèle de la pertrine, generalement le sour, a la muit dans la position concher, a le natin, ou apres-*Tour ham de avec expretoration abundante de mucasites epoisses, blanchaires on jaunatres, comme celles d'un vieux ervis Crachats feldes, d'un jaune cerdatre on ecume du pus et d'un gout sale et douceatre en toussant. "Tour fébrule men "grachement de sang "En tomsunt. douber d'excoration on clancements dans la portrue, de pleurs do meurtrissure ou clancem nts lans la tete, mal au ventre obscurity detant les yeux douleurs lans les hanches et aux rems.

Poitrine **Haleim courte, eto iffements frequents, *quie de la resperation duspure et acres d'sufficialition, princ palement la nuit en étant ranche et mem pendant le sommed, ainsi que, qu'equelois en parlant et en se pretienant au grand air. Inspessibilité de respirer préordement avec sensation comme si la peitre de et ut contracte : Respiration frequente, courte ou sibiliait : «Routhement et rale monque et dans la poutrine.
En pour d'ancements dans le dos et le sacron. «Sensation doul ut us lans la poitrine, comme si quelque hose tombait contre les parois auteri ures en se rete armant dans le lit : Gene deul oure use dans le rete quiche de la postrine, avec angoisse et impossibilité de se coucher sur le côte affecte : *Pesanteur, plénetule, et pression comme par une pierre, dans la poitrine patente.



SULFUR.


711

et le stermum, principalement le matin, cainsi qu'en toussant, en éternuant et en baillant. — Douleur en toussant et en éternuant, comme si la poitrine allait éclater. — *Spasmes périodiques de la poitrine, avec sensation de constriction, douleurs crampoides, •haleine courte, couleur bleuatre du visage et impossibilité de parler. — Pulsations dans la poitrine et le sternum. — *Faiblesse de la poitrine, sensible surtout en parlant, avec grande fatigue des ponmons après avoir parlé ou chanté. -- *Elancements dans la poitrine ou le sternum, ou jusque dans le dos, ou dans le côté gauche, principalement en toussant, en respirant profondément et en levant les bras. -- *Il semble que les douleurs de la poitrine affectent le côté gauche de préférence. — Sensation de froid, ou *brûlement dans la postrine, quelquefois jusqu'au visage. — Elancements et coups dans la région du cœut. — Forte congestion de sang vers la poitrine et le cœur, quelquefois avec bouillonnement dans la poitrine, malaise, défaillance, tremblement des bras. — Sensation de vide, dans la région du cœur, ou pression et sensation comme si le cœur n'avait pas assez de place. - *Battement de cœur fréquent, quelquesois même visible, et avec anxiété, principalement en montant.

Tranc.—Douleur de meurtrissure au thorax, au toucher. —*Faiblane et douleurs de luxation ou de meurtrissure aux reins et dans le dos, principalement en marchant et en se levant de son dége.—*Douleur dans le dos après un travail manuel. — Élancements aux reins, dans le dos et les omoplates, quelquefois avec gêne de la respiration.—*Douleurs vives et rhumatismale-, tiraillement, tension et roideur dans les reins, le dos et la nuque. — Pincement et sensation brûlante entre les omoplates. — Distorsion de la colônne vertébrale. — Dartre à la nuque. Gonfiement et inflammation des glandes de la nuque et de celledu cou. — Sueur fétide des aisselles. — Gonfiement et suppura-

tion des glandes axillaires.

Bras. — Pression sur les épaules, comme par un poids. — "Tressaillement des épaules, des mains et des doigts. — "Treaille ment, douleurs rives et élancements dans les articulations et les muscles des bras, des mains et des doigts, ainsi que dans les épaules, et principalement la nuit, au lit. — Cramp » nocturnes aux bras. — "Fourmillement aux bras et aux doigts. — "Gonflement des bras, "quelquefois avec chaleur, dureté et douleur-lancinantes ou tensives. — Exostose au bras. — Verrues au bras. "ou miliaire pruriante, ou taches rouges, brûlantes, apparaissant après les lotions. — Vésicules purulentes dans le pli du coude. — "Faiblesse paralytique des bras et des mains. — Craquement au coude. — "Gonflement des mains et des poncès. Boideur et douleur de luxation dans les articulations des mains et des dolgts. — "Tremblement des mains, principalement en s'occupant de travaux fins.— Contraction involontaire des mains.



SULFUR.

comme pour saisir quelque chose. — Froid aux mains et aux doigts. — "Sueur aux mains, et entre les doigts. — Éruption de petits boutons rouges aux mains et aux doigts, avec prurit. «Verrues aux doigts. — Desquamation, sécheresse et gerçure de la peau des mains. — Cramp » et tressaillement dans les doigts.

n pean des mains. — Cramp set tressattement dans les doigts, - Raccourcissement des tendons des mains et des doigts, - *Conflement volumineux et luisant des doigts. — *Doigts morts,

Nodosités aux doigts. — Envies aux ongles. — Engelures aux

doigts, avec prurit à la chaleur. -- Conflement et inflammation du bout des doigts, avec ulcération sous-cutanée et douleurs noc-

turnes térébrantes et pulsatives.

7!2


Jambes. -- Douleur d'ulcération sous-cutanée aux fesses et aux tubérosités sciatiques, principalement au toucher et en restant longtemps assis. Tumeurs ourulentes et douloureuses aux fesses. - Douleur de luxation et de meurtrissure à la hanche, au moindre mouvement, arec élancements à chaque pas.—•Mal à la hanche, avec raccourcissement de la jambe. — Douleurs rices et tractives aux jumbes, principalement la nuit, au lit. - *Pesauteur des jambes, quelquefois, avec tension dans les cuisses et les genoux, principalement la nuit. - Taches rouges, suintantes et douloureuses à la face interne des cuisses. — *Tension dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. — Gonflement columineux et lumant du genou, avec roideur et cour-*Craquement, tiraillement, douleurs vives et élancements dans les genour. - Dartres aux jarrets. - *Agitation dans les jambes et les pieds. — Torpeur et engourdissement des jambes.

l'atique douloureuse et *faiblesse paralytique des jambes, principalement des genoux, qui fléchissent fréquemment. - *Taches rouges et miliaire pruriante aux jambes. - • Gonflement transparent des jambes. - • Erysipèle à la jambe et au pied. - • Taches bleuftres et veines gonflées ou variqueuses aux jambes.

Douleur aux mollets en marchant. — Crampes aux mollets et a la plante des pieds, principalement la nuit. — Bensibilité douloureuse de la plante des pieds en marchant. — Luxation facile du pied en marchant. — Roideur et douleur de luxation au cou-de-pied. — *Fourmillement dans les jambes et les mollets.

"There is brûlants et inrétérés aux jambes et les mollets, "There is la malléole, — *Elancements dans les pieds. — *Froid aux pieds, principalement le soir au lit, ou sensation brûlante, principalement à la plante des pieds, — *Sucur des pieds, qui sont froids. — Gonflement des pieds, surtout aux malléoles. — *Engelures aux pieds et aux orteils. — Vésicules rongeantes à la plante des pieds. —Ulcère au cou-de-pied. — Crampes et contraction des orteils. — *Froid et roideur des orteils, — *Fourmillement au bout des orteils. — *Gonflement rolumineux et luisant des orteils. — Vésicules ulcérées et rongeantes aux orteils, — Cors avec douleurs pressives ou lancinantes,





SULFURIS ACIDUM.

SULFURIS ACIDUM.

SULF-AC. — Acide sulfarique. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy Pharmac. homeop., p. 146. — Doses unitees : 5, 20, 30. — Durée d'ac tion : 4 à 5 semaines, dans des effections chroniques.

ARTIBOTE : Puls.

Companie Avec : Ammon. arw. con. dig. mur-se. nitr-se. phos-se. pals. rut. sulf — C'est surtout après ern., que sulf-se. est efficace. lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après l'acide sulfurique, convient quelquefus : Puls.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Écorchures; Suites facheuses de lésions mécaniques, blessures, contusions, etc.; Fièvres typhoïdes; Ophthalmies chroniques: Aphthes des enfants; Hémoptysie, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

striptores Géréraux. — Déchirement dans tout le corps, et même à la face. — Crampes dans les membres. — Douleurs sensibles pendant le sommeil. — Douleurs qui augmentent, puis disparaissent subitement, généralement comme par une pression sourde. — Soufirances ictériques. — Soubresauts des tendons. — Apparition ou exacerbation des symptômes, le matin ou le soir. — On semble sa trouver plus mal au grand air. - Le côté gauche semble être plus particulièrement affecté. Lassitude dans tout le corps, avec sensation de tremblements

Peau. — Prurit sur tout le corps. — Taches rouges, pruriantes à la peau. *ou petites taches rouges, livides et bleuâtres, comme par ecchymose. — *Excoriation de la prau, même avec ulcération semblable à la gangrène. — Furoncles. — Rongement dans les ulcères. — Engelures. — Cors aux pieds, avec dechirements et

élancements. - Verrues.

Sommeil. — Sommeil tardif et réveil de bonne heure. — Insomnie par surexcitation morale. — Tressaillements pendant le sommeil. — Rêves anxieux. — Tressaillement des doigts pendant le sommeil.

Fièvre. — Prédominance de la sensation de chaleur. — Pouls petit. faible. — Sueur au moindre mouvement. — Sueur matutinale.

abondante.

Moral. — Abattement mélancolique. Besoin de pleurer. - Appréhensions anxieuses et méliance. — Agitation, précipitation et impatience. — Humenr irritable, fatigue nerveuse, et disposition.



SULFURIS ACIDUM.

711

à s'effrayer - Morosité chagrine et éloignement pour la conversation. Degoût de la vie. - Serieux, alternant avec humear par trop boutfonne | Distraction excessive. | Esprit obtus.

Tâte. - Tête entreprise d'un seul côté, comme si elle contennit de la fumee. - Vertige, en etant assis, se dissipant au grand air. Maux de tête, qui augmentent d'abord, pues desparaissent sulatement. Sensati in de faiblesse dans la tete. Cephabilgie, comme si le cerveau etait dech.re. - Maux de tete pressifs Sensation de pesanteur et de plémitude dans le cerveau, comme si la tôte allait eclater Sensation de constriction dans la tôte Secousses et coups dans la tete Maux de tête avec lanequations sources ou tractions et declurements. Sensution de eacultement du cerreau - Sensation d'ulceration a l'exteriour de la tête - Prurit et eruption au cuir chevelu. Grisonnement et chute des cheveux.

Youx Pression brutante dans les yeux, au grand air, ou en fixant les yeux sur un objet, dans l'appartement. L'ension dans les paupieres, le matin Cuisson, sensation brulante dans les vens, et l'armoiement, surtout en fisant. - Yens rouges, avec ph t phobie. - *Inflammations chroniques des yeue Diffi-

culte d'ouvrir les panpières Myopie

Oreilles. Dechirement dans les creilles Durete de l'ouie. comme s'il y avait un bandeau sur les oreilles. - Sonnerie devant les reilles Bourdonnement d'oreilles, le soit.

Nos - Epistaxis, le soir - Coryza sec, avec perte de l'odorat, Resultment d'esu par le nez avec chiuration d'une narine.


Visage. Paleur du visage Douleur de contaston dans les pomm, tres. Declirement dans les os de la face. - Sensation de gonfiement du visage, et commes il etit tenduit de blan-d'œuf desseche Levres gereees et qui s'exfolient. Doubeur d'excoriation any commissions des levres. Inflammation et gonflement des glandes sous-mavellaires.

Dents. Odontalyic, plus violente le soir, au lit, aggravee par le froid, s-alagee par la chaleur-generalement avec decharement, creasement on rongement Dentk encousees. - Configurant et saignement facile des geneixes. I lecres nox geneixes,

Bouche et Gorge. I aphthes dans la bouche. Sensation de secheresse dans la beuche. Langue seche Suluration abou-dante. Crachement de sang. Mal de gorge, pendant la deglutition, avec donlerr lancmante, surtout le soir America dans la gorge.

Appetit Gout putrid. Le pain a an grut amer, et pese sur l'estomac - Boulimie, avec grandement et borborygmes dans la ventre - Appetence peur les fruits (les prunes). Apres le repas, agitation, tranchees et fouillement dans le ventre, ou fort ballonnement de l'estomac - Immédiatement apres des aliments





SULFURIS ACIDUM.

chands, sucur froide. — Lassitude et flatuosités, après avoir pris du lait. — Toutes les boissons refroidissent l'estomac, si l'on y

ajoute des spiritueux.

Asterna. — Renvois à vide ou amers. — Régurgitations acides, amères, ou salées, ou bien douceatres. — Pyronis. — Nausées dans l'estomac, avec frisson. — Vomussements d'eau d'abord, puis des aliments. — Bensibilité très douloureuse de la région de l'estomac. — Plénitude et premion dans l'estomac. — Serrement dans l'estomac, le soir, comme par un refroidissement. — Contraction dans l'estomac et le scrobicule. — Tranchées autour de l'estomac. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomac.


Ventro. — Elancements à la rate. — Élancements dans la région hépatique. — Élancement dans les lombes. — Coliques abdominales comme les douleurs d'enfantement, jusque dans les hanches et les reins. — Mouvements, tranchées et pincements dans le rentre, quelquefois la nuit. — Sensation de chaleur dans la région ombilicale. — Tressaillement dans toute l'étendue du bas-ventre, surtout à la superficie. — Battement, déchirements et élancements dans les aines. — Cuisson dans la région de l'aine. — *Hermie inquinale très-saillante. — *Hermies incarcérées du côté gauche, surtout chez less individus d'un tempérament mélancolique et flegmatique. — Colique flatulente dans le bas-ventre, avec grondement et borborygmes, et sensation comme » une descente allait avoir lieu.

Selles. — Ténesme. — Selles retardées, dures, noueuses et noires. — Selles d'un moule très-volumineux. — *Relachement chronique du rentre. — *Selles diarrhéiques de la consistance de la bouillie, ou verdâtres, aqueuses. - Diarrhée, seulement de mucosités écumeuses, avec sensation brûlante dans le rectum. — Évacuations de mucosités striées de sang. — Selles comme hachées (chez les enfants). — Selles d'odeur putride très-fétides. — Écoulement de sang pendant la selle. — Congestion sanguine au rectum. — Boutons hémorrhoidaux de l'anus avec élancements, sensation brûlante, prurit et suintement.

Urines. — Diminution de la sécrétion des urines, avec sensation brûlante, en urinant. - Émission d'urine, la nuit. Urine aqueuse, comme si elle contenait de la terre. - Sédiment muqueux, dans les urines. — Sédiment comme du sang dans les urines, qui sont reconvertes d'une pellicule fine. — Douleurs dans la vestie, quand le besoin d'uriner n'est pas immédiatement.

satisfait.

Parties génitales. — Forte chaleur des parties génitales et des testicules. — Écoulement de sperme, sans sensation voluptueuse. — Forte disposition au colt, par irritation des parties génitales externes (chez la femme). — *Règles trop hátices et trop abondantes. — •Règles de trop longue durée. — Métrorrhagie. — Avant les règles, cauchemar. — Pendant les règles, lanciuntleus.



716 SULFURIS ACIDUM. TABACUM.

dans le ventre et le vagin. — Stérelité, avec règles trop hâtives et trop abondantes. — Leucorrhée âcre ou brûlante, ou comme du lait. — Écoulement de mucosités sanguinolentes par le vagin

Larynx. Enrouement, avec sécheresse et *ápreté dans lu gorge et le larynx. — Douleur dans le larynx, avec parole embarrassée, comme si les parties étaient trop peu souples. — Toux provoquée par le grand air. — Toux sèche, courte, haletante, quelquefois le matin, après le lever. — Toux grasse, avec expectoration muqueuse. — *Toux arec crachement de *ang. — Apres la toux, renvois ou régurgitation des aliments.

Poitrine. - *Dyspnée. - Grande faiblesse de la poitrine, avec parole difficile. - Pression dans le côté gauche de la poitrine et dans le scrobicule. Lancinations dans la poitrine. - Bat-

tement de cœur. Lancinations à travers le cœur.

Tronc. — Sensation d'excoriation et de brisement dans le dos et les reins. — Traction dans le dos et les reins. — Furoncles au dos. — Roideur du dos, le matin. — Sensibilité doulourense et gon-

flement des glandes axillaires.

Bras. — Pesanteur des bras. — Contractions crampoides, paralytiques, dans les bras. — Élancements dans l'articulation de l'épaule, en levant le bras. — Douleur tensive dans l'articulation des coudes. — Taches bleuâtres sur les avant-bras, comme par ecchymose. — Crampes dans les mains. — Secousses et coups dans les os de la main, en écrivant. — Éruptions sur les mains et entre les doigts. — Lancinations dans les articulations des doigts. — Engelures aux doigts.

Jambes. Pesanteur des jambes. Torpeur et engourdissement des jambes. — Besoin d'étendre et d'étirer les jambes. — Déchirement dans les varices des jambes. Faiblesse douloureuse des genoux, avec lancinations sourdes, secousses et coups dans ces parties. Taches rouges, pruriantes sur le tibia. — Roideur des malléoles. — Froid aux pieds. — Gonflement des pieds. — Dé-


chirement et lancinations dans les cors aux pieds.

TABACUM.

TAB Tabac. — HABTLAUB et TRINKS. — Host. nat. et prép. Voy. Pharmic. hommeop., p. 294 — Louis unitées : 30. — Direc d'action ?
ANTIDOTES : Camph. ipec. n-vom. — On l'emploie comme antidote de :
Cicc. strain

COMPARER AVEC : Acon. ars. bell. cham. em, cocc. con. hell. hyos. spec n-rom op. stram. verstr.





TABACUM.

dans tout le corps, et sueur anxieuse. — Crampes et fourmillement dans les membres. — Amuigrissement excessif. — Fuiblesse paralytique et douloureuse des membres. — Tremblement des membres. — Grande lassitude générale. — Tressaillements dans tout le corps, avec pulsation et battement de cœur. — On se trouve mieux au grand sir. — Conrulsions générales avec perte de connaissance.

Pean. — Prurit à la peau, comme par des piqures de puces. Eruption de boutons pruriants, ou de vésicules, avec sérosité jau-

natre et auréole rouge.

Semmell. — Forte envie de dormir, aurtout après le repas et verle soir, avec bàillements fréquents. — Sommeil tardif le soir, et difficulté de se réveiller, le matin. — Sommeil agité la nuit, avec frayeur. — Cauchemar, en dormant.

Fièvre.—Froid et frisson, quelquefois avec claquement de dents.
 Accès fréquent d'horripilation, quelquefois avec chaleur fugace.
 Horripilation permanente, depuis le matin jusqu'au soir.

Sueur nocturne.

Moral. — *Mélancolie sombre. Angoisse et inquiétude, généralement après midi, soulagées par des pleurs. — Agitation qui pousse de côté et d'autre. — Éloignement pour le travail et la conversation. — Surexcitation et gaieté exaltée, avec chants, danse et grande loquacité. — Affinence d'idées confuses.

Tota. — Vacuité et embarras dans la tête. — Étourdissement. — Vertige, souvent au point de faire perdre connaissance, avec nausées et douleurs dans la tête et les yeux. — Céphalulgie avec nausées et vertiges. — Pesanteur excessire de la tête. — Maux de tête pressifs, surtout au-dessus des yeux, au vertex et dans les tempes. — Élancements dans la tête. — Congestion de sang à la tête, avec chaleur intérieure et battement dans les tempes. Amélioration des maux de tête au grand aux. — Sensation brûlante et fourmillement à l'extérieur de la tête. — Tremblement de la tête.

Your.—Donleur dans les yeux, comme après avoir beaucoup pleure.

- Pression dans les yeux, jusque dans le fond des orbites.

Sensation comme si on avait un cheveu dans l'oil. — Cuisson dans les yeux. — Chaleur et sensation brûlante dans les yeux.

avec rougour. — Contraction des paupières. — l'erte de la vue en regardant fixement quelque chose de blanc. — Trouble de la rue, le soir, comme à trucers un coile. — Scintillement et points noirs devant les yeux. — Photophobie.

Orelles et Hen. — Elancements dans les oreilles, surtout au grand air, et en entendant de la musique. — Chaleur brûlante et rougeur des oreilles. — Tumeur dure, rougeatre, derrière l'oreille. avec sancements. — Sensation brûlante et fourmillement dans le nes. — Diminution de l'odorat, qui expendant est très semble.



3 ABACUM.

718

Visage. *Paleur mortelle du visage (pendant les nausees).

Chaleur ardente de la face, avec rougeur quelquefois d'une scule joue, et pâleur de l'autre. Tarlies rouges a la face. — Dechirements dans les os du visage. — Tuberosites granulces sur les joues. — Amaignessement du visage. — Levres seches, brulantes, àpres et gercoss. — Éruption aux commissures des levres. L'ancinations dans l'articulation de la machoire, en riant.

tive dans les geneives.

Bouche et Horge. Scheresse de la bonche et de la langue, avec torte suf tuntiment des glandes sous la langue.

Parole fuble, entrecouper Lecture tramante, monotone.

Apreté, secheresse et graftement dans la gorge, comme par un corps etranger Lecturalation de mucosites risqueuses dans la gorge.


Appetit Gout fade et pateux, on amer et aigre — Gout acide de tons les aliments. Gout acidule de l'eau, comme si elle contenait du vin Absence de seif et horreur de l'eau. Absence de taim et d'appetit. Faim continuelle, avec nausées, si on ne

la satisfait pas

Estomac. -- Renvois frequents, a vide et bruyants. algres, brulants Pyrosis. Hoquet spasmodique. Nausées frequentes, surfout pendant le mouvement, souvent au point de s'econo uc, avec polear mortelle du visuje, se dissipant generalement au grand air Nausces, ave envie de vomir, sensation de froit dans l'eston ac, en pincements dans le ventre. L'omisse sement d'eau sculement, avec reflets jaunes et verdatres devant les yeux. Lomissements de serosites aeides, souvent mélées de mucasites #Lex romissements sont renouveles par le plus leger mourement - A holera assatique aver ramissement, diarchec accorde dépullance et consulmons generales. Pression à l'estomac. - Crampes d'estamac, serrentes, contractives, quelquefois après le repas, accompagnees souvent de nausces et d'accumulation de salive dans la bouche. Etam ements dans le scrobicule, jusqu'au travers du dos. Laxite et sensation de froid on de brutement dans l'estomac

Ventre. Douleur hepatique, en pressant sur la partie. Pression dans la region hepatique, comme par un corps pesant — Eluncements dans la region hepatique. Elancement dans l'hypocendre gauche. Grande sensibilite lu ventre au plus léger contact. Ballonnement douleureux du ventre Maux de ventre pressifs, surtout dans la region embilicale, avec rétraction crampoule de cette partie. De la rements nocturnes dans le ventre. Pincements et borboragues dans le centre.





TABACUM. — TARAXACUM.

Selles. — Constipation. — Ténesme frequent. — Selles molles de la consistance de la bouillie, même la nuit. — Diarrhées violentes. fétides, on vert jaunâtre, même la nuit. accompagnées et suivies de ténesme violent et de sensation brûlante à l'anus. — Selles cholériques, décolorées, avec vomissements de la même manière, défaillance dans les intervalles. — *Selles involontaires.

Urines. — Urines rouge jaunêtre et plus abondantes. — Inflammation de l'orifice de l'urêthre. — «Coliques néphrétiques, causées

par la gravelle.

Parties génitales. -- Erections fréquentes. -- Écoulement de laqueur prostatique. -- Règles en retard et plus abondantes. --Leucorrhée comme de l'eau sanguinolente.

Laryax. — Toux sèche, procoquée par un chatouillement dans la gorge, le matin et vers le soir. — Toux avec hoquet, au point de

suffoquer.

Poitrine. — Oppression de poitrine, avec angoisse. — Constriction de poitrine. — Pression sur la poitrine et le sternum. — Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine, quelquefois en respirant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine pendant le repas. — Battements de cœur, en étant couché du côté gauche. — Boutons pruriants sur la poitrine.

Trunc. — Douleurs contractives aux reins, surtout après la selle.

Amaigrissement du dos. — Éruption rouge, pruriante, au dos.

Roideur du cou.

Bras. -- Faiblesse douloureuse des mains et des bras, qui sont comme paralysés. -- Besoin continuel de s'étirer les bras. - Élancements et tractions dans les épaules. - Taches rouges, brûlantes au toucher, sur l'épaule. -- Tension dans le bras, surtout dans le coude. -- Douleur et élancements dans le bras, qui ne permettent ni de s'en servir, ni de l'étendre. -- Tremblement des mains. -- Sueur froide aux mains. -- Crampes et fourmillement dans les doigts. -- Gonfiement des doigts. -- Boutons pruriants aux doigts.


Jambos. — Douleur brûlante dans le genou et la plante des pieds.

Elancement dans le genou et le jarret. — Flechissement des genoux, en marchant. — Crampe et fourmillement dans les yeux et jusque dans les orteils. — Tension dans la jambe, en marchant depuis le genou jusque dans le pied. — Tremblement et faiblesse

paralytique des pieds.

TARAKACUM.

TAR. — Pissenlit, Deut-de-lion. — HARNEMANN. — Hist, nat. et prép. Voy. Phaymac. homosop., p. 255. — Dones antest: 0, 30. — Harée d'action: Anniert : Camph ? Compagne avec : Con. kal. n-vom. puls. spig. valer.



720

TARAXACUM.

CLINIQUE. -On a recommandé ce médicament contre les affiretions gastriques et une sorte de Céphalalgie. Le médecin homospathe, en étudiant les symptômes suivants, verra dans quels cail pourra faire usage de ce médicament.

BYMPTOMES GENERAUX. — Sensibilité douloureuse de tous les membres, surtout au toucher et dans une fausse position. Sensation de faiblesse et de malaise dans tout le corps, avec besoin continuel d'être assis ou couché.—Presque tous les symptomes paraissent en étant assis et se dissipent par la marche. Forte encre de dormir, le jour, avec baillements fréquents. Sommeil avec affluence de rêves, la nuit, réveil fréquent et jactation. — Frisson, avec maux de tête pressifs. — Chaleur generale, surtout a la face et aux mains, sans soif.—Sueur generale la nuit, au commencement du sommeil. — Irrésolution et répugnance pour le travail. — Loquacité et cuvie de rire.

Tôte. Vertige, avec étourdissement et chancellement, en nurchant en plein air. - Mal de tête, comme par contraction on expansion du cerveau. - Pesanteur et pression dans la tête. Lancinations dans le front et les tempes. Douleurs de tête ciolentes, sensibles seulement en se tenant debout et en marchant.

- Tension du cuir chevelu.

Youx et Oreilles. Douleur dans les yeux, comme si un grain de sable s'était introduit dans l'angle interne. — Sensation brûlante et clancements brûlants dans les yeux. — Inflammation des yeux. avec larmolement et photophobie. — Agglutination nocturne des paupières. — Élancements dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe, le soir.


Visage et Dents. Boutons purulents à la face, aux joues, aux ailes du nez et aux commissures des lèvres. - Sensation de chaleur et rougeur de la face. - Elancements et pression dans les joues

Lèvre superieure gercée. Odontalgie, avec douleur tractive dans les dents cariées, jusque dans les sourcils. Coups pressifs dans les dents. Il sort du sang acide par les dents cariées. Émoussement des dents.

Rouche et Gorge. - Accumulation de salive acidulée dans la bonche. Langue chargée d'un enduit blanc, arec exfoliation. Langue seche, chargée d'un enduit brun, le matin, au réveil. Mal de gorge, avec douleur pressive, comme par un gonfiement interieur. Sécheresse, élancements et mucosités amères dans

la gorge. - Renúclement de uniconités acides.

Appétit. - Goût amer dans la bouche, avec goût normal des aliments. Goût salé, ou acide, des aliments, principalement du beurre et de la viande. — Le tabac à fumer est désagréable, donne des pyresis et coupe la respiration. — Forte disposition frileuse après avoir bu on mangé.



TARAXACUM. — TARENTULA HISPANICA.

Esternas. -- Renvois amers. - Renvois à vide, surtout après avoir bu. — Nausées comme après des aliments trop gras, avec anxiété et manx de tête pressifs, améliorées an grand air.

Ventre. — Pincements dans le ventre. — Elancements premifs dans le ventre et les côtés du ventre, à gauche principalement. — Grondementa et mouvements dans le ventre, comme si des vessies y éclataient.

Selles et Urines. — Selles, plusieurs fois par jour, et cependant ne s'évacuant qu'avec effort. - Selles de la consistance de la bouillie, suivie de ténèsmes. -- Prurit voluptueux au périnée. -- Encie fréquente d'uriner, avec émission abondante.

Partice génitales. -- Douleur dans les testicules. - Érections permanentes. — Pollutions fréquentes.

Pottrine. - Pression à la poitrine. - Elancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. - Tressaillement dans les nincies des côtes.

Tronc. -- Douleurs pressives aux reins. -- Elancements pressifs et tensifs dans le dos et les reins, en étant couché, avec étouffement de la respiration. — Gargonillement et gonflement dans les omoplates et les épaules, avec frisson général. -- Tiraillements pressifs, et élancements dans les muscles du cou et de la nuque.

Bras. — Battement pulsatif et tressaillement dans les épaules et le bras. — Tressaillement des muscles dans les bras. — Elancements dans les bras et les coudes. — Tractions et déchirements dans l'avant-bras et le poignet. — Eruption boutonneuse aux mains et aux doigta. - Froid glacial du bout des doigts.

Jambes. — Elancements dans les cuisses, les genoux, les mollets, la plante des pieds et les orteils. - Sensation brulante dans les genoux, les jambes et les orteils. - Sueur abondante entre les

orteils.

TARRNTULA HISPANICA.

TARENT. - Tarentule espagnole. - NUNEZ et PERRY, Lindes du venim de la Tarentule. ARTIDOTES: 1) Phosph. - 2, acon. bar-m. bovis, chel. cupr. lyc. magn. mosch. natr. puls. rhus. spig sulf. zinc Companen avec : Bell. canth. lach. merc puls phos ac secal.

CLIMIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où ce médicament sera particulièrement efficace contre les affections suivantes : Affections à type intermittent : Hypocondrie; Hystérie; Chorée; Erotisme, chez l'homme et la femme; Diabete; Albuminurie; Rhumatisme goutteux; Nephrite



TARENTULA HISPANICA.

et cystite calculeuses et inflammatoires; Rhachitisme scrofuleux (et même syphilitique?); Tumeurs fibreuses de l'utérus et de ses annexes, Lesions organiques du cœur et des gros vaisseaux, par suite de rhumatismes; Paralysies rhumatismales et nerveuses

SYMPTOMES GENERAUX. Affections convulsives avec besoin de remuer continuellement ; periodicité des accès, accompagnes d'époueunte, de terreur, crainte d'une mort prochaine, rertiges et anxiété précordiale Aggravation des sonffrances par le repus et le lit, un temps sec et froid, par le bruit et la conversation, les causes in rales déprimantes, et les changements de temps — Les souffrances se pred usent de préférence de midi a la muit, et retourneut periodiquement. Necessité de remuer cant nuellement tout le corps et de changer de position, a cause d'une inque cude generale, avec oppression. - Attaques de verfs; sensation d'un fourmill ment géneral, avec douleur à l'écciput. sunti d'engeurdissement du tronc et d's membres jusqu'à la pert du meuvement, pais în prietude generale, crainte de perdre la raison, envie de se mordre et de s'egratigner avec rage. soif, baillements, horripilation et tremblement avec cephalalgie.

Peau. Picotements et ardour sur tout le corps. Peau de couleur ecurlate - Eruption miliaire de petits boutons très-pruriants.

qui suppurent rarement.

722

Sommoil. - Prepension irrésistible au commeil. - Assoupissement, sommeil lourd et prolongé. - Sommeil léger, troublé par agitation nerveuse, inquiétude, et rêves de toutes sortes, mais surtout tristes.


Fièvre. Ardeur brulante par tout le corps, alternant avec un froid glacial qui fait trembler. - Alternatives de chaleur et de froid; au debut du froid, douleur dans la région hepatique : puis, gran le agitation et chaleur ardente, enfin, sueur copieuse avec grand besein de dornir, sans pouvoir y arriver. Augmentation de la chaleur à la surface du corps, avec rougeur de la peau. Deuleur de meurtrissure par tout le corps et a la tête, pendant une heure, avec soif extraordinaire; puis, sueur abondante d'une odeur très-aigre, avec amelieration de tous les symptômes. - l'endant la sueur, semment, pendant le froid, deuleur pressive intence au ceur - Fievre quotidienne vespertine.

Moral et intellect. Tristesse, affliction et mauvaise lumeur.

Delines — deminent les ilées tristes, les menares et les emportemonts, pas grand mal de têt saivi de signes de joie et de
bonne han our — Benne humeur extraordinaire. La musique
cgaie et soulage, amene de la sueur et un brisement général
La musique détermine du malaise, du dégoût et de l'agitation.



 $^{-23}$



TARENTULA HISPANICA.

avec des contractions dans les doigts. - La musique diminue les symptòmes. -- Anxiété, partant du creux de l'estomac, avec tristesse et crainte d'un malheur. -- Faiblesse de mémoire. -- Peu d'aptitude au travail intellectuel.

Tête. — Douleurs de tête de diverses natures, principalement gravitantes et lancinantes, se répétant aux mêmes heures de la journée et l'mitées ordinairement aux tempes, au front, à l'occipat. La douleur occipitale est profonde et accompagnée d'une forte chaleur brûlante s'étendant à toute la tête, avec soif ardente. Les douleurs de tête sont ordinairement précédées de beaucoup de chaleur et terminées par des sueurs. — l'endant les maux de tête, nombreux symptômes accessoires, surtout : inquiétude générale, grande tristesse, oppression, toux avec gène de la respiration, nausées et vomissements, vertiges, prostration des forces et roideur des muscles de la tête et du cou.

Yeux, Oreilles et Mes. — Élancements et douleurs par intervalles aux yeux, picotement et irritation aux paupières : larmoiements, vue trouble ; illusions d'optique ; taches lumineuses, etineelles et d'autres objets devant les yeux. Douleurs d'oreilles ; douleur à l'entrée du conduit auditif externe ; douleur dans l'oreille interne et la trompe d'Eustache, s'étendant à toute la tête ; bruits et sons éclatants dans les oreilles. — Excitation de la muqueuse nasaire, avec odorat tantôt augmenté, tantôt diminué; epistaxis.

Face et Dents. — Névraigies faciales du nerf maxillaire inférieur droit, avec symptômes gastriques, douleurs dans quelques articulations et se terminant par un sommeil prolonge. - Eruptions prolongées, souvent confluentes, de petites papules rouges, sur la face (et d'autres régions), avec beaucoup de chaleur, de picotement et cuisson en se grattant. Herpes furfuracé et dartres au front et à la face, avec prurit qui s'aggrave la nuit. - Douleurs de dents, comme si on les arrachait.

Bouche, Gorge et Appétit. — Aphthes dans la bouche, mauvaisodeur de l'haleine. — Mal de gorge en avalant gonflement des amygdales; élancements douloureux dans les amygdales. -- Manque d'oppétit, avec soif intense ; grand appetit; boulimie ; grandsoif.

Betomac et Ventro. -- Douleurs vives a l'estoune, surtout après le repas et la nuit, avec vomissements, clancements au niveau de la rate, grande soif, douleurs dans les articulations et abattement moral. -- Douleur à la région du foie avec alternatives de chaleur et de froid, douleurs dans les hypox indres, -- Coliques plus ou moins vives; élancements dans divers es parties de l'abdonen et a l'anus; douleurs de veutre qui s'et in lont à la pourrine, où elles deviennent intenses, avec bruits produits par les gaz qui parcourent le ventre; borborygmes; seusibilité excessive de tout l'abdomen.

Selles et Urines. Evacuations alvines aboudantes : diarrhe >



TARENTULA HISPANICA.

724

resserrement du ventre; selles difficiles avec tenesme et perte de sang. - Douleurs aux reins, a la vessie et dans l'urethre, spasme de la vessie, difficulté d'uriner, l'urine sort goutte a goutte et est très-brûlante; urine épaisse et sedimenteuse; ardeur dans l'urethre, pendant et après la miction, excretion abondante d'urine.

Parties viriles. Augmentation de l'appetit venerien. Testicules douleureux, engorges. Traction le long des cordons spermatiques. Erections sans desir : crections qui ressent facilement. -- Testicules flasques et douleureux au toucher. --Engorgement de la prostate. -- Suites fâcheuses de pertes séminales.

Parties sexuelles de la femme. — Avance des regles qui deviennent plus abondantes, avec douleurs au sacrum. — Pendant les règles, grande agitation, avec spasmes erotiques. — Pertes utérines, avec douleurs dans les aînes. — Flueurs blanches, alternant avec un écoulement de sang. — Douleurs très-fortes, contusives, pressives et incusives dans la matrice, avec extension aux hanches et au sacrum — Douleur brûlante dans le ventre et la matrice, avec sensation d'un grand poids qui gène la marche et démangeaisons a la vulve. — Douleurs spasmodiques et insupportables dans la matrice, accompagnées de tremblement, au point de produire de véritables crises nerveuses, suivies de prostration complète. — Hystericisme sous toutes formes. — Exaltation des désirs vénériens chez la femme.


Larynx et Toux. - Toux seche par suite d'un chatouillement dans le larynx, avec grande fatigue et oppression. - Acces de toux avec ardear générale et rougeur de tout le corps, se terminant par des sueurs, suivies de prostration des forces - Toux, accompagnée de douleurs a la tête, a la poirrine et au bas-ventre, avec oppression et angoisse - Toux sèche, fatigante, convulsive, avec nausces. - Expectoration difficile. Aggravation de la toux

par la famee du tabac et le cort.

Poitrine et Cœur. Oppression de poitrine, gêne de la respiration, et anxiete avec douleur comme si le cœur se retournait dans la poitrine, et sueur genérale - Oppression par le plus leger motvement. - Oppression, avec prostration des forces. Oppression avec douleur au cœur, abattement moral et fatigue - Deuleurs rhumatismales a la partie moyenne et antérieure de la poitrine - Suffecation et besoin d'un air incessamment renouvele. Douleur au cœur comme si on le comprimait - Palpitations de cœur, et anxiete précordiale. - Palpitations avec grande tristesse et oppression - Battements du cœur tumultueux, et grande irrégularité de la circulation.

Pronc. Tension et ra deur des muscles du tronc; retraction musculaire — Douleurs a la région lombaire et le long de la colonnvertébrale. - Douleurs de reins, se répétant plusieurs pour d suite, pour la plupart compressives, contusives, parfois tre-





TARENTULA. - TARTARUS EMETICUS.

aiguës, et accompagnées de nombreux symptômes dans d'autres parties. — Convulsions et mouvements continuels du tronc, des bras et des jambes, avec impossibilité de conserver aucune partie en repos, et précédés d'oppression et de malaise général. — Rai-

deur de la nuque; rétraction musculaire.

Extrémités. — Douleurs vagues dans les os des bras et dans les poignets, avec enflure de ces derniers: douleurs dans les pouces; éruptions pustuleuses et callosités douloureuses aux mains. — Dans les membres inférieurs, inquiétude qui force à les agiter; Douleurs articulaires, comme chez les rhumatisants par les changements de temps; Pesanteur des jambes et difficulté de les mouvoir; Paralysie incomplète des membres inférieurs; Paralysie des membres inférieurs avec violente douleur de dos, que le moindre mouvement rend insupportable; Paralysie des jambes avec incontineuce d'urine et selles involontaires.

TARTARUS EMETICUS.

TART. — Tartre émétique ou stiblé; Tartrate de potasse et d'antimoine — Archives de STAPF. — Hist, not, et prép. Voy. Pharmac. homosp., p. 148. — Doses usitées : 30. — Durée d'action : 3 à 5 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES - Cocc. ipec. puls. — On l'emploie comme antidote de : Sep. Companent avec : Ant. asa, haryt cham. cocc. ign. ipec. nitr-ac. n vom puls. sep. veratr. — C'est surtout après puls. on baryt., que le tartre émétique est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le tartre émétique, conviennent quelquesois : Baryt. ipec. puls. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Fièvres rhumatismales; Varioloïdes; Affections gastriques et bilieuses; Asphyrie des nouveau-nés; Coqueluche; Croup, etc., etc., Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Déchirement et tractions arthritiques et rhumatismales dans les membres, avec sensation de brisement. — Contraction des membres. — Tressaillement des muscles. — Tressaillements convulsifs et crampes. — Attaques d'épilepsie. — Tremblement des membres. — Elancements dans les varices. — Exacerbation des symptômes en s'asseyant, on bien en étant assis et en se levant de son siège. — Pesanteur générale de tous les membres et grande paresse. — Pulsations violentes dans tout le corps. — Grande débilité, faiblesse et lassitude excessive. — L'enfant veut constamment être porté. —



TARTARUS EMETICUS.

720

Acces d'evanoussement. Sensibilité excessive de tout le corps. — Des qu'en touche l'enfant, il pousse des cris perçants.

Peau - Prurit a la peau. - Boutons pruriants et éruption meltaire. - Éruptions comme la gale. - Eruption de pustules, semblables aux varioloides, avec aureole rouge, se recouvrant ensuite d'une croûte et laissant une cicatrice. - Prurit autour

d'anciens ulceres.

Sommeil *Forte entre de dormir, le jour, avec pandiculations et balliements fréquents. — Sommolence invincible avec sommeil projond et engourdissement — Le matin, il semble qu'on n'a pas assez dormi - Sommeil tardif et insomme nocturne.

Sommeil leger avec affluence de rèves fantastiques. — Paroles fréquentes pendant le sommeil. — Cris pendant le sommeil, avec yeur fixes et tremblement des membres. — Secousses et coups pendant le sommeil, qui font tressaillir tantôt un seul membre, tantôt trut le corps. — On est couche sur le dos, en dormant, la main gauche passée sous la tête.

Prisson. — Predominance de frisson et de froid — Frisson avec paleur excessive du visage, et tremblement de tout le corps. — Chaleur ardente de tout le corps, principalement dans la tête et le visage, augmentee par l'moindre mouvement. — Pouls accéléré, faible ou plain. — Fièrre avec absence de soif et somnolence excessive. — Sueurs abondantes, fréquentes, et quelquefois troules. — Sueur des parties affectees. — Sueur nocturne,

abondante.

Moral. - Inquietude et agitation, avec battement de cœur et tremblement - Apprehensions anxieuses pour l'avenir (le soir).

Découragement et desespoir - Manie du suicide. Gaieté

douce, le jour seulement.

Tôte. Hebetude, enfusion et embarr s dans la tête, qui est comme engourdie, avec envie de dormir.— Acces de vertige, avec scintillement devant les yeux, et étourdissement en marchant. Émoussement de tous les sens. — Maux de tête, avec battement de cœur et vertige. — Pesanteur de la tête, surtout dans l'occiput Douleur de tête semi laterale. — Douleurs pressures dans la tête, avec tension compressure comme si le cerveau s'était contracté en masse durc, souvent avec étourdissement jusque dans la racine du nez, quelquefois le soir et la neit. — Traction, déchirement et fouillement dans la tête. — Douleurs lancinantes dans la tête, quelquefois s'étendant jusque dans les yeux, avec besoin de les fermer. — Tétebration dans le front. — Battement dans une moitié du front. — Tremblement chronique de la tête.

Yenx. Yeux fatiques, et qui ont besoin de sommeil et d'être fermés fortement. — Douleur de meurtrissure dans le globe de l'æil, au toucher. — Pression eur les yeux. — Elancements, sensation brûlante et cuisson dans les angles internes des yeux, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux troubles, noves. Amaurose





TARTARUS EMETICUS.

commençante. — Vue trouble, avec scintillement decant les yeux, surtout en se levant de son siège.

Oreilles et nes. — Bourdonnement d'oreilles. — Violent coryzu fluent, avec éternument fréquent, narines ulcérées, frissons et

perte de l'odorat et du goût.

Face et dents. — Visage pále et háce, ou rouge et boufil, avec expression anxieuse. — Pression sourde, tractive, à la pommette. — Tressaillement convulsif des muscles de la face. — Lèvres arides et qui s'exfolient. — Lèvres gercées. — Odontalgie avec douleurs très-violentes, le matin.

Bouche. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Langue humide, nette, ou chargée d'un enduit brun.

Aphonie.

Appétit. — Insipidité des aliments. — Goût salé dans la bouche. *Goût amer dans la bouche. — Soif d'eau froide. — Appétit modéré, avec soif ardente. — Appétit prononcé, avec prompt degoût dès qu'on a pris quelques aliments. — Boulimie, en se promenant au grand air. — Désir excessif d'acides, ou de fruits crus (des pommes). — Dégoût pour tous les aliments, surtout le lait. Chaque bouchée produit une sensation douloureuse, jusque dans l'estomac.

Estomao. — Renvois à vide. - Renvois sanglotants. — Renvois avec goût d'œufs pourris, la nuit. -- Regurgitations de sérosités acres, on salece, on bien acidulées. - Regurgitations du lait. après en avoir pris. - *Nausées, continuelles quelquefois. avec enrie de comir, angoisse, pression dans le scrobicule et mal à la tête, soulagées en expulsant des flatuosités par le haut et le bas. - Vomiturition violente, avec écoulement abondant de salive. sueur au front et lassitude dans les jambes, ou bien *avec diarrhée et débilité excessive. - Vomissement abondant, avec efforts riolents, douleurs dans l'estomac et le ventre, tremblement du corps, besoin de se replier sur soi-même, frissons, et forte enviede dormir. -- Fomissement muqueux, avec diarrhee muqueuse. — Vomissement aigre des aliments. — *Vomissement de matière » aigres et amères, surtout la nuit. Sensibilite excessive de l'estomac; la plus petite bouchée cause une sensation douloureuse - Mal à l'estomac, comme par surcharge. - Malaise et vacuitdans l'estomac. — Pression dans l'estomac et le scrobicule, surtout après le repes. — Battements violents et pulsations dans la région de l'estomac. — Élancements dans le créste de l'estomac. Ventre. - Douleurs abdominales, avec grande agitation morale et physique, et éloignement pour toute espèce de travail. --

ventre. — Douleurs abdominales, avec grande agitation morale et physique, et éloignement pour toute espèce de travail. — Malaise dans l'épigastre et l'hypogastre, qui oblige à se coucher et à s'étendre. — Plénitude et pression dans le ventre, comme s'il contenait des pierres, surtout en se tenant courbé en étant assis. — Coliques crampoldes, dans le ventre, avec contraction viulente des paupières, et besoin invincible de dormir. — Douleux-



TARTARUS EMETICUS

incisives dans le ventre, comme si les intestins ctaient coupes. Pulsations dans le ventre. Production abondante de flatuosités,
avec grondement, borborygmes et pincements dans le ventre.

Selles. Constipation, alternant avec diarrhee — Selles de la consistance de la bouillie — Diarrhées maquenses, on jaunes, brun clair, ou bien aquenses, precédées souvent de tranchées et de mouvements dans le ventre. — Selles sanguinolentes. — Evacuations involontaires. — Pendant la selle, battement de cœur. — Chatouillement excessivement brûlant, depuis le rectum jusque

dans le glaud. - Lancinati ins dans le rectum.


72K

Orines, Règles. Emussion d'urine, très-abondante et pénible, avec tension dans le perinee, sensation brûlante dans l'urethre, et econlement peu abondant, et sanguinolent vers la fin, avec douleurs violentes dans la vessie. - Besoin d'uriner, la nuit, avec soif ardente et emission peu abondante - Emission involontaire des urines. - Urine rouge, enflammes, qui forme, eu reposant, des filaments rouges de sang. - Urine brune foncee, acre, trouble. - Pression et tension sur la vessie. - Elancements dans l'urèthre et la partie inferieure de la vessie. - Menstruntion d'un sang aqueux. - Eruption boutonneuse aux parties genitales.

Larynx. — Catarthe, avec irritation qui provoque la toux, accumulation abondante de mucosités, et râle muqueux dans la poitrine. — Enrouement. — Sensibilite douleureuse du larynx, au toucher — Toux provoquée par un fort chatouillement dans la trachée-artère. — L'enfant tousse, lorsqu'il se fache. — Accès de toux, avec étouffement suffocant de la respiration (tous suffocante) — Toux, avec chaleur et moiteur des mains, et sueur n la tête, principalement au front — Toux, avec romissement des aliments, après le repas. — Toux creuse, avec rale muqueux dans la poitrine. — Toux avec expectoration de mucosites blanchâtres ou jaune-citron, quelquefois la nuit seulement.

principalement après minuit.

Poitrine. * Étouffement de la respiration fréquemment, surtout le soir ou le matin, au lit, au point de suffoquer. Haleine courte. — Respiration difficile. — Paralysic des poumons. — *Oppression de poutrine, anxieuse, avec sensation de chaleur qui remonte au cœur. — *Râle muqueux dans la poutrine, en respirant. — Douleur d'excoriation dans la poutrine, surtout au côté gauche, par accès. — Douleur rhumatismale dans le côté gauche de la poutrine. — Sensation brûlante dans la poutrine, qui remonte dans la gorge. — *Inflammation des poumons, avec symptômes bilieux et gastriques, signes d'hépatisation et expectoration jaunâtre. — Battement de cœur, visible et anxieux, quelquefois pendant la selle. — Fouillement tournoyant et coups dans la region du cœur, la nuit, ne cédant que lorsque la sueur commence à s'établir. — Eruption miliaire sur la poitrine.



TARTABUS. — TEUCRIUM MARUM VERUM.

Trens. — Douleur au dos et aux reins, en étant assis, comme par fatigue. — Douleur rhumatismale dans le des. — Faiblesse des muscles du cou, qui ne permet pas de tenir la tête droite. —

Eruption miliaire à la nuque.

Bras. — Craquement dans les articulations de l'épaule, avec déchirement dans les bras et jusque dans les mains. - Pesanteur excessive des bras. — Tressaillement des muscles dans les bras et les mains. — Eruption miliaire aux bras. — Boutons pruriants sur les bras et les poignets. — Taches rouges sur les mains, comme de piques de puces. - Tremblement des mains. -- Mains froides. -- Froid glacial du bout des doigts. - Bouts des doigts morts, sees et durs. — Taches jaune foncé, sur les doigts. — Distornion des doigte.

Jambon. — Pecanteur et douleurs rhumatismales dans les hanches et les jambes. — Faiblesse douloureuse dans l'articulation du genou, le matin, au lit. — Tension des tendons du jarret et du con-de-pied, en marchant. — Crampe dans le mollet. — Froid aux pleda. — Engourdimement des piede, chaque fois que l'on

s'assion.

THUCKIUM MARUM VERUM.

TEUCR. — Germandrée maritime. — Archives de STAPE. — Hist. not. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 288. — Dones nutées : 0, 30. — Darée d'action : 2 à 3 semaines, dans quolques cas de maladies chroniques. ANTIDOTES: Camphors. COMPARER AVEC: Con. ign. magn-aret

CLIBIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : --Polypes au mes et quelques affections par suite d'Ascarides.

SYMPTOMES GENERAUX. — Déchirement dans les membres. mais surtout dans les articulations. — Treseaillement des musclen. — Grande irritabilité et surexcitabilité nerveuse, avec tremblement et étourdissement. -- Chancellement en marchant : on met les pieds l'un sur l'autre. - Engourdissement et fourmillement dans les membres. — Besoin d'exercice en plein air. Élancements pruriants à diverses parties.

Sommeil. — Sommeil tardif, le soir. — Sommeil non réparateur et difficulté de se réreiller, le matin. — Sommeil agité la suit. par surencitation excessive, avec rères vifs et surmants fréquents.



TEUCRIUM MARUM VERUM.

730

Fièvre. Frisson et grelottement, souvent avec froid glacial, aux mains, et baillement frequent - Chaleur augmentée, le soir.

Moral. — Irestabilité et disposition o se facher, avec une telle impressionnabilité qu'en se sent beaucoup fatigué en ne faisant qu'enten le parlet. — Morosite. — l'aresse et oloignement excessif pour l'étravail. — Forte surexcitation morale et loquacité. — Entre irresistible de chanter.

Tête. Cephalalgie, avec doaleur sourde, crampoide. — Douleurs pressures dans la tête, principalement dans les yeur, dans le tront et les tempes. — Déchiroment par accès dans le côté droit de la tête.

Youx. — Douleur dans les yeux, avec pression comme ai un grain de sable s'y était introduit. — Cuesson dans les yeux, surtout dans les angles internes, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux rouges, enflammes. — Yeux larmoyants avec aspect comme si on avait pleuré.

Oreilles. — Otalgie. — Élancements et déchirements dans les oreilles. — Sifflement dans les oreilles en parlant, ou en produisant un son quelconque. Eruption de dartres écailleuses au laba de l'artille.

lobe de l'oreille.

Nez. - Sensation d'obturation dans le nez. Fourmillement dans le nez. Eternument frequent, avec fourmillement dans le nez.

Obturation du nez. - Coryza fluent au grand nir.

Visage. — Teint maladif, pâle, avec yeux caves. — Chaleur fugace au visage, sans rougeur. — Déchirement pressif dans les os des jones, jusque dans les dents.

Dents. Odontulgie, avec douleur déchirante, dans les racines des dents et les geneives. Douleur dans les dents et les geneives,

pendant la mastication.

Bouche et Gorge. Bouche pâteuse. Cuisson et grattement au fond du gosier et à la racine de la langue. Mal de gorge, avec douleur lancinante et déglutition génée. - Presson ou traction et déchirement dans la gorge Besoin fréquent de renâcler et renâclement abondant de mucosités d'un goût de moisi.


Appétit. — Gout amer dans le gosier, après le dîner — Appetit plus prononcé. — Sensation de farm, comme si les aliments ne rassaciaient pas, empéchant de s'endormir. — Après avoir bu de l'eau, tranchées et nausées avec envie de vomir.

Estomac. Regurgitation des aliments, avec goût amer.—Hoquet pénible en mangeant, avec coups violents dans le scrobicule. —

Mal d'estomac, comme par vacuité, avec gargouillement. —

Fadeur dans le creux de l'estomac. — l'ression et oppression anxieuse dans le scrobicule.

Ventre. — Coliques avec tractions déchirantes sous les hypocondres. — Incarcération de flutuosités, avec tiraillement, pincement et gargouillement dans le ventre. — Pression dans le ventre. — Pression dans le ventre.



TEDOR, MAR. VER. -- THERIDION CURASSAVICUM. 731

nice vere l'anneau inguinal. — Expulsion abondants de flatuosités, avec adeur d'ords pourris.

Salles. - Belle abandante, de la consistance de la bouillie, et fétide. - Espulsione d'accarides. - Prurit et fourmillement fréquent

à l'anns, souvent après les selles.

Urines. — Sécrétion d'urine plus abondante et aqueuse. — Senention pénible d'emoriation et de cuisson à la partie supérieure de l'urèthre. — Sensation brûlante pendant et après l'émission des urines. — Diminution de l'appétit vénérien.

Polizine. — Poitrine chargée, avec sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — l'oux sèche, provoquée par un chatouillement dans la trachée-artère, comme si on avait respiré de la poussière. — Pretsion serrante dans la partie inférieure de la poitrine, avec malaise anxioux.

Principles. — Traction rhumatismale et tension dans le dos. —
Principles des principles des bras et les avant-bras. — Tresmillement des muscles des bras. — Déchirement tractif dans les
es et les articulations des bras, des mains et des doigts. — Pulsations deuloureuses et tiraillement dans l'index. — Tressaillement des muscles dans les jambes. — Déchirements dans les articulations et les es des jambes, des pieds et des ortells. —
Doulour dans le gros ortell, comme si l'ongle entrait dans lex
chairs.

THERIDION CURASSAVICUE.

THER. — Théridien ou Areignée noire de Curação. — Héning. — Hist. not. et prép. Vey. Pharm. homosp., p. 346. — Dose usitée : 30. — Durée d'action :?

ARTIBOTES : ?
Courann avec : Cale. Iye., médicaments après losquels le théridien est principalement efficace, foragu'il est d'ailleurs indiqué.

CLABIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : - Mai de mer; Affections gastriques, etc., etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande faiblesse générale, avec tremblement des membres. — Malaise excessif qui ne permet d'effectuer aucun travail. — Forte enrie de dormér, et sommeil plein de rêves. — Sommeil profond, la nuit. — Frieson violent. avec pessateur dans tous les membres. — Envis de dormér et



732 THERID, CURASSAV. THUYA OCCIDENTALIS.

besoin de se coucher après le déjeuner. Découragement et manque de confiance en soi-même. — Forte disposition à s'effrayer. — Le temps passe trop vite. — Crainte excessive du travail. Difficulté de méditer, et surtout de faire des comparaisons.

Tête. — Embarras de la tête, qui empêche de travailler. — Vertige fréquent, surtout en se baissant — Vertige ar ce nausces, au point de vomir. — Mal de tête dans le fond des orbites. — Sensation comme s'il y avait un corps etranger dans la tête. — Cephalalgie frontale, violente, avec pulsation jusque dans l'occiput. — Mal de tête à chaque mourement que l'on fait. — Pression tensive autour de la tête, comme par un cercle de fer, à la racine du nez, et audessus des oreilles. — Maux de tête le soir, avec grand accablement.

Youx — Face. — Scintillement devant les yeux, par accès fréquents. — Bourdonnement d'oreilles. — Bruissement dans les oreilles comme par une chute d'eau. Sensibilité excessive de l'oule, vertige et nausées à chaque son un peu fort. — Prurit violent derrière les oreilles — Éternument frequent et écoulement d'eau par le nez, sans coryza — Mâchoire inférieure quelquefois immobile, surtout le matin, au réveil.

Bouche — Ventre. — Bouche pâteuse, et comme brûlée.

Tous les sons et le froid produisent une sensation douloureuse, au travers les dents. — Appotence pour les acides, le vin, l'eaude-vie et le tabac. — Desir continuel d'aliments ou de boissons, sans savoir lesquels — Nausces et romissements, la nuit, précedes de vertiges et renouvelés par le plus léger mouvement ou en fermant les yeux. — Nausées provoquées par tous les sons un peu forts.

Selles - Parties génitales. — Constipation. Selle peu abondante, de la consistance de la bouillie, avec besoin pressant. Chute de l'anus, douloureux en étant assis. Sécrétion d'urine plus abondante. — Exaltation immodérée de l'appetit vénérien. — Racornissement du scrotum.

Poitrine et Tronc. — Lancanations violentes, dans la partie supérieure de la poitrine. — Besoin de respirer profondément et de soupirer. — Prurit et nodosités aux fesses.

THUYA OCCIDENTALIS.

THUI. -- Thurs du Canada - Hahnemann - Hist. nat et prop. Vor Pharmac homœop., p. 301 - Doses usitées 0,30 - Durec d'action . jusqu'a 5 semaines dans des affections chroniques

Antidotes Cample puls - On l'emploie comme antidote de Thea et

COMPARER AVEC Asa, bry cann. chin. etc. for led bye many mere, nor oc.



733

phon-ac. pu'e. sabin. salon. staph. — C'est surtout après nitr-ac., que shape est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après thuya, conviennent quelquefois : Nitr-ac. pule. staph.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, en verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques; Dartres syphilitiques et chancres opinitires; Affections sycotiques (Condylomes); Verrues; Patite vérole; Fièvres intermittentes; Onène?; Prosopalgie; Gremonillette; Coliques par étranglement des intestins; Gonorrhée; Cancer de la matrice?; Verrues aux mains ches les onanistes, etc., etc. Voir le mote, page 15.

STRPTOMES CHURLAUX. — Élancements dans les membres et les articulations. — Craquement dans les articulations, en **étendant la partie. -- Gondement des veines de la peau. -- *Tres**saillement de quelques membres et de quelques muscles. — Douleurs déchirantes et pulsatives, comme si les parties souffrantes étaient ulcérées. — Gonflements inflammatoires avec rougeur. - Souffrances après s'être échauffé, avoir bu du thé, ou mangé des aliments gras ou des oignons. — Tremblement de quelques merabrea. — Engourdispement facile des membres, surtout la muit, en se révellant. — *Les symptômes s'aggravent généraloment au révoil, ou après midi, ou la nuit vers trois heures du matin ; ils empêchent de s'endormir, le soir. -- *Beaucoup de symptômes s'aggravent dans le repos et par la chaleur, surtout celle du lit ; ils s'améliorent par le mouvement, le froid cl **la transpiration. — *Beaucou**p de symptômes semblent se mamifester principalement du côté gauche. — Roideur et pesanteur générale dans tout le corps, surtout dans les épaules et les cuisses. — Paibleme physique, avec plénitude des facultés morales. — Tressaillement fréquent de la partie supérieure du corps. — Bouillonnement violent du sang, le soir, avec pulsation dans toutes les artères, aggravé par le mouvement, soulagé en étant amia. — Crainte du mouvement. — Les symptômes ont le plus souvent un caractère local, paraissant par attaques, se remplacant par des souffrances dans d'antres parties, apparuissant et disparaissant subitement.

Poen. — Sensibilité douloureuse de la peau. — Élancements pruriants à la peau, surtout le soir et la nuit. — Boutons purulents, comme dans la variole. — Condylomes. — Furoncles. — Engelures. — Taches brunes ou rouges, marbrées sur la peau. — La plupart des souffrances cutanées sont soulagées par le toucher. Sennell. — Perte envie de dormir, le soir. — *Sommeil tardif. à cause d'agitation et de chaleur sèche. — Insomnie nocturne.



THUYA OCCIDENTALIS

734

avet agitation et froid du corps. — Sommeil non reparateur, la nuit. — Dès qu'on s'endort, *rêves pénibles, anxieux, de dangers et de mort, ou bien avec sursauts et cris, surtout en étant couché du côté gauche — Rêves luscifs, sans émission de sperme, avec érections douloureuses au réveil

Pièvre. — Frisson avec baillement, après minuit. — Frisson tous les matins, sans soif — Frisson grelottant avec froid interieur et extérieur (et soif), suivi immédiatement de sueur. — Frisson tous les soirs (à 6 heures), avec chaleur exterieure, sécheresse de la bouche et soif. — Chaleur *le soir, à la fues surtout. — Sueur au commencement du sommeil.

Moral. *Accablement moral. - Appréhensions anxieuses sur l'avenir. -- Agitation qui rend toute chose pénible et répuguante. -- On est tres-pensif. pour la moindre bagatelle. -- Dégout de la vie. Humeur morose et maussade -- Lenteur de la parole et de la réflexion; on cherche les mots en parlant. -- Incapacité de réflechir.

Tête. Vacnité de la tête, comme dans l'ivresse, surtout le matin, avec nausées — Faiblesse et embarras de la tete, comme par torpeur ou paralysie du cerreau. - Vertige comme si en était balancé — Vertige en se levant de son siège et en étant couché, ou bien en regardant en l'air. - Moux de tête le motin, comme après s'être baissé ou apres un sommeil trop profond, avec rougeur de la face. - Céphalalgie sourde, etourdissante - Cephalalgie aggravee en se baissant, soulagee en reuversant la tetu. Pesantour de la tête, surtout le matin, au réveil, dans l'occiput, avec manvaise humeur et eloignement pour la conversation. -Céphalalgie comme si le front allait e echapper, avec frisson intérieur, soulagee par la marche au grand air. - Moux de tête pressifs avec secousses dans le front et les tempes. Maux de tote compressifs, surtout dans les tempes. — Douleur dans la téle, comme si un clou était enfoncé dans le vertex. - Déchirement semi-lateral, dans le sinciput et la face, jusque dans les pommettes, principalement le matin et le soir. Tressaillement déchirant dans l'occiput - Lancinations a travers le cerveau. -Congestion de sang a la tête. Pulsation dans les tempes. -Sensibilité excessivement douloureuse du côte gauche de la tête. et même des cheveux, la nuit, en étant conche, et au toucher. Traction pressive dans les muscles des tempes, surtout pendant la ma-tication - Elancements dans les tempes - Gonflement des vemes, aux tempes. - Prunt et rongement au cuir che-

Yenx. Pression dans les yeux, et cuisson comme si un grain de sable s'y était introduit. — Déchirement dans les sourcils. Elancements dans les yeux, à une vive clarté et à l'air vis Sensation brûlante dans les yeux — Selératique enflammec, rouge de sang. — Gonfirment inflammatoire des paupières.





avec dureté. — Nodosités rouges et douloureuses sur les bords des paupières. — Boutons purulents et pruriants entre les sourcils. — oCondylomes dans les sourcils. — Sensation de chaleur et de sécheresse dans les angles externes des yeux. — Larmoiement, surtout de l'esil gauche, pendant la marche au grand air. — Agglutination nocturne des paupières. — Obscurcissement de la vue en lisant, avec sensation de sommeil. Vue trouble, comme à travers un voile. — Myopic. — Points noirs, voltigeants, devant les yeux.

Orellies. — Otalgie, avec compression serrante et élancements violents, surtout le soir. — Douleur crampoide à l'oreille extéricure. — Martellement et dechirement dans l'oreille, le soir, au lit, avec émission frequente d'urine, et froid aux jambes et aux

pieds. - Douleur pressive derrière les oreilles.


Tension tractive dans les os du nez — *Crostes doulourenses dans le nez. — Mouchement de sang. — Epistaxis fréquentes, surtout après s'être échauffé. — Coryza sec, qui devient fluent, en plein air, avec maux de tête continuels. — Coryza fluent, avec tous et enrouement. — Écoulement verdètre et fetide par le nez.

Vinege. — Chaleur de vienge, quelquefois soulement fugace, ou bien eves rougeur ardente. — Sueur à la face. — Eruption faciale, erotteuse, pruriente. — Nodosités rouges et douloureuses sux tempes. — Doulour faciale térébrante et fouillante, dans les pennecties, soulagée par le toucher. — Tressaillement des libres. — Éruption boutonneuse aux lèvres et au menton. — Élancuments dans la machoire inférieure, qui semble ressortir par les orailles. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Dunte. — Odontalgie, après avoir bu du thé, avec douleur prossive jusque dans la machoire. — Odontalgie avec tiralllements algus, surtout pendant la mastication. — Rongement dans les dents (cariées), avec sensibilité douleureuse de tout le côté de la tête, fortement aggravé par le contact des choses froides ou la mastication. — Gencives gonflées, avec douleur d'excoriation.

Bonche.—Aphthes dans la bouche.— Fort gonflement des glandes salivaires, avec salive plus abondante dans la bouche. — Salive sanguinolente ou amère. — Douleur d'excoriation au bout de la langue, an toucher. — Gonflement de la langue, douloureux au toucher. — Grenouillette des deux côtés de la langue, transparente, rouge bleuâtre, grice et comme gélatineuse. — Parole leute.

Gerge. — Apreté et grattement dans la gorge. — Pression et douleur d'excoriation dans la gorge et le palais, pendant la déglutition. — Besoin d'avaler. — Élancements depuis le gosier jusque dans les crailles. — Gonflement des amygdales et de la gorge. — *Ulcium dans la gorge et la bouche, comme des chanceps. — Renàclement de musesités couleur rouge de sang.



茎

THUYA OCCIDENTALIS.

Appétit. — Goût fade et douceâtre dans la bouche, le soir et après le repas. -- Gout amer du pain. -- Les aliments ne semblent jamais assez salés. — Soif seulement la nust et le matin. — Appétence pour les boissons et les aliments froids. — Satiété prompte en mangeant. — Incommodités après avoir mangé des aliments gras ou des oignons. - Apres le repas, grande paresse, ou abattement avec angoisse et battement de cœur, ou fort ballonnement et souffrances par des flatuesités.

Intomao. — Renvois des aliments, après le repas. — Renvois amers, ou putrides. -- Renvois rances, surtout après les aliments gras. --Nausées et malaise dans la région de l'estomac. — Vomissement de aérocités acidulées et d'aliments. — Crampes d'estomac, avec exacerbation excessive vers le soir. — Pression dans le scrobicule après le repas, avec douleur au toucher. — Battement dans le scrobicule. — Angoisse dans le creux de l'estomac qui monte

iusque dans la tête.

786


Ventre. — Pression douloureuse dans la région hépatique. — Pression dans la région des reins. - Ballonnement du ventre, souvent avec douleurs contractives et crampoides. — Tension constrictive dans le ventre. — Douleurs pressives dans le bas-ventre, surtout vers le côté (avant la selle). — Sensation de quelque chose de vivant dans le bas-ventre. - Douleur dans le ventre comme par étranglement des intestins. — Grondement et borborygines dans le ventre. - Induration dans le bas-rentre. - Douleur déprimante dans les aines. — Traction dans les aines en marchant et en étant debout, avec élancements le long des cuisses, en s'asseyant. — *Gonflement douloureux des glandes de l'aine, quelquefois avec traction jusque dans le genou.

Belles. — *Constipation qui dure plusieurs jours, quelquefois après des pollutions. — *Ténesme -avec roideur de la verge. — -* Ecacuation difficile d'une selle dure, volumineuse et enduite de sang. — Ecoulement de sang pendant la selle. — Contraction douloureuse de l'anus, pendant la selle. — Sensation brûlante à l'anns et entre les fesses. -- • Condylomes à l'anns. -- Déchire•

ments le long du rectum. -- • Fustule du rectum. Urines. - Besoin fréquent d'uriner, avec émission abondante d'une urine aqueuse, même la nuit. --- Sédiment nuageur dans l'urine. — Urinc sanguinolente. — Suintement d'urine prolongé, après avoir uriné. — Sensation comme si une goutte coulait dans l'urèthre, après et hors le temps de l'émission des urines. - Sensation brûlante dans l'urèthre, surtout le matin et dans la journée, comme aussi après et pendant l'émission des urines. - Élancements dans l'nrèthre, pendant et hors le temps de l'émission des urines. — Cuisson dans les parties sexuelles de la femme, pendant l'émission des urines. — Prurit dans l'urèthre. *Ecoulement jaunătre par l'urêthre, avec verge cordée.

Parties génitales. — Sueur abondante aux parties génitales, sur-





THUYA OCCIDENTALIS.

tent an account. — Gonorrhée bâtarde. — *Condylomes sur le gland et le prépuce, humides, pruriante, et suppurant surtout à la lune craimante. — *Ulcères comme des chancres au prépuce. — Gonfisment du prépuce. — Élancements dans le scrotum, la verge et le long du cordon spermatique, jusqu'à l'ombilic. — Traction dans les testicules, avec rétraction de l'un d'eux (le gauche). — *Érections douloureuses, continuelles, surtout la suit et le matin, avec lancinations dans l'urêthre. — Pollutions, avec senation de rétrécissement de l'urêthre. — Écoulement de liqueur prostatique. — Écoulement abondant et aqueux par la verge.

Edgiss. — Prurit et enimon brûlants, comme par excoriation, aux parties génitales. — Premion sur les parties génitales. — Douleur contractive et crampolde dans les parties génitales, jusque dans le bas-ventre. — Gonflement et excoriation des lèvres. — •1'er-rues à l'orifice de la matrice, avec élancements et sensation brûlante en urinant. — Menstruation trop peu abondante. —

Loucorrhée.

**Content de la trachée-artère. — Élancement et fourmillement dans la trachée-artère. — Toux, le matin, provoquée par un chatouillement dans la trachée-artère. — Toux provoquée par un échaussement. — **Expectoration de petits globules grus, james ou verts, en toussant. — Toux, avec expectoration de mucosités james, et douleurs dans le scrobicule, l'après-midi.

Petitine. — Gêne de la respiration, avec forte soif d'eau et grande anxiété. — Dyspuée, avec besoin de respirer profondément. — Opprension tantôt du côté gauche de la poitrine, tantôt de l'hypocondre gauche, avec irritation qui provoque la toux. — Douleur de poitrine, comme par quelque adhérence intérieure. — Pression sur la poitrine, quelquefois après le repas. — Agitation et sensation de gonfiement dans la poitrine. — *Lancination* dans la poitrine, surtout après avoir bu froid. — Bouillonnement de sang dans la poitrine, et *battements de cœur riolents et sensibles à l'ouie, surtout en montant un escalier. — *Battement de cœur, avec nausées. — *Sensibilité douloureuse de la région du cœur. — Couleur bleue de la peau, autour des cluvicules.

Trens. — Douleur de brisement et roideur aux reins, dans le dos et la suque, surtout le matin, après s'être levé. — Tractions dans le dos et aux reins, en étant assis. — Térébration dans le dos. — Pulsation dans l'épine dorsale. — Furoncles au dos. — Inquiétudes dans la nuque, le cou et la poitrine. — *Tension de la peau de la nuque en remuant la tête. — Gonflement des glandes du cou. — Gonflement des veines du cou. — Sueur abondante sous les aissalles. — Taches brunes sous les bras, comme des taches de

maimance.



738 THUYA OCCIDENT. - VALERIANA OFFICINALIS

Bras. - *Battement dans l'articulation de l'épaule. *Douleur d'ulcération, déchirante, pulsative, depuis l'epaule jusqu'au bout des doigts. - Douleur de laxation dans l'epaule et le bras, avec craquement. - Traction feuillante dans les bras, comme dans l'os on le périoste. - Tressaillement invalentaire des brus, le jour. -La puit, sensation de froid, au bras. - Lancinations dans les bras et les articulations. - Craquement dans l'articulation du coude, en etendant les bras. Tache rouge marbré a l'avant-bras. Tremblement des bras et des mains, en ecrivant. - Sensation de néche resse de la peau des mains. - Sueur aux mains. - l'eines gonflees aux mains - Verrues aux mains. Froideur, torpeur et paleur du bout des doigts et des doigts, s'etendant quelquefore jusqu'a l'avant-bras. - Fourmillement et élancements dans le bout des diagts. — Conflement rouge et douloureux du bout des donts - *Les douleurs dans les bras s'aggravent en les laissant pendre ou à la chaleur; elles s'améliorent par le mouvement, le froid et après la transpiration.

Jambes. Traction dans les jambes. Elancements dans les jambes et les articulations. Grande faiblesse et lassitude dans les jambes, surtout en montant un escalier. Pesanteur et roideur des jambes, en marchant. Sueur abondante aux cuisses et aux parties génitales. Prurit aux cuisses Eruption boutonneuse aux fesses, aux cuisses et aux genoux. Ulceres aux cuisses. Craquement dans les articulations des genoux et des pieds, en les étendant. Pustules suppurantes aux genoux. Nodesites blanches, avec prurit violent aux orteils — Gonflement inflammatoire et rouge du bout des orteils, ou du ceu-depied, avec douleur et tension en s'appuyant sur le pied et pendant le mouvement. — Taches rouge marbré sur le cou-de pied. — Sueur aux pieds, principalement aux orteils. — Engelures aux


orteils.

VALERIANA OFFICINALIS.

VALER - Valériane officinale. - Archives de STAPF — Hist not, et prép Voy Pharmac homosop , p 306 - Doses usitées . 12,30 — Durée d'acuon -3 à 10 jours dans qui lques cas. ANTIDOTES : Camph. coff.

COMPARER AVEC : Arn. bell. cham. cocc. coff con ign merc n-vom. plat.

CLINIQUE. — On a employé ce médicament contre quelques cas de Fièrre entermittente, ainsi que contre des l'éphalalgies et des Coliques chez des personnes hystériques.



739

 ${f EYEPTOMMS}$ GRNERAUX. Déchirement shumatismal dans les membres, généralement en dehors des articulations, principalement dans le repos, après le mouvement, et le plus souvent soulagé par le moucement, ou transformé par la marche en d'autres sensations et à d'autres parties. - Douleurs tressgillantes et ébranlantes, apparaissant subdement et par accès. — Douleurs qui se manifestent lorsqu'on reste longtemps dans une position quelconque, et s'améliorent lorsqu'on en change. -Traction et tressaillement aux membres, comme si c'était dans les es. — Doulour de paralyzie dans les membres, vers la fin d'une promunade. — Souffrances périodiques, réapparaissant après 2, 8 mois. — Attaques d'épilepsis. — Torpeur paralytique dans les membres. — La plupart des symptômes se manifestent le seir et après le diner. - Surexcitation et irritabilité maladives, générales, avec lamitude dans les membres, grande gaieté et apparence de vigueur. — Courbature, surtout dans les membres inférieure, le matin, après s'être levé. — Eruptions de petites nodositée, d'abord rouges et confluentes, puis blanches et dures. mantil. — Incomnic. — Sommeil agité, avec jactation et rêves

anzioux et confus.

Fidure. — Friscon, avec chaleur continue, après un court friscon, nocempagné d'embarras de la tête et de soif. — Pouls accéléré. — Sucur fraguents, surtout à la face et au front (souvent apparaiseast subitement, et se dissipant promptement).

Beral. — Sursation anxiouse, hypocondriague, commo si tout ce qui environne était désert, déplaisant ou incompu. — Surexcitation joyeuse, tremblante. - Peur, le soir. - Désespoir. - Apparition alternative d'attemptémes moranx les plus opposés. — Modilité excessive de la little des la line de la company du - Mobilité excessive emtiment général.

Tôte. — Tête embarramée, comme par l'ivresse. — Ivresse et étourdimement, avec absence d'idées. — Tournoiement dans la tête en sa penchant en avant. — Céphalalgie apparaissant subitement ou par acoès. — Céphalalgie pressire ou avec lancinations pressives aurtout dans le front, vers les orbites, alternant souvent avec embarras et étourdissement dans la tête. — Douleur tractive d'un côté de la tête, par un courant d'air. — Contraction étourdissante dans la tête, comme par un coup violent sur le vertez. — Sensation de froid glacial, à la partie supérieure de la tête, par la pression du chape

Four. - Yeur abattus, comme après une débauche nocturne, surtout après le repas. — Pression, sensation brûlante et cuisson dans les yeux. - Bougeur et douleur d'excoriation au bord des paupières. — Gonflement et sensibilité douloureuse des paupières. — Myopis. — Clarté et lueur devant les yeux, dans l'obscurité, de manière que les objets deviennent presque recon-

naimables, - Etincelles devant les yeux,



VALERIANA OFFICINALIS

740

Oreilles — Dents. Otalgie, avec traction crampoide. — Tressaillement dans les oreilles. — Tintement et sonneries dans les oreilles. — Douleur faciale, avec traction crampoide dans les os des joues. — Rougeur et chaleur des joues, au grand air. — Vésicules blanches sur la joue et la levre supérieure, douloureuses au toucher. — Odontalgie, avec douleur lancinante.

Appétit. - Goût dans la bouche (et odeur devant le nez), comme de suif fétide. - Goût amer sur le beut de la langue, en la passant sur les lèvres, après le repas. - Gout fade et muqueux de la bouche, le matin, après le réveil. - Boulimie, avec nausées.

Estomac. — Renrois avec goût d'œufs pourris, le matin au reveil. — Renvois fréquents, a vide, ou rances et brulants — Nausées, acec encie de comme, et sensation comme s'il y avait un fil depuis le gosier jusque dans le ventre, avec accumulation abendante de salive. — Nausées, avec evanoussement, levres blanches et froideur du corps. — Vomossement de bile et de mucosités, avec violent frisson grelottant. — Vomissement nocturne — Faiblesse de l'estomac et de la digestion. — Pression dans le scrobicule, apparaissant subitement, et se dissipant promptement par un gargouillement dans le ventre.

Ventre. — Douleurs dans la region hepatique et l'epigastre, au toncher. — Secousses douloureuses dans l'hypocondre drait. — Lancinations dans la region des reins, en s'asseyant. — Ventre ballonne et dur. — Forte sensation d'expansion dans le ventre, comme s'il allait éclater. — Propension a retracter le ventre. — Crampes abdominules, generalement le soir, au lit, on après le diner, ne se laissant soulager par aucune position. — Coliques par des hemorrhoides. — Tranchees et pincements douloureux dans le ventre, en le rétractant — Manie de ventre, le soir, du côté gauche, comme par ulceration sous-cutanée. — Traction, pression et douleurs de meurtrissure dans le bas-ventre, les aines et les muscles abdominaux, comme après un refroidissement, ou un tour de reins. — Douleurs feuillantes dans le ventre.


Solles — Urines. — Selles duarrhéiques. — Selles verdâtres, de la consistance de la bouillie, mêlées de sang. — Térebrations dou-loureuses dans le rectum. — Écoulement de sang par l'anus. — Ascarides du rectum. — Émission d'urine, abondante et fréquente.

Poitrine — Gêne de la respiration et angoisse sur la poitrine.

Oppression de la respiration, avec pression sur la partie inferieure de la portrine.

Lancinations dans la portrine, quelquefois du côté ganche (dans la region du cœur), en inspirant. -- Éruption de petites nodosités dures sur la poitrine.

Tronc. — Douleur tractive aux reins et dans le dos. — Douleur dans lu région des tombes, comme apres acoir pris un refroidissement ou s'être donné un tour de reins. — Douleurs raumatismales dans les omoplates.



VALERIANA OFFICINALIS. — VERATRUM ALBUM. 741

Bras. — Tractions crampoides et tressaillement, ou bien déchirement dans les bras. — Douleur paralytique dans les articulations de l'épaule et du coude, vers la fin d'une promenade. — Eruption de petites nodosités dures sur les bras. — Tremblement des mains, en écrivant. — Secousses douloureuses à travers la main. Jambes. — Douleur brûlante dans les hanches, le soir, au lit. – Traction crampoide et tressaillement dans les cuisses. — Grande pesanteur et lassitude dans les jambes, mais surtout dans les mollets. — Douleur de brisement dans les cuisses et le tibis. — Douleur paralytique dans les genoux, vers la fin d'une promenade. — Douleur tensive dans les mollets. — Déchirements dans les mollets, surtout en croisant les jambes. — Traction dans les articulations des pieds, en s'asseyant. — Douleur de luxation dans les articulations du pied et les malléoles. — Douleurs et élancements dans les talons, surtout en étant assis. -- Déchirements dans la plante des pieds et sur les orteils.

VERATRUM ALBUM.


VERATR. — Hellébore blanc. — HAMMEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac hommop., p. 307. — Doses a itres : 12,30. — Durée d'action : 2 à 3 semaines dans quelques affections chroniques

ARTIOTES: Acon. camph. chin. coff. - On l'emploie comme antidote de :

Ars. chin. fer.

Comparer avec: Acon. ars. arn. bry. camph. caps. caus. chin. cic. coff coloc. cupr. dros. fer. hell. hyos. ign. ipec. laur. lyc. magn-m. merc mez. op. phos. phos-oc. puls. rhus. rut. sabad. sec. sep. sil. spig. strum. sulf tart. zinc. — C'est surtout après: Ars. chin. cupr. phos-ac., que veratrum est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après veratrum, conviennent quelquefois: Ars. arn. chin. cupr. ipec.

CLIBIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -- Affections chroniques par l'abus du quinquina; Suites fâcheuses d'une peur, d'une frayeur ou d'une contrariété, avec colere; Souffrances rhumatismales; Spasmes hystériques; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de fortes maladies aiguês; Éruptions galeus es; Fièvres gastriques; Fièvres intermittentes; Manie; Migraine; Cephalalgie nerveuse, chez des jeunes filles hystériques et de jeunes femmes; Amblyopie amaurotique; Odontalgies rhumatismales et autres; Faim canine, même à la suite de maladies aiguês (dans la convalescence); Choléra sporadique ou asiatique; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Hématémèse; Diarrhées de différentes natures, même celles produites par des boissons froides, lorsqu'on s'etait échanffé; Constipation opiniàtre; Dysménie des jeunes filles; Vo-



VERATRUM ALBUM.

748

le var la tôte. — Rêves anceloux. — Gémissement pendant le

Mirro. — *Fraid général de tout le corpe, et susure froides visnewses, surfact an front. — Horripilation et frimon, avec soif Pesu freide. — Herripilation et chair de poule, après aveir bu. – •Fidure upoc froid extérieur seulement. 🜥 •Violent frieson gralottant (suivi de chaleur et de soif peu forte), puis sueur, qui se transforme bientot en froid. — Prisson, d'abord avec forte if, saivi de frisson alternant avec chaleur, puis chaleur pernamente asse soif. - Tièvre, avec chaleur intérieure seulement. **he foncés; ou "avec vomimement et diarrhée, ou avec con-**Parison; spendant le frisson, vertige, nausées et douleurs aux rains et dans le don. — "Pendant la chaleur, assouplesement continuel, ou délire taves rougeur de la face. -- Fièrre grant mimust et le matin, quotidienne, tierce ou quarte. — "Poule leut et presque étaint, ou potit, accéléré et intermittent. - Sueur facile

propoguer le jour, par le moindre mouvement.

Maral.— Abattement mélancolique, tristesse et besoin de pleurer. - Affliction inconsolable, avec hurlements et cris pour des malheurs imaginaires. — "Angolese excessive et inquiétude, arec apprehensions et trouble de conscience, surtout la nuit ou le matin, souvent aumi chaque fois qu'on se lève de son siège ou du 18t. — Forte disposition à s'effrayer, et caractère peureux. — *Angolste mortalle.-- *Découragement et désempler.-- Agitation affairés; on se donne beaucoup de mourement, avec grande disposition an travail. -- Disposition à se facher, pour la moindre 10, souvent anivie d'anxiété et de battement de cour. — Grande disposition au silence, avec injures à la moindre provoentico. — Disposition à s'entretenir des fautes d'autrui. — Galeté **Immodérée et loquacité. — Fureur, avec envie de mordre, de** tout déchirer et de s'enfuir. — Perte de la mémoire. — Absence Tidics. — Perto de seno. — *Alienation mentale et démence; avec chant, sifflement, rire, besoin de courir de côté et d'autre. iddes et actions extravagantes et orgueilleuses, ou bien encoravec disposition à se dire atteint d'affections qui n'ont pas la meindre vraisemblance et sont tout à fait fictives. -- *Accès **Tiliénation érotique ou religieuse. — *Délires violents.**

2000. — Embarras dans la tête, comme si, au dedans, tout était meuvant, surtout le matin. — Emoussement de tous les sens. — Vertige tournoyant. — Ivreme et étourdimement. — *Accès de mans de tête, avec páleur du visage, nansées et romissements. - Maux de tête, avec roideur douloureuse de la nuque. --Mal de tête avec flux d'urine. — Maux de tête par accès, comme si le cerveau était meurtri ou déchiré. — *Céphalalgie pressice, couvent dans le vertex, ou bien semi-latérale, avec douleur d'es-Mac. — Douleur constrictive dans la tête (et le gester). — Doulour incisive an vertex. — Ebranlement dans la tête, avec tres-



tion de sang à la tête, en se baissant. — Maux de tête pulsatifs.

- *Douleur brûlante dans le cerveau. — Sensation de froid et de chaleur a l'extérieur de la tête, avec *sensibilité douloureuse des checeux. — *Froid au vertex, comme s'il y avait la un mor-

ceau de glace. - * Sueur froide au front.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme si le globe était meurtri. — Déclurement douloureux, on compression dans les yeux. — Ardeur permanente dans les yeux. — Rougeur des yeux. — Inflammation douloureuse des yeux, surtout de l'œil droit, et parfois avec maux de tête violents, et insomnie nocturne. — Yeux ternes, troubles, jaunâtres. — Couleur bleue des yeux. — Yeux noyes et comme recouverts de blanc d'œuf Sécheresse excessive des paupières — Larmoiement aboudant, souvent avec ardeur, douleurs incisives et sensation de sécheresse dans les yeux. — Agglutination des paupières, pendant le sommeil. — Paralysie des paupières. — Yeux convulses, préminents. — Pupilles fortement contractées ou delatées d'une manière sensible. — Perte de la vue. — Diplopie. — *Cécité nocturne. — Étincelles et taches noires devant les yeux, surtout en se levant de son siège ou du lit.

Oreilles. - Élancements dans les oreilles. Pression et etreintes dans les oreilles. Sensation de froid alternant avec chaleur dans les oreilles. Surdité, comme par obturation des oreilles. - Brassement dans les oreilles, surtout en se levant de son

siége.

714

Nes. — *Froid glacial du nez. — Inflammation et douleur d'ulceration dans l'intérieur du nez — Douleur contractive et déprimante dans l'os du nez. — Epistaxis nocturne, ou par une seule narine. — Odeur de fumier, devant le nez — Sensation de sécheresse pénible dans le nez — Eternument violent et fréquent. —

Coryza


Visage *Face pâle, froide, hippocratique, hâce, acec nez effilé, et cercle bleu autour des yeur. — Visage bleuâtre. — Couleur jaunâtre de la face. — Rougeur de l'une des joues, avec paleur de l'autre — *Rougeur et pâleur alternatives de la face. — Rougeur de la face lorsqu'on est couché, pâleur en se redressant. — *Chaleur brûlante, rougeur foncée et sueur du cisage. *Sucur froide a la face. Douleurs faciales, tractives et tensives, d'un seul côté et s'etendant jusqu'a l'oreille. — Tressaillement et pincements dans les muscles de la face. — l'ustules à la face, vers la fin avec douleur d'excoriation au toucher. — Couperose a la face. — Eruption miliaire sur les joues. — Bouffissure de la face.

- Eruption miliaire sur les joues. — Bouffissure de la face.

*Lèvres sèches, nouvêtres et gercées. Éruption aux commissures des levres. Couperose autour de la bouche et du menton.

*Crampe de la méchoire. Douleur et gouffement des

glandes sous-maxillaires.



745

nts. -- Odontalgie, aveç maux de tête et face rouge, bouffic. -*Odontalgie (quelquefois pulsative) avec gonflement du risage. sueur froide au front, nausées et comissements, courbature et froid de tout le corps, prostration des forces jusqu'à la défaillance. chaleur intérieure et soif inextinguible. — Pression et sensation de pesanteur excessive dans les dents, avec tiraillement pendant la mastication, même des aliments mous. — Grincement des dents. — Vaciliement des dents.

Boncho. - Bouche sèche et pateuse. - Saliration, avec nausees. on avec gout acre ou salé. — Ecume à la bouche. — Sensation de froid ou brûlement dans la bouche et sur la langue. - Inflammation de l'intérieur de la bouche. — Langue sèche, noirâtre, fendillée, ou rouge et enflée. — Langue chargée d'un enduit jaune. — Bégayement. — Perte de la parole. — Sensation

de torpeur et grande sécheresse au palais.

Gorgo. — Mal de gorge, arec douleur constrictive d'étranglement. surtout pendant la déglutition. — Rétrécissement du gosser comme par un gonflement pressif. — Gonflement du gosier avec péril de suffocation. — Sensation de froid ou brûlement dans l'arrière-bouche et le gosier. — Sécheresse dans la gorge, qui ne

peut être apaisée par aucune boisson. — Apreté et grattement

dans la gorge.

Appétit. — Insipidité de la salive dans la bouche. — Goût amer. bilieux, dans la bouche. - Goût putride dans la bouche. comme du fumier, herbacé. -- Goût frais ou piquant dans la bouche et la gorge. — *Soif inextinguible, avec désir de boissons froides, principalement. — Appetit et désir d'aliments. même dans l'intervalle des vomissements et des évacuations alvines. — Faim ardente et voracité. — *Boulimie. — *Désir ardent et continuel d'acides et de choses fraiches (des fruits) - Bepugnance pour les aliments chauds. - Pour peu qu'on ait mangé, comissement immédiat et diarrhée. — En mangeant, nausées avec faim et pression à l'estomac. — Après le repas, hoquet, envie de vomir et régurgitation de sérosités amères.

Estomas. — Renvois avec gout des aliments. — Renvois riolents à vide, même après le repas. - Renvois amers on aigres. - Hoquet fréquent et violent. -- Nausées violentes, avec envie de vomir, sourent au point de s'écanouir et généralement arec forte soif.— *Nausées fréquentes ou continuelles, même le matin. -Ecoulement d'eau par la bouche, comme par pituites. * l'onnissement violent, arce nausées continuelles, grand épaisement et besoin de se coucher, précédé de mains frontes avec horripilation sur tout le corps, accompagne de chaleur génerale et suivi de bouillonnement de sang et de chaleur aux mains. -- *1 omissement des aliments. *Vomissement amer ou aigre. . *Vomessement d'écume et de mucosités cert jaunaitre ou blanches. -



Vomissement de mucosités, la nuit. - Vomissement de bile mire et de sang. *Vomissement continuel, arec diarrhée et pression dans le scrobicule *La moindre goutte de liquide et le plus léger mouvement proroquent les comissements. En vomissant, contraction douloureuse du ventre. Douleur d'estomac, avec faim et soif ardente. *Sensibilité excessive de la région de l'estomac et du scrobicule. *Angoisse excessive au creux de l'estomac. - Vacuite et malaise dans l'estomac. - Crampe d'estomac. - Pression dans le scrobicule, s'et adant quelquefois jusque dans le sternum, les hypocondres et le bas-ventre, surtout après le repas. - *Sensation brûlante dans le creux de l'estomac. - Inflammation de l'estomac

Ventre. — Coliques dans la région mbilicale. — Grande sensibilité douloureuse du ventre, au toucher. — Maux de ventre nocturnes, avec insomnie — Gonflement du ventre. — Ventre dur et ballonné. — Tension dans les hypocondres et la région ombilicale — *Crampes abdominales, et coloques. — Maux de ventre pressifs, tractifs, le soir, en marchant. — Tranchees comme par des conteaux, accompagnées de diarrhée et de soif avec diurèse

*Sensation brülante dans toute l'étendue du rentre, et mine par des charbons andents. Douleur de meurtressure dans les entrailles. Inflammation des intestins. Hernie inquinale. — *Colique flatulente, avec gargonillement bruyant et borborygmes dans le ventre — Plus les flatuosites tardent a être expulsées, plus elles sortent difficilement. — Expulsion violente de


vents par le haut et le bas.

740

Belles.—*Constipation quelquefois opiniâtre, le plus sonvent par inactivité du rectum, et souvent accompagnée de chale ir et de maux de tête. — Ressertement du ventre. — Selles dures et d'un moule trop volumineux. — *Diarrhées riolentes et douloureuses, ou tout à fait indolores, souvent avec tension du ventre, précedées et suivies de tranchées. — Diarrhée de matières àcres, avec sensation brûlante à l'anus. — Diarrhées nocturnes. — *Selles diarrhéiques, nourâtres, verdûtres, brunâtres — Selles diarrhéiques sauguin leutes. — Leucuation insperçue d'une selle liquide, (n'expulsant un vent. — *Pendant la selle, grande lassitude, frisson avec horripilation, pâleur du visage, sueur froide au front et anxieté, avec crainte d'apoplexie — Sensation brûlante à l'anus, pendant la selle — Douleur d'excoriation a l'anus. — Pression vers l'anus, avec hémorrhoides aveugles — Symptômes vermineux.

Urines. — Retention d'urine — Envie d'uriner, pendant que la vessie est vide, comme si l'orèthre était étrangle derrière le gland. — l'rine plus rare, jaune et deja trouble l'esqu'on l'émet. — Flux d'urine, avec faim et soif ardente, maux de tête, nau- nées avec envie de vomir, coliques, dureté des selles et coryza. — Ecoulement un colontaire des urines. — Unine acre — l'rine





fancie ou verdétre. - Douleur premire dans la venie et sensation brélante en seinant.

Parties générales. — Sensibilité excessive des parties générales. — Exceriation du prépute. — Tractions dans les testicules. — Edgles trop Adrices et trop abondantes. — Suppression des règles. — Avant les règles, maux de tête, vertige, épistaxis et meur nocturne. — Au début des règles, diarrhée, nausées et frissons. — Pendant les règles, inaux de tête, le matin, avec nausées et envie de vemir, bourdonnement d'oreilles, soif ardente et douleurs dans tous les membres. — Vers la fin des règles, grincement des dents et visage bleuktre. — Bègles supprimées, avec délire.

Larynx. — Spannes du larynx. — Poitrine chargée de mucocités, avec âpreté et grattement dans la gorge. — Toux provoquée par un chatouillement, profondément dans les bronches, avec expectoration facile, ou bien sèche. — *Toup violente, avec rapports continuels, comme si on allait vouir. — Toux, le soir, avec salivation. — Toux sèche, ardente, généralement le soir et le matin. — Toux avec douleur dans le côté, faibleme et gêne de la respiration. — Toux creuse, profonde, comme venant du ventre, avec douleurs incisives dans l'abdomen. — *En toussant, lancinations vers l'anneau inquinal. — *Toux, semblable à la coqueluche, avec comissement. — *En entrant dans un appartement chaud, toux avec expectoration jaundire, suivie de douleur de meurtrissure dans la poitrine. — Toux, avec expectoration abondante.

Politine. — Étouffement de la respiration, fréquemment, au point de suffoquer, produite généralement par une constriction apasmodique de la gorge ou de la poitrine. — Haleine courte, au moindre mouvement. — Dyapnée et géne de la respiration, même en étant assis. — Poitrine très-oppressée, avec douleur dans le côté, en respirant. — Pression à la poitrine, surtout dans la région du sternum, et principalement après avoir bu ou mangé. — Sensation de plénitude dans la poitrine, qui force à des renvois continuels. — Serrement dans la poitrine, surtout après avoir bu. — Crampe de poitrine, avec constriction douloureuse. — Contraction spasmodique des muscles de la poitrine. — Douleur incisive dans la poitrine. — Élancements par accès dans la poitrine, avec étouffement de la respiration. — Battement de cœur violent, qui soulève les côtes, avec étouffement et accès d'angoisse de cœur excessive.

True. — *Douleur de brisement aux reine et dans le dos, "avec pression tractive, surtout en se baiment et en se redressant. — Berrement entre les omoplates. — Reideur rhumatismale de la nuque, avec vertige, lorsqu'on la bouge. — Faiblesse paralytique des muscles du con; ils ne penvent plus supporter la tôte.



VERATRUM ALBUM VERATRUM LUTEUM

Bras. - Douleur de brisement paralytique dans les bras, depuis l'articulation de l'épaule jusque dans le poignet. Tressaillement dans les bras. - Froideur ou sensation de plénitude et gonflement dans les bras. - Sensation continuelle d'engourdissement des bras. - Tremblement des bras, en saisteant un objet. - Ebranlements dans le coude, comme par des etincelles électriques. - Dartre sèche a la main - Fourmillement dans les mains et les dorgts. - Engourdissement et palissement des doigts. -* Froid glacial des mains. - * Tiraillement et crampes


dans les doigts.

Jambes. - Paralysie dans l'articulation coxo-femorale, avec gêne en marchant. - Douleur de brisement paralytique dans les jambes. Dechirement arthritique, et traction dans les jambes ct les pieds. - Sensation continuelle d'engourdissement des jambes. Tension des tendons du jarret, comme s'ils etaient trop courts Douleur de brisement dans les genoux; en descendant les escaliers. - Ebranlements dans le genou, comme par des étincelles électriques. - Pesanteur excessive et douloureuse dans les genoux, les jambes et les pieds, avec marche difficile. - *Crampes violentes dans les mollets et les pieds. -Gonflement rapide des pieds. - *Frond glacual des pieds. Tremblement des pieds, avec froid, comme s'il y circulait de l'eau froide. - Eluncements dans les (gros) orteils - Goutte douloureuse aux pieds - Lancinations et douleur d'exceriation dans les cors aux pieds.

VERATRUM DUVEUM,

VERATR-LUT - Hélomas dioica, Hélonie, Ellébore jaune - Voy. Hai E. Remèdes américains,

Pour les homosopathes allopathisants qui ne choisissent leurs quédicaments que solon les recommandations conjecturales de quelques auteurs, ils doivent être très-contents d'avoir, avec cette substance, un nom de plus à ajouter à leur formulaire empirique. Mais pour les vrais homœopathes, qui veulent agir d'après des indications sures et positives, cette substance est aujourd'hui encore comme si elle n'existait point, attendu que les sou-disant pathogénésies qu'on en a données jusqu'ici, sont faites dans des termes tellement vagues que les renseignements que nous donnent les pharmacodynamies de l'ancienne école sur les effets, par exemple, de la bryone, de la pulsatille, de la noix vomique, etc., peuvent encore être regardés comme des indications précieuses a côte de celles-la Copendant, pais-



VERATRUM VIRIDE. - VERBASCUM.

749

que des lecteurs qui sent dans l'ignorance la plus complète de ce que l'homosopathie transatlantique nous a réellement fourni ou non, nous demandent à grands cris d'insérer ce médicament dans notre manuel, nous leur dirons que, même selon Hall, on n'a fait, jusqu'ici, que le recommender contre les affections suivantes :

Diabite sucrée (où on le dit diminuer le sucre dans l'espacé de peu de jours en l'amociant au quinine et à l'huile de foie de moque); anémie et atonie générales; albuminurie; état torpide des parties sexuelles de la femme; aménorrhée, dysménorrhée, métrorrhagie, cheste de la matrice, et autres faiblemen des parties génitales féminimes.

VERATRUM VIRIDE.

VERATR-VIR. - Elifbere vert. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Cotte substance, qui ne paraît pas besucoup différer du veratrum album, a été employée, jusqu'ici, avec assez de succès contre: Convulsions de diverses natures; Opisthotonos; Épilepsis; Éclampsies puerpérales, avec délifes furibonds et speur froide, visqueuse; ou avec grande surexcitation du système vasculaire, alternant même avec manie; Rhumstismes, surtout de l'épaule gauche, de la hanchet du genou; Endocardite rhumatismale; Péricardite, avec défaillance, en se levant de la position couchée et en marchant; Pneumonie commençante avec pouls dur, plein et fréquent, ou bien avec pouls régulièrement intermittent, et sensation de faiblesse ou de défaillance dans le creux de l'estomac.

VERBASCUEL

VERB. — Bouillon-blane. — HAMMERANN. — Hist. mat. et prép. Voy Phormac. homosop., p. 308. — Duce meités : 30. — Durée d'action : 4 à 8 jours. Antidore : Camph. Comparen avec : Plet. stenn.

CLENIQUE. — On verra les cas où ce médicament pourra être consulté contre des Touz caterrhales, surtout ches les enfants. seule affection dans laquelle en l'ait jusqu'iel employé.





Ventre. — Ballonnement du ventre. — Pression forte et douloureuse, sur l'ombilie, comme par une pierre, soulagée en se conrbant. — Constriction crampoïde du bas-ventre, vers la région
ombilicale. — Maux de ventre qui s'étendent profondément vers
le bas, avec envie d'aller à la selle et contraction spasmodique
de l'anus. — Pincements et tranchées dans le ventre. — Élancements dans le ventre, principalement dans la région ombilicale,
quelquefois déchirants, et se dirigeant vers le bas. — Sensation
comme si les intestins étaient adhérents à la région ombilicale et
qu'on les arrachât.

Selles et Urines. — Selles supprimées. — Selles dures, comme des crottes de mouton, avec efforts. — Besoin fréquent d'uriner, arcoémission abondante. — Pollutions.

Larynx. — Sensation d'obturation du larynx et du nez, avec *cnrouement en lisant à haute voix. — Catarrhe, avec enrouement
et poitrine chargée. — Toux, surtout le soir et la nuit, en dormant, généralement âpre et sèche, ou creuse et sourde.

Poitrine et Tronc. — Elancements dans la postrine, quelquefois avec oppression et étouffement de la respiration. — Tension dans la poitrine, avec lancinations dans la région du cœur, le soir. après s'être couché. — Lancinations dans le dos et les omoplates. — Nodosité rouge près du cartilage xyphoide, douloureuse en premant dessus.

Extrémités. — Déchirement à l'épaule, dans le dos de la main et le coude. — Pression crampoide dans l'avant-bras, la main et le pouce. — Élancements déchirants dans la main et les doigts. — Douleur tensive dans le poignet. — Douleur de luxation dans l'articulation de la main. — Douleur paralytique dans les articulations des doigts. — Pesanteur excessive et lassitude dans les jambes et les pieds, surtout en montant les escaliers. — Pression crampoide dans les cuisses, les jambes et la plante des pieds. — Tremblement des genoux. — Lancinations sourdes dans la rotule. les os du pied et les orteils. — Déchirement le long des jambes.

VIOLA ODORATA.

VIOL-OD. — Violette de mars. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 311. — Dones unitées : 9 à 30 ? — Durée d'uction : 2 à 4 jours.
ANTIBOTE : Camph.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre des souffrances hystériques.



VIOLA ODORATA.

Ponleurs tractives dans les membres. Douleur de brisement dans toutes les articulations, le matin, au réveil. Tremblement des membres. — Brûliment et chalcur fugace à diverses parties. — Les souffrances sont deuces, mais cependant tres-distinctes et les mêmes dans toutes les positions. — Baillement tous les matins, avec larmoiement — On est couche sur le dos, la nuit pendant le sommeil, la main gauche passée sous la tête et les genoux pliés. — Horripilation febrile. — Sueur nocturne — Mélancolie sombre et tristesse. — Humeur hyster que, arec pleurs continuels, sans qu'en sache pourquoi. — Eloignement pour la conversation — Faiblesse excessive de la mémoire, et oubli, — Grande affluence d'adées mobiles et incomplètes. — Perspicacité remarquable et forte activité du cerveau. — Prédominance de l'intelligence sur le sentiment et le cœur.

Tête. - Embarras sourd et douloureux dans la tôte. - Vertige tournoyant, même en étant assis. - Cophalalgie, parfois avec crampes dans les yeux, et cercles lumineux devant la vue. - Pesanteur de la tête, avec sensation de faiblesse dans les muscles de la nuque. - Congestion de sang a la tête, avec picotements dans le sinciput - Tension dans les teguments de la tête, s'etendant jusque dans la face, le nez et les oreilles, forçant souvent à

froncer les sourcils - Ardour dans le foont

Youx. Crampe des paupieres. — Les yeux se ferment, comme par une sensation de sommell dans les yeux et les paupières. — Pesanteur des paupieres. — Sensation comme si le globe de l'œil était comprimé. — Ardeur et sensation brûlante dans les yeux. Myopie. — Flammes devant les yeux.

Oreilles. Élancements dans les oreilles. - Aversion pour toute espece de musique, princ pal ment pour le violon. - Bruissement


et tintement devant les oreilles.

752

Nes Selles. Torpeur au bout du nez, comme s'il avait reçu un coup. — Douleur faciale, avec pression tractive aux pommettes. — Tension dans les teguments de la face, surtout au-dessous des yeux. Déchirements dans la machoire inférieure, se dirigeant vers l'orcille. — Odontalgie, avec douleur dechirante dans les dents inférieures. — Constipation avec envie inatile d'aller à la selle. — Pollutions, suivies de maux de tête.

Larynx — Extrémités. — Respiration difficile et a peine sensible, avec expiration douloureuse, angoisse excessive et battement de cœur violent. Haleine courte — Forte oppression de postrine et duspner, avec pression sur la poitrine, comme par une pierre.

Tension dans les muscles du cou. — Douleur tractive dans l'articulation du coude et le dos de la main. — Douleur pressive dans le poignet.



VIOLA TRICOLOR.

75.3

VIOLA TRICOLOR.

VIOL-TR. - Penaée. - Archives de STAPF. - Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac homosop., p. 311. - Doses usuees : 9, 30. - Durce d'action : 8 à 45 jours.
Antiborés : Camph.

CLIRIQUE. — Jusqu'ici on n'a employé ce médicament que contre quelques cas de Croûtes de lait.


startomes Généraux. — Accablement, quelquefois comme si on n'avait pas assez dormi. — Douleurs lancinantes dans les membres. — Étuption miliaire sur tout le corps, avec sensation lancinante, rongeante. — Enrie de dormir l'après-midi. — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — Sommeil tardif par affluence d'idées, avec difficulté de se réveiller, le matin. — Réves vifs et érotiques. — Tressaillement des mains et rétraction des pouces, en dormant, avec rougeur de la face et chaleur sèche generale. Disposition frileuse et froid au grand air. — Sueurs nocturnes. Tristesse sur ses affaires domestiques. — Précipitation. comme par une angoisse interne, avec sensation de grande faiblesse. — Envie de pleurer, manicaise humeur, moronité, avec éloignement pour la conversation. — Forte susceptibilité, et humeur querelleuse. — Désobéissance. — Éloignement pour le travail.

Tôte. — Tête entreprise et embarrassée. Vertige et étourdissement en marchant. — Céphalalgie, depuis la racine du nez jusque dans le cerveau, se dissipant en plein air. — Pesanteur de la tête, qui la tire en arrière, principalement en se redressant, soulagée en se baissant. — Céphalalgie pressire, surtout dans le front et les tempes. — Élancements dans l'occiput, jour et nuit. Ébran-

lement du cerveau, en marchant.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme si un corps dur se trouvait entre la paupière supérieure et le globe de l'œil. — Cuisson et élancements incisifs et pruriants dans l'œil. — Contraction et occlusion des paupières, avec envie de dormir. — (Myopie.)

Face. — Chalcur de la face, la nuit; au lit, quelquefois semi-latérale, à la joue sur laquelle on n'est pas couché. — Peau épaisse et dure à la face. — *Croûtes à la face, avec prurit brûlant, surtout la nuit, et suintement d'un pus jaune et visqueux. — Tension dans les téguments de la face et du front. — Mal de gorge, le soir. — Langue chargee de nuccesités blanchâtres, avec goût



VIOLA TRICOLOR. — ZINCUM.

754

amer.—Accumulation de salive dans la bouche, avec sensation de sécheresse.

Estomac. — Perte de l'appétit et insipidité des aliments. — Après le repas, chaleur générale, surtout à la face (avec sueur), oppression de poitrine et forte angoisse qui ne permet pas de rester en place. — Nausées et vomituritions.

Ventre. — Maux de rentre, avec douleurs incisives, au point de pousser des cris, avec besoin d'aller à la selle et expulsion abondante de vents et de grosses masses de mucosités.—Élancements dans le ventre. — Élancements pressifs dans le diaphragme.

Belles.—Selles avec évacuation de mucosités et abondance de vents.

-- Selles molles, comme hachées. — Selle dure. -- Besoin trèspressant d'aller à la selle.

Urines et Parties génitales. — Besoin d'uriner, avec émission abondante. — Ténesme de la vessie. — Urine brûlante. — Urine fétide; comme celle des chats. — Urine très-trouble. — Lancinations dans l'urèthre. — Élancements et pression dans la verge, se dirigeant vers le gland. — Sensation brûlante dans le gland. — Prurit et gonflement du prépuce. — Érections. — Pollutions. — Leucorrhée.

Poitrine — Matrémités. — Elancements dans la poitrine. — Oppression et lancinations dans la région du œur, en se tenant courbé lorsqu'on est assis. — Angoisse au œur, en étant couché, avec palpitations de œur. — Douleur crampoïde et contraction, avec pincement dans les omoplates. — Gonflement des glandes du œu. — Lancinations dans les articulations de l'épaule, les coudes, les avant-bras et les doigts. — Douleur de brisement dans les cuisses, le matin, au réveil. — Fléchissement des genoux en marchant, avec traction dans les mollets et les cuisses. — Tressaillement des muscles dans les mollets. — Élancements dans les rotules, le tible et les pieds.

SINCUM.


21NC. — Zînc. — HAMNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homopop., p. 449. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 30 à 40 jours dans les affections chroniques.

ANTIDOTES: (amph hep. ign. — Le zine est l'avildote de : bar-e. — Le

companies que cham, et n-rom., aggrave les souffrances.

Companies avec : Ant. arn. bell. canth. carb veg. hep. ign. plumb. puls. sep. stram. suif.

CLINIQUE. — Étant indiqué par l'ensemble des symptômes, ce médicament pourra quelquefois être utile dans l'un ou l'autre cas



ZINCUM.

755

des affections suivantes : — Luxations spontanées ; Paralysies ; Dartres: Ambiyopie amaurotique; Gonflement inflammatoire du nez: Coliques venteuses: Gravelle et calculs rénaux??; Orchite?; Disposition à l'avortement, avec nausées aux parties?; Nymphomanie des femmes en couche? Hydrocéphale des enfants; Scarlatine.

Foy. la note, page 15.

STUPTOMES GENERAUX. — Déchirement dans les membres. **aggraré toutes les fois que l'on s'échanffe ou qu'on se donne de** l'exercice. - Déchirement tractif dans la cavité des os, avec douleur tellement forte que les membres n'ont aucun soutien. -Douleur d'execriation. — Douleur crampolde et crampe dans les membres. — Frémissement visible et tressaillement à diverses parties des muscles. — Fourmillement dans les membres. -- Varices. — Douleurs qui sembleut quelquefois être entre cuir et chair. — Les symptômes sont aggrarés extraordinairement par la camomille, la noix vomique et le vin, substances qui les provoquent aussi, particulièrement l'agitation nocturne et la constipation. - La plupart des symptômes se manifesteut après le diner et vers le soir. - *Insensibilité générale du corps. - *Sensation de froid dans les os. — Pulsation violente dans tout le corps. - Tremblement violent de tout le corps, particulièrement apres toute émotion morale. — Pesanteur, lassitude et faiblesse excesaire, principalement en marchant ou le matin an réveil. -Répugnance pour le mourement.

Pear. — Prorit dans les articulations. — Prurit, avec lancinations violentes, surtout le soir au lit, se dissipant immédiatement au toncher. — Fourmillement entre cuir et chair. — Eruptions chroniques. - *Dartres et ulcères dartreux. - *Ganglions. **engelures et disposition des parties externes à se geler.** gades. — Petits furoncles. — Eruptions opiniatres. -- Affections hydropiques avec douleurs néphrétiques. — «Scarlatin»


avec affections cérébrales.

Sammeil. — *Sommeil le jour et envie continuelle de dormie. surtout le matin, ou après le repas, "avec besoin de biiller -Sommeil tardif. - Sommeil agité, avec reveil frequent - *Sommeil non réparateur. — *Rêces funtastiques, effrayants, auités. on dégoûtants et épouvantables, avec paroles et eris pendant le sommeil. — Froid excessif aux pieds, la nuit. - Secousses dans

le corps, pendant le sommeil, et sursants frequents.

Fièvre. — Horripilation fébrile le long du dos. — Frissonnement continue), avec accroissement de chaleur intérieure.--- Horripilation febrile, avec chaleur fugace: tremblement riolent des membres: haleine courte et chaude, et pulsation dans tout le corps. - *Disposition à transpirer le jour. - *Sueurs nocturnes.

Moral. - Humeur hypocondriaque. *Pensée de mort, comme »



ZINCUM.

lèvres et des commissures des lèvres, avec ulceration interieurs. Mucosités épaisses, visqueuses sur les levres. Eruption page. riante et rougeur au menton.

 Odontalgie pendant la mastication. - Odontalgie dechirante, lancinante ou tractive, surtout dans les dents molaires. Douleur d'excoriatem aux dents. «Vacillement des dent ». Saignement abondant des dents et *des geneives. - Geneives blanches, gonflées, avec douleur d'excoriation. -- Ulcères aux gencives.

Bouche. - Ulcères dans la bouche, petits, jaunes, à la face interne des joues. - Fourmillement a la face interne des joues et secrétion abondante de salire, avec goût metallique. -- Vésicules sur

la langue.

Gerge. - Déchirements tractifs dans le fond du gosier, plus sonvent hors que pendant le temps de la deglutition a vide. - Sensation de rétrécissement et crampe dans l'osophage, à la region de la fossette du cou. - Sécheresse et aprete dans le palais et la gorge, avec enisson et grattement. -- Douleur d'executation dans la gorge. — Accumulation abondante de mucosités dans la gorge. — Dartres blanchâtres dans la gorge, après des gonorrhées.

Appétit. — Goût de sang dans la bouche. — *Goût salé dans la bouche. — Forte soif. — Diminution de l'appetit. — Faim vive et roracité insatiable. Repugnance pour la viande (le veau). les douceurs, le poisson, les aliments cuits et chauds. avoir mangé du pain, pression de l'estomac, avec nausces. — Après le repas, humeur hypocondriaque, avec pression sous les fausses **côtes, étouffement, griffem**ent dans le ventre, et plenitude, pres-


sion, ou brûlement de l'estomac.

Estomac. - Renvois avec douleur pressive dans la poitrine. -Renrois aigres, après le repas, surtout après avoir pris du bait. --Pyrosis, après des choses sucrèes. - Hoquet, surtout après le dejeuner. - Nausces, avec vomiturition et vomissements de mucosités amères, renouvelés par le plus leger mouvement. - Vomissement de sang. — Pression à l'estomac. — Sensation penible au cardia et le long de l'œsophage. Serrement et pression dans le scrobicule. — Dechirement et élancements dans le scrobicule.

- Sensation brülante dans l'estomac.

Ventre. - Douleurs crampoides dans les hypocondres, alternant avec oppression de poitrine. - Forte pression dans les hypocondres et les côtés du ventre, aggravée par le mouvement et la marche. - Serrement, pression et elancement dans la region hépatique. — Élancements dans la région de la rate. - Pression, élancements et douleurs d'excorration dans la région des reins. - Maux de ventre, le soir, après s'être couché. - Forte pression et tension dans le rentre (et les côtés), avec ballonnement. — Sensation de malaise produite par une pression sur le-

75.



ZINCUM. -- MAGNES ARTIFICIALIS

759

Poltrine. — Gêne de la respirati de la appressa e arce do deur pressive dans la poltrine, surte ve le selve. Il repues se connedique. — Haleine courte, par des flavosités, que se le repus.

Poltrine chargée de mucosités. — Pression a la poltrine. — Douleur tensive au sternum. — De hirement a la poltrine. — Élancements dans la poltrine, surte de dous la relevant de cour. — Sensation brûlante dans la poltrine. — Theorement de cour. — avec et sans angoisse. — «Mouvements irreguliers du cour »— «Secousses au cour et intermitte neu des buttements arec étouffement.

Tronc. — *Douleur aux reins, surtout en marchant et en s'asseyant. — Sensation de faiblesse paralytique dans le dos et aux reins. — *Douleurs rhumatismales dans le dos. — Dartre pruriante au dos. — Tension et elancements dans et entre les omoplates. — Déchirements lancinants, roideur et tension dans la

nuque et le cou.

Bras. - *Traction rhumatismale et décharement lancinant dans les épaules, les bras, les coudes, les articulations de la main les mains et les doigts. - "Sensation douloureuse de paralysée dans les bras. -- Furoncle aux bras. -- Palissement et paralysée des mains. -- Faiblesse et tremblement des mains, en cerivant, "Taches dartreuses, ràpeuses et pruriantes aux mains, -- *Foau sèche, avec rhagades aux mains. -- Gerçures entre les doigts, --


Engourdimement des doigts, le matin en se levant.

Jambos. — Tractions rhumatismales et déclarement dans les jambos, les genoux, les articulations du prol et les pieds. — Varices aux cuisses et aux jambes. — Douleur tensive dans les genoux — Douleurs nocturnes dans les genoux. — Sensition commo si le sang ne circulait pas dans les jambes — Traction et robleur tensive dans les mollets, en marchant. — Fourmillement dans les mollets. — Infiammation érysipelateuse et gondement du tendon d'Achille. — Roideur de l'articulation du prol, après aven ete assis. — Douleur de l'uxation dans les articulations du pret et des orteils. — Sensation brûlante dans les prois. — Confiement infiammatoire des pieds. — Faiblesse et tremblement des pieds. Paralysie des pieds. — *Engelures douloureuses aux paels. Prurit, chaleur, rougeur et gonflement des orteils, comme s'ils étaient gelés. — Laucinations pulsatives dans les orteils.

MAGNES ARTIFICIALIS.

MGS. — Aimant artificiel. — HARNEYANN — Hist, nat et prép. Voy. Pharmac, homorop. Emploi : Le malade touche le pôle Nord ou le pôle Sud pendant une minute, du bout du doigt — Durée d'action : 40 a 15 jours dans quelques cus de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Ign. zinc, et le pôle oppose.



MAGNETIS POLI AMBO.

761

Bourdonnement d'oreilles. — Diminution de l'ouie. — Aberration de l'odorat; on sent une odeur de fumée ou de moisi.

Face. — Sueur à la face, sans chaleur, le matin. — Déchirement tressaillant dans la mâchoire supérieure. — Forte lancination brûlante dans les muscles de la face, le soir. — Gonfiement des lèvres, le soir, avec salivation. — Petits boutons, avec douleur de plaie sur les lèvres.

Dents. — Odontalgie, après avoir bu froid, ou par le contact de l'air froid. — Odontalgie pressive, tressuillante, par secousses isolées. — Odontalgie dans les dents cariées, avec gonflement des generies.

Appétit. — Haleine fétide. — Goût métallique dans la bouche. — Insipidité du tabac et de la bière. — Goût de moisi de diverses choses. — Satiété prompte. — Faim prononcée le soir.

Estouse. — Renvois avortés. — Renvois avec odeur et goût de ràclure de corne. — Régurgitation d'aigreurs, en se baissant. — Pression à l'estomac, avec crampes se dirigeant vers les parties supérieures, agitation qui ne permet de rester nulle part, pesanteur de la langue, pâleur du visage et froid du corps.

Ventre. — Pression et plénitude anxieuse dans le ventre, surtout pendant une tension d'esprit. — Grondements bruyants et borborygmes dans le ventre. — Production abondante de flatuosités. — Colique flatulente. — Expulsion de flatuosités, avec pression douloureuse.

Sellas. — Constipation, comme par rétrécissement du rectum. — Diarrhée sans douleur, avec fiatuosités. — Douleur hémorrholdale, cuisante à l'anus, après la selle, avec constriction dans le rectum. — Hémorrholdes aveugles. — *Chute du rectum.

Parties génitales. — Sensation brûlante dans la région des vésicules spermatiques, qui excite au coît. — Défaut d'intensité de l'appétit vénérien et répugnance pour le coît. — Erection, sans pensées érotiques. — Rétraction du prépuce derrière le gland. tionflement de l'épididyme, avec douleur pendant le mouvement et au toucher. — Règles trop hâtives, trop abondantes et de trop longue durée.

Peitrine. — Quintes de toux sèche, la nuit. — Toux crampoide, surtout après minuit, en veillant ou en réfléchissant. — Dyspuée nocturne provoquée par des mucosités dans la trachée-artère, qui, le matin, se détachent facilement.—Lancinations brûlantes, insupportables, dans les muscles de la poitrine.

Trene et Extrémitée. — Tressaillement dans l'épine dorsale, comme par quelque chose de vivant. — Sensibilité douloureuse de l'articulation du sacrum, le matin, au lit, en étant couche sur le côté, ou le jour, en se courbant. — Douleur de l'uxation dans l'articulation de l'épaule, ou comme le soubresaut d'un tendon, au poignet. — Douleurs tractives dans les articulations et les muscles des bras, souvent depuis la tête jusque dans les doigts.



762 MAGNETIS POLI AMBO. - MAGNETIS POLUS ARCT.

"Tressaillement déchirant dans les muscles du bras, après avoir sejourne au froid. Taches rouges dans la paume des mains, commo des vésicules. Acces de crampes dans les mollets et les orteils, le matin, après le reveil. — Lancinations brûlantes dans les talons et les cors aux pieds.

B. — MAGNETIS POLUS ARCTICUS.


MGS ARC — Pole Nord de l'aimant. — Hut. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosp., p. 341. Antibotes : Mgs-aus. 1gn. zinc.

CLINIQUE. On a jusqu'ici employé ce remède contre: — Surc vertation nerveuse; Odontalque nerveuse, et Prodromes d'une hernie inguinale.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande lassitude et courbature dans tout le corps, avec abattement, surtout le matin et en plein air. comme quand il fait un temps etouffant. — Sensation tractive dans le perioste de tous les os, comme au début d'une flèvre intermittente. — Lancinations fouillantes qui sont d'autant plus douloureuses qu'elles sont plus profondes, à diverses parties du corps. — Secousses lancinantes, battement, tremblement, froid et sensation comme si le sang se portait vers les parties touchées par l'aimant. — Surexcetation, avec tremblement, agitation inquiète dans les membres, et grande faiblesse nerveuse. — Fourmillement et prurit lancinant à la peau. — Sensation brûlante ou déchirement brûlant dans les dartres. — Panares

Sommeil. — Baillements violents, spasmodiques, avec douleur dans l'africulation maxillaire, comme si elle allait se luxer. *Forte curie de dormer, le jour. — Sommolence. — Sommeil profond, la muit, pendant lequel on est generalement couché sur le dos. — Afiliance de rèves vifs (quelquefois lascifs) et chants, pendant le sommeil. — Reveil, le soir, après qu'on s'est endormi, par une seconse eviolente dans la tête et les muscles du cou. — Jactation pendant le sommeil, avec chaleur pénible et besoin de se decouvrir, sans soif — Le matin, reveil incomplet, avec pleine conscience de sor-même, mémoire vive, grande affluence d'idées et réflexions sur un sujet important.

Plèvro. Sensation de froid ou fraîcheur sur tout le corps. --Disposition fracuse. - Fraîcheur dans les mains, avec sueur fraîche à ces parties et sur tout le corps. - Horripilation suivie



MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

763

de chaleur de courte durée et de gonflement des veines des mains. — Sensation de chaleur sur tout le corps avec mains froides et froid aux extrémités inferieures.

Moral. — Maussaderie et envie de pleurer, avec frisson. — Caractère doux, soumis. — Paresse, comme si on avait perdu la faculté de se mouvoir, en étant assis. Irresolution, survie d'une prompte exécution de ce qu'on a enfin résolu. On parle hant, tout seul, pendant ses occupations. — Humeur changeante. — Hésitation anxieuse et caractère inquiet. — Perte des sens. — Perte des idées. — Faiblesse de la mémoire. — On se trompe facilement en écrivant.

Tôte. — Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en se promenant en plein air et manque de solidité en se tenant debout. — Tiraillement semi-latéral avec vertige, depuis le milieu de la tête jusque vers les oreilles, comme le balancier d'une pendule. — Céphalalgie en levant et en remuant les yeux. — Céphalalgie déprimante, comme par un fardeau. — Céphalalgie comme si le cerveau allait éclater. — Tension des téguments de la tête, comme s'il étaient trop adhérents au crâne.

Yeux. — Yeux proéminents et fixes. — Froid glacial des yeux (faibles). — Mouvements inquiets des yeux. — Lancinations, prurit et traction tressaillante dans les paupières, avec larmoiement. — Sensation de sécheresse douloureuse des paupières, le matin, au réveil.

Oreilles et New. — Bruissement dans les oreilles, et chaleur intérieure, comme par de l'eau bouillante. — Surdité comme si on avait un bandeau sur l'oreille. — Aberration de l'odorat, comme si l'on sentait des œufs pourris, ou du plâtre frais et de la poussière. — Épistaris, précédée de céphalalgie pressive dans le front — Rougeur et chaleur du bout du nez, suivie de taches rouges, chaudes et fortement circonscrites sur les joues.

Pace. — Pàleur du visage. — Tension à la face. — Serrement douloureux dans l'articulation des mâchoires, avec sensation pendant le mouvement, comme si elles étaient luxées. — *Gonflement d'une seule jone. — Trismus.

Dents. *Odontalgie dans les dents carrées, par intervalle, comme si on les arrachait. — *Douleurs dans les dents carrées avec geneures gonflées et douloureuses au toucher. — *Douleurs dans les dents (cariées), augmentées après le repas, et à la chaleur, soulagées au grand air et en marchant. — *Odontalgie, avec joues rouges, chaudes, gonflees. — *Odontalgie avec secousses qui traversent le périoste de la mâchoire, ou avec douleurs tractives, pressives, ou bien déchirantes, fouillantes, ou brûlantes, lancinantes. — Dents incisives agacées, en respirant par la bouche. — Torpeur et insensibilité des geneives après la cessation des maux de dents.

Estomac. - Perte du goût. - Goût acidulé dans la bouche.



764 MAGN, POLUS ARCT, - MAGN, POLUS AUSTRALIS.

continuelle, surtout après le souper. Voracite le soir.

Ventre. Production abondante et mearceration de flatuosites. Colique flatulente, pressive Seconsses dans l'abdomen, comme
si quelque chose y tembait, su coups partant du ventre et remontant dans la portrine et jusque dans la garge Bullonnement
du centre. - *Pression et terebration vers l'anneau inguinal,
comme pour une descente, avec relatio ment de l'anneau inguinal.

Selles Règles *Resserrement openative du rentre et constipation. Selle dure, d'un moule volumn san, deficile à evacuer, souvent preceder de d'ul urs tractives, dyssenteriques, dans le bas-vontre — Seretion plus abendante d'urine. — Urine force : — Erections immodèrees, avec pollutions fréquentes. — Evatation au ent. Regles trop faibles — Suppressent des règles

Larynx. For sufficiently, seelie, asthmatique, aggravee par la marche en plein air. Four spasmodique, ebranlante, le soir, en s'endormant, empéchant de dormir Toux spasmodique, sufficiente, vers minuit, produite par une irritation dans les bronches, ebranlant la tete et tout le corps, et prevoquant la chaleur jusqu'a ce qu'il s'ensuive une sueur generale, avec cessation de la toux. Besoin continuel de tousser, le soir, qui ne se peut


dissiper qu'en retenant la toux.

Tronc. Extrémités. Douleurs de brisement dans le dos, en se ranversant. Craquement dans les vertebres cervicales pendant le mouvement. Infiantmation du dos de la main, avec doul ur pulsative. Pesanteur dans les bras, les mains et les doigts. Doul ar de brisement dans l'articulation coxe-femorale et les membres inferieurs. Grande lassitude dans les membres inferieurs; ondirait qu'ils vont se briser en marchant. Douleur d'executation dans les orteils et les cors aux pieds.

C. - MAGNÉTIS POLUS AUSTRALIS.

MGS AUS - Pole Sud de l'arment. - Hist. nack et prep Voy Pharmae. homœop. VYT bours Mgs are, igu ome

CLINIQUE. On a jusqu'ici employe ce remède contre: État paralytique du col de la vessie; Impuissance; Varice des femmes en emites et Panaris.



MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

765

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tractions dans les doigts, les articulations des doigts et des pieds et les malléoles. — Douleurs lancinantes, pulsatives dans les racines des ongles, comme si elles allaient entrer en suppuration. — Douleurs avec pincements ou lancinations brûlantes, à diverses parties du corps. — Douleur de brisement dans les membres et leurs articulations, comme si on était couché sur des cailloux. — Disposition à prendre des refroidissements. — Disposition du nez, des orteils, des mains et des pieds à se geler par un froid peu intense. — Lassitude subite en se promenant, avec anxiété et chaleur, on besoin subit de dormir.

Scameil. — Forte envie de dormir, le soir et le matin, on ferme les yeux, sans pouvoir s'endormir. — Insomnie, avec surexcitation avant minuit. — Rêves confus, effrayants. — Rêves prolongés sur un même sujet, avec fatigue de la méditation. — Expiration lente, bruyante, ronflante, avant minuit; après minuit, il en est de même de l'inspiration. — On est couché sur le dos pendant la nuit. — Le matin, congestion sanguine à la tête, qui force à être couché la tête haute.

Pièvre. — Horreur excessive du grand air, lequel pénètre jusqu'à la moelle des os, lors même qu'il fait chaud, avec mauvaise humeur et envie de pleurer. — Horripilation, avec obscurcissement devant les yeux, tremblement et jactation des membres, sans frisson, suivi de chaleur à la tête et à la face.

Meral. — *Morosité et mauvaise humeur, avec éloignement pour la conversation. — Éloignement pour la société et les visages riants.

Emportement et colère. — Instabilité des idées.


Tôte et Gorge. — Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en marchant. — Pesanteur, fourmillement et fouillement dans la tête. — Secousses dans la tête, quelquefois avec dechirement. — Sécheresse et cuisson aux paupières, surtout en les remuant, et -principalement le soir et le matin. — Larmoiement. — Amblyopie. — Odontalgie déchirante, tressaillante, aggravee par les choses chaudes. — Accumulation de salive aqueuse dans la bouche.

- Parole embarrassée, comme par gonfiement de la langue. - Sensation brûlante dans le gosier.

Estomac. — Goût métallique, tantôt douceatre, tantôt acidule, sur et sous la langue. Goût trop peu prononcé de tous les aliments. — Indifférence excessive pour les aliments, les boissons et le tabac à fumer. — Boulimie à midi et le soir, quelquefois pendant les frissons fébriles. — Pression dans le scrobicule pendant

une tension d'esprit.

Ventre. — Pincement dans le ventre par un courant d'air. — Borborygmes bruyants et grondement dans le ventre. — Colique flatulente, pressive, avec pincements et ballonnement du ventre — Sensation de dilatation de l'anneau inguinal, comme pour une descente, avec sensibilité douloureuse de cette partie, chaque tois que l'on tousse.



MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

Selles. - Selles molles, diarrhéiques, précédées de tranchées. -Evacuation d'une selle liquide, avec sensation comme si on allait expulser un vent. — Retrécissement et constriction douloureuse du rectum et de l'anus, qui ne permettent pas d'expulser un vent.

*Emission involontuire des urines par paralysie du sphineter de la ressie, surtout la nuit. - Emission d'urine goutte à goutte, avec torpeur de l'urêthre. - Jet d'urine très-

faible. 🕝 *Emission fréquente d'urine, la nuit.

Parties génitales. - Forte disposition des parties génitales à l'éjaculation. - *Impuissance, avec disparition subite de toute jourssance au moment de la plus forte exaltation. - Douleur dans la verge, comme si quelques fibres se déchiraient ou étaient, Retraction douloureuse des testicules, la nuit. -Gonflement des testicules, avec secousses déchirantes et sensation d'etranglement dans ces parties. - Règles trop hâtives et trop

Métrorrhagie. abondantes.

766

Toux et coryza, avec expectoration de mucosités verdatres et haleine courte. -- Quintes de toux fétide, la nuit, en dormant. - Besoin de respirer profondément, comme des soupirs, avec déglutition involontaire - Oppression de poitrine, comme si la respiration était tremblante et qu'elle produisit une impression de fraicheur. Pression tractive des deux côtés du sternum. aver angoisse de conscience qui ne permet de rester nulle part. Battement de cœur violent.
 Dattements au cœur; il semble que ce na soit pas le cour même qui batte.

Douleur pressive, brulante dans les reins, pendant le repos et le mouvement. - Douleur de brisement et de luxation

dans les jointures du sacrum et des vertèbres lombaires.

Fourmillement le long du bras, comme de légères secousses. - Tressaillement douloureux et prompt le long du bras. Pesanteur et lassitude dans les bras. - Gargouillement le long des bras et des veines du bras. Fourmillement et batte-

ment dans le hout des doigts. — *Panarus.

Battement tressaillant dans les tendons du jarret, avec contraction d s jambes, surtout pendant le mouvement. - Déchirement pressif dans les rotules. Battement dans les muscles des pieds, après avoir marché. - Fléchissement des genour pendant le monvement -- Luxation facile de l'articulation du pied, en faisant un faux pas. — Sensibilité et douleur de plaie, à l'ongle du gros orteil. — *Les ougles des orteils entrent dans les chairs, Varices.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.




TABLE ALPHABÉTIQUE

DES INDICATIONS CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Abcès, bep. lach, merc, phos. sulf, sil. chands on inflammatoires, merc. bell, cham, puls, phosph.

Abstinence sexuelle (mal. par l'), con. Affliction (s tites d'une), ign. phos-ac.

Accouchement laborieux puls. sec.

cham. coff. B-vom. op. adhérence du placenta (avec) puls.

sec. plat. - douleurs absentes (avec). puls. sec. Aigreurs, puls. n-vom. calc. chin.

ep.

- douleurs vaines, coff. n-vom,

- douleurs consécutives trop fortes,
cham, coff. arn,

- troc. plat. chin.

métrorrhagie, croc. plat. chin. sabin,

spasmes, convulsions, hyose, ign. bell, cham.

Acide hydrocyanique (mai par l'). coff. ipec. n-vom.

- nitrique hep.

 phosphorique coff, lach.
 sébecique bry phos-ac.ars, kreos. sulfarique, puls

Acides mal par l'usage des), acon. lach n-vom sep. staph.

- districe staph bry. n-vom. ant.

- exanthèmes, bell, rhus.

~ Sèvre lach bell.

Acné bell carb-vg hep sulf. led.

- indurée, bell, carb-vg.

- jeunes gens (chez les, bell, carb-Alcooliques (mai par les boissons .

phos-ac. sulf.

Acné ponctuée, sulf. dros. selen. - rosacce, carb-an, rhus, ruta, verat.

vermiforme. natr. selen. nit-ac. sulf.

Adipsie roy. Soif nulle.

- froids ou chroniques, hep. sil, sulf. Aérophobie camph. caus. cocc. coff. n-vom. sulf

Accès nerveux n-vom, sep. carb-vg. Agés 'maux des sujets), amb. aur. natr-m. sil. plat sulf baryt. con. op sec

Agilité du corps augmentée, coff. şira m

Agitation nerveuse, acon. coff. n-yom, cham, ars.

sulf phosph, phos ac

Air chaud (mal par l'), carb-veg, aut bry puls suit, lyc, courant (par I). acon. bell. chin.

sulf. · froid (par l'), ars. verair, merc dulc.

rbus libre 'par l') camph. n-vom, cocc.

sulf, cause coff du soir par l',, merc, sulf, carb vg

nur ac. Aisselles affertées calc, hep. sil. sulf.

carb-an. Iyo, sep dartres sep. lyc carb-an.

excortation mez ars carb-vg zinc. glandes engorgées, sulf. calc. sil.

hep staph carb an - prurit phosph, spig, anac, carb-au, sep nitr ac

- sueur sen hep, sulf, lach, petr. kal nitr-ac thui.

- ivrognes (chez les), carb-vg. led. Alralis mal par l'usage des,, mitr ac. sulf-ac.

vg sulf.

Reon op ars. n-vom cale suit taculibertins (chez les), carb-vg. calc. Alienation mentale bell hyos. op. i stram, veratr, ars cupr a-vom.






TABLE ALPHABETIQUE DES INDICATIONS

Amygdales.suppuration.bell.hep.lach.[Anus+fistule, cale, sil, sulf, caus merc. self.

ulcération, merc. beil, lach, lyc. thui.

Amygdalite, roy, Amygdales, Anasarque, ars, hell, kal, chin.lyc. sulf. Anémie, chip, fer suif, u-vom, ars, con, calc.

Anévrismes, carb-vg. lach. lyc. puls. guai. sulf.

Angine, acon. bell. merc. lach. sulf. dulc. coff.

🗕 aiguệ, acon, merc, bell, dulc, coff puls, ign, cham.

catarrhaie, cham, merc. puls, duic.

hep, bell, sulf,

carb-vg. baryt. alum. amm.

- conenneuse, bell. ars. baryt, sulfac. lyc. chin.

- degmoneuse, bell, merc, lach, hen, duic.

gangréneuse, ars. lach, amm. sulfac, carb-vg.

- membraneuse, brom, merc, bell, sulf-ac, lyc. chin.

— mercurielle, bell, lach, hep, lyc.

sulf. nitr-ac. - muqueuse. bell. puls, salf. merc.

chin. - palatine. acon. coff. merc. bell lach.

pharyngée, merc. bell. canth. lach. նծը,

– refroidissement (à la suite d'un acon, merc, dulc, bell.

-- rougeole à la suite de la . carb-vg. puls, merc, ars,

searlatineuse, bell, sulf ars mere – syphiluque, merc. lyc. auc. nits-ac thui

tonsillaire, bell merc, hep, lach kal. ign

traumatique, arn. acon. merc. cic. bell.

- ulcération avec . merc. lach. bell lye, hilt ac.

-uvulaire coff.acon.merc.bell lach variolique, merc, bel_sulf

Anthrax ars, lach sil, hell chin Anorexie, von Appetit perdu. Anus affecté, n-vom suif cale ign,

dartres, natrem, petr.

- doubeur ign. n-vom.

- ecoulement - maqueux, phosph.

mere sep graph. eruption, cale kal, lyc.

- excoriation sulf hep, mere, carb - bons vivants ,chez les', ant cale on sep, early vg.

gonflement. hep. n-vom. graph.

paralysic hyos, bell, acon, laur —rhagades.agn graph.ign.sulf.cham. prurit acon, sulf, mere cale nitr-

ac thui, zine baryt,

- suintement, carb-an, nitr-ac, carbveg baryt.

tenesine, merc sulf n-vom, caps. ars rhab.

Auxiété, augoisse ars. bell. n-vom. acon chain merc.

Anthropophobie, ambr. hvos. puls. baryt.

Aphonic, 1994. Yolx perdue,

- chronique. aulf. hep. lach. lyc. Apoplexie. bell. acon. arn. op. a-vom lach, puls.

agés chez les sujets), op. con. arn. merc.

congestive bell lach, arn. op. n rom. acon.

gastrique, ipec, n vom puls

ivrogues (chez les', n-voin oplach, puls ceff.

nerveuse, bell, hyos, camph, laur, colf. stram.

semi-latérale (hémiplégie . cocc lach, bell, n-vom.

séreuse arn, ipec chin, dig, merc કપાર્ધિ

Appétit altéré, sulf., n-vom, ant chin sil, rhus, sep, eyel,

- perdu, nul. sulf a rom, chia sep eyel, sil pals rhus.

perdu, avec faim op natr-m rhus bry, hell perdu, avec soif natr-m. n vom nitr, phosph. s.l

variable, capricieux, natr in bry

chu ign vorace, chin, verate, cin, mere sepmur ac

Apprehensions, cale acon, coff bry. rhas hyos.

Appayant (mal en s'), suif, notr ac co toe arn evel hep

an membre , mal en . con arn. sil. kal bell thus cm

Arrache louleur comme și quelque close fub. rhus plumb, n-yom culoe hep.

par l'usage de l') ipec it vom, chin, veratr hep-

Arthrite acon, sulf lyc, arm bell, sass n-vom bry aigue acon, pills, ant. n-voin bell

feer bry



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Arthrite chronique lyc sulf. sass. Asthme (acces même pendant l'). caus ant puls

dans al les ouvriers travaillant Bans all pals sass suff estomas dans I n von ant lye -

770

puls 15

no come cale lye graph and spiritiouses par l'alus les boissons a your cale sull acou

- Iète dans la , sep, puls color n vom belt

- vague, erratique, puls, n-vom, aru mang salf to

- year dans les, acon, bell, more color spig

Arthrome color phos ac cale sil s of more boy thus

Articulations ifferfees acon solf are

rhas lay mere caus chain than стада плене ence sulf, and petr caps niline

debote tent facile chas agn salf carb year rata ave as vein natr-acdoubters acon arn sulf, rhus bry yere caus chan

executation sidf sham ign mang calc parts are lye

goating out a en by suif lye sass thus a vom fell

inflormation acon sulf arn thus bry merc class caus cham rhagades mang

re deur rhus lach sep cham graph salf rhod.

secheresse puls a vom canth lyc phos accree

Ascarces any Vers intestinaux Ascite ips are sulf chin kal hell mere Aspirant mal en acia squill bry sabin thus kal mere

Assevant malcus, coff valer, spong agn lel samb spec

Asplyxic crim ip arn bell lach congelation par suite de bry acon, carb-yg, ara

fou iroyes , chez les n voin gaz pai l'inspiration des cp aconbell.

neutraux-nés chez les tart, op Avortement sabiu plat sec ehan

noves they lest Jach

pend of ther less op arn
Assis mal en etant puls asa, rhus,
sep that due lye con
Asthme, acon suff ars cupt puls ipee

tampt spec op mosch agés chez les aujets op tach.

arsen e par la vapeur de l') spec-

n vo . cupr merc intestinale bell in vom ant sulf | estarrhal, tart, camph ars. ipec, n-

your puls - chruique sulf cale nitrae kal ars n ver

congestif arou bell n vom suif mere ser phosph convolsif cupy kal n-vom sulf.

Jaca stram carve par la vapeur dus hep.

tpec ars merc emotion à la suite d'une ign. n som cham acon staph

enfants they les, acon, bell spec mesch u vem saub femmes 'chez les puis coce cupr

hell here u vom flatulen, carb-vg a vom. salf chin, chain op.

hysterique, ign n-vom mosch ecff be.l

Millar (dc samb, acon fpec chite puls ars. dule. maqueux sep stram sulf pervent cupr. kal a your sulf

lach stram refroid, seement apres un . dulc. ipec, acon, bell, bry, puls, scu, picars ,des cale, sil, sulf hep-

are iper soutre par la vapeur du' puls seasmodique rou Asthme convulsif. thymique acon, spec spong hell

m re tart Wigand de acon samb bell,

spec ars Atrophie are cale sulf chin ind nvom phosph

enfants des) n-vom sulf cale ars. chin en parties mala les (des bry phosph,

pl mts coups sur la tete a la suite de seu Attouchement (mal par l'), hep. chin. beta bry n youn

Autombe souffran es di, rhus dulc. verste mere chin

Avidité puls ars bry lye cale cham tpec

B

Baillements, hep, rhus, a vom lyc. ign bry avortes lyc lach,



rhus plat.
- pendiculations (avec n-vom. plat. bry puls.

violents, hep, rhus, ign, n-vom, plat. Bains, comme cause, rhus, ant, carbvg sass, sulf.

- froids, ars. dule. puls. sass. sulf. ant. calc.

--- mer de) ars rhus sep.

- pieds (de), rhus, puls, sil, cupr. Bitr-ac. merc.

Baissaut (mal en se) n-vom. bell.

acon bry, hep, puls. Balanite ou inflammation du gland. merc, nitr-ac thui, sulf, sep.

Balbutiement et Bégayement. euphr. caus.stram. aur.sulf.acon.op. Battement dans le corps. carb-vg Boulimie chin cin. hyos. iod. sabad.

phos. sil puls. sep. bell, ferr. ign. cham. sep.

Bégavement, voy Balbutiement. Beurre (mal par l'usage du), carb-vg puls, ars, chin, hep.

Bière (mal par l'usage de la), n-vom sulf, bell, puls,

Bile, affections bilieuses, acon. cham. Brouchite

n-vom, merc, bry Blennorrhagie, roy, Gonorrhée. Blépharite, bell, acon, ars cham, hep.

n-vom puls, sulf, ign, sep. – aiguë acon, bell, merc, cham, hep.

puls. n-vom. bord des paupières au), beil, puls.

hep. merc. cham. - chronique. aut. ars. calc

sulf – conjonctive (à la), acon, ars, bell,

merc puls. - extérieure acou, bell bep suif — orgelets (avec - puls-staph.calc ferr.

anım. londes (affections des personnes). bell, caps, cocc, hyos, lyc, merc personnes). Blondes (affections sil. sulf.

Boissons, comme cause, ars. chin ferr nair sil, verair.

Borborygmes verate chin. carb-vg. ign natr. puls, sep sulf.

Bouche affectée merc. n vom. carb-

convulsée, contractée, tirée, bell.

hyose, caus, cham, op.

stram veratr

Baillements crampoldes, hep. ign Bouche enflammée en dedans, acon, rhus plat. merc, lach, bell, n-vom, cauth,

entr'ouverte, spasmodiquement, bell. on puls. ars. hyose, acon.

excorrée en dedans, merc, n vom lach phos. carb-veg sil.

fétide merc, ara, ars, beli rhus sıl. şulf,

fermée par la crampe, bell, cample. lach merc op verat. gonflée en dedans, merc n-vom,

bell, lach, amm, sep.

sèche en dedans, acon bell, ars. hyose, merc, n-vom,

ulcérée en dedans merc. nitr-ac op. bell. iod. n-vom.

hell. Bouillonnement de sang acon merc. fer, hep, phos. sep, sulf.

spig. sulf. douloureux:douleur pulsative.acon. Bourdonnement d'oreille, voy. Oreilles bourdonnantes

Boutons (éruptions del bell, merc. acon ant. nitr-ac. sep.

Bras affectes, lach, lyc ign, phos. puls. Brisure (douleur de . arn. bry. chin. hep n-vom. rhus. veratr.

spong phos, n vom puls, cham, agées chez les personnes), carb vg. con, baryt, hyose sulf.

catarrhale ou Catarrhe bronchique. mere n-vom. puls. chain thus sull. coryza avec mere puls, sulf dulc. ars, lach, bell, hep.

enfants (chez les) acon, cham, tart ipec. sulf.

enrouement avec dule, carb-vg. merc. cham. sulf

épidémique ou grippe merc bell. n vom, bry, acon, caus thus, hepars. phosph

gras chez les sujets, cale tpec inflammatoire, acon bell, bry.phos


muqueuse, avec expectoration puls mere sulf, tart, dule carb-veg

rongeole (à la suite de la), dros carb-vg. bry. cham serofuleux (chez les sujets) bell

calc_hep. sulf - aphtes en dedans bor. sulf-ac. claim bell ign sulf acon.

spasmodique, avec toux convulsive time, carb-vg bell, n voin, ein dros

 cerclée de bleu veratr, cin, cupr. — suffocante avecaccès de suffocation - de jaune n-vom sen. ars. spec op. carb vg. chin lach - écomeuse bell, hyos. ign. camph Brust mal par let. arn n vom bry. beil, cham, ign, coff, spig, veratr.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

carb-veg. cauth. caus. merc. phos.; voy Estomac, Utérus, etc. Brûlures. cauth. ars. caus. kreos. Cantharides (suite de l'abus des, camph. Carcinome, voy. Cancer. Brulement, douleurs brulantes, ars. Cancer de l'estomac, de l'utérus, etc.

772

Brunes affections des personnes) bry. Cardialgie. roy. Gastralgie. acon hitr-ac. n-vom. ars.

natr. sit. veratr.

suif nitrac.

 syphilitiques, merc, nitr-ac, carban aur carb-vg

Bulles eruptions de, dulc. caus. canth graph, rhus, ars

- vite inal en), sil, **ars, n-vom**, nitr-

ac. sulf.

Buyeurs (maladies des), roy, lyrognes

Café (mai par l'abus du), n-vom, chem. ign merc, canth.

acon.

- céphalaigie, n-vom, cham

- coliques cham n-vom, ign, bell. coloc.
- -- gastralgie, cham, n-vom cocc. -- hernie 'douleur de', n vom, cham

– insomnie, n-voin acon. (mal par le) odontalgie, cham, n vom ign, bell cocc, mere

Calcuts, stil. sass, lye sulf, calc.

— biliaires cale hep, lach sil, sulf.

— renaux lye sass cale phos sil

zine cann.

– Vésicaux, sas, cann, lyc, caic, ant, phos. rut. Callosités de la peau ant, sep dule,

sulf, graph Camomille mai par l'abus de la' puls.

ign n-vom, cor acon, cor. - agatation nerveuse, acon, n-vom.

- coff - coliques n-vom, coloc, horax,
- -- convulsions, ign. cocc.
- diarrhée, puls.
- douleurs, acon, coll
- excornations puls, ign.
 fictre, acon coff
- gastralgie, u-vom, ign.
- métralgie coce.
- nausees, puls, n-vont.
- surexcitation nervouse, acon, colf. n-vom

Camphre (ma) par l'abus du't coff op-Cancer ars, kreos, graph, bell, cann, sil. sull.

Cardite, roy, Losur 'inflammation du'. Bu (mal après avoir), ars. fer. chin., Carie des os. sil. calc. lyc. merc. phosac. sulf asa

Bubons scrofuleux, sil. hep. aur.merc. Carottes indigestion par les), calc. lyc. Carphologie, rhus, hyose, beil, op. phos phos-ac.

Carreau des enfants, n-vom, sulf, cale.

cili ars.

Carus, roy, Sommeil comateux

Buvant mal en), aur bell, lach, merc. Catalepsie, plat, cham ipec, stram sil, cupr. acon bell hyose, mosch, veratr cic.

> Cataracte puls, sil, amm, con. sulf. phos. magn.

> Catarrhe bronchique, roy, Bronchite calarrhaie.

- nasal. voy Coryza

- fébrile roy. Fièvre catarrhale. pulmonaire, roy, Bronchite catarrhale.

suffocant roy. Orthopnée paraly tique.

vésical, roy. Cystite catarrhaic. Cauchemar acon, n-vom, op, sulf. puls, sil,

Géphalalgie, n-vom, bell, acon, bry coff. puls. mere, sulf. arthruique, coloc. bell. n vom. bry.

inec. sep. bain a la suite d'un'. ant. cale. puls

boissons froides par les) 2con bell, ars. natr. puls

café par l'abus du , n-vom, cham ign, bell

sulf n-yom. acon estarrhale. chin cia merc.

chaleur par l'effet de la acon-carb-vg, bell, bry, sil. chagrin par un ign, staph phos-ac

colere par une. cham. n-vom. bey congestive acon, bell, bry, lach,

op sulf, n vom. arn. contrariété par une), cham, bry,

n vom ign. coups sur la tête (par des , arn

cic. con bry. courant d'air par un. acen. chin. bell, n-vom, coloc.

commotion du cerveau (par une . cic, can, hry, hell, hyose, debauche par une, carb-vg.

efforts corporels par des', rhus arn. calc.





Céphalalgie - par une émotion morale. Charbon mai par la vapeur du bell ign, n vom, cham con, bry, op

acon coff igu.

- excès d'étude (par des), n-vom, suif. calc. lach.

femmes chez les', puls, cham. acon bell, plat, chiu,

– hystérique, igu. acon, sep. plat. mosch.

gastrique, puls, n-vom, îpec, aut.

aru, bry. indigestion par une puls rhus.

n rom ipec, sulf, - mercurielle, hep, nitr-ac, aur, carb-

vg chin, sulf. - métallique (par un poison), sulf.

hep. carb-vg. chin. puls.

- migrame, seneg, spig, sep. n vom puls, color.

- nerveuse, coff, n-vom ign, cham acon.

- refroidissement (par un), dulc. bell. acon merc. puls. coff. n-vom

- rhumatismale, puls, merc, acon, sulf. chin.

- sensibles chez les sujets', coff. acon, ign. n-vom, cham.

- spiritueuses (par l'abus de boissons . çarb-vg n-vom. çale. puls. sulf.

- tabac à fumer (par le), puls, n-vom. acon, ant. ign.

- temps par le mauvais , dulc, carbveg. bry. rhus. rhod.

tour de reins (par un) rhus, arn, cale sil, natr, bry,

- veilles prolongées 'par des'. n-vom. coce, puls, bry cale chin, sulf. Cerveau affecté, bell hyose, acon, bry.

une, cumph. - congestion, voy Apoplexic. - hydropisie, voy. Hydrocéphale.

 inflammation roy. Meningite. Chagrin suites d'un . ign staph. phosac caus, lach,

Chaleur mal par la . acon. carb-vg ars. aur. rhus.

– de l'air. carh-veg. ant. bry. lyc. pule, sulf.

- de la chambre, acon arn. natr-m. auls, suif.

du feu, merc, ant, bry,

 du lit ars, mere, sulf, bell, carbvg. cham

Champignons (ma) par les , carb-vg coff, puls, acon, n-vom.

Chancre roy, Syphilis Chant mal par les, carb-vg, phosph amm. dros. hep. stann. sulf.

op amm arn

enfants chez les bell. cham. Chaude pisse, roy Gonorrhée.

Chenilles venimeuses mat par les thus acon, bell.

Cheveux affectés, bell borax, graph. hep kal. lyc. natr-m. sulf

céphalalgies (après de fréquentes : hep nutr-ac calc, sil, sulf

chagrin par suite d'un ign, phosac staph

chute des hep, kal, suif cale. graph patr-m

aux rôtes graph phos kal zinc. s ir le devant, ars, natr m phos. à l'occiput, carb-vg, phos, sifpetr

 derrière les orcilles, phos,
 par plaques canth iod, phos - aux tempes, cale, kal, lyc, natrm

au vertex, baryt, lyc, graph, sep.

endolorissement, ars. chin. carbvg. n-vom, ferr.

 entorisliement, lyc. phos-ac, bor. natr-m.

faiblesse (par cause de), ars. chin. ferr, carb-vg, veratr. flaccidité, phos-ac.

- gras cheveux), bry, plumb.

grisonnants, phos-ac. staph. lyc ars

(hérissement des) arn. canth, zinc. maladies graves (à la suite de). lycnep sit.

mercure (par Pahus du), hep. nitr ac carb-vg kal, iod.

 (sécheresse des . kal. calc phos-ac sucurs après de fréquentes mère. chia, ferr

visqueux (cheveux), chin.

Chlore (mal par l'usage du) puls Chlorose sulf, cale ferr puls con crotal, sep.

Choléra, veratr ars, (pec cample, sec phos-ac

- astatique roy ci-dessus. asphyetique, ars verair, cample

carb-v - cephalalgie (avec), camph

crampes predominantes, cample. cupr. sec. veratr

— crampes des mollets, camph enpr veratr

- cyanose camph, verate kal nod carb vg

– diarrhée prédominante vecutr ars sec ipce




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Coliques : indigestion (per une . puls | Constipation . purgations fr bell, n-vom, carb-veg, bry sulf.

- indignation (à la suite d'une), cham. coloc, sulf,

- indammations, acon, bell, hyosc. merc. ars. puls.

 mensuelles ou pendant les règles.
 champ, beil, cocc. puls. sec. n-vom. · miséréré (de . op. n-vom. plumb.

thui. - néphrétiques, puls, lyc. sass, bell.

- refroidissement (par suite d'un). cham. n-vom. merc. puls. coloc. Constructions spasmodiques. chin.

-saburrales, puls, n-vom, bell, bry. Contractives (douleurs), voy, l sulf.

- saturnines (par le plomb), op. bell. Conteariété (suite d'une), ig cham, plat, alum.

- spasmodiques, cham, coloc, bell. Contusions, arn, eughr, co

cocc. puls. n-rom. - tour de reins (à la suite d'un), rhus.

bry, arn. carb-vg. lach. – ulériues, cham. cocc. ign. n-vom

vermineuses, merc. con, sulf. cic. Coma, roy. Sommeil comateux. Commotion du cerveau, cic. arn. bry

mere, suif. Condylomes, nitr-ac, thui, lyc. phos-

ac. 5355. - fendillés, choux-fleurs, thui, nitr-

ac. lyc. plates thur, nitr-ac, sass.

- a queue, lyc.

Congélation (suites d'une), ars. bry. carb-vg. acon. hyos. lach. pi

Congestion, acon, arn. n-von bry op. merc. sulf. - a la tete acon arn. bell. bry. op.

u-vom, merc. - à la postrine, acon, bell, n rom.

phos. sulf. au ventre n-vom. sulf. puls. carb-

vg. ars. caps. Constipation, n-vom, veratr, bry, op.

sep lyc, lach, aluin n-vom. veratr. op. · accidentelle

bry, plamb chronique ou habituelle, n-vom.l

sulf, bry, cale, lye, sep. onfanta à la mamelle chez les

n-vom, op. bry lye. - femmes enceintes chez les n-vom

sep, bry op lyc – femmes en couche chez les , n-vom,

op bry plat ant. lach. - ivrognes chez les M07-0 op cale, suif.

- plomb (par l'abus du . op. plat. alum.

par des op. n-vom lach, sédentaires chez les sujets

sulf bry, plat lye,

vicillarda (chez les). op. a bry, sulf, lach,

- voyage en) plat alum, o_l - hémorrhoïdes (par des). sulf.

Contact (mal par le,. voy. A ment.

Contractions crampoldes, c sulf caus. coloc. rhus.

alum plemb n -rom, thus contractives.

cham bry, coloc, staph, n sulf-ac.

Conversation (mai par la). a cocc. ign. n-vom. suif.

des autres (mai par la), are Convulsions, bell op, hyose, a ign ipec, stram, veratr.

Coqueluche, cin. dros. spec. c n-vom. puls. veratr. acon. période calarrhale, aco ipec, plus, p-rom.

spasmodique, cia. dre veg. kal. veratr.

de décroissance puls. à veg. dulc. hep.

Cordon spermatique affects n-vom, spong. Cornée affectée nitr-ac. cant

hep. mere. obscurcissement.euphr.cai

puls. sulf. pellicule dessus lach, euph cale.

 pustules merc kal bry taies, cann. euphr hep, ni - ulcères ars, calc bell ar Corrosifs mal par l'abus des pals kal suff

Cors aux pieds 270 ant. c mtr-ac sep, sil sulf

Coryza, bell cham mere hep, n-yom, ars. euphr.

aigu mere bell, hep pul commençant u-vom, her

cale chronique hep sil. sulf ci graph, natr. épidémique merc, bell, h-

febrile, merc. spig. acon TOM





Groutes (éruption de) sulf. calc. ars. Dartres seches, bry calc ars veratr rhus, graph dulc

Croûte de lait, rhus, ars, carb-an, sulf rale.

Cùir chevelu affecté, carb-au, bep. ars. chin, rhus, calc.

- croûtes, suif, rhus, heplars, calc. lyc. — ccarlles, alum, phosph staph mez

oleand. - endolorissement, chin. hep. merc

n-vom, staph, sulf. -- froid sensation de), sulf, calc. ve-

rate sep.

- gouflement, rhus ars, bell, mere, graph.

- prunt, alum, sulf, sop, staph, cale. graph, merc.

- sensibilité douloureuse, chin. 🗗 vom. spig ars. merc. sulf

--- sueur bell, calc. kal. sil.

- lension, merc. nitr ac. ars. caus. Jach. spig.

Cyanose, hydr-ac dig laur, verair eamph lach, cupr. acon.

Cuivre (mat par l'usage du), hep. uvom. bell. ipec.

Cystite, con, capth. puls. n-vom. scon. dig.

catarrhale ou catarrhe vésical. dulc, puls, sult, n-vom, ant.

- du col de la vessie, cann. canth. n vom. puls.

hémorrholdale, puls, n-vom, sulf.

Cystoplégie, ars. bell laur. dulc. hyose.

Danses, bell, stram, cic, hyosc, acon

Dartres, sulf calc. clem. con dufe. graph, lyc merc, rhua, sep. oleand. annulaires, sep. natr. natr-m.

blanches, ars, graph, lyc, zinc.

brunes, lyc natr

 furfuracées, ars. bry. cale. sulf. kreoa

gercées, sep. suif, calc puls, rhus. eyel graph, hep, lach lyc grises, ambr. sulf.

 jaunătres cic. suif. dulc. lyc. cupr. j hyosc. merc. lach. canth. stram. merc. sep.

 pruriantes, clem, calc. ars. merc. sulf, rhus, sep.

– rongeantes, ars. lyc.

sep. ealc. graph suif – rouges, graph, rhus, puis, sulf. staph rhus, sep. ail.

suintantes, merc, sulf, cale, clem, duic, graph, sep

suppurantes sulf, mere, sic, clein rlius, sep

squammeuses, dule calc, ars, phos 50 f

Débilite roy, Faiblesse.

Déchirement roy. Doulour déchirante Debout souffrance en étant), bry, aur. cocc. caps. phos-ac. plat, puls,

Découvrant (mal en se), acon, merc ars cocc. hep n-vom.

Découvrant la tête (mal en) iod. lyc. acon cale, ferr puls, spig, veratr.

Découvrant un membre (en) hep. sil rhus, squill, stront,

cham, chin, bry, merc, puls. Défaillance, évanouissement, acon, igu. n-voin, op, camph carb-veg chant.

chule a la suite d'une arn douleur & la moindre), kep, nmosch

(par la violence de la , acon cham.

émotions morales après des ign acon coff. op chain, veratr.

efforts intellectuels (après des vom lach.

- frayeur après une) ign op. veratr coff.

ivrognes (chez les . carb-veg. op. acon. joie 'après un excès de , coff. op-

mercure (après l'abus du), hep, lach op.

mouvement au moindre). arn. acon verstr. pertes débilitantes à la suite de

carb-veg. chin veratr. n-vom. vertiges avec), acon, bell n-voni. bry, ars

Dégligation douloureuse bell, merc fach hep puls, sulf

des aliments inerc, bell, chain hepsulf.


des boissons, bell, merc canth. phos. de la salive, merc bell, bry, cocc

hep merc Degluttion génée, empêchée, bell

des aliments alum, baryt, cham

hep. n-vom. sulf. sil. - des boissons, bell, lach, merc aur **\$1**]

Deglutition involontaire, besoin d'avaler, bell cham, ign, lach, merc, u-. TOM.



778

CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Déjeuner (mai après le), cham, n-vom. Dents cyriées (mai aux), cham, aux,

phosph bry. cale. cans. natr. natr-m. Dégoùt soy. Répugnance. Délires, bell. acon. bry. hyosc op. stram. n-vom. lach. suif.

anxieux, op. stram, bell-hyosc, sil.

puls. fantastiques, bell, stram sulf, hyose.

furthonds, bell, bry, op-

color. gais, acon, bell, op. sulf veratr. bry, petr. sulf. - loquaces, bell, stram, rhus, veratr. Désespoir acon

lach. op.

70m. op.

puls, arn sulf Démangeauson, roy, Prurit.

Dentition laborieuse, clam, merc.

suif. acon. calc. - agitation nerveuse, acon, coff, cham.

– constipation, n-vom, bry magn-m. - diarrhée, merc, sulf, cham, ipec

cald, ars. tièvre acon. cham. n-yom. coff insomnie, coff acon, cham, bor,

- spasmes et convulsiona bell, ein. ign cham.calc

- toux, cham cin n-vom.

Dents affectées, cham, merc p-vom. staph bell acon

- agacement merc. dulc. phos-ac sulf, sulf-ac, mez, nitr-ac, staph.

- allongement, cham, bry, arn-bell, sulf. byosc.

– carie "staph, croc, sep, phos, plumb. mėz.

· douleurs, roy Odontalgie.

ébréchement staph, lach, euphorb. bell, plumb borux,

- exfoliation, staph, arg-n. lach,

~ féndné, calc, gráph, kal, plumb, rhus

- princement, ars. bell. hyosc. lyc. stram, veratr.

- Jaumssement, phos-ac, nitr-ac, lyc. iod.

- notreissement staph. merc sep. plumb, squill.

saignement, carb-vg. merc. sulf ant phos. phos ac.

- suppuration, fistules, cale sit, sulf. caus staph, natr-m.

- vacilleulent, chain merc. staph.

puls, amm. bry caus.
- canines (mal aux . calc. n-vom. sep sulf-ac, thus.

staph, merc, n-vom. incisives (mal aux), sulf, sep. rhus.

natr-m. m-arc.

- inférieures affectées, cham, bell. staph m-arc.

molarres id. staph. cham. chin. hry, nate. supérieures, id. acon. bell. chin.

sep. aur carb-vg Descendant (mal en), acon. ars. aur.

calc. veratr. ign.

lach puls, sulf, valer. · mussiants, bell, hyos, stram, n-{Déshahillant (mal en se), ars, dros,

n vom. rhus oleand puls coce. - tristes, puls, acon. bell. spong. spong. - nocturnes acon. bell. bry. rhab. Desir d'acides, acon. sulf. aru. ars.

chin, puls, veratr.

air libre (d'), stram, rhus, croc. n yom, magn, plat,

 alunents gras (d'), n-vom. nitr-ac. - amers (d'aliments), dig. nutr-m. sulf

· biere (de), sulf, acon, cocc, merc n vom. puis.

café (de), ang. ars. bry. carb-veg. con aur

chaux, craie (de), nitr-ac, n-vomcalc, hep, ign.

charbons (de) eic. con.

eau de vie (d'), lach, sulf, hep, ars, chin.

· farineux (de), sabad,

 friandises(de) claim, spec, calc, natr. petr. rhus.

fritures del. plumb.

froids d'aliments) sulf-ac, veratr. puls ign, tart.

fromage (de), arg

grasses de choses), n-vom, nitr-ac, lait de , sabad mere, sil. staph. ars thus.

- légumes (de . alum. magn.

liquides (d'aliments). bry, merc. staph sulf, ferr.

pain de) puls, ars, bell, natr. natr-m. plumb. rafraichissantes (de choses), puls.

rhab, cocc, caus,

- succulents d'aliments', phos-ac. - viande de sulf hell, magn.

- viande funiée de), caus.

 vin (de), calc. staph. acon. bry. hep. lach, sulf.

Diahète sucré phos-ac, merc, nitr-ac, phosph, sulf, natr m. aur, baryt. Diarrhée veratr, cham, puls, merc chin ars. dulc. ferr. ipec. rhab.



Diarrhée : après l'usage des acides. Diarrhée nocturne, cham, ars merc staph, bry, n-vom ant.

affaibles ,chez les personnes), chiu. ferr. phos-ac. phos.

- ágées (chez les personnes : ars. bry

phos. sec ant.
alternant arec constipation, ant.
phos. bry. lach. n-vom

automnale, merc. ars, sulf, carb-

vg. chin. - bilieuse. ars. cham merc. puls. úb.

-bu froid (pour avoir), ars. carb-vg. puls. n-mosch.

chagrin ia la suite d'un' staph,

phos-ac. ign. colere (à la suite d'une). cham. n. vom, coloc.

coliques (avec', cham, coloc, merc. ars, rous, bry, sulf, chin, rhab.

débauche après une , carb vg. n-

- débilitante, chin, ipec, veratr, phos phos-ac.

dentition (pendant la), merc. sulf. cham ars. calc. cocc. ferr.

- émotion (à la suite d'une), cham, coloc. acon coff.

enfants (chez les), cham, merc. ipec, sulf, rhab.

-été (en . ars. dulc. bry, merc. carb-

exanthème (à la auite d'un), ipec. Dos affecté calc. puls, sulf, sep. lach. ars, merc. puls. sulf.

femmes enceintes (chez les). sep.

ant. dulc. hyose - frayeur (à la suite d'une), veratr. op.

ani. acon. coff. frissons avec), plus, merc, sulf.

- fruits (par l'usage des), puls ars. chip, lach, indolore, ars. chin. puls. verstr.

phos-ac. ferr. indigestion (par suite d'une), coloc.

staph. joie excessive (après une). coff.

acon. op. veratr. puls. last (per l'usage du), sulf. lyc bry.

patr. - benterique, chin, ferr, bry, ars. phos. phos ac.

matutinale, bry, ars, n-rom. mercurielle, hep. nitr-ac, carb-vg.

chin, sulf. - muqueuse, puls, mere sulf, chin caps.

— nausées (avec). spec. veratr. ars cham, puls, merc.

chin puls, ferr, sulf

opiniatre, sulf graph, phos. calc kreos mir-ac.

phthisiques chez les sujets), phos. cale, chin ferr

printaniere, dule merc, carb-vg. sulf ars, bry.

refroidissement (à la suite d'un). dulc, mere, bry cham,

repas (après chaque chin. ferr. coloc ars. lach.

scrofuleuse sulf, cale, sil, lye, ars.

screuse, aqueuse, merc ferr, phosac. phos. ars. chin apec, puls. sec. soif avec, ars. cham, chin, ferr dule.

- soir (chaque). puls. merc, sulf. dule veratr.

stercorale, ars. puls cham, rhab sulf

tabac (après l'usage du), puls, cham, - temps humide par un lach, rhod, - vomissement 'avec' ipec, veratr. ars. cupr. puls. camph hell rhab Digestion faible, laborieuse, roy byspepsie

Diplopie, hell, cic. hyose, natr-m puls, sulf.

Distension (sensation det. 1gm bell. n-vom. spig. bry, mere

peir sil. courbe, puls, sulf, n-vom, cale, sil.

suif. ant. phos.
- femmes en couche chez les) rhab. Donieurs arthritiques, acon, suif colch puls, a vom, ant, arn, hep, class

battantes, voy Pulsation. brisure (de', bep bry arn, chin. n.-vom. rhus. verstr

brûlantes, ars carb vg. caus, merc.

changeaut de place en , puis mang. sulf, chin, arn, rhod

contusives, arn con, ruta, cic, cin. puls.

déchurantes, chin merc puls, bry carb-vg. calc sulf.

- distensives 109. Distension. écartelantes, bell, merc, bry, ign. n your sulf sil

- étourdissantes, cham.n-vom oleand. cocc plat

exceriation (d'), hep, ign, canth arg

- fonillantes, cocc puis, colch, - griffe (de) case lye, graph, caus carb-vg. ign. n-vom. phos. puls.






TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

con, puls, sulf,

Eclampsie. bell. cham. igu. caus. n-vous plat.

- enfants (des), cham, bell, n-vom, cic. cm.

- femmes enceintes (des) plat. bell. Encephalite, roy. Méningite. hyose, cham, etc.

couche (des). plat. - femmes en cham bell, n-vom, sulf.

Ecorchures, arm. sulf-ac. puls. malades alités (des), arm sulf ac-

vg. ant. bey. belf. Ecrivant (mal en), sil, aur. calc. sep. igo kal. natr-in.

Ecthyma, sil.sep. sulf. merc, ars, kreos. rhus tart.

Eczéma, bell, dulc, merc, acon, phos. ars. sulf. graph. mez

- agées des personnes), aur phos. staph, sulf.

- aigu, acon bell duic, petr. phos - chronique, clem, dulc. merc. phos. sulf. graph. mez.

- fébrile, acon, bell, dulc.

enfants (des), acon, bell, dulc, phos.

– impéligineux - hell carb vg. dulc. sulf.

 rouge ars, aur dule, merc, sulf, Envies des femmes enceintes, sep. 190 simple, dule ars, petr. sulf. phos. (suite facheuse d'un) rhus.

Efforts intellectuels, roy. Etudes for-Ephélides, con. sep. sulf. hyose lye

Effronterie, op. ign. acon. merc. sulf. alum.

Elancement, roy Douleurs lancinautes.

mbarras gastrique, roy. Gastricisme. Epigastre affecté u vom. bry. cham Echardes (douleurs comme par des)

nitr-ac, help carb-vg etc. Emotions morales suites facheuses des), ign. acon, cham, staph, coff Epistaxis, acon, chin bry arm croc coloc n-rom.

- aliénation, plat, bell hyose stram lach

plat.

congestion à la tête bell acon coff B-vom. op. convulsions, bell, ign, cham, hyosc

op samb - defaillance, verair coff op, cham

– diarrhée - verstr. cham. puls. Jann. - 80 édit., 174 part., t. 55.

Ean de vie 'mal par l'usage de l'), n-vour, op. ign. ars. lach. sulf. Ecchymoses, sulf-ac, bry. n-vom. arn.

– moral affecté, bell, aur, ign. phosac plat staph vertiges, bell, mere n-vom, op-

- T. missements. n-vom. op puls. ign.

Enfants (affections dest. acon bell. cham. merc. sulf. calc. hep-spec. roy, 2038i Xourrissons,

Enfantement. voy. Accouchement Enflure. voy Gonflement.

Echauffement (mai par un). acon carb. Engelures. bell. puls. sulf. ars. u-vom. carb.-an, nitr-ac phos, lyc. petr. bleues, arn, bell, kal, puls.

donloureuses, bell, sulf, puls, nvom nitr-ac.petr.

 enflammées, cham, puls, sulf aris. nitr-ac

Engourdissement des membres, puls, croc. rhus. chin.

Eurouement carb-vg. dule dros, mang phos, spong.

Entéralgie roy. Coliques.

Entérite, acon. merc. hyosc. ars. bell lach bry

arthritique, bell, n-vom merc.

merc. rhus Entorses, rhus, arn, amm bry cale ruta, lvc.

ipec, con puls.

aux ongles, rhus, calc, sulf, lyc. arn, cocc, sulf, calc, rota, sil, acon. Épaississement de la peau ant, dule graph, rhus, sep. sil

nitr-ac ant.

 bépatiques, ant, lye mere sep. solaires, lye, sulf puls, ant natr

calc.

cocc. sulf. Epilepsie, bell, cale sulf, cupr

rom ign, op caus, sil.

bell op.[Erections, canth graph, n-yom phos.

natr-m puls, sil-— angoisse, bell, acon, cham, mece] — absentes, con, lyc, kal, graph

caus, hep-

- courtes trop', con, calc.

- doulourcuses, con n-vom, cauth thus mere puls. - faibles (trop), baryt, hep-

selen sulf - fortes (trop), zinc, puls, canth.

phos. sabin.





Expectoration facile, arg. krees, sang. Free couperosée, carb-an, cale, rhus veratr.

- fétude puis, **cale, s**il natr, sulf. caps graph

 floconneuse suif. stann. -Plios

frequente, puls, sulf, dulc, sep. squill stann.

- gélatinéuse, laur, dig. arg. baryt. ferr chin

- grisátre ambr. ars. lyc. sep. ars. dros.

herbacé (d'un goût . phos-ac.

- impossible caus arn, sep.ambr kal – jaunátre, puls, sulf, dros, lyc. bry.

carb-vg. – moisi (d'un gont de), borax.

– muqueuse, puls, sulf, chin, dulc ars, seneg

avec du sang, bry. chin. ferr. acon ars. bell.

– noirátre, chin-lyc, n-vom, rhus, – putride puls, stann, graph, carb-

vg arn, cham - purulente, calc. sulf. kal. sil. lyc.

nitr-ac. comme d'un vieux), puls, – rhume

bell, sulf, ign, n-vom, - roussaire, bry, squill,

- salé d'un goùt), lyc. puis, ars. phos. natr

 sangumoleuto acon ipec. fei sulf-ac. arn. bry. lyc. phos. puls. ipec. ferr transparente, sil. ars. ferr. seneg.

 verdåtre, magn. puls. ars. carb-vg. lyc. sulf.

visqueuse sil. kal. chin Extension d'un membre (mal par l') hell, n-vom, spig.

Extase, agar, stram, acon.

Face affectée. belt. acou. phos. plat puls rhus.

amaigrie, cale ferr, selen, met. bleudtre acon bell, op. veratr ars, cham

– bouffie hyos, n-vom, acon, ars, chin op phosph

- boutonneuse, bell, carb-vg, ars.

- brulante, cham, acon, ars. bell, bry. | mere sit, natr. plat verate

ar sep sulf. cocc arn

— convulsée, ars. bell cham stram n-vom.

rula ars veratr.

croùteuse rhus dulc, ars graph cale merc.

dartres à la), dulc, natr-m, rhus carb-vg. sep merc. bry

décomposée ars. camph. chin. op. phos-ac, rhus, spig. stram, veratr

douloureuse, voy. Prosopalgie éphélidée, ant. lyc. sulf. calc. dulc graph.

érysipèle à la, bell, crotal, lach rhus puls sep.

froide camph byos, veratr. gouffée, bell, ara merc, lach lye

sulf. phosph. grisátre, ars. ferr. chin. lyc. merc n-rom.

have, creuse ars. chin. veratr. hvom. stann. sec.

hippocratique, ars. phosph. chin phos-ac, verair sec, carb-vg n-vom. jaune acon, chin ferr, spig, sep. ars, n vom. bell, bry.

— autour du nez. sep.

- autour de la bouche n-voni

autour des yeux, nitr-ac, spig. n-vom.

luisante, graisseuse. magn. natr-m selen.

norratre, chin ars.

noirs avec pores) suif, natr nitr ac. dros. dig.

pâle puls, merc, ars, carb-vg chin sep, sulf,

— alternant avec rougeur, acon agn croc cham bell n-vom

paralysée caus, graph, op. pruriteuse, calc con lyc, natr in

alum chel réseaux veineux à la plat

ridée, calc op sulf, lyc sep rouge aron bell n-vom mere bry. op

ragueuse graph sulf, ars thus sep.

d'un teint, lach, sec. ars sale chin ferr

suante carb vg. 1gn, merc, n-vom puls rhots veratr.

lachetee **ars** ferr

de bleu ferr ars, veratr, brundtre bell, op. daph, hyos nitr-|--- de jaune, sep. ferr. natr. colch-

n-vom chaude acon merc sulf, chin. - de rouge, sulf samb ferr, bell

bry lyc sabad, sec — de sales faches plumb lach




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Flatuosités bruyantes en sortant, merc (Flueurs blanches roussattres, cocc sepcaus lach, squill zinc

-chaudes on sortant, cham. acon staph phoph zinc.

-fètides très-', chin, carb-vg sulf puls, arn

· fréquentes, carb-vg. chin. phosph. graph

– froides en sortant, con,

- incarcérées, carb-vg. chin. graph. lach n-vom. sulf

- inodores, bell, carb-vg. lyc. ambr. coff plat.

Fiéchissant la partie malade (mai en . cale ign arn.chin bry bell.n-vom la têtê en,. calc. spong. cic. rhus.

arn. Flueurs blanches, puls, sulf merc sep. cale, alum, con, cocc.

- ácres, cham, puis, suif, sep.phosph

kreos, ars mere mez, - aqueuses, puls, graph, carb-vg.

sulf alum amm. blanches, cale, puls, sil, mere.

kreos ferr. sep.
- blanc d'œof (comme du) borax.

plat, amm-m petr bovis, mez. - bleuåtres ambr

— brûlantes carb-an.calc, puls. sulf ac alum kreos, amm, con, fluor ac.

- brunătres coce, mir-ac, amm m. corrosives, sulf. sep_ars. phosph. con, cham, puls, sulf, merc, mez. - épaisses, puls, sep carb-vg, con

ars, borax natr-m, magn-m, natr. - féndes n-vom kreos, natr. sep nite-ac.

— jaunes. sep. n-vom. sianu. sulf. ars krees.

- laiteuses, puls, calc, sil, сод. sep. lyc.

- inuqueuses, puls, lach, con, stann nair sass, sep carh vg mere coce

– nocturnes ambr. caus, natr-m - pruriteuses, calc. sulf sep. merc chin cham.

— puriformes, calc., merc agn., sep. coce con

– patrides natr sep nitr-ac kreos. - regles avant les cale lach carbchia, phosph. puls, graph. ٧g sülf

- - après les alum puls sabin ruts cocc sil graph suif mere - pendant les alum, puls, chin

cocc lach graph - roidissant le linge, sabin alum nur sep

rongeantes kreos ars sulf, chamsep puls phos; h ruta.

sabin calc alum lyc

saugum dentes chin cocc. sep calc carb-vg con.

sereuses puls, graph alum corbvg amm sulf

transparentes, stann, suif-ac alum natr-in

– sortant en urmant, carb-vg. sil amm-m. calc.

verdatres, sep. carb-vg. merc. lach.

visqueuses acon phosph, fart Fore affecté, n-vom, lach lyc aur. natr. sulf. magn-m. calc. caps chin merc.

douloureux, n-vom, merc. chin bry bell, lach, acon, aur, lyc.

dur, induration, calc. n-vom sulf chin, lye, merc, ars

enflagimé acon, n vom, bell sulf, mere, lach, tye, aur, magn-m.

- engurge cale n-vom. chin. sulf. mere, ars. magn-m. caps n-mosch. Fongus, fongosités ant. suif. sil. staph. ars, kreos.

articulaire ant, bry, sil. sulf, tod staph, con.

hématode ars carb-vg carb-au phosph sep, sil

médullaire, carb-an, phosph. thui bell sil. sulf

Foulures, arm, thus, ruta bry, cate lye amm puls.

Fractures des os. calc. sulf. sil lyc. ruta, sitr-ac.

Fraveur suites d'une , ign, op acon. coff bell, verair lach

Frissons more puls caps chin v catr ars, n vont spee, bry, lye nate ac accompagnés de chaleur, acon n-vom, bell, puls ars, rhus merc cham ign

alternant avec chaleur, chin, n-yoni mere ars, bry ride, sulf bell precedés de chaleur, bell caps, bry


puis n-vom sep lye staph smyrs de chaleur, acou n-vom bell puis arn sulf, spig rhus partiels bell, puls, cham, n-voni acon lach.

bry natr-m em, cale, soil avec verate acon chin. arm.

sans puls are n-vom chin daph, rhus, spig, sabad

aver sueur puls, lye sulf sabad n vom. ars. calc.

- suivis de **sueur, bry, rhus,** caus, lve, carb-an, caps, sabad, veratr, oatr-m.



786

CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Proid (mal par le). are, dule, campb.;Gastralgie, indigention (par une), puls. rhus. n-vom. rhod. hep. sil. cham. Fromage (mal par l'usage du), coloc. – gātē (par le), bry, ars, rhus, phosâc.

Frottement (mal par le), puls, con, sil. sep. caps. cans. merc. ars.

 soulagement par le), calc. phosph. natr. sulf. arn. ant. merc. puls. Fruits ,mal par l'usage des... uls. ars.

bry, chin, veratr, sep, magn-m. Fureur, bell, stram, hyos, veratr.

canth, op. ars,

Furoncles, arn. bell, hep, sil, lyc. phosph. suif. lach.

grands, n-vom, sil. lyc. hep. nitrac. hyos. hell.

- petits, arn. belt. sulf. lyc. magn. Batr-m.

G

sicté folle, coff. croc. op. st. veratr. bell. natr-m. lach, plat. Gaicté foile. stram.

Gale, sulf, merc, caus, carb-vg, sep. selen, hep, lyc.

grosse, pustuleuse, sulf, lyc. caus. clem. rhus. kreos, merc. sep.

- miliaire, sulf. carb-vg. merc, caus, sep. lach natr.

- répercutée, sulf, merc, caus, ambr. sep.

- saignante. merc. sulf. calc. dulc. arg-ii.

seche, sulf, merc, carb-vg, hep,

caus lach, sep veratr. - suintante, sulf, merc, caus, kreos. carb vg. sep.

Ganglions, aru. sil. phosph plumb. phas-ac. zinc.

Gangrène, ars. sil. sec. squill, sulf. chin acon, hell

- hunnde, chin, bell,

– inflammatoire, sabin, sec, arx, bell, acon, mur-ac.

- sphacèle, ars. sec, plumb, lach sif asa, cuphorb squill, sulf-ac. 8uif

Gastralgie, n vom. cocc. carb vg. ign. puls, bell, suif.

usage du). cham. n-vom. afé par l ign cocc.

camomille (par l'usage de la . puls. n-vom, ign. bell.

- émotion (après une), cham, coloc. n-vom. siaph, cocc. - hypocondriaques (chez les sujets).

n-vom sulf, grat, cocc. cocc puls, arn, n vom, sulf, hystériques (chez les femmes), ign. Gargouillement dans le ventre, chin.

h-vom cocc. calc. magn.

n-vom, bry, ent.

ivrognes (chez les', n-vom, carbvg. sulf calc. lach.

pertes débilitantes (à la suite de). chin, carb veg. n-vom. cocc. sulf. règles dérangées (par suite des)

puls, cocc. lyc. calc. cham. n vom trop faibles (par suite des), puls. cocc.

-- trop fortes (par suite des), calc

Jyc. sel de cuisine (par l'abus du), carb-

vg. nitr-sp. Gastricisme, gastrose, puls. n-vom. ipec ant bry, cham.

· acides (par l'usage des . acon. hep-

ars, carb-vg. lach, suif. - café (par l'abus du). n-vom, c'ham.

ign, cocc, merc. chagrin ,à la suite d'uu), ign, staph, phos-ac, lach.

camomille ,par l'usage de la).puls. n-vom. ign. bell. colère (à la suite d'une). cham.

n-vom. bry. coloc.

coup sur l'estomac (à la suite d'un'. arn. bry. rhus.

échaustement (à la suite d'un), bry.

effort corporel (après un). arn. rhus, bry, puls.

enfants (chez lest, cham, bry, iper, meré, pula, n-vom. émotion (après une), cham, ign

coloc. acon. bry. étude forcée à la suite d'une). n-vom sulf. arn. puls.

fruits (par l'usage des), ars, puls, carb-veg.

glaces (pur l'usage des) ars. puls. indigestion (à la suite d'une : puis. ipec ant. n-vom arn. mercure (par l'abus du), carb-vg.

aur. chin. sulf. hep.

pertes débilitantes à la suite de chin, carh-vg. ruta, calc - refroidissement (à la suite d'un)

coce iper puls, cham. ars. spiritueuses (par l'abus des bois-

SOUS). n-vom. op. tabac (par l'usage du, puls, n-vom.

ipec, ign staph tour de reins (à l rhus bry ara puls. la suite d'un.

veilles prolongées (à la suite de . cocc puls, arn. n vom, sulf.

veratr, carh-vg, puls, suif.





Gastrite, acon. ars. bry. puls. n-yom. Glandes dures, cham. con. iod. spong ipec. bell. hyos.

- aiguē, acon, bry, aru, pula, ipec. n-vom bell.

- chronique, n-vom, sulf, hep, lach, cale, lye.

- rhumatismale, acon. bell, n-vom: bry

Gastro-entérite, roy, et-dessus Gastrite. Gastrose, *voy*, Gastricisme,

Gaz délétères (mal par les , bell, op. suif-ac amm

Geneires affectées, mere, sulf, staph. Glaucome phosph.

nitr-ac.

— décollées. carb-vg merc. natr. phosph. rhus, sep.

- chilammées. n-voir. sulf. hep

natr-m, sep. amm. – excorides, carb-vg. sep. sil, chin. nilr-ac,

- fetides, graph, calc, rius,

- fistuleuses, calc. caus. sulf. sil. staph natr-m.

— fongueuses, siaph, sulf, carb-тg. mere nitr ac.

gouffées, acon. n vom. merc. staph. sulf phos-ac.

– (nodosités aux), siaph, calc. caus. phos-ac thui, natr.

páles, mere, staph, carb-an, nitr-ac, aur. plumb. zinc.

- rouges, hep. n-vom. sulf. amm. natr-m sep.

- saignant facilement, carb-vg. sulf. apere cale, pitr-ac, sil

 scorbutiques, merc, n-vom, carbvg. sulf. staph. caps.

 suppurantes, merc, sulf, carb-vg. s'aph. caus. natr-m

- ulcérées, merc, siaph, calc, carbvg. sulf-ac. natr-m. lyc.

 vesicules (couvertes de) beli, mez, Genou affecté, bry. sulf, rhus, sil, sep. puls, n-vom.

enflammé, sulf bry, n-vom, arn. cale, lyc

- gonflé iod.calc.lyc.sulf.sil n-vom - hydropique sulf. calc. iod. sil merc. con. dig.

Genoux (mai en étant à), suif. phos-ac.

dye hep mitr-ac thur. Glandes affectées, hell merc, sulf rod. Gorge affectée bell merc, acon, dulc.

bell, chin, sulf-cale

sil. sulf

enflammées, merc, bell, phosph sal, cham, bep.

engorgées, merc. bell. suif. bep. iod con, duic.

squirrheuses, cham, bell, ied lye clem. con sil phosph

suppurantes sil. hep. merc. bell sulf, dule, lye, nitr-ac.

ulcérées sil. phosph. ars. bell lach hep con sulf. cauth

n-vom. hell, cham. carb-vg, caps. Glossite, merc. acon. bell. lach. arn-blanches, merc ataph. carb-an. Glossoplégie, caus. bell. hyos, dule graph. lach.

- bleuatres, cia. lach, oleand, sabad Goitre, iod. spong, calc. lyc. amm nair.

> Gonflement, cham, bell, merc, bry sulf, hep puls.

blane, tumeur blanche, bry, lyc puls, ars, rhos, ant, sulf, sabin, sil bleu4tre, cham bell, lach, ars, am, sil. puls. con.

dur, bry, rhus, phosph, puls, sulf, carb an, cham, calc.

froid, tumeur froide, con, mere

ars, sulf, coce, squill, rhod, inflammatoire, acon merc. bry, hep, puls, ars, sulf, ad-lussant, bry, sulf, rhus, arn, mere

ars. sabin.

mélanotique, bématode, carb au ars. sil. phosph. carb-veg sulf nitr-ac.

œdémateux, ars. suif, puls bry squill, ant, chin, hell, lye, kal

pale, bry, lyc rhus, arm fod puls lach, ars. merc. calc. purulent, bell ber hep.

phosph. lach, sulf, calc, lye. rouge acon merc, bell, bry, ben puls, ars, sulf, sil

spongieux lach, sil ars, sulf, carban phosph, ant

tod. Ive hell squirrheux con clem cham sil phosph. variqueux, carb au, ars sil phosph

carb-vg. sulf. nar-ac. lacb. Gonbrahée, cann mere sulf canth caps, nur ac.

aigue cann canth

bry. - balarde sep. merc. unc-ac. thur salf, n-vom

Gercures rhus cham, sulf, merc, cale - chronique merc, sulf cann caps

con lye hep sil amm, cale. hep, lach baryt brom, douloureuses, cham, mere phosph. — douloureuse, acon bell, ign mere , dule a vom, hep. lach



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Gorge convalsée, spasines du gosier, Grossesse avec canva sions

bell stram lach n vom ign veratr entlamace acm bel, mere dale break hep but barve exercise alors in relacing fits ac ang graph cans brom earling goothe tell lash mere bop saff char coff p your ign

- paralysee caus cupr sil Hul

lach are belt.

788

 réfrécie par des spasmos bell strain ; p vom caps verage, ign

- seche mere bell acon sulf n-

vom ign cham Gout altere puls thus chia suit acon veratir bell n-vom hry

acide puls bell sulf n v n chin eale tarax phosph were cham, aver pals ber novem chain sep

mere salf a on lye arn doacratre puls phosph sabad plumb squit acon stann ahan en o sse als ant n your cauth belt prosph ly st ale cous chin.

- fide aquety thin ign her staph ' ant jus bel, caps natriu.

grassedt, pals mas valer lye, alam mong rhas st sang i herby e n your phos ac sass puls versir stant.

metal que thus cupr n-vom cace thee bale mere

- bauserbond puls mere sabad sep h v n vom ars cale rod pute le arn puls mere n v n som salt hed sem, arn coll cham salé pals mere sep ars phosph carb vg. soil con whos p-rion terreux, pals, prespi cana a mosen chia iga, hap, ipre-

Con to roy Arthrite.

Grave le pals sussi tve, me, case, con a tom al

Grossess Jahorneuse sept a voint puls He for Jopar hell mere verate strain. versity among here

- borden two sep a-vom petr. He me a fre, sep, nur cale caus. natr- n magn m cin.

- cophalilgic ever, bell, nevom the gegge concernas hell belt puls or territ par bry.

Chapes as Cham a tom, puls floreprise purs de cham acon ara.

Lela es as Cham a tom, puls floreprise purs de cham acon ara.

Lela es as cham a tom puls floreprise purs de cham acon ara.

Lela es as cham a tom puls floreprise pur sulf a bell see, bry arp coust pake a avec fary n vom

sep lye, a vom alam.

ign belt on byos, open thee d arches avec soll and sep phosph.

did her hose thyspeps reaver a your pals, spec-

con shif fell, metr-m

tysum avec juls, coce, phos ac n vo suf con

gastrissa avec. ipec. n-rom.

plot nem som vera r. maisers ave. ., ec. n-vent sulf.

CB pres per sep ed nyalgie avec sep cham bell.

taches sales a la face avec . sep. ret, ferr nitr ac

tout wer sep juds, bell, a vom. - various avec puls, carb-vg lyc sulf. con. sep. feer puis.

H

empyreamatique pals sulf sq n l llelm nthinse acon sulf on mere. stig e.c. sabad ferr hvos. sil. n. vom. a large symmet avec on soft. sorg graph by one

services pardes acon sulf merc. feet ign r vom cale physph.graph. bucon- asec spig cin sulf. sobid class Bu, graph,

of pars avec, spig, cir mere cin.

convidence on these d reflée avec merceus spig acon, there are, men mere can helt, so had song feer upon

ere subact spag sailf

fun implene si scrofal is the leasurets sil ver soldaire par le sulf niere salto proph sil cate puls carle

Gren sailiette, that stapli, merc, ambr. Hemntemese, ipoc, arn, phosph. ferr.

cale
Grippe, mere a vom. bell. bry, ars Henritage e un canth pals arn camph.

to s puls

11 1 12

fest mes care uclas chez les as a pals ther are thin brox sad





Hémoptysie, à la suite d'hémoryhotdes [Herpes, merc bell, rhus, acon, dulc supprimées cham.acon.phosph.sull.

- masturbation à la suite de la -suif. carb vg. phosph, chin, n-rom.

 phthisiques chez les persounes).
 acon. sulf-ac. sulf, arn. phosph. chá m

- regles dérangées (à la suite de). puls bry, acon sulf, sep. con ferr. Hémorrhagies, chin. croc. acon. ipec. phosph. bell. arn. sulf-ac. lach.

actives bell, acon ferr hyos, croc. puis cham,

passives. chim. carb-vg. phos-ac. Hoquet. ign. puls. n-vom. acon. hyos.

sec. ferr puls. ipec. arn. Hémorrhoides. n-vom. sulf. carb-veg. calc. ars. mur-ac. phosph.

– hleuáires, carb-vg, mur-ac,

- coliques (avec), suif, n-vom, puls, carb-vg.

- douloure**uses**, ars, carb-vg, n-vom, cham, natr-m.

- enflammées, puls, n-vom, ars, sulf, mur-ac. acon

— gercées, cham, caus,

gondées, n-vom, puls, carb-veg, cale, carb-an, sulf

reg. caps. merc.

calc. caus. lach.

- pruriantes, acon-sulf, n vom,

— rectum dans le . n-vom, calc, cam, coloc lach, lyc.

- saignantes, acou, bell, phospb. ipoc. sulf pals.

- sortanies. cale, sep, caus, puis. sulf hep, phosph.

- suintantes, sulf. sulf-ac. sep. caus. natr-m

– supprimées, n-vom, suif, puls, carbvg. calc.

ulcérées, puis, cham, n-yom Hépatite n-vom. acon. cham. bry. bell, merc. puls.

- aigue acon, merc. bell, n-vom, sulf i lach.

- chronique, n-vom, sulf, lyc, aur. magn-m. lach.

Hernies n vom sulf. sulf-ac. veratr. cocc sil

versir coce nitr-ac.

sulf ac op lach

-- inguinales. n-vom. cocc. aur. sil. Incontinence d'urine, puls, sulf-bell. chain amm-m

– ombilicales n-vom.

— secotales, n-vom magn-m

hep sulf.

annulaire, sep. clem. natr. natr m. face de la , des lèvres. bell. rhus merc, hep.

furfuracé, bry, ars. sulf, cale kreos.

phlycténoïde, acon, bell, merc, ars. cleid

prépuce du sep mere, nitr-ac. hep. dulc. caus. Hiver affections d'', rhus, dulc. n-vom.

camph are carb vg. petr. veratr.

stram bell.

puls. Horreue de l'air. bell n-voin. camph. coff. sulf. cocc.

- de se laver. sulf. calc. sass. ліtг-ас. du mouvement, n-vom, caps, natrm. sulf. lach,

Humeur mauvaise, merc, n vom phosph sulf, staph.

variable.croec. ign acon. plat bell stram

hep. Hydrargyrose. nitr-ac - Clan carb-veg. sulf aur, sil. lach. lyc kal-bor.

Hydrarthre, sulf calc, iod, sil, mere muqueuses, borax, sulf, puls, carb-[Hydrocele, iod puls, sulf, sil, graph. rod.

- opinatres. n vom. sulf. carb-vg [Hydrocephale, acon. bell. bry. hell. aru, ars

aigue, bell, bry, hell **sulf** ara. lach mere, zinc, phosph

chronique, sulf bell, ars. mere dig, lach, stram.

Hydrophobie, bell canth, hyos lach veratr stram dydropisie aps chin heil, ars. k '

sulf, dig dule lyc. Hydrothorax carb-vg, kal, bry lach,

ars merc Hypochondres sensibles, n vom, kalfye, cale, sulf, bry hep, cans, carb,

vg. Hypochondrie, n-vom sulf natr. dule, lach, cale con, ign, cans, chain

Hysterie ign n-vont, puls, ein aur caic plat.

1

- enfants 'chez les . n-vom aur. ichthyose, coloc, hep. plumb, Impelign roy. Darties croutcuses incarcérées, acon, sulf, n-vom Impuissance, ign, lye calad con cann. sep. suff

> hyos em sep, sil, puls, em bell - énfauts chez les

sulf sep, sil



Langue chargée de gris. ambr. puls, Lèvres bleues, ars, lyc. dig. cupr. argtart cupr arg.

- de jaune. chin. bry. ipec. nvom cham.

de mucosités, chin, merc, puls.

suif, bell - de noir, chin merc, phosph. - de vert. magn. magu-m. rhod.

plumb.

 convulsée, cham. ign. lyc - endammee, acon, merc, lach, arn.

— excuriée merc, ail n-vom, lach Carb-vi

- fendillee, beil sulf, puls, cham, nvom chiq.

– froide veratr bell, laur.

gonflée, ars. bell. lach bell. kal. hell,

 lourde bell, mur-ac, colch, plumb. carb-vg.

- noire ars. chin lach n-vom. veratr. - paralysée caus, lach, bell, hyos,

dule graph, op n mose, eaphr. - roide, lach bell, lyc, calc, mere COD

rouge hyos, cham rhus, bell, sulf
 seche bell rhus, sulf, byos, cham

ulcérée merc. natr-m. lyc. n-vom. borax, suif-ac. op.

vésicules couverte de), heil, sulf. carb-an merc. natr.

Larynx affecté, acon, spong, hep. dros. carb-vg caus phosph, iod.

enflatumé acon dros. рроври spong carb-vg caus. hep.

- ulceré, carb-vg, phoeph, arg. iod. sulf caus, lach, hep.

Larmoiement, acon. euphr. bell. puls. sil phosph ars.

Lascivité carb-vg phosph, chin. calc. canth, puls, sep, strain.

Lassitude, puls, veratr, chiu, ars-rhus, bry. arn. Légumes (mal par les), bry natr. hell

veratr ars cupr

Lèpre, sulf sil ais, hep, alum, graph, natr phosph.

Lésions mécaniques, arn. rhus. puls de trop longue du lach sul-ac ruta con bry. sil. cic rhus puls Léthargie op. bell. camph lach puls Lombes ,mal aux tart hyos.

Leucorrhée roy Plueurs blanches. Levant du lit (mal en se) carb-vg core con. ign. ars. acon bry. bell puls.

Levant de son siége en se), puls, caps. rhus, con spig phosph. Lèvres affectées, bell sulf, sep. rhus.

natr-m bry. staph. n.-vom. igu.

a phosph.

brundtres ars. bry. op. staph. phosph chin.

caucèreuses ars sulf, con bell, sil clem

douloureuses, phos-ac, ign. ipec, plat sabad bell.

excorrées ars, bell, cauth, cham, lyc, natr-m,

exfoliées cham n-rom, puls, sep. tart.

gercées, carb-vg. ign. mere natr-m. versi

gontiées, beil, merc, ars, suif hep. sil.

-- inférieure (l'). lach. sep. puls. lye, mur-ac - supérioure (la), sulf natr-m.

mere natr arg. noires, ars chin, rhus, veratr, acon.

Squall pales, caus lyc. ferr, spig, calc.

sulf. con

- renversées, bell, merc

saignantes ign. merc. ars. carb-an. bry

seches, bell, merc, bry, rhus, chin, verate sulph, phosph, acon.

ulcérées, bell, sil, suif, merc, ars sep natr-m vésicules (couvertes de , suif ars

bell, rhus, bry, sep. Lichen acon, lye, sulf, cic, bry, natr-m. Lieutérie, chiù, ferr, phosph, bry ars.

phos ac. calc. Lippitude acon, euph, merc puls, rhus, stram,

Lisant (mal en), sil, calc, sulf, bell, natr-m, cm, iye chin, ruts, n-TOTAL

· a haute voix (eu phosph. carb-vg. mang, par, nitr ac verb, cocc

Lochies dérangées, sec. puls, plat-rhus, beli carb-an

arrêtées puls, n-vom, bell coloc. sec, plat

- fetides, carb-an sec bell

de trop longue durée sec plat, calc.

puls, hry n-vom.

Lombries acon cin mere sabad, sulf. cit. Spig

Loupes, cale nitr-ac sulf, hep, graph, sabın

Luette affectée, coff bell, mere n-vom puls carb vg.

- allongée, coff. calc. croc. dulc. lyc. iod.



793




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Méningite, bell, bry. acon, bell, suif, Montant sur une hauteur ,en, calc. camph, hyos.

- soleil 'par l'action du , camph. aconbell, hyos.

Mentagre, etc. sil, sulf, ars, hep. graph ant.

Mercure mal par l'abus du hep, tiltr ne bell suif, chin, aur, lye, lach, magne, lye, bell, hep, lach, suif

carb-vg. staph.

- houche affectée, nitr-ac, sulf dulc op. carb-vg. staph. hep. aur. faiblesse chin, carb-vg, bep, nitrac tach, aur.

- glandes afferiées, aur. Ditr-ac. carb-vg. sil. duk.

hydropisie, chin hell, sulf, dule, mal par le , impressionnabilité au

temps carb-rg, chin. - - nerfs fatigues. hep. nitr-ac. aur. puls, carb-vg, cham.

os affectés, phos-ac, aur, nitr-ac, sil, sulf. Iye

-- rhumatisme, chin, hep, carb-vg. sulf, puls, lach, bell, aur.

salivation, nitrac, op. dulc. sulf. nal hep, chin, carb-vg

niceres, untr-ac, bep. thui, lyc sulf, aur carb-yg, sil. Metralgie, Voy. Matrice douloureuse. Nævi, Voy. Taches de naissance. Metrale Voy Matrice cullammée.

Métro-péri onite, merc, bell, cham. n-vom plat, bry, aron, rhus. Metrorrhagie bell chin, sabin, plat, eroc, ferr hyos.

Micl venéneux mal par le', coll.

camph.

Migraine sang, bell, coloc, sep. puls. n-vom, spig, bry. Miliaire, acon ipec bry, merc, rhus. cham, ara, sulf.

enfants des , acon. bry, iper. bell.

pourprée acon roff, bell, suif. calc. alum, puls, lyc. sil. scarlatineuse, suif. dulc. acon. bry. Nausées, ipec. u-voin, carb-veg, aut.

Moelle epiniece affectée, dule, n-vom. ewe. rhus, suif.

 atrophice, n-vom sulf cocc, caus. s'aph phosph.

 euflammée, dule caus, n-vom, lach bry coce.

Môles canth, mere

Mollets crampes dans les cham. cample veratr, sep. nitr-ac. sil. sec.)

Montant malen calc, spong, bry, ars, Navets mal par l'usage des , puls, cupt spig sep mere, amin, intr

spig, oleand, sulf, acon

Moral affecte. n-yom, bell, stram, veratr aur, sulf hyos, hell, staple ign, puls acon.

Morsures, sulf-ac, arm.

 venimeuses, seneg lach, bell, amm ars, arn

Morve du cheral, ars. merc. sulf. sil. bell, bry, bep.

Mouillé mal apres avoir été, puls. çalı rhus, sep. sass. bell. n-mosch. hry,

Mouvement mal par le , bry, chin, nvoin arn, bell, lach,

Mouvement horrent du , caps. n-von. nair-m. suif. lach.

Muqueuses affections. puls. suif. chin. fluor-ac, dule, bell, hep.

Musique mal par la , phos-ac, calc. sep. natr. coff. n-vom. kal.

Myéfite dulc. lach, n-vom caus, bell. ars. bry.

Myopie carb-vg. con, phosph. phosac. lyc. nitr-ac. suif-ac. ruta. sulf. pols.

Narcotisme, coff, amm, carb-veg, puls. lach, bell. ars. calc. hell.

Narines affectées, cale, cham, lach. lye, suif, n-vom, beil, puls, sil caus, bouchées, sil, cale, bry, n-vom, sulf. caus. con. amm. alum.

-- crodieuses, mere lye sulf, aur cham lach, graph, calc, staph, douloureuses, hep, merc, cham,

bell, n-vom, bry, phosph.

excorices, phosph n-vom, fluorac, spig. igu. alum, graph, aut. - ulcérées, merc, sulf, aur stáph.

tart, hep. natr-m. puls, bry,

bu a; res avoir, a-vom, puls, bry, natr-m. rhus.

mangeaut en puls cocc vérair. kal, carb yg.

mangé dprès avoir an-vom sulf. pais, sit natr in,

matin le , te vom sil graph carb. veg amm verair.

- voitare | en allant en . petr. cocc. sulf

bry escaher un mere n-vom rhus. Nephralgie, puls, lvc. sass. canth. petr. aur. acon. sulf. bell. n vom caun.



795




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Odeurs diverses devant le nez. beil. Odeutalgie nerveuse, coff, acon, byos cale, suif, puls, n-vom, aur. veratr. beil, spig, n-vom. milr-ac.

- acides. bell, alum.

— aromatiques ign. puls.

- doucestres, nitr-sc.aur, sil, n-vom. empyreumatiques. D-TOM SEAC. sulf, aur, graph, calc.

posz (de), ars. con. - pus (de), sulf, seneg.

putrides. bell. phosph, aur. nitr-

ac. sep. cale. n-vom. graph. veratr. – rhume (d'un vieux puis, self. graph. merc.

sang (de). n-vom. amm. sil.

- soufre (de'. n-rom, ara, graph, caic, plumb, anac.

terreuses, versir, calc. sulf, spac Odonialgie, cham, merc, puls, sulf acon. staph.

- - arthritique, acon, puls, n-vom, sulf, chin.

-- café 'par l'abus du', cham, n-vom,

ign, bell merc. cariées (dans les dents : rham.merc.

staph puls. sep. n-rom. congestive, acon, cale, bell, aur. hyos, chin, cham.

ean qu'on boit :par l'. cham. rhus. Odorat affecté, bell suif, n vom. lyc. amm, sil. spig. enfants chez les', cham, merc. scon.

bell, suif, calc. face 'jusqu'à la', mere n-vom, hyos, zhas, spig.

femmes (chez les , puls, bell, sep. OEdème, chin, bell, ars, sulf kal, lyc, hyos. acon. cham.

froid humide (par un', n-mosch, bores, puls, rhus, rhod, sulf,

 gencivés enflées avec¹, mierc, bell. n-vom. sulf. staph

- glandes sous-maxillaires engorgées 'avec', cham, staph, mere sep. n-[Oignons mal par l'usage des, thui, TOM grossesse (pendant la , sep. beil

puls. staph. n-vom. hystérique, ign. sep. n-vom. aur.

- jeunes filles (chez les acon. bel) joue enflée (avec), bell, merc, chain

n-vom, staph, puls, arn, sulf, - mangeant (en), bell, merc, bry staph, sulf.

- - chaud (en), bell, puls, bry, sulf. cham.

- froid (en', cale, merc, carb-veg, phosph.

 mercure 'par l'abus du', carb-veg. nitr-ac staph.

norturne, cham, bell. merc. coff. sulf puls.

nourrices (chez les) carb-veg, chin oreilles (jusqu'aux), puls, merc. bell, staph cham, suif.

rangée de deuts dans toute une). mere staph cham, rhus,

- refroidissement (rausée par un'. duic, bell acon, merc, puls, n-vom

règles & l'époque des , carb-veg.

cham, amm sep. graph, caic, rhumatismale, chin puls, puls, merc acon sulf, n-vom.

semi-latérale, puls, cham, n-vom, merc, thus.

sensibles (chez les sujets), coff. acon. cham. n-tom. ign

soir (le), puls, merc, sulf, bell, rhus, igu. bry.

table (par la fomée du', ign. bry spig. chin. tête (jusque dans la . merr puls,

bell, sulf, n-vom,

yeux (jusqu'aux), spig, puls, calc. cham.

puls, natr-m. sil. sep. hep. émoussé, bell puls, n-vom, sil. sulf. sep

sensible "trop). bell. suif, n-vom. асоп. lyc. beр

dig. bey. OEal Foy. Yeux.

OEsophagite, cocc, carb-veg, lach ars, canth. ass

OEufs (mal par l'usage des , rolch.

Ongles malades, sil. graph, hep, aut merc. sulf. rhgs.

bleus, chin, n-vom, pate-m, dig, aur. sil.

cassants, sil. alum, sulf, graph, sep. mere

cotelés, sabad.

- croissant lentement, ant.

- décolorés, graph, nite-ac, sil, ant. ars. sulf.

– difformes, graph, sulf, sil, sèp, ant. alem.

- douloureux * graph, caus, m-aus merc, ant.

matin (le), ign. n-vom. merc. staph. -- entrant dans la chair sulf m-augraph sil. teuer, colch.

- envies (affertéa d'), sulf. natr-m. rhus, stann, mere cale.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Ongles épaissis graph sil suif cale Orage mal par un temps d', sil. 20 sep alum sahad mere exfoliés graph self sil, alum Ortor des vens tembureux spig. hi

7110

merc jaunes, sep sil con mir ac, mere Orclate mere arh aur puis spet Bulf

sensibles ant gaph caus so'f merc

- tombants, graph mere are sepsec, hell

ulcores kep. sil, mere self fach Oppliente thus, plat intriac merc Oreshes affectives puls merc, be bell sep

Ophthalmie, bell acon mere puls, cuphe ars, cham, cale phosph Staff

aigue acon bell, mere pais, cham duk.

- arthering to, acon puls sulf bell spig cale estarchale merc. scon bell ars eathr merc. puls. n vom

chronique ars sulf bep cale phosph, eaphr nar ac.

conjourtise affectée avec helt ars merc sulf p ls.

cornec affectee aver cann nitran more hep ars lach

- exterieure hep, acon sulf, hel puls merc fatigue les yeux pour arour hell

ruta glandes de Merbonnus affectées aver puls bell more, suif, ars

gonorrheique, aron pals nar ac mere stdf tris affecté avec l' merc sulf clem, seneg.

mercurielle nitrae hep salf lach aur

nouveaux nés cher les sulf cuptir Orgueit plat lye stram cur e, verni-mere acon puls bell ,Orteils affic és arn caus, graph sul palpébrale acon bel, suif puts n your ? cp

refrodissement par saite d'un dule cham con ars

rhumatismale acon mere sulf puls bry ars

n vom syphilitique nifr-ac aur mere

thui phosph traumitique arm con reon suff sil cal sulf ac hep fach travaux firs causée par des ruta

bell carb vg Opisthotonos op a vom. bell ipec ang Opauni mal par l'usage de l'. coff.

camph. aut. spec. merc. bell.

uatr m bev

chin livos plat cale

31 gonoral cique mere aur chais on the agu-

crede u a la suite d'un carb veg puls

transatejoe aen con chain soft n yeur cale con h prhees cut puls mare.

ny ac suff high borantes puls acon can entreca en ocdana unin-accada a

staph asa. confinites pals sulf more collin ere embag

Luleareases, Toy, Otalgie dat treuses graph sep, oleand, care lye Su f

- inflammics Foy. Otto. excitaces graph, mere petr. and cale had fetales graph on hiveg hep. How

cheg sit, go there puls mere sep lye ring

couges pals alon ant chin. serbes en dedans graph phospil f by I ch rite-ic

Saintan es, derracre ofeand only le graph tia antes chin hell, puls n-vom cale.

- ulcérées, merc, pals, ruiq, spons ka cale

Sec 10 1150

d il prises near sulf ain colo. Ivi buy mis sabin

graph natr carb-an. exercis pitr a mang stantes ovel large ara clear.

scrofulcuse bell mere sufficiale Orthogone paralytique tart ara carb Us affectes mere cale sulf. sil. and

lye phosph aur caries, sulf. calc, merc. sil, phonar lye

deviés cale sulf sil, puls rhus. tve.

- douloureux chin mere, sulf pitrar aur phosph enflammes, mere chin, aur. all nite-ac





Os formant lentement le calus, cale, sulf. sil. iye.

 gonfiés (exostose). merc. phos. aur. cale, asa, phos-ac, sil, sulf, staph, Pain (ma) par l'usage du), chin, sulf nécrosés, sil, sulf, calc sec. phosph.

- ramollis, sulf. calc. sil. merc.

- picérés, suif. calc. merc. sil. asa. lyc. phosph, aur.

Otalgie, puls, bell, mere, cham, sulf. B-tom.

- inflammatoire, bell, merc, puls. 8q][.

refroidissement (à la suite d'un . cham, puls, dule, chia,

rhumatismale, puls. bell. merc.

chin, p-70m. - nerreuse, bell. cham.n-tom.sulf.

pals. Otite, puls, merc. bell, sulf, n-vom.

- externe, puls, merc. bell, suif. . interne, pals. bell. sulf. merc. n-

TOTAL. Otorrhée, puls, sulf, merc, calc, men, CATD-TE

catarrhale, puls, sulf, merc, calc.

hep, bell. - exanthème (après un), men, merc. puls, bell.

- muqueuse, puls, merc, sulf, calc. Bitr-ac.

ass. calc. sil.

-- sangumolente, puls, more, graph. thus, bry. scrofuleuse, merc. sulf. lyc. puls

- supprimée, puls, merc, bell, bep. bry. lach, n-vom.

 suivie de céphalaigie, bell, bry. — suivie de glandes enflées, merc. puls. bell.

- survie d'orchite, merc. puls, aur. zinc. D-YOU.

Oure affectée, puls, bell, merc, phosph, caus, sulf.

aigue (plus, phos-ac, bell, lyc. nate, bry.

- émoussée, faible bell, caus, sil. puls, phosph, sulf.

sensible (irop, acon, coff, cham. bell. n-voin.

Ovaires affectés, more, lach, plat, thui, nitr-ac, canth bell, sep. chin.

Ozène, aur. merc. **252, cal**c. sulf. puis, lye

sep. merc. bry.

de seigle, sep. bell, sulf, puls, chin rhus.

Palais affecté, merc, aur, n vom, bell. calc. lach.

carié, aur. merc. lach, sil. calc.

enflammé, n-vom. calc. merc. lách. ant. chin.

carb-vg. merc, nitr ac excorié. lach, sulf,

gonflé. u-vom. calc. chin. baryt. Palpitations de cœur. acon. spig puls. sep, lye, chin natr-m, iod. phosph. congestives, acon, kal, phosph, chin,

contrariété (après une), ign. acou.

bey, spig, joie subite (après une), coff. acon.

verstr. nerveuses, coff. cocc, cham, n-vom.

puls. verntr. pertes débutitantes (après des . chin n-vom suif. phos-ac.

peur après une coff, versir, opulcères réperculés (à la suite d' ars. sulf. caus. lach. lyc.

Panaris, hep. sil. fach. sulf. purulente, merc, sulf. hep. puls. Paralysies, coce, caus, rhus, n-vom bell, hyos,

apoplectiques, bell, ara, n-vom. zinc. stram.

faiblesse (par suite de chin. sulf. ferr. cocc. rhus. n-vom.

particles, caus, sulf, eupr. sec. bell, cocc.

rhumatismales, ruta, ferr baryt,

semi-latérales, hémiplégies core. caps, lach, plumb, graph, bell.

spasmes la la suite de,, cupe, sec. caus, bell, n-vom. ulcères répercutés (après des suif

caus, lach, rhus, bell, sil, Parjant malen), ars arn sulf. n-vom,

cocc. ign. Parlé 'mal après avoir), sulf, arg, igu-

bell, cocc. Parole affectée, bell, stram, euphr.caus.

merc. lach. bégayante, bell, stram, caus, euphr.

merc difficile, euphr, stram, n-vom, dele lach.

embrouillée, indistincte, caus. lyc bry, lach calc. sec. – lente, ars. thui, sec.



79~

CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Parole masillarde, heli, lye, phos ac. Peau froide veratr, ipec. sulf, rhus. lach, sil.

- perdue hell hyos, caus laur, lye, stram.

- précipitée, bell lach, hep, mère

Parotite, rhus, mere, carb vg. kal. aur cale

scarlatmerse, cale, kal, nitr ac tye.

Patisseries mat par l'usage des , puls ipec, ant kal.

Paumeres affectees, acon hep bell. euphr. ars. cham.

 agglutudes mere puls, u-vom sulf, ars carb vg.
 clinte (affectées de), spig sep.verat nitr ac bell, stram

crampes affectées de hyos, clean. sil, bull hep, croc.

darirenses bry, sep rhus, avs.
 enflammées, foy, Blépharite,

- fermées, occlusion, cham, hyos, eroc hep stram.

— gonflées, acon incresaff, hell. puls, hep, nitr ac ars, cham,

- nodosités (affectées de - staph-cale.)

— rhus, bry, aur.

- paralysées veratr, sep. apig. mtrac, hell, stram, hyos.

- pesantes, cham, sep n-vom spong bell.

- retrécies fles fentes : ant. canth. arn, erec

rojdes rhus, veratr, spig.

 rouges acon, lyc, cham, bell, nyom, hep, merc sulf.

ean ardenic, brûlante ars. acc bry, hell sill phosph, lach, lyc. Peau ardente, ars, aron

atonie de la), con, phos-ac, kal. anac tye bry, sil, dule, ipec. belt, ars. carb-veg phos-ac, sec.

--- calleuse sep graph ant sil. ran. borax, rhus, lach, sulf, annu

 chaude, acon, bry, ars, bell, sil ; lyc, phosph. lach.

- douloureuse puls, rhus, graph amm:-m phosph. kal. mang. hep

dure, sop. rlms graph ant sil ara thui, lach, kal chia - parchemin comme du ars. sil

lye, chin squill kal, phosph, - élasticité manque d' veratr.

- flasque, cale verate, ind once, lye, chin caps, see, sulf, con-

– Aétrie, sec. chin. veratr. phos ac. ars, all ferr, sass, fed.

sep, camph, phos. carb-vg, samb. chi**n**.

graissense natr-m. chin. mere, bey selen vale, magn-m, asar-

- insensible see anac, oleand, ambr phos-ac lyc. sulf. plat. conc. phosph. - jaune, acop merc, chin, sep. con.

n vom sulf, aur, spig, bry, op. bell. noirátre, ser, nitr-ac, spig. acon. rut, asa

redemateuse, hell, ars. chin. ferr. ant cupr. cale caps, graph, bry, asa.

pale, sulf. calc. nitr-ac. ferr. puls. bell coce plat, lyc. sep. kal. phosph-ridee, veratr, cupr. sec. ant. sep. lye, stram ambr. rhus, phos-sc. spig

rolde phosph nitr-ac, plat. acon. cans matr-m, strout, sep. n-vom.

rouge thus bell mers graph puls. acon n vont. arn. phos-ac. lyc. rude. sep. calc. sulf. bell. rhus. and, sass, graph, oleand laur.

sale and ferr, phosph, merc, sec. ЫŢ.

serite, acon, sulf, bell, phosph. lyc. bry kal, cale dule, chin, cham. suintante, rhus, carb-vg, lye, graph. sep kal staph, petr. selen, lach. squammeuse, de-quamation. mer.

bell amm, veratr, acon, staph, coloc, visqueuse phosph. Iye, veratr acon phos ac, bry, merc, cham. iof, ars.

 vulnérable, sil, cham, pete, nitr-oc. sulf haryt, puls, borax, hep. asa. - seches, veratr acon, rhus, m-aus, Pemphigus, dulc, rhus, cauth, ars, rain liep, raus,

Peritonite merc, acon, n-rom, lety. hell, hyos.

puerpérale n.-rom. acon. merc. helt chain bry.

Peterlites bry, ars, rhus, phosph.hyos. n voin

Petite vérole mere, sulf, ars, rhus, thui, bell.

avant l'éruption, acon, coff. bell. thas, bry, sulf. eraption (pendant I', sulf. mere.

bell stram, thuipustales confluentes

вист. pustales mores avec. ars. chin.

elasticité manque d'éveratr. capr. sulf carb-vg. lach. rhus. rhus. bovis, ars. lach, dulc. -- suppuration pendant la sulf merc. thm. puls, rhus.

temps de la dessiccation pendant le . bell cham, puls acon, sulf. Peur suites d'une, veratr, op. ign.



Pharyny affecté bell, acon, hyos, lach, Plaies par morsure, sulf-ac. arn. mere coff, coce, sulf, dule,

erampes pris de , bell, stram, ign, n-vom, sull, cocc,

enflanimé, acen, bell, merc, coff. sulf dulc.

paratysé cans, cope ail, lach, laor, Phimosis, mere, sulf. cann. thui, nitrac. sep.

Phosphore mal par l'usage du coff. n-vom. sulf. bell. alum.

Photophobic, bell, acoq, con, hep. phosph, merc, sulf, can,

Philipsie, aulf. calc. sil. lyc. phosph.

kal, nitr-ac, hep. abdominale, calc phosph, sulf sec.

nitr ac. – laryngés, carb vg. lach, arg. spong.,

hep mang, ars. ind. pulmonaire calc. sulf sil nitr-ac. lye hep. lach, puls.

cale, sep. zine,

Pieds affectés, puls. bry. suif. caus Plemb mat par l'usage du , alum. pl.d. sep. lye, sal. hep, graph. op. cham.

- crampes pris de carb-vg. amm. cale, sep. coff, sil n-vom. phosph - érysipèle affectes d' puls, dule, - froios, suif, caus, sil, con, verair, caus, sil, con, verair. graph, plat, kal, phosph. lyc.

gonfles, kal, ferr, sulf, ars, phosph, bry, sil, chin, phos-ac, led, sep.

- paralyses, oleand, chin, ars, plumb. phosph.

su nts. sal carb-vg. sulf. cale. sep. lye. hep. graph.

Pierre de la vessie, sass, lyc. cann. cair, phosph, aut.

Piqures d'insertes, arn. bell. acon aat. merc, sep.

Pissement au lit ein, helf, puls, sulf, Sep. sil.

Pituites de l'estomar, bry, carb-vg. sep. n voin, sulf. sil. lyc. staph micz.

Pityriasis, by are sulf calc. 6il. kreos, phosphodule,

Placenta adhérent, plat, sec. puls, bell-Plaies, arn, sulf ac, daph, puls cham : sil, sulf.

- contuston par arn, con, sulf-ac, buryt. puls, euphr.

- échardes par des hep, nitr-ac. - entlammers cham, hep, sil, puls, hell untr ac hell. suit, petr.

— gangrenees, chio ars, sil, hell, par plamb hell isch, carb-vg — tout le corps par cale, her isc, — guérissant difficilement, hep, cham, graph, sec carb-vg sabin, sil, petr, sulf, isch — Poires mal par l'usage des , verci

- incision par; staph, arn sulf, pat, borax, bry,

ouvrant denouveau s' lach, phospha carb-veg. sil,

piqure par arn lach, sil, carb vg. nur ac.

saignant facilement, kreus. phosph, chin, sulf-ac.

suppurant beaucoup, merc sulf, hep, puls,

Plethore, aron, sulf. bell, phosph, puls, n-vom, byos, sabin cale, hep

Picurésie, acon. hry. kal, aquill, sulf. nit. lach merc. épanchement avec , kal, there, suff,

squill. Pleurodynie, arn. n-vom, bry. acon

suif. puls. chin. Pleurs faciles, puls, cham, sulf, acon.

p at, caus, uitr-m, sep. mat en versant des , arn hep, bell

stang. Piano mal par le jeu du . kal, natr. Plique polonaise lye. fluor-ac nate m

borax.

Pheumonie, acon. bry, sulf, phosph

mere, chin tart, squill, ars. - aifynamique, acon, theren-vom, veratr, ars.

bilienz arce symptomes CADIL.

debut au acon, bry, sulf phosph,

hépatisation dans la période d' sult phos, lach, lye. splenisation période de l'acon, bre.

phosph. sulf. chin. lach, sil

suppuration arec sulf, playsph.lyc.

typhot le putride, rhus bry, veratr. ars. op. arn hell, vieillärds chez les - tart, chiu, cann.

op, verair, ars, Podagre, arn, aron sulf, lye, sass,

puls, sabin,

Poils chute des sulf, kal phosph natr m. cans cale, sil, rhus, -- favoris aux graph natr m cale.

ambr sil nitr-ac plumb moustaches aux kal plumb. - moustaches kal.

narines our graph, caus, sil cale - pubis au , rhus, nate-in mate selen

- sourcits aux , kal bell, selen caus





Prurit: chalent du lit (à la), n-vom : Pus sangumolent, merc, ars, Lep. earli-vg. staph. cocc. sulf. thui.) pierr.

- deshabillant (en se), cocc, puls, con sit n-voni.

- nort "la), ars. verstr. cham. puls. CORT.

-- sor ,le), rhus, amm-m. staph, nvom puls.

- sueur pendant la , op. rhus, cham. iper con

arn afon belt, hep.

Psoriasis, sep. dulc. sulf. ara. phosph. calc

Piyalisme Toy Salivation.

Pupille affertée, bell, merc, calc, hyos. nity ac. spig hyos, stram, hep.

- adherente 'nitr-ac, calc, sulf, graph \$tl.

- contractée veratr cocc. sulf. arn.

s i cham, sep. chel. - dilatée, stram, bell-spig, calc. op.

hyos, nitr-ac, cm - immobile, op. bell. nitr-ac. capr.

stram, hyos, laur, baryt. – inégale, merc, sulf, bary),

Pus des ulceres altéré sil, asa ars.!

mere rhus, sulf, chin, bell, abondant, hep, sulf, mere, puls,

asa, sep chin, sil

sep. calc. graph. albumineux, puls, lyc, cale, sulf. ars, sil. amm, sep.

- aqueux, sil, merc, rhus, caus, sulf, ars staph, asa.

– blanchatre, laiteux, puls, lyc, calc. sulf. ars. sil. som.

- brunátre, sil, bry carb-yg ars. –

merc, sep nitr-ac.

aut sil, carb vg. ph sph.

- fétide sulf, hep phos ac. ars. sil. — anaers bry. ara. puls. ars. con.

asa, sep cale meré chin,

sulf,

sep ars chio, thu, earlesu.

blaveng sentant le , graph, jannatre puls, mere sit sep, ars. earb vg. staph cale, phosph, caus. - fetales will core, bism.

suif, n tr-ac, thus - noir - teignant en . sulf. chin. bry.'-Iye.

rare, manquant, sil. calc. tach, hep bell, verate, cupe, manquant, sil. calc. merc. asa, sil, cocb-vg, puls, cans, nitr-6. lye.

sanieux, sil, ars, rhus, earb ve nitr ac. merc. chin asa, siaph. Vernimeux, avec insectes, sil. sabasulf, ars, mete, cale,

- vert teignant en , ad. asa. puls. caus, sep. merc. zhus, aur. n-vonvisqueux, sil. asa. con, ars sep. mere.

Profite, puls, rhus, sulf, bry, merc, Pustules, tart, ars, thui, merc, sulf ant, hell, hep.

noires, chin. 4rs.

Pyrosis, puls, n-vom, sulf, calc, sulf ас. сарк.

Quinquina anat par l'abus du liper. verate, sulf. u-vom, puls, ars, mere-

R

Raccourcissement des muscles, caus. arn, sep. a:nm-m. suif, coloc, lach. natr-m.

Rachitisme cale, bell, sulf, lye, s.l. mere, puls, nur-ac

Rage, canth bell, hyos, lach,

- acide d'odear), hep. sulf. merc. Rapports, bry. sulf. aut. n-your, arn. nate-in, verate, coce, sep, rhus, conacres, pierc, alum, asa, salf, hepphos-ac bell.

aigres pals n vom sulf-ac, carb-vg, sulf, phosph, cale, lye, natr-m.

graph

-failf odenr d'asa. -fair 'd'an-yem, bry, sulf, carb-ye puls thus, lack caus, lack caus,

graph a rou.

comme du fromage fort, hep -- avortes, con caus, phosph. carb-Ag sulf, ambr

gelatineux sil, mere, ambr, sep — brnyants, petr, con, sil, aut, puls.


cans) phosph, ambr. lach, kal.] - doucedtre | d'un gout , ac u. sultac mere alum, dule,

-dordourchs, in-vom, core, phosph pytr. sep. carb-an.

liqui le, clair, merc caus, sil, asa — patride d'un gout , puls, ara, coff, aut, mere, n-you

-rances, thui, merc, asa, sulf, hep. bell, puls.

répugnants, nauséabonds. sep natr-m ein



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Rapports d'un gout salé. staph, arn. Règles âcres, suif, carb-vg sil, amm. tart, suif-ac.

802

Rasant ,mal en se), carb-an, puls caled.

Rate affectée, caps, arn, sulf, ars, sec chin, rhus, ign, asa, natr.

con amm-m. chin. sulf. natr. - douloureuse, natr m.

 dure, induration sulf, caps, chin. ars. n-mosch.

- enflammée, chin bry. sulf. acon. n-vom.

- engorgée, caps, ars sulf, chin, n mosch, ign. n-vom

Réchauffant au grand air (mal en se .

puls bry. lyc. iod. spig. sabad. au lit en se). cham, merc, dros.

sulf, sabin, veratr, thui, lyc. Redressant mal en se', acon, sulf, bell, rhus, bry, op, n-vom,

Rectum douloureux, ign. caus, acon m-vom, con merc, ars, sulf,

- sortant, chute. ign. sep. n-vom. sulf merc. ara.

dule. Refroidi-sement (mal par un acon, n-vom, cham, puls, mer-

céphalalgié, acon n-vom, belt, dulc.;

 coliques cham, merc, bell, - diarrhée, merc. veratr. dulc. puls. sulf.

dysurie, pula, calc, dulc.

 fievre, acon, coff bell, merc, dule, gastricisme. ipec. acon. n-vom. puls. bry

- odontalgie. cham. dulc. acon. coff.! merc.

- ophthalmie, acon. bell. merc. otalgie, puls, merc, bell.

L.

n-vom.

rhumatisme, puls, acon, merc. dule.

rhume de cervezu, merc. n-vom dute, acon, puls, bell, hep.

- de postrinc. acon. bry. n-vom. puls, bell,

- sucurs abondantes, merc, cham, - yue affectée, bell, dulc, merc,

Refroidissement des pieds (mai par un) Sil. puls. cham

Refroidissement de la tête (mal par un). sep. bell. puls. ed. Refroidissements faciles. dulc. baryt.

sulf. calc. sep carb-vg. sil. graph. calc. natr-m, carb vg. hep. chin. Regard fixe. op. stram. bell. phos-ac. Repos (mal dans le'. carb-vg. rhus.

hyos, ars. Règles dérangées, puis, sep. sulf, cocc. vom.

puls, kal.

avançantes, n vom, ipéc, sep, calc, phosph. carb-vg

brunes, chin, bry.

 caillots en forme de , cham, ipec. chin, bell, sabın,

courte durée 'de trop', puls, dulc lach baryt amm.

- faibles (trop , puls, con, natr-in, graph, baryt, lach,

-fétides, bell, sil, carb-vg, bry, sabin. cham.

-foucées (trop , chain, puls, cocc. sulf. bell. n-vom.

fortes trop', calc, plat, ign. sec. tyc. sil. phosph. bell.

longue durée de trop', n-vom, lyc.

sulf-ac. plat. phosph.
- pales trop . carb-vg. sulf. puls.
graph. nitr-ac. ferr. calc. com.

retardant, sulf, puls, sep, caus. natr-m, dule.

 retardées chez les jeunes filles, puls, sulf. caus. sep. kal.

- supprimées, puts, bry, lyc, sulf. sep con, acon, kal,

avec souffrances, puls, bry, sulf, cale, sep. cocc n-vom, graph. - - avant l'époque, puls, cale, sulf.

cupr. sep. lyc. verat. sec. - au début de l'époque, hyos, sep. acon, puls cham, plat, caus, phosph.

pendant les règles, puls, graph. kal, hyos, cham, sulf, sep, n-vom.

· — à la suite des règles, n-vom, borax,

 oule affectée, dulc puis, acon, bell, graph, kreos, stram, lyc, phosph, prosopalgie, acon, merc, dulc, bell. Régurgitations, suif, carb-vg, phosph. lach n vom. bry. cham. puls. con. aliments (des), phosph. bry, sulf.

cham, puls, con, sanguinolenies, n-voin, sep.

Reins (maux de , n-vom, calc, sulf, rhus, puls, sep. caos.

tour de reins (suite d'un). rhus, bry, puls, n-vom, cale, sulf, puls, Reins, rognons affectés, puls, lyc. sass.

canth. n-vom cann zinc. Repas (mai pendant le,, carb-vg.


phosph. sep. graph. puls. bej. natr-m. lyc. - (mzl a la suite du', sulf, ars, n-vom.

caps, duic, aur. puls. con. valer. sabad.

graph, cale, bey, acon, phosph, n-Repugnance pour les aliments, puls, am, n-tom, hry, ipec, chin,



803



TABLE, ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Répugnance pour les acides, sulf. Rétrécissements, merc. cie. rhus, nell, ferr, cocr. iga.

cham, cocc.

-- bouillon pour le), rhus cham, arn.

graph, ars. bell. café pour le), n-vom, bry, phosph.

cale. coll.cham.sulf-ne.lyc.natr-m.

douceurs pour les . suif. caus. phosph ars. merc. graph. nitr-ac. cau pour l' . bell. stram. n-vom.

fromage (pour le), chia, oleand.

 graisse (pour la), petr. bry, puls, carb-vg, batr-m, ang, sulf, ars. hép

- - lait (pour le), sep. calc. puls. guai. bry, sit, cin.sulf, bell, igh, carb-vg, liqueurs (pour les), bell, magn,

pain pour le , natr-m. con, sep. lyc. pais, n-vom, sulf, nitr-sc. phosph. pain de seigle (pour le, lyc. sulf.

kal puls. n-vom.

- poissons (pour les , zinc graph.

- sataisons pour les), selen, carb-vg, - solides (pour les aliments), staph, ang. merc. ferr.

- viande pour la , sulf. mur-ne petr. sep. calc. rhus. carb-vg

vin (pour le) merc, sabad, rhus ign. sulf. tach.

Respirant 'mal en), bry, acon, chin, kal, ara, merc, mir, bell, arn,

Respiration a fectée, acon, sulf. puls. ars phosph. bry. ipec. bell. - accelérée. acon sulf. bell. sep. carb-

g. phosph. cupr. lyc. ipec - bruvante, cham. spong. chin, samb,

ars, sulf, cin. stram, hep, phosph. courte, acon, ipec, sep bell, carb-vg, arn, bry, phosph, difficile sulf, ars, phosph, bell,

lach iod, kreos.

- baletante, pec, bry, stram, bell. cham, carb-an, phosph, arn, all.

 inégale, bell, op, ang, cupr, puls, cham, ign, cin, laur, iod.

- lente, bell.op, cupr, ign. ipec.hep. Mur. bry. n-vom.

- profonde, op. bry. ipec. lach, sil.

-rilanic, hep. tari. lyc. cupr. hyos. cham, spec. chiu, bell, stram, - sibilante, samb hep, spong, cupr.

lach. suspirieuse, șii, acon, stram, cocc. op. bry. sec. ipec.

bell, ferr, cocr. iga.

vom. puls. bell, phosph, bry, petr.

bière (pour la, chin. bell, n-vom. Réves, chin. sil. n-vom. puls sulf.

phosph. lyc. agréables, n-vom, op. puls, acon.

ztia n-m. steph. animaux (d'), pols, sulf, arn, phosph.

bell, veratr, byos. anxieux, chin, ail, bell, n-vom, suif,

calc. acon. argent d), zinc. alum, magn, cycl.

chutes (de), chin, thui,

confus. chin. puls. eroc. stann, patr. - continuant après le réveil. ign. chin. caic, natr-m.

contrariants, cham, nitr-ac, chin. natr-m staph caus, bry, n-rom

danses (de), sut. natr. alum, magn. esu (d', sul. ars. merc. ferr. magn.

drotiques, op. chin. slaph, ign. n-TOM, Sil.

evenements du jour d', n-vom bry, sil, rhus, puls, fantantiques, sil, carb-vg, sulf,

con. petr. n-vom.

feu (de), suif. ars. hep. caic. spong. natr. spig. fréquents, chia. sil. lye. carb-vg.

puls. a-rom. guerre et soldats (de), hep, bry,

amm-m. ferr. spong. merc. maladies (de , n-vom, kal. calc. con. amm. sep.

malheur (de, puls. arn. phosph. ars. B-10m, chia.

morts, cadavres (de), phosph. anac. phos-ac, thui, kal.

orage (d'. spig. ars. arn. querelles (de), n-vom. bry. staph. arn. phosph. cham.

revenants, spectres de), sil. carb-vg. puls. ign. alum kal. vermine (de , n vom. alum. s.l.

amm. phosph. kal. - voleurs de . merc. aur. sil. natr.

veratr, bell, voyages (de), op. lach, sil, sang.

magn-m, pair Rhagades, puis, cale, sulf, cham, mere lye hep petr.

Rhubarbe mal pur l'usage de la . cham, merc. bell. n-vom.

Rhumatisme, acon, puls, merc, rhus. bry coich, arn, n-vom, sulf.

Rhume de cerveau. Voy. Coryza. – de postrine. Foy Catarrhe bronchi-

que. Rides à la face, lyc. cale, sep. strain rhab. hell.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Rides an front, cale lye hell, stram thang corrosif, dere intr are sil kalsep, rhua, suif

hier envie de croc phosps acon hyos bell stram con that verair | tenvelad comagn ig. care phosph atum capr hell croc caus.

804

mal par le la d'aix stram carb idental 34

flordeur ers mescles sulf cupr sepcaus culoc.

Rougeole pais a en sulf lels phospi-AFR Than

avant lempton puls nent lay salt that phosph

pend at recupied puls cell aconsulf her ptough

suite de l'éraption à la puls ars coff thus ber phosph dros.

- suppression, repercussion puls

bry rhus phosph suil

Rupia ars sull patr sep merc graph.

8

Safran mal par l'usage du), puls, bell op heou.

Salivate o merc. op chin nitr-acsulf hep

balise afferce more suff livos pals deg bism magn-m sabm

aqueuse puls arece magnin. a ignentée mere aell rhas puls phosph soft byom nat sup arg

brundler listo

dimiruet beli verate strain n mosch sulf phosph sep ars. conmense sulf bry spig canth Saban

epaisse a mosch bell hism fétide mere dig.

illante arg. verste bell camph netr-ac.

rougeatre sabin

sangua oleute sulf, hyos, mere n tom arm mersac

visqueuse campli arg bry bell

Sulseparealle mal par l'usage de la mere bed sulf

Sang des beworthagies a iére pals early og graph eroe cham by hundere carbyeg by rhus cute pas on

coagul, rhas, cham, bell plat ferr

. F25

chattil dak

· lust, rouge vif. bell salue hvos dule see arn thus bry, phosph

suif are bep asim carb seg épais sulf croc plat cupr puls.

arn fetide sabin beli plat carb-au.

phosph by four claim a tom croc.

self arem pass salf

pale puls carb veg graph salf. plat

Visipen's Fric ruph raight secharte to lon lesticules goniles Salvenous claim part more sulf natrm majoran

have some giften may par less bry phos at ary kreas

Scarla, ne bell sulf, amm phosph. Acen Berc

gang cacase ars early veg action. surf Lack

lisse bell saif phosph merc. amm acon

miliaire suif, acon dule bell bey. COM réperentée pliesp! bry sulf bell.

phos ac Schatigue rhus, puls bry cale suif. CO N:

carb-yeg tach natr w Scorbut mer Scrofules salf calc mere kep baryt. tod bed sil anni ars

Scrota raffecte sulf peti thut rhus. ्राण राज्य क्रमा च रिक्री ४०३ ४४ — darbes ्रीट) psa oje nitim

provit de petr carb vg su graph. St Jen

saenr der sil amm sep buryt.

thu, igu rhod maga a. Seigle (rgolo mal par f'usage du . stram bell hyos odeh solan nigr. Sems affectes V y Mamelles

Sel de cuisme mal pa l'at us du carbveg n ir sp cale lye ara dros. Selles alterees mere, sulf pals n-YOTH

acides, rhab call sulf graph natr. dicte.

ders mere ars puls, sulf cham, verair

aqueuses see are fuls ferr, chitt. this ac cham tale dule

- bil cases pais ars, mere cham, vera richal bry suif - blanchatres mere acon sulf chia.

1 ds hep phosph ars verate, ipoc, - boddie een forme ac soff bell. pids phospic chin than libbe. t bam

- brolantes are mere lack sual




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICA

sep. caic. mere. au lit (mal ie).

bry. sep. car phosph.

Soleil (mal au). 1

ant, acon. bry.

rhus, bell, pals.

agité, sulf. ars.

čham, rbab, pu

ADIIOUL RCOD. op. lyc. dulc.

leger (trop). me n-vom. ign.

non réparateu

sep. con. sil. p

profond. op.

soporeux, com: bell. n-vom. cri tardif, le soir

chin. phosph. c Sommeil avec sou

stram, bell, all,


stram.

Solitude (mai dan lyc sil. ars. dn

Sommeil altéré.

Selles branstres, verstr. ars, suif. Soir (mai le), puls chip. sec. ara. changeant de confeur, puls, erottes de mouton (en forme de). magn-m. sep. sulf. lach. difficiles, n-rom, alum, sil, chin. natr-m. sep. sulf plumb. op. dures. n-vom. calc. sep. at baryt. lach. alum. sil. sulf. ant. op. écumeuses, suif, cale, merc, chin rhus. coloc. - féndes (très-), ars. sulf. carb-vg. ail. puls cale, merc, chip, p-vom. fréquentes. Foy. Diarrhée. grisátres, merc. phos-ac, aur. rhab. dig. chin. hachées (comme), cham, rhus, puls. merc. lach. inaperçues, sulf, colch, verair, ars. puls. phos-ac. insullisantes. p-vom. calc. sulf. natr. alum. ehin. - involontaires, rhus, arn, sec. bell, byes, chin, phosph, arejaunátres, ipec, ars, merc, dalc. chin. puls. cham. - liquides. Voy. Diarrhée. - mince (d'un moule trop . mur-ac. graph, staph, caus, sep. merc. muqueuses, puls, chin, sulf, bel), phosph. mere. moqueuses et sanguinoleutes, merc. suif. ars. bep. rhus. puls. n-vom. hoires, verstr. ars merc, chin,

bep endormant (en bry. puls. calc. merc. pendant le som stram, bry. si cham. squill, cupr. non digérées (de matières), chin. ern. sulf. bry. ferr. phosph. · suite du somme vg. sulf. calc. str Somnambulisme, pales (trop), carb-veg, lyc. hep. bry, sulf, op Somnolence, sulf. e – purulentes, merc. arn. lach. canth. nitrac. sil. sulf. phos-ac, natr-m - potrides, sulf. ars. chip. carb-reg. malin (le). n-to n-vom. rhus, nitr-ac. phos-ac. natr-m. - rares, Yoy Constipation. jour (pendant) - senguinolentes. merc. sulf. puis. chin, puls, hep. ars. Phus, ipec. repas (après le . verdatres. merc. ars. puls. cham. ail, phosph. lach soir le), sulf, b veratr. ipec. volumineuses (trop). n-voin. Solles avec souffrances, merc. sulf. Soubresauts des B ceps. ars. n-rom. Thab, ars, sep, kal, sul avent l'évacuation, veratr, mere. - des tendous, rhu tart, cham, puls, caps, rhus, duic. sulf-ac byos. Soufre(mal par l'us rendant l'évacuation, verair, ars sulf, cham, merc, puls, caps, rhab. sil, n vom. sep. phosph. n-vom. veratr. ars. sulf. calc. cupr. op. hyos. c cupr. op. hyos. c Sevrage (mai par le), pula, bell, calc. - cloniques. bell. brt. veratr. hyos. Société (mal en), sep. baryt, puls, natr. - internes. ign. c cupr. bell. n-100 byes. ambr. Jann. — 8º édit., Ire part., t. II.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Spasmes toniques, op. camph. veratr. Sucur huileuse. Voy. Sucur grasse. bell. sec. cupr. stram. aug. — jaunátra. merc. ara. rhab. bell. maga.

806

Spermatorrhée, ferr. phos-ac. sulf. calc.

Sperme altéré, sulf, caus, sep., mur-ac. merc. seien.

Spharele, sec. chin. squill. lach. ars. Splénalgie, arn. sulf. acon. chin. ars.

Splénue, bry, sulf, chin, acon, ara. caps. 11-vom.

Squirrhe, con. sil, sulf, clem. sep.

bel. pet Biaphylome, aps. caic. lyc. puls. sulf. Stéatome. baryt, calç, jod, sabiu, ant.

sull. hep. Stérilité, merc. borax, phosph. cann. sulf. caus. natr-m.

Stomacace. n-vom. sulf-ac, carb-veg.

merc. boraz. ars. mercurielle, carb-veg, nitr-ac, hep.

sulf. aur. suph.

– refroidissement (après un). dulc. nvom. merc. earh-veg. Strabisme. alum. hyos. hell. puls. men.

BCC.

Stramonium (mai par l'usage du), nvom. coff. hyos. bell.

Strangurie, n-vom, puls, dule, cann. sulf, merc, canth.

Strofulus, sult. scon. bell. calc. Sucre (mai par l'abus du), ign. merc. cham, selen, acon, zinc, natr, calc.

- (désir de), kal. amm, lyc. ipec. - (répugnance pour le), caus, sulf.

graph, phosph. Sueur, merc. hep. chin. cham. op. samb, acon, sulf. natr. kal. nitr.

- acide (d'odeur), sulf. lyc. sep. mitr ac. ars. sil.

- ocre. cham. ipec. cop.

— affaiblissante, chin. merc. samb. bry. carb-au nitr. phosph.

- amère (d'odeur). dig.

— anxiété (avec), ars, natr, n-vom,cham, caus, sulf. phosph, staph.

chaude, op. cham, stram, phosph. bell. lach.

- colorant le linge, merc, ars, magn, bell, rhab, carb-an, graph, selen, facilement provoquée, suif hep. calc.

sep. chin. natr. kal. lyc. sil. - fetide, staph, baryi, puls, dule,

phosph. graph. - froide. veratr. ars. sec. camph. ipec. chin. puls. bry. n-vom. hep. carb-vg. - grasse, merc. bry, strum, chin. magn.

givante, phosph. chans. verstr. acon. Iye. ars. phos-ac.

mangeant (en). carb-veg. nitr-ac. carb-an, natr-m.

matutinale, chin, bry, sep. n-vom. phosph, rhus, bry, puls, calc, stram, moisi (d'odeur de), stann, n-vom.

nocturne, sulf. calc. sil. kal. stann. hep. phosph. puls. ars. sep. chin.

parties affectées (aux). Merc. ambr. tart. stront.

-parties couvertes (aux). bell. -putride (d'odeur). stram. n-vom. staph, carb-veg.

roidissant le linge, merc. seles. sang (d'odeur de), lyc.

sanguinolente, lach, n-mosch, crotal.

semi-laterale, puls. cocc. n-vom. bry. rhus. sulf.

sommeil (pendant le). puls. cham. ferr. chin. ars.

travail de tête (pendant un). sulf.

graph, sep. boras urine (d'odeur d'). coloc. nitr-ec. canth.

visqueuse, phosph. cham. veratr. acon lyc. ars. phos-ac.

Suintement de la peau, suif, calc. petr. merc. graph. lyc.

Suppurations, hep. lach. puls. morc. sil. sulf. asa. cham. phosph. ars.

bénignes hep. eil. sulf. puls. merc. bell, phosph. calc. lach. copicuses (trop). sulf. asa. puls.

more, sep. sil. hep. chin. phosph. calc. ars. malignes, sil. asa. merc. phosph.

hep. sulf. krees. nitr-ac. carb-vg. supprimées, arrêtées. hep. lach. sil, merc, calc

Surdité. Voyez Dysécie.

Sursauts du corps. sulf. ars. kal. bell. sil, hep. sep. carb-vg. puls. cupr.

Sycose, thui, nitr-ac, lyc. phos-ac, sabin. sass.

Syncope. Voyes Défaillance.

Syphilis. merc. nitr-ac. sur. carb-vg. carb-an. iod. lyc.

Tabac (mai par l'abus du), puls, n-vom. cocc. veralr.

Taches sur la peau. sep. con. sulf. bry. phosph. hyos. nitr-ac. ant.

bi-mches. suif. sil. sep. ass. merc. alum. natr.

807




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Taches blenes, ferr. sulf-ac. arn. Teigne squameuse, calc. sulf. graph. phosph, bell, plat.

brunes, sep. con, sulf. carb-vg. Teint. Voyes Face. nite-ac. hyos.

enivrées, nitr-ac, merc, phosph.

- écarlates, bell. merc. amm, phosph. ipec, exphorb,

-forforacées, bry, sulf. ars. sil. calc. kreos, lyc.

- hépatiques, sulf. ant. lyc. laur. sep. merc. nitr-ec.

jaunes. sep. con. suif. arn. phosph. ferr. petr.

- lépreuses, natr. sil. ars. sep.

– livides, ars. plumb. sec.

- marbrées, thui, carb-vg, natr-m. ceus, lyc. plat.

 naissance (de), carb-vg, sulf, calc. thui. suif-ac.

- poires, ars. chin, euphorb, bell. pourpres. bry. ars. con. rhus. sulfac. arn.

rosées, natr.

 rouges, aulf, arp, sulf-ac, bell. nabad. ars. sep.

- rousseur (de). lyc. suif. ant. puls. caic. mair.

- sang (de). hry. sulf-ac, arn. rhus. ers. u-vom.

– verdátres, con, ars, sep. arn,

--- vin (couleur de). ecp.

— violettes, con, phosph. Taies de la cornée, cann, cin, nitr-ac. hep. bell. sil. ouphr.

Tailleurs de pierre (maux des), sil. calc. lyc. puls. patr. ipec. sulf. nitr-ac. Talons ulcérés, sep. natr. ars. caus,

Tannes, carb-vg. bell. sulf, hep. n-vom. calc, carh-an, ars.

Teigne, sulf. calc. baryt. lyc. ars. hep. rhus. merc.

- amiantacée, ars. staph. rhus, carban. merc.

- faveuse, ars. sulf. phosph. hep. mere baryt, cale, broin.

furfuracée, ars. bry. alum. oleand. mez. calc. sulf. kal. graph. rhus.

hep, sep, staph, graph, merc.

hep. phosph. merc. ars. iyc. hep. staph. sep. graph.

merc. — sèche, sülf, baryt, calç, aur, ars. graph, thui, lach, merc.

sorpiginouse, sulf. ars. calc. sep ciem. sees. graph. dulc.

se . lyc. con, phos-ac. rhus. dulc.

Télangiectasies, puls, carb-vg, sep, ars. mitr-ac.

Tempète (mai par un temps de), sep. con, sulf. sil. rhus.

Temps changeant (mal par le), calc. suif.

carh-vg. sil, rhus. -humide (par un). pula. veratr.

dulc. rhus. carb-vg.

nébuleux (par un), rhus, mang, cham, n-mosch, chin, sep, rhod, merc. bry. sec (par un), caus, n-vom, heb, asar,

spong, acon, ipec, bry, sabad. Ténesme de l'anus, merc, suif, n-vout,

ars. rhab. caps. rhus. puls. de la vesué, puls, cana, n-vom, merc, canth, dig.

Testicules affectés. puls. aur. nitr-ac.

merc. clem. arn. zinc, rhod.

atrophiés, spong, tod.

-douloureux, sep. rhod, spong, phosac, arn, phosph.

dura, induration, clem. rhod. agn. spong.

enflammés, merc. puls, aur. nitr-ec.

gonflés, puls, sur, iod, clam, rhod, BPB,

Tétanos, op. camph. ipec. bell. sec. cic. ign. veratr.

Tèle affectée, bell. verb. sil. n-vom. ign. phosph. acon. sabin. natr-m. sabari

chaleur (de), arm. acon. sulf. bell. sep. bry. sil, - congestion (de). bell, acon. n-vom.

am, sulf. bry. op. lach.

croutes. (de). Voy. Tergne.

- douleurs (de). Foy. Céphalalgie. - fatigue (de). Foy. Méditation difficilc.

volumineuse (trop) chez les enfants. cale sulf. sil.

The de Chine (mal par l'usage du), chin, thur ferr, veratr, coff selen, lach Tie douloureux. Voy. Prosopalgie. . - humide, sulf, rhus, calc. ars, lyc. Tintement des oreilles, chin. n-vom, bell puis, cale caus, suit, con. ; impéngineuse, sulf, calc, rhus, ars. Tour de reins (suites d'un), rhus, bry,

puls, n-vom, calc. - porrigineuse. sulf. calc. rhus. Toussant (malen). n-vom. bry. phosph. acon, dros, sulf, puls, caus.

hypocondres doulouroux, n-vom. bey, dros, phosph, lach, lye, sulf, op. bep.

poitrine douloureuse, acon, phosph. bry. puls.boll, sulf, carb-vg. kal.mitr.




TABLE ALPHABETIQUE DES INDICATIONS

809

Ulchres fétides, ars. eil, merc. carb-vg. Ulchres variqueux, carb-vg. sulf. puls. sec, chin, sep. asa,

fixtuleux. calc. sil. phosph. aut. sulf. puls. carb-vg. caus.

fongueux. merc. ail. clem. petr.

lach, ars. staph,

· froid (avec sensation de). sil. ars rhus, bry, merc.

gangreneux, ara, ail. bell, sulf. chin, iach, sec.

gonfiés, sil. merc. sep. rhus, sulf.

ars, puls, bell. gristires, sil. ars, merc, caus.

- herpétiques, sulf, calc. c'em, lach. graph, all, merc, lyc. sep. rhus. indolents, phos-ac. ars, sep. carb

vg. lach. cupr. pols, phosph insensibles, op. carb-vg. sulf. phos-

ac, lyc. ars.

jaunes, cie, mere, sil, bell, puls, lardaces, merc. hep. sahin, sulf. thui. nur-ac.

– luxuriants, petr. cham, sulf, mere. ail. ara. graph,

- mercuriels, soff, hep, ultr-ac, sil asa. lyc. thui. bell, aur, lach. carb-

- noirs (qui deviennent), sil, lach. ars. mur-sc. suif.

- plats, superficiels, nitr-ac, lach, merc. thui, ars.

– profonds. merc. bell. asa., łach. – pruriteux, lyc. sil. ars. hep. puls.

rhus. phos-ac. - putrides, suif-sc, ars, sil, cycl

bell, hep. mur-ac. merc.

rongeants, phagédéniques, merc. carb-vg, sil. ars, caus, sulf. nitr-

- rouges autour, acon, sil, phosph. cham, ars. bep. lyc. ass. merc.

- saignant facilement, phosph, ars graph, hep. phos-ac. carb-vg. puls. sales au fond, merc. lach. nitr-ac.

thui, sabin. - scorbutiques, sulf-ac, ars, sil. mur-ac, amm, staph, sulf, merc.

- scrofoleux, sil. ars. sulf. cale. mere, lyc. carb-vg. asa. bep.

suppurant beaucoup. sil. chin, puls, chao sulf.

· --- pcu, ars. hep. lach. sil, merc. calc.

syphilitiques, merc, nitr-ac, thui, aur lyc, carb-vg, sil, carb-au.

- tachetés, sulf-ac, arn, ipec, ars lach. com.

ars. lyc. cans. graph. lach.

vermineux. sil. mere. sabad. ars. calc.

versuqueux, ars. sil. petr.

Brèthre affecté, cann. cauth. puls. sulf, merc. caps. n-vom.

douloureux, cann. sulf. calc. merc. arg-n. puis.

enflammé, camp. mere. D-TOM. cauth, puls, acon,

rétréci, clem. petr. dulc. sulf, rhus. p-vom.

Urinant (mal en), cann. merc. puls, nvom. sulf. calc. coloc.

event l'émission. puls. n-vom. borax, coloc. tart. arn. sulf. bry.

début de l'émission (au), merc. cauth. clem. caus.

durant l'emission, puls, cana, phos-ac, canth, merc, iye, thui, hep. fin de l'émission (à la), canth. suff.

phosph. bry. petr. - suite de l'émission (à la). canth, natr-m, coloc, hep, suif, hell, staph.

Uriner (besoin d'). n-vom. acon, puls. bry. sulf. caus. staph. n-rom.

besoin sans resultat, dig. centh. sass. n-vom. puls. sulf. sep. caus.

petr. Urines altérées, puls, sulf, acon, nvom. phos-ac. carb-vg. sass. lyc. merc.

aboudantes (trop), puls, carb-vg, phos-ac, merc, sulf, aur, spig, natr-

acide (d'odeur), merc. ambr. petr. cale, graph, nitr-ac.

acres, borax, merc, hep, caus, phosph. calc. veratr. brúlantes, merc. acon, phosph. ars.

lyc. cann. dulc. chaudes, n-vom. acon. merc. ars.

hep bry. dépôt avec), sep. arn. puls. chin.

phos ac. dulc. merc. lyc – argileux, zinc. sulf. snac. sep.


sass, kal. 1gn. amm-m. cauth. -- blanchåtre, rhus, phosph. soif.

sep. con. spig. hep. petr. faren phos ac. chin. tart. merc.

- filandreux, floconneux, mez.zine. cauth, sencg, sass, merc,

— grisatre. con, spong.hyes.mang. tart. led.

— jaunātre, zinc. cham, sulf-ac. phosph, spong, sil, chin, cupr.



810

CLIMOVES LES PLUS IMPORTANTES.

Unines gree dépôt maqueux, puis, dule. Hirines verdêtres, compà, verutr, shah, valér, natr-m, sulf, ant sulf-se, pur, phos-se, phos-se, arg, cupr, aitr, seneg, merc, ambr peir, sous, canth, krees, dule, calc, rhus, hep, fye, sep, con, kai, cann, sulf, and puis.

Typ, sep, con, kai, cann, sulf, and puis.

rougestre, puls, canth, sep netr-m. valer, nitr-ac, chin. lyc.

Açon. - amblommenz. sess. lys. sinc. ant

sil, calc, ruta, phosph. - angumolent, canth, sep. puls

phos-ac. zinc. lyc. dulc. sulf. -ecumentes, spong, chin, lach seneg.

- émises trop fréquemment, merc. arg, staph. caus. Phus, nitr, squill. cauth, petr. dulc. camph. ara.

- interrompu (en jet), con clem zinc. self, m-aus dulc. op. caus.

rhus, suif. bell, sil, duje, sep, lyc. --- punt an lit (la), bell, sulf, rhus

ein. sil. puls. sep. caua. rarement (trop), canth, puls, arm.

effam, econ, u-vom, aru.

fetides, dufe, puls, ars, phos-ac earb-vg mir ac, natr, viol-tr. · Blandreuscs. Mez zinc. canth

deseg sass, mere, cham, cann, nitr foucées, acon veratr, bell, tart bry sep. colch. merc. carb-vg. sulf. - froides. nitr-nc. agar.

- laiteuses, phos-ac aur, merc, cin. mur-ac, dule, iod, carb-vg, hep.

🖚 muqueuses, puis, duic, vaier, natr m. sulf ant. sulf-ac aur.

nuageuses phos-ac, bry, carb-vg thus nite seneg, mere, ambr. pote pales, phos ac. con. nitr. rhus. arn. puls bell stram ign coloc.

pellicule trisée (avéc) puls, phosph. culc, hep iod par, sulf.

con. sep. kal cann. sulf.

rares, peu copieuses, op. canth. staph, coich, bell, ruta. dig.

retenues, rétention d'urines stram arn lyc. cauth, cuts, acon, puls,

- saugumolentes, puls, canth, sulf ara, sep. calc. acc. caps. phosph. ipec.

troubles on sortant, ciu. sahad, con. merc. sep. cann. rhus. chio. pais.

troubles (qui deviennent), bry. phos-ac. cham rhus, caus, valer, more.

Giécus. Voy. Matrico.

Vagin affecté, sop. merc, con. sulf, bell, forr, lye.

- 'chute du , sep., merc, 11-vom, - estismmé, merc, puls, sep., sulf, lyc. n-rom.

sec (trop), lyc, bell, mere.

Yetmenux sanguins affectis, phosph. era. sulf. ars. sep. carb-vg. puls. CR US.

onflammés, acon, cham, ball, puls, stelf sep.

— froid intérieur (de). lye. Valériene (mal par l'usage de le), chaqu. . u-vom. coff. sulf.

Varicolles, puls, tart, ant, more, sulf. hell. ncom

Varices, carb-vg. puls. arm. sulf. cale. n vom. ars. lyc

enflammées puls, arn, suif, ars, spig, cale, sil, krees, zinc, n-vom, ulcérées, lyc, sil, puls, ars, lach,

sulf. tart. kreos. Variole. Voy. Potito véroie.

Varioloīdes, rhus, sulf, ball, more, ars, Voau (mai par la viando de), nitr. cale sep. caus. ipec.

Veilles prolongées (mai par les), cocc. n-vom, selen, colch, puls, ambr. Veni (mal per le), con, sulf, bry, sil,

earb veg. lyc. lach. sep. eaus. bry. est (d'). sil. acon. hep. caus. bry.

u-tom, carb-teg. nord (du), sep. caus. sil, hep. n-vom.

purulentes, clem. canth. pals, lyc. Ventre afforté, sulf, chin. sep. coloc. puls. n-vom. plumb. cham, rhus. bell.

ballonné, chin, carb-veg, suif, coloc. phosph. lyc. veratr. arn. puls.

graph.

-douloureux. Foy. Coliques. - chaleur intérieure (de). all. bell. n-vom. ers. phosph econ.

- congestion (de), sulf. n-vom, carbreg ars, caps, puis

- enflamme Voy. Enterite et Péritamile.

- froid intérieur (sousation de), sep. vératr. ars. petr. calc. phosph. sec. gouffé. Poy Flatuosités et Ascite.



hell, n-your, cale, coloc, chin.

- sensible au toucher, n-4006, merc. acon puls, hyos sulf, cham, bell.

- taches sur la peau, phosph. sep. sabad, bell. lach, canth.

Verge enflammée, cann. merc, canth. sulf sep. n-rom. zinc.

Verrues, calc. nair, caus, rhus, sulf. dulc thui. sep.

- anciennes, caus, rhus, sulf, nitr-ac

- bras (aux). esię. gity-ąc. caus, sulf. sep.

- calleuses, ant. thui, dulc, sulf. graph.

- crétiformes, thui, nitr-ac, phos-ac patr. raus.

 doigts faux', thui sep, sulf, lach. – douloureuses, caus, thui, untr. sulf.

nitr-ac mair-m. entiammées, natr. caus, suif. sil.

thui, pitr-ac. - face là la't caust sept kalt duict

grosses, caus, sep. natr. mitrac. dulc.

– mains aux', Ihui, cale, **sep, rhu**s i phosph duic, lyc. inch.

- nêz (au'. curs.

-- paupieres (aux), caus, thui, nitr-ac,

 pediculees sabin, thui, lyc dule, petites, rhus, cale, thui, sep. sulf. sass. mir-ac. dulc.

– plates, lach, dulc, cale,

- pruriteuses, thui, phosph. nitr-ac cale, euphorb.

- saignant facilement, nair, thai. mitr-ac.

--- sourcils (swx). caus.

- ulcérées, natr. caus, sil. calc. thui. ars. phosph.

yeux sous les; caus, sulf.
 Vers intestinaux. Foy. Helminthiase.
 Vert-de-gris (ma) par l'usage da), hep.
 n-vom, hell, spec, chin.

Vertiges, acon. sulf. bell. a-vom. arn. puls, con, sil, phosph, caus, lach.

congestals, acon, n-rom, bell, op.

arn, suif puls.
— estomac surcharge , par 1). puls. n-vom ant, bell.

 nerís fatigués (par les), n-vom, puís. aru. thus. chin.

– ulcares réperculés 🗯 la suite d';. sulf, calc. phosph. bell fach. cana. --- voiture (en allant en), ferr, cocc-

sulf. hep. Vessie affectée, dule, puis, canth. sulf.

Ventro gros, chez les femmes, sep. [Vessie affectés de catarrhe dulc. puls. suif. n vom, aut. phospil.

douleurs (da), cann. pals, n-vom. duic. suff.

épaississement (d', dulc.

- indammation (d), caug, puls, cauth. D-TOID, 2008.

- do col. caun canth. dig. puls. n-vom, acon,

paralysie (de), ars, bell, laur, dule, Ryos.

du col. ars. hyos. dulc. lach. bell, acon, m-aus, cic.

- polypo 'de', cale, staph, puls, con. thui, merc. al.

Vétements (géne par les, n-vom, bry-sulf, cale, lyc. bep, caus, spig.

Viande (mel par l'usage de la,. colch. calc. puls. sil. sep. ferr.

crépagnance pour la . sulf. puls. sil. lyc. sep. ign. rhus. merc. mir-26.

Vin (désir de), cale, acon, staph, bry,

sulf. sep. sil.

mal par l'usage du', nevom. coff.

op. lach, zinc, calc, sil lyc, puls, an'. is priguence pour le) lach ign. rhus, mere, huor-ac.

Vin igre (mal par l'usage du), ant. ars.

sulf, ferr. sep.
- saturae (par le), op. sulf, bell, plat. n vom ers. alem. stif-ac.

souité (par le, . puis, merc. sep. ars. chio.

Violon (mal par le jeu du), kal, cale viol-od.

Visage, Voy. Face

Visions fautastiques, bell, stram verate, hyos. op. merc. anac sulf sil. ars.

Visions physiologiques, bell, phosph aur sulf. calc. stl. sep.

auréole autour de la flamme, puls bell, sulf, rata pho-ph, cocc, sep. couleurs blanches, kal, amm sult.

ainm, phos-ac bell dig. canb.


zinc. sulf. - claires, bell, stront. Campb. n-fom. aut. faler.

blenes, lye bell, stront, stram.

kal, borax. ---- direises phosph, bell, phos-ac. cic. strain, dig nitr kal

 foucces, strong hell, sil, calc. sep, chin phosph con, nitrac. merc, cocc.

graph. a-vom. phos ac merc. — grises, phos sil, stram sep-eate, — ursces phas-ac, bell, phosph. cate, — con stram cic, nite kal, dr., sulf.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES. 812

Visiona physiologiques, couleurs jannes, sep. bell. dig. canth. stront. sil. kal. alum. salf. ars.

– noires. phosph. sil. bell. stram.

sep. magh.

- rouges, sulf, bell, byos, con. hep. stront. croc. sabad. cann, spig. dig.

- striées, sep. amm. natr-m. con. puls, bell. phosph. amm-m,

- vertes, phosph. dig. rutz. zinc. sep. stront. sulf. merc.

- éclairs, spig n-vom, nair, sec, kal. eroc, staph, bell, zinc.

- feu, flammes. apig. bell, kal. zinc. aur. puls. n-vom. caus. natr-m. hyos. mouches volantes, stram, agar, sil.

bell sep, calc, rhus, chin, phosph. objets doubles, hyos, verair, sulf, bell, sec, c.c. puls, dig, natr-m.

lyç. - éclairés (trop), hyos, valer, con.

n-vom, camph.

- éloignés (trop). stana. anac. phosph. carb-an. suif, n-mosch. stana. anac. patr-m.

- grands (trop). phosph. hyos natr-m. cupborb. laur.

petits (trop), plat, stram, hyos,
 rapprochés (trop), bovis, stram.

voilds, phosph. calc. croc. caus. sulf, bell, ruta, lyc. phos-ac, natr-m.

taches, phosph, sil. kai. amm-m. calc. sep. caus. merc. bell. aur. Voile du palais affecté, acon, merc, coff, lach, bell, suif, phosph.

Voix altérée dros, phosph, baryt, sulf.

chin, caus, iod, carb-vg. - abolie, aphonie, phosph. carb-vg.

verstr. ant, spong. bell puls, caus. - aiguë, stram, cupr, staun, - basse-taille (de). dros, chin. iod.

par. baryt. cham. arn. laur. creuse, veratr, spong, ipec, stann. samb, led, dres, caus, tart, stram,

Séc.

- criarde, stram, cupr.

- enrouée, spong, carb-vg, phosph. mang. veratr dros, puls, cele, caus. Ikible, versir, hep, canth, ang.staph,

ant, spong, chain, sec, chin. dros. hyos. chin. nitr-ac. croc.

– nasillarde, staph. lach, merc. bell. phos-ac. aur. bry. slum.

- rauque, phosph, sulf, caus, stann, seneg. men. puls. n-vom.

– sibilante, phosph, bell.

- timbre (sams). dros. spong. bcp./ phosph. phos-sc. soc.

calad, ambr. chin. carb-an, samb. cib.

Voix tremblante. merc. acon. ign. ars.

anth.

voilée, merc, camph. stann. caus. spong.chin.selen.dros.mang.graph. Vomir envie de). Voyez Nauscei

Vomissements, ipec. n-vom. ars. veratr.
puls tart. ant. sulf. bry. sil. cham.
— acides, aigres. sulf. cate. phosph.
chin. n-vom. puls. cham. ferr. bell.
— aliments inches. (deam. ferr. bell. aliments ingérés (des,. n-vom. ars. ail. phosph, bry ferr. lyc. ipec. puls. amers, bilieux. ars. verair. puls.

ipec, n-vom, cham, merc. boissons ingérées (des). aru. ail.

veratr. ipec. hyon. spong. ein. arn, fécales (de matières), op. sulf. bell.

bry. plumb. fetides, sep. are. sulf. capr. stann. n-vom. op. phosph. veratr.

nvom. ars. ipec. bell. ign. chem. hyos.

noirs, n-vom, ars. veratt, phosph.

lyc. ipec. plumb. petr. sulf-ac.
- sang (de). arn. phosph. ipec. ferr.
sulf. acon. sep. chin. puls. vers (de). cin. acon. sabad. ferr.
 sec. hyos. verstr. spig. sil.
 Vomiturition. ipec. bell. verstr. ara.

n-vom, chin. tart. merc. asar.

Vue affectée, bell, ruta, suif, phosph. sil. con. amm. sep. calc. hyos. abolie. Voyes Amaurose.

confuse des lettres (en lisant), natem. sil. graph. dros. chin. bell. lyc., hyos.

— des objets, plat. con, stram, graph, sil, lyc. iod, led.


faible chiu, cin, bell, ruia, suif. phosph. sil. calc.

obscurcissement fréquent. pale, des objets. sil. dros.

trouble, caus, phosph, sil, calc. sep, cann, ruta, hell, puls, merc, stram, Vulnérabilité de la peau, cham. petr. sil, hep, sulf, staph, nitr-ac, alum, caic.

fausse graph spong, merc. caus. Yeux affectés, bell, cuphe, scon. pula, merc. sulf. phosph. ars hep. nitr-ac. agglutination (des), sulf. ars. puls. caus, phosph. n-vom. cham. merc. caves, chin verair, ars. sec. staph. phosph. ferr. phos-ac.

cernes chin. ars. versir. staph-





- 813

TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS.

salf.

- — de jaune aitr-ac. spig. a-

- de vert, veratr.

- chassieux. ant. suif. greph. aur euphr. sil

- convulsés, cham bell, op. hyos. Atram, acon. cic.

--- crohieux autour, mere, spoug, sep. --- coffammés, Voyes Ophthalmie et Bléphárite

-- étincelants, bell. strass, hyes, acou

op. bry.

— fermes, occlusion.bell.atram.cham.

sep. croc. hep. ara. hyos. phosph. - fixes, regard fixe. hyes. ars. stram,

bell, phos-ac, cic, op. sulf. -- froid (sensation de), plat, sam. lyc.

Youx cernés, de biou, versir, ara.; Youx injectés, merc, acon, ign, bell, chin, lac, cham, n-vom, phos-ac. ars, ambr, sulf, lach, spig, phosàc.

jaunes, merc. chia, bell. ars. dig.

larmoyants, puls, enphr. self. econ, phosph. ars. bep. ant. bry. staph. calc.

pr éminents. hyos. soan. spong.

bell, hep, ara veratr, ars. rouges, acon, bell, more cham. ant. sep. phosph. cuphr. bey. puls.


suppurants, euphr. caus. nitr-ac bell. more, krees, puls hep, sulf, ternes, ope bell, verair, chin

merc. hyos. strats.

z


com. hal. caie.
- gonflés, bell. sulf. acon. puls. bry. Zonn. rhos. graph. sulf. ara. puls. rhus. caic. merc. cuphr:
- caus. merc. bry.

FIN DU TOME SECOND ET DE LA MATIÈRE MÉDICALE.



LIBRAIRIE J.-B. BARLIÈRE ET FILS.


814	Librairie JB.	Ballière et fils.	
		opathique, publiées par une Socion de 1834-1857; 6 vol. in-8. 30	
Recueil nos jour in-8	de toutes les observe rs. Paris, 1830-1839	x). Clinique homosopathique, ations pratiques recueillies jusq 9. Ouvrage complet. 9 forts v	ol. fr.
monts s	ur l'economie animale	génétiques de plusieurs médi e dans l'état de santé. Paris, 184 bleaux in-folio 5	45;
pathique la matic Paris, 1	ie, pour servir de guie ère médicale pure, tra 846; 1 vol. grand in- ôtés du corps ainsi e	Manuel de thérapeutique home de au lit des malades et à l'étude aduit de l'allemand par le D. Ro -12, avi-570 pages	de = fr.
BOURGEO	ruxelles, 1×57 ; in-8 d OIS. Les Passions da adies, par le docteur l	le vin-24 pages 1 fr. ins lours rapports avec la santé L. X. Bounggois. — L'Amour et igmentée. Paris, 1871; in-12, ?	50 - et =
pages. Bulletin e paraissa cahiers Paris.	de la Société médi int le les de chaque : d'au moins 1 feuille	icale homosopathique de Francis, depuis le 1er mai 1860, es in-8. Abonnement d'un an p	fr. 100, par
in-8, 4 0	8 pages	r de l'homœopathie. Paris, 18	fr.
ancien i	nterne des hôpitaux d	ormes et son unité, par J. Davas le Paris. Paris, 1865; 1 vol. in-8	ssz, de fr.
médical	le et thérapeutique l	éthodique et pratique de mati basé sur la loi des semblables. Pa pages	ris, .
physiolo pages	ogique et philosophie	générale. Traité d'Anthropolo que. Paris, 1863; in-8 de xvi- 11	854 l fr.
		Étude sur nos traditions, tome	
GRANIER 1858; in	t (Місикі). Confére a-8, viii-524 pages .	ences sur l'Hommopathie. Pe	aris, i fr.
- Dea E	es	bears dreits. Paris, 1860; in-	3 de -



LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS.

815

ARTMANN. Thérspeutique homospathique des maladies des carrants. Traduit de l'allemand avec des notes, par le docteur Lion Smos fils, membre de la Société gallicane de médecine homosopathique. Paris, 1853; 1 vol. in-8 de 700 pages. . 8 fr. TRSCHEL (B.). Guide du Médecin hommopathe au lit du malade et répertoire de thérapeutique homosopathique. Traduit de l'allemand par le docteur Léon Smon fils. Paris, 1858; 1 vol. 3 fr. 50 **DFFM**ANN (Acr.) **L'Hommopathie** et la vicille médecine. Paris, - L'Hommopathie exposée aux gens du monde. Paris, 1870; Traduction nouvelle sur la 12º édition allemande, augmentée d'indications nombreuses et précédée de conseils d'hygiène et de thérapeutique générale, par Léon Smon fils. Paris, 1867; in-18 écus, 738 pages avec 168 figures, cartonné 7 fr. BERT-GOURBEYRE. Lectures publiques sur l'hommopathie. OUSSET (P.). Eléments de médecine pratique, contenant le traitement homœopathique de chaque maladie. Paris, 1868; Court de la Pomenais. Paris, 1863; in-8, 555 pages. (7 fr.) 4 fr. IARCHANT (Léon). Etudo sur les maladies épidémiques, avec une réponse aux quelques réflexions sur le mémoire de l'angine épidémique. Seconde édition, corrigée et augmentée. Paris, 1861; DNESTROL (J. de). De l'Homospathie en dehors des préjugés **de ses adversaires** et des exagérations de ses partisans. Paris, 1861; 1 vol. in-18 jésus, 72 pages 1 fr. OLINARI (Ph. de). Guido de l'hommopathiste, indiquant les moyens de se traiter soi-même dans les maladies les plus communes en attendant la visite du médecin. Seconde édition. Bruxelles, 1861; in-18 de 288 pages TURE (B.). Doctrine de l'école de Rio-Janeiro et Pathogénésie brésilienne, contenant une exposition méthodique de l'Homœopathie, la loi fondamentale du dynamisme vital, la théorie des doses et des maladies chroniques, les machines pharmaceutiques, l'algèbre symptomatologique, etc. Paris, 1840; in-12 de 400 pages, avec 57 figures intercalées dans le texte . . . 6 fr. IINEZ. Etudo médicalo sur lo venin de la tarentule, d'après la méthodo de Hahnekann, suivie de quelques indications théenpeutiques et de notes cliniques, traduite par le docteur J. Perry. Paris, 1869; 1 vol. in-8, 268 pages, 2 figures. 4 fr. RIARD. L'Homosopathie mise à la portée de tout le monde 80 édition. Paris, 1863; in-18 jésus 4 fr.



LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS.

816

PARSEVAI. (Lab. de). Observations pratiques de Samuel Hahnemann, et classifications de ses recherches sur les propriétés caractéristiques des médicaments. Paris, 1860; in%, 398 pages. 6 fr. PROST-LACUZON (J.). Formulaire pathogénétique usuel, on Guide homospathique pour traiter soi-même les meladies. Troisième édition, corrigée et augmentee, avec figures. Paris, 1872; in-18 jésus de 584 pages. 6 fr. PROST-LACUZON et BERGER. Dictionnaire vétérinaire hemospathique ou Guide homospathique pour traiter soi-même les maladies des animaux domestiques. Paris, 1865; in-18, 486 pages. 4 fr. 50 RAPOU. Histoire de la doctrine médicale homospathique, son état actuel dans les principales contrées de l'Europe. Application pratique des principales contrées de l'Europe. Application pratique des maladies. Paris, 1847; 2 forts vol. in-8. 15 fr. RUOFF (A. J. F.). Guide de l'Homospathe, ou traitement de plus de mille maladies, divisé en deux parties: la première contient l'indication des maladies sous les dénominations nosologiques de l'ancienne école, les symptômes de ces maladies et les remèdes qui leur ont été opposés avec succès; la liste des médicaments par ordre alphabetique, et à la suite du nom de chaque substance les affections gueries par son emploi, etc. Traduit de l'allemand par Q. L. Straavss. Deuxième édition. Paris, 1851; in-18, vin-460 pages. 5 fr. SIMON (Léon) ûls Des Maladies vénériennes et de leur traitement homosopathique, Paris, 1860, 1 vol. in-18 jésus de 745 pages. 3 fr. L'ouvrage de M. Samon se compose de deux parties; la première comprend l'examen des questions de pathologie et de therapeuique génerales souverés per les syphilographes; la deux-neur est consacrée à la description de chaque variété de la maladie et à l'indication des médicaments capables d'en triompher. 6 des deux parties; la première comprend l'examen des questions de pathologie et de therapeuique génerales souveres per les syphilographes; la deux-neure est consacrée à la description de chaque variété de la maladie et à l'indication des méd
triompher. — Cours de médeoine homosopathique, 1867-1868. De l'Unité de la doctrine de Halingmann. Paris, 1869; in-8
Cours de médecine homœopathique, 1867-1868. De l'Unité de la doctrine de Hahnemann. Paris, 1869; in-8
TESTE. Systématisation pratique de la Matière médicale homose- pathique. Paris, 1853; 1 vol. in-8 de 600 pages. 3 fr Traitement homosopathique des maladies aiguës et des mala- dies chroniques des enfants. Deuxième édition, revue et aug- mentée. Paris, 1856; in-12 de 416 pages. 4 fr. 50 WEBER (Georges P. F.). Codex des médicaments homosopathiques, ou Pharmacopée pratique et raisonnée à l'usage des médecins et des pharmaciens. Paris, 1854; iu-12, xu-440 pages. 6 fr.

